DAX MEDIDAS COLUNAS E CÁLCULOS BÁSICOS

Iteradores variáveis e divisão segura

Construir medidas que respeitem a unidade de cálculo.

Some o produto de cada linha

Microcaso didático de itens, fora das tabelas ST1.

Quantidade	Preço	Subtotal
2	R$ 100	R$ 200
3	R$ 50	R$ 150

SUMX

R$ 350

Soma dos produtos: 2 × 100 + 3 × 50 = 350

Multiplicar as somas daria 750 e mudaria o cálculo.

ENTENDA

Uma agregação de coluna e um iterador não são equivalentes em qualquer situação. SUM soma valores existentes. SUMX avalia uma expressão para cada linha de uma tabela e soma seus resultados.

OBSERVE

Variáveis tornam a expressão legível e evitam repetir a mesma expressão no mesmo escopo.

APLIQUE

DIVIDE permite definir o comportamento quando o denominador é zero ou branco. Um branco pode comunicar que o cálculo não se aplica.

PARA FIXAR

Dois itens têm 2 unidades a R$ 100 e 3 a R$ 50. Escolha o valor total correto.

DEMONSTRAÇÃO E CONFERÊNCIA

Coloque em prática

Construir medidas que respeitem a unidade de cálculo.

```
Valor Itens = SUMX(Itens, Itens[Quantidade] * Itens[PrecoUnitario])
Ticket Medio = DIVIDE(SUM(FatoContratos[ValorMensal]), [Contratos])
```

Exemplo de código da aula · Confira nomes e separadores no Desktop.

01 Crie uma medida com SUMX em uma tabela de itens de teste.

02 Compare com o produto das somas.

03 Reescreva uma taxa com VAR.

04 Teste denominador zero.

05 Confira o efeito de COALESCE.

06 Formate o resultado sem converter para texto.

ATENÇÃO

Multiplicar soma de quantidades por soma de preços produz um valor sem correspondência com os itens.

COMO CONFERIR

R$ 350, pela soma de 2×100 e 3×50. O produto das somas, 5×150, produziria R$ 750 incorretamente.