

Capítulo 5 | Algumas distribuições de probabilidade secretas

5.2 Distribuição uniforme discreta

Distribuição uniforme discreta


Se a variável X assume os valores x_1, x_2, \dots, x_k com igual probabilidade, então a distribuição uniforme discreta é dada por

$$f(x; k) = \frac{1}{k}, \quad x = x_1, x_2, \dots, x_k.$$

Teorema 5.1

A média e a variância da distribuição uniforme discreta $f(x; k)$ são

$$\mu = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i \quad \text{e} \quad \sigma^2 = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2.$$



5.3 Distribuições binomial e multinomial

A rigor, o processo de Bernoulli deve ter as seguintes propriedades:

1. O experimento consiste em n tentativas repetidas.
2. Cada tentativa gera um resultado que pode ser classificado como sucesso ou falha.
3. A probabilidade de sucesso, denotada por p , *se mantém* constante de tentativa para tentativa.
4. As tentativas repetidas são independentes.

Distribuição binomial

Uma tentativa de Bernoulli pode resultar em um sucesso com probabilidade p , ou em uma falha, com probabilidade $q = 1 - p$. Então, a distribuição de probabilidade da variável aleatória X , o número de sucessos em n tentativas independentes, é

$$b(x; n, p) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}, \quad x = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Teorema 5.2

A média e a variância da distribuição binomial $b(x; n, p)$ são:

$$\mu = np \text{ e } \sigma^2 = npq.$$

Distribuição multinomial

Se certa tentativa pode resultar em k resultados E_1, E_2, \dots, E_k , com probabilidades p_1, p_2, \dots, p_k , então a distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias X_1, X_2, \dots, X_k , representando o número de ocorrências de E_1, E_2, \dots, E_k em n tentativas independentes, é

$$\begin{aligned} & f(x_1, x_2, \dots, x_k; p_1, p_2, \dots, p_k, n) \\ &= \binom{n}{x_1, x_2, \dots, x_k} p_1^{x_1} p_2^{x_2} \cdots p_k^{x_k}, \end{aligned}$$

com

$$\sum_{i=1}^k x_i = n \quad \text{e} \quad \sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

5.4 Distribuição hipergeométrica

Distribuição hipergeométrica

A distribuição de probabilidade da variável aleatória hipergeométrica X , o número de sucessos em uma amostra aleatória de tamanho n selecionada de N itens dos quais k são chamados de *sucessos* e $N - k$ de *falhas*, é

$$h(x; N, n, k) = \frac{\binom{k}{x} \binom{N-k}{n-x}}{\binom{N}{n}},$$

$$\max\{0, n - (N - k)\} \leq x \leq \min\{n, k\}.$$

Teorema 5.3

A média e a variância de uma distribuição hipergeométrica $h(x; N, n, k)$ são

$$\mu = \frac{nk}{N} \quad \text{e} \quad \sigma^2 = \frac{N-n}{N-1} \cdot n \cdot \frac{k}{N} \left(1 - \frac{k}{N}\right).$$

5.5 Distribuições binomial negativa e geométrica

Distribuição binomial negativa

Se tentativas independentes repetidas podem resultar em um sucesso com probabilidade p e em uma falha com probabilidade $q = 1 - p$, então a distribuição de probabilidade da variável aleatória X , o número da tentativa na qual o k -ésimo sucesso ocorre, é

$$b^*(x; k, p) = \binom{x-1}{k-1} p^k q^{x-k}, \quad x = k, k+1, k+2, \dots$$

Teorema 5.4

A média e a variância de uma variável aleatória que segue a distribuição geométrica são

$$\mu = \frac{1}{p}, \quad \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}.$$

5.6 Distribuição de Poisson e o processo de Poisson

Distribuição de Poisson

A distribuição de probabilidade da variável aleatória de Poisson X , que representa o número de resultados que ocorrem em certo intervalo de tempo ou em uma região específica denotados por t , é

$$p(x; \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \dots,$$

onde λ é o número médio de resultados por unidade de tempo, distância, área ou volume, e $e = 2,71828\dots$

Teorema 5.5

Tanto a média quanto a variância da distribuição de Poisson $p(x; \lambda t)$ são λt .

Teorema 5.6

Seja X uma variável aleatória binomial com distribuição de probabilidade $b(x; n, p)$. Quando $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$ e $np \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu$ permanece constante,

$$b(x; n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} p(x; \mu).$$

