

Конспект лекций по предмету

Математическая физика

для специальности «Прикладная механика»

Учебный год 2020 – 2021

Содержание

1. Уравнения и краевые задачи математической физики	6
1.0. <i>Προλεγόμενα</i>	6
1.1. Уравнения движения материальной частицы	6
1.2. Уравнение <i>Лапласа</i> (вывод уравнения <i>Лапласа</i> для гравитационного и электростатического полей)	9
1.3. Уравнение теплопроводности (представление о тепловой энергии и теплороде; объемная плотность тепловой энергии; поверхностная плотность потока тепловой энергии; закон теплопроводности <i>Фурье</i> ; уравнение переноса тепловой энергии в интегральной и дифференциальной формах)	13
1.4. Уравнение колебаний (предположения о малых поперечных колебаниях гибкой нерастяжимой струны, уравнение малых поперечных колебаний струны в интегральной и дифференциальной формах, уравнение малых поперечных колебаний мембраны, уравнение малых продольных колебаний среды)	20
1.5. Уравнения и краевые задачи математической физики ()	23
1.6. Задачи	27
1.7. Пояснения	28
2. Канонический вид линейных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными	30
2.0. <i>Προλεγόμενα</i>	30
2.1. Основные определения	31
2.2. Общее преобразование независимых переменных	33
2.3. Приведение к каноническому виду	36
2.4. Алгоритм приведения к каноническому виду	43
2.5. Примеры приведения к каноническому виду	47
2.6. Задачи	56
2.7. Пояснения	58
3. Метод разделения переменных и специальные функции	59
3.0. <i>Προλεγόμενα</i>	59
3.1. Введение в метод разделения переменных	59
3.2. Операторы ∇ и Δ в криволинейных ортогональных координатах	61
3.3. Задача <i>Штурма – Лиувилля</i> на отрезке	64
3.4. Общее решение уравнения <i>Лапласа</i> в полярных переменных	69
3.5. Задачи	72
3.6. Пояснения	73
4. Задачи для уравнений эллиптического типа	74
4.0. <i>Προλεγόμενα</i>	74
4.1. Постановки основных задач для уравнений <i>Лапласа</i> и <i>Пуассона</i>	74
4.2. Задачи <i>Дирихле</i> для уравнения <i>Лапласа</i> внутри и вне круга	74
4.2.1. Постановка внутренней задачи <i>Дирихле</i>	74

4.2.2.	Решение внутренней задачи <i>Дирихле</i> методом разделения переменных	75
4.2.3.	Решение внутренней задачи <i>Дирихле</i> с помощью интеграла <i>Пуассона</i>	75
4.2.4.	Обоснование решения внутренней задачи <i>Дирихле</i>	76
4.2.5.	Постановка внешней задачи <i>Дирихле</i>	76
4.2.6.	Решение внешней задачи <i>Дирихле</i> методом разделения переменных .	77
4.2.7.	Решение внешней задачи <i>Дирихле</i> методом <i>Кельвина</i>	77
4.2.8.	Обоснование решения внешней задачи <i>Дирихле</i>	78
4.2.9.	Примеры решения внутренней и внешней задач <i>Дирихле</i>	79
4.3.	Задачи	94
4.4.	Пояснения	95
5.	Задачи для уравнений параболического типа	96
5.0.	<i>Προλεγόμενα</i>	96
5.1.	Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями <i>Дирихле</i>	96
5.1.1.	Постановка задачи	96
5.1.2.	Решение задачи методом разделения переменных	96
5.1.3.	Обоснование метода разделения переменных ()	103
5.1.4.	Примеры решения задачи методом разделения переменных	103
5.2.	Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями <i>Неймана</i>	106
5.2.1.	Постановка задачи	106
5.2.2.	Решение задачи методом разделения переменных	106
5.3.	Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями <i>Робена</i>	111
5.3.1.	Постановка задачи	111
5.3.2.	Решение задачи методом разделения переменных	111
5.4.	Сводные сведения о решении краевых задач для пространственно одномерного уравнения теплопроводности	118
5.5.	Задачи	120
5.6.	Пояснения	120
6.	Задачи для уравнений гиперболического типа	121
6.0.	<i>Προλεγόμενα</i>	121
6.1.	Краевая задача для пространственно одномерного волнового уравнения с граничными условиями <i>Дирихле</i>	121
6.1.1.	Постановка задачи	121
6.1.2.	Решение задачи методом разделения переменных (метод разделения переменных; метод вариации произвольной постоянной)	121
6.1.3.	Обоснование метода разделения переменных ()	129
6.1.4.	Примеры решения задачи	129
6.2.	Задачи	134
6.3.	Пояснения	134

7. Ряды Фурье	142
7.0. Προλεγόμενα	142
7.1. Разложение функции в ряд Фурье (определение ряда Фурье; условия разложимости функции в ряд Фурье; условия почленного дифференцирования ряда Фурье)	142
7.2. Различные виды записи ряда Фурье (чётное и нечётное продолжение функции; разложение функции в ряд Фурье по косинусам и синусам; комплексный ряд Фурье) . .	143
7.3. Примеры разложения функций в ряд Фурье (разложение кусочно-непрерывных функций, заданных на: 1) симметричном промежутке $[-\ell, +\ell]$; 2) несимметричном промежутке $[0, +\ell]$, с возможностью чётного и нечётного продолжения на промежуток $[-\ell, 0]$)	145
7.4. Задачи	154
7.5. Пояснения	154
Список литературы	155

1. Уравнения и краевые задачи математической физики

1.0. Προλεγόμενα

Основным источником уравнений с частными производными являются модели сплошных сред математической и теоретической физики. [6]

1.1. Уравнения движения материальной частицы

Вообразим пустое трёхмерное пространство, в котором движутся материальные точки (далее будем говорить о *материальных частицах*, см. определение 1.2). Для того, чтобы различать места в пространстве, то есть геометрические точки, введём понятие *системы координат*. Последняя определена заданием: 1) некоторой отсчётной геометрической точки в пространстве и 2) направлений. В пустом пространстве такую точку выбрать невозможно, поэтому выберем некоторую материальную частицу, из которой выведем взаимно перпендикулярные направления. Таковыми могут быть выбраны направления на удалённые материальные частицы, например, на *неподвижные звёзды*. Итак, мы завершили взаимно однозначное сопоставление геометрических точек и троек чисел — декартовых ортогональных координат, подтверждаемое человеческим опытом (то есть в нашем трёхмерном пространстве есть евклидово, поскольку мы можем измерять расстояния между геометрическими точками и углы между направлениями, см. задачу 1.1 на с. 27).

Для того, чтобы можно было изучать последовательную смену материальной точкой своих положений в пространстве, то есть пребывание материальной частицы в различных геометрических точках, к системе координат прибавим часы, хотя природа измеряемого ими времени нам не вполне понятна (или даже так — вполне непонятна). Мы просто соотносим время с некоторым непрерывным параметром t , с помощью которого упорядочиваем положения материальной точки в пространстве, в общем случае — различные события (значениям параметра, меньшим соотносимого с текущим мгновением значения t , соответствуют предшествующие события, то есть произошедшие в предшествующие мгновения, а бóльшим значениям параметра — последующие события, см. пояснение).

После того, как мы обсудили и, тем самым, ввели в оборот *основные* (или *первичные*, то есть не определяемые строго) *понятия*, введём *определения*, а затем перейдём к *аксиомам*, которые в механике называются законами *Ньютона* (их обоснованность есть следствие обобщения наблюдений, подобно обоснованности аксиом евклидовой геометрии).

Определение 1.1. *Системой отсчёта* называется система координат, в каждой точке которой находятся одинаково идущие (синхронизированные) часы. □

Определение 1.2. *Материальной частицей* называется материальное тело, размерами которого в условиях данного движения можно пренебречь. □

Каждой материальной частице ставится в соответствие параметр m , принимающий действительные положительные значения и называемый *массой*. Масса частицы с течением времени сохраняется, то есть $m = \text{const}$, что выражает *закон сохранения массы*.

Одну инерциальную систему отсчёта, связанную с некоторым наблюдателем, будем называть *лабораторной*. Декартовы ортогональные координаты геометрической точки в лабораторной системе отсчёта будем обозначать x, y, z , а орты соответствующих осей —

$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$. Любую точку пространства в лабораторной системе координат можно указать вектором

$$\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}. \quad (1.1)$$

Определение 1.3. Закон движения материальной частицы есть функция геометрического положения частицы от времени

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\varphi}(t), \quad t \in [t_1, t_2], \quad (1.2)$$

траектория частицы — образ отображения $[t_1, t_2] \rightarrow \mathbb{R}^3$, первая и вторая производные закона движения (1.2)

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\boldsymbol{\varphi}}(t), \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = \ddot{\boldsymbol{\varphi}}(t) \quad (1.3)$$

суть скорость и ускорение материальной частицы. \square

Аксиома 1.1. Существует система отсчёта, называемая *инерциальной*, в которой изолированная материальная частица (не испытывающая действия какой-либо силы) сохраняет состояние покоя или равномерного и прямолинейного движения (*первый закон механики Ньютона*). \square

Замечание 1.1. Поскольку скорость материальной частицы в инерциальной системе отсчёта постоянна, то есть $\mathbf{v} = \dot{\boldsymbol{\varphi}}(t) = \text{const}$, закон движения материальной частицы $\mathbf{r} = \boldsymbol{\varphi}(t) \equiv \mathbf{r}_0 + t\mathbf{v}$ есть равномерное движение вдоль прямой или состояние покоя. Очевидно, что любая система отсчёта, движущаяся равномерно и прямолинейно относительно инерциальной системы отсчёта, также будет инерциальной. Это значит, что указанная в аксиоме 1.1 система отсчёта не единственная. \square

Аксиома 1.2.
(принцип детерминизма Галилея-Ньютона) \square

Аксиома 1.3.
(принцип детерминизма Галилея-Ньютона) \square

Аксиома 1.4. В инерциальной системе отсчёта скорость изменения количества движения $\mathbf{p} := m\mathbf{v}$ материальной частицы, находящейся в мгновение времени t в точке пространства \mathbf{r} , равна действующей на материальную частицу силе \mathbf{F}

$$\dot{\mathbf{p}} = m\dot{\mathbf{v}} = m\mathbf{a} = \mathbf{F}(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}) \quad (1.4)$$

(второй закон механики Ньютона в дифференциальной форме). \square

Замечание 1.2. Проинтегрировав обе части (1.4) вдоль траектории за конечный промежуток времени, то есть при известном законе её движения (1.2), получим, что изменение количества движения материальной частицы равно импульсу действующей силы

$$\mathbf{p}(t_2) - \mathbf{p}(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F}(t, \boldsymbol{\varphi}(t), \dot{\boldsymbol{\varphi}}(t)) \, dt \quad (1.5)$$

(второй закон механики Ньютона в интегральной форме). \square

Теорема 1.1. Умножив обе части (1.4) скалярно на скорость \mathbf{v} материальной частицы, будем иметь уравнение *кинетической энергии* K (или *живой силы*, см. пояснение 1.1 на с. 28), $2K = m\mathbf{v}^2$, в *дифференциальной форме*

$$\dot{K}(t) = \mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{F}(t, \mathbf{r}, \mathbf{v}), \quad (1.6)$$

то есть скорость изменения кинетической энергии K материальной частицы равна мощности $\mathbf{v} \cdot \mathbf{F}$ силы, действующей на последнюю. \square

Доказательство. ■

Замечание 1.3.

Интегральная форма уравнения энергии может быть получена интегрированием обеих частей дифференциальной формы вдоль траектории за конечный промежуток времени

$$K(t_2) - K(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{v} \, dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{x}. \quad (1.7)$$

то есть изменение кинетической энергии материальной частицы равно работе действующей силы.

Определение 1.4. Градиентом скалярной функции $u(\mathbf{r})$ пространственных переменных называется векторная функция $\mathbf{a}(\mathbf{r})$ этих же переменных, вычисляемая по формуле

$$\mathbf{a}(\mathbf{r}) = \nabla u(\mathbf{r}) = \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u(x, y, z)}{\partial z} \mathbf{k}, \quad (1.8)$$

где выражение

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k} \quad (1.9)$$

называется (дифференциальным) оператором *Гамильтона*. \square

Определение 1.5. Действующая на материальную частицу сила называется *консервативной*, если существует *потенциальная функция* $V(\mathbf{r})$ (также *потенциал*, *потенциальная энергия*) или, что то же самое, *силовая функция* $U(\mathbf{r})$, такая что

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -\nabla V(\mathbf{r}) = \nabla U(\mathbf{r}); \quad (1.10)$$

при этом потенциальная и силовая функции положения в пространстве определены с точностью до постоянной, то есть: $\nabla V(\mathbf{r}) = \nabla(V(\mathbf{r}) + C)$, $\nabla U(\mathbf{r}) = \nabla(U(\mathbf{r}) + C)$, а сила есть однозначная функция положения в пространстве. \square

Теорема 1.2. Пусть действующая на материальную частицу сила консервативна, тогда уравнение кинетической энергии (1.6), (1.7) допускает запись в виде уравнения сохранения энергии в дифференциальной (скорость изменения энергии материальной частицы равна нулю)

$$\dot{E}(t) = \dot{K}(t) + \dot{V}(t) = 0 \quad (1.11)$$

и интегральной (энергия материальной частицы есть величина постоянная)

$$E(t) = K(t) + V(t) = \text{const} \quad (1.12)$$

формах, где $E(t) = K(t) + V(t)$ — (полная) энергия материальной частицы. \square

Доказательство. Для консервативной силы, как функции положения в пространстве, верно представление (1.10), откуда следует, что правая часть уравнения кинетической энергии в дифференциальной форме (1.6) может быть записана так

$$\mathbf{v}(t) \cdot \mathbf{F}(\varphi(t)) = \left[\frac{d\mathbf{r}}{dt} \cdot (-\nabla V(\mathbf{r})) \right]_{\mathbf{r}=\varphi(t)} = - \left[\frac{d\mathbf{r} \cdot \nabla V(\mathbf{r})}{dt} \right]_{\mathbf{r}=\varphi(t)} = - \frac{dV(\varphi(t))}{dt} = -\dot{V}(t),$$

где производная сложной функции $V(\varphi(t))$ по t обозначена как $\dot{V}(t)$ для простоты записи. Но тогда уравнение кинетической энергии (1.6) принимает вид $\dot{K}(t) = -\dot{V}(t)$, а значит допускает запись (??). Из полученной выше записи правой части (??) сразу же следует интегральная форма уравнения сохранения энергии (1.12). \blacksquare

1.2. Уравнение Лапласа

Материальными частицами, как идеализацией протяжённых тел, будем называть любые тела, если их размеры (наименьшие радиусы описанных вокруг тел сфер) намного меньше расстояния между телами (центрами описанных сфер). Закон всемирного тяготения *Ньютона* позволяет вычислить взаимное притяжение материальных частиц, если известны их массы и положения в определённые мгновения времени в инерциальной системе отсчёта (для удобства положим систему координат декартовой ортогональной с базисом $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$). Пусть центры двух шаров (рис. 1.1, а), массы которых суть M и m , находятся соответственно в геометрических точках $\mathbf{r}_0 = (x_0, y_0, z_0)$ и $\mathbf{r} = (x, y, z)$, а радиусы шаров намного меньше расстояния δ между центрами, где

$$\delta^2 = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2, \quad (1.13)$$

тогда величина силы взаимного притяжения материальных частиц (рис. 1.1, б), которыми заменим шары, равна

$$F = \frac{\gamma m M}{\delta^2}, \quad (1.14)$$

где $\gamma = 6,67430 \cdot 10^{-11} \text{ м}^3 \text{ с}^{-2} \text{ кг}^{-1}$ ($\text{Н м}^2 \text{ кг}^{-2}$) — гравитационная постоянная, а массы частиц выражены в килограммах.




Рис. 1.1. Силу взаимного притяжения двух шаров массы m и M , центры которых расположены в точках пространства \mathbf{r}_0 и \mathbf{r} (а) можно вычислить по закону тяготения *Ньютона* (1.14), заменив шары материальными частицами (б)

Если выполнено условие $m \ll M$, то можно пренебречь влиянием материальной частицы массы m на положение материальной частицы массы M , откуда заключаем, что положение первой меняется с течением времени, а положение последней — неизменно.

Введём орт (единичный вектор) \mathbf{e} направления от точки \mathbf{r}_0 к точке \mathbf{r}

$$\mathbf{e} = \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_0}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|} = \frac{x - x_0}{\delta} \mathbf{i} + \frac{y - y_0}{\delta} \mathbf{j} + \frac{z - z_0}{\delta} \mathbf{k},$$

тогда силу притяжения, действующую со стороны материальной частицы M на материальную частицу m , запишем так

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = -F \mathbf{e} = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \mathbf{e} = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}, \quad (1.15)$$

где компоненты (F_x, F_y, F_z) вектора \mathbf{F} суть

$$F_x(\mathbf{r}) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{x - x_0}{\delta}, \quad F_y(\mathbf{r}) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{y - y_0}{\delta}, \quad F_z(\mathbf{r}) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{z - z_0}{\delta}. \quad (1.16)$$

Очевидно, что для силы притяжения \mathbf{F} (1.22), (1.16) можно указать силовую функцию

$$U(\mathbf{r}) = \frac{\gamma m M}{\delta}, \quad (1.17)$$

такую, что

$$\mathbf{F} = \nabla U = \frac{\partial U}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial U}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial U}{\partial z} \mathbf{k}, \quad (1.18)$$

или

$$F_x = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad F_y = \frac{\partial U}{\partial y}, \quad F_z = \frac{\partial U}{\partial z}.$$

В самом деле, вычислим частные производные функции (1.27) по переменным x, y, z

$$\begin{aligned} \frac{\partial U}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\gamma m M}{\delta} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\gamma m M \delta^{-1} \right) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{\partial \delta}{\partial x} = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{x - x_0}{\delta}, \\ \frac{\partial U}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\gamma m M}{\delta} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\gamma m M \delta^{-1} \right) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{\partial \delta}{\partial y} = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{y - y_0}{\delta}, \\ \frac{\partial U}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\gamma m M}{\delta} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\gamma m M \delta^{-1} \right) = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{\partial \delta}{\partial z} = -\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{z - z_0}{\delta}, \end{aligned}$$

где

$$\frac{\partial \delta}{\partial x} = \frac{x - x_0}{\delta}, \quad \frac{\partial \delta}{\partial y} = \frac{y - y_0}{\delta}, \quad \frac{\partial \delta}{\partial z} = \frac{z - z_0}{\delta}.$$

Теперь вычислим вторые производные силовой функции

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(-\frac{\gamma m M}{\delta^2} \frac{x - x_0}{\delta} \right) = -\gamma m M \frac{\partial}{\partial x} \left(\delta^{-3} (x - x_0) \right) = \\ &= -\gamma m M \left(-3 \delta^{-4} \frac{\partial \delta}{\partial x} (x - x_0) + \delta^{-3} \right) = -\gamma m M \left(-3 \frac{x - x_0}{\delta^4} \frac{\partial \delta}{\partial x} + \frac{1}{\delta^3} \right) = \\ &= -\gamma m M \left(-3 \frac{(x - x_0)^2}{\delta^5} + \frac{1}{\delta^3} \right), \\ \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} &= -\gamma m M \left(-3 \frac{(y - y_0)^2}{\delta^5} + \frac{1}{\delta^3} \right), \\ \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= -\gamma m M \left(-3 \frac{(z - z_0)^2}{\delta^5} + \frac{1}{\delta^3} \right), \end{aligned}$$

а затем сложим их

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= -\gamma m M \left(-3 \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}{\delta^5} + 3 \frac{1}{\delta^3} \right) = \\ &= -\gamma m M \left(-3 \frac{\delta^2}{\delta^5} + 3 \frac{1}{\delta^3} \right) = 0. \end{aligned}$$

Это значит, что силовая функция удовлетворяет уравнению в частных производных

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = 0, \quad (1.19)$$

называемому уравнением *Лапласа*. С помощью дифференциального оператора *Лапласа*

$$\Delta := \nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.20)$$

уравнение *Лапласа* (1.19) допускает краткую запись

$$\Delta U = 0. \quad (1.21)$$

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}) = - \sum_{i=1}^n \frac{\gamma m m_i}{\delta_i^2} \mathbf{e}_i = F_x \mathbf{i} + F_y \mathbf{j} + F_z \mathbf{k}, \quad (1.22)$$

$$U(\mathbf{r}) = \sum_{i=1}^n \frac{\gamma m m_i}{\delta_i}, \quad (1.23)$$

$$\delta_i^2 = |\mathbf{r} - \mathbf{r}_i|^2 = (x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 + (z - z_i)^2, \quad (1.24)$$

$$\rho d\omega = \rho d\xi d\eta d\zeta \quad (1.25)$$

$$U(\mathbf{r}) = \gamma m \iiint_{(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega} \frac{\rho(\xi, \eta, \zeta) d\xi d\eta d\zeta}{\delta^3(\mathbf{r}; \xi, \eta, \zeta)}, \quad (1.26)$$

$$\delta^2(\mathbf{r}; \xi, \eta, \zeta) = (x - \xi)^2 + (y - \eta)^2 + (z - \zeta)^2,$$

$$U(\mathbf{r}) = \gamma m \rho \iiint_{(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega} \frac{d\xi d\eta d\zeta}{\delta(\mathbf{r}; \xi, \eta, \zeta)}, \quad (1.27)$$

$$(\xi - x_0)^2 + (\eta - y_0)^2 + (\zeta - z_0)^2 \leq R^2$$

Ньютон доказал, что однородный шар (или шаровой слой) притягивает точки внешней области так же, как если бы вся его масса была сосредоточена в центре (см. рис. 1.2).

Будем рассматривать притяжение Землёй, масса которой M и радиус R , материального тела с массой m , принимаемого за материальную частицу и расположенного на расстоянии h от поверхности Земли (рис. 1.2).

Расстояние от центра Земли до притягиваемого тела, очевидно, есть $r = R + h$, тогда значение силовой функции U (1.27) на высоте h над поверхностью Земли

$$U(R + h) = \frac{\gamma m M}{R + h}$$

запишем в виде разложения в ряд *Тейлора* относительно поверхности Земли ($h = 0$)




Рис. 1.2. Закон тяготения (1.14) позволяет описать притяжение однородным шаром массы M и радиуса R материальной частицы массы m на расстоянии h от поверхности шара как притяжение материальной частицей массы M материальной частицы массы m , расстояние между которыми равно $R + h$ (а). Замена материальной частицей возможна также для сферической оболочки массы M и радиуса R (б) и слоистого шара массы M и радиуса R (в), если плотность шара зависит только от расстояния до центра

$$U(R+h) = U(R) + \frac{dU(R)}{dh} h + \frac{d^2U(R)}{dh^2} \frac{h^2}{2} + \mathcal{O}(h^3) = -\frac{\gamma mM}{R} + \frac{\gamma mMh}{R^2} + \frac{\gamma mMh^2}{R^3} + \mathcal{O}(h^3).$$

Ограничившись линейным приближением, будем иметь следующее выражение силовой функции на высоте h

$$U(R+h) = -\gamma \frac{mM}{R} + \gamma \frac{mMh}{R^2} = \text{const} + mgh, \quad (1.28)$$

где g — ускорение свободного падения (связь g с γ , M и R вводится в школьной физике).

Подставив значение силовой функции (1.28) в уравнение сохранения энергии (1.12), получим запись последнего в таком виде

$$E = K - U = K + V = \frac{mv^2}{2} + mgh = C + \gamma \frac{mM}{R} = \text{const}, \quad (1.29)$$

известную из школьного курса физики как *закон сохранения механической энергии* (но мы знаем, что на самом деле теорема).

1.3. Уравнение теплопроводности

1807 год ознаменовался тем, что вековой спор по самым основным вопросам математики в одном из ее аспектов был решен и решен в пользу Бернулли: знаменитый французский математик и физик Жан Батист Фурье (1768—1830) представил Парижской Академии наук статью о распространении тепла внутри твердых тел... [38]

По теореме 1.2, энергия тела не сохраняется, если на последние действуют неконсервативные силы.

Пример 1.1. Тело с массой m начинает двигаться со скоростью \mathbf{v} по горизонтальной шероховатой плоскости. Под действием силы трения \mathbf{F} (направления векторов \mathbf{v} и \mathbf{F} суть противоположны, то есть $\mathbf{v} \cdot \mathbf{F} = -|\mathbf{v}||\mathbf{F}| < 0$) тело остановится за конечный промежуток времени, нагревшись при этом. ▲

Пример 1.2. Металлический шар с массой m падает с высоты h на твёрдую поверхность, не отскакивая от последней, а оставаясь в месте падения. В начале падения шар обладает потенциальной энергией $V = mgh$, к концу падения потенциальная энергия полностью переходит в кинетическую $K = \frac{mv^2}{2}$, последняя же полностью расходуется на деформацию (смятие) и нагрев шара. ▲

Нагрев тел в обоих примерах указывает на переход кинетической энергии движения в тепловую энергию. Для дальнейшего изложения напомним определения энергии и тепловой энергии, известные из школьной физики.

Определение 1.6. *Энергией* называется способность материальных тел производить работу.

Определение 1.7. *Тепловой энергией* называется вид энергии, передающийся немеханическим путём.

Немеханический способ передачи энергии означает, что нет возможности указать видимые тела (макротела), которым передана кинетическая энергия. По современным представлениям таковые тела суть невидимые структурные элементы вещества материальных тел — электроны, ядра атомов, молекулы, частота и размах колебаний которых увеличивается (что воспринимается как нагрев) или уменьшается (охлаждение). Эти движения невидимых тел (микротел) описываются не на языке механики, а молекулярно-кинетической теории. Физика XVII–XIX вв. описывала тепловые явления (передачу тепловой энергии) с помощью понятия *теплорода*. Теплород мыслился как особая невидимая среда (тонкая субстанция), приток которой к телу (или в тело) воспринимается как нагрев тела, а отток от тела (из тела) как охлаждение. Именно на таком языке и было впервые выведено уравнение теплопроводности, применяемое и в современной физике.

Закон сохранения тепловой энергии гласит, что *изменение тепловой энергии в некоторой области пространства за промежуток времени равно потоку тепловой энергии через границу этой области и выделению тепловой энергии источниками (поглощению потоками) за этот же промежуток времени*.

Пусть передача тепловой энергии происходит в некоторой произвольной конечной области \mathcal{D} пространства (рис. 1.3, а) на конечном промежутке времени $[t_1, t_2]$. Область имеет кусочно-гладкую поверхность \mathcal{S} и заполнена материальной несжимаемой средой (веществом) с известными теплофизическими свойствами. Мы выведем уравнение, описывающее перенос тепловой энергии, двумя способами: 1) для малой подобласти конечной области \mathcal{D} ; 2) для конечной области \mathcal{D} .

Рассмотрим малую (элементарную) подобласть $d\mathcal{D}$ области \mathcal{D} в виде прямоугольного параллелепипеда («кирпича»), «вырезанного» с помощью трёх пар параллельных плоскостей $x_0 = \text{const}$, $x_0 + dx = \text{const}$, $y_0 = \text{const}$, $y_0 + dy = \text{const}$, $z_0 = \text{const}$, $z_0 + dz = \text{const}$, где $(x_0, y_0, z_0) \equiv \mathbf{r}_0$ — произвольная точка области \mathcal{D} (рис. 1.3, б). Далее для просто-




Рис. 1.3. Конечная область трёхмерного пространства \mathcal{S} с кусочно-гладкой границей \mathcal{S} (а); малая подобласть $d\mathcal{D}$ области \mathcal{D} в виде параллелепипеда с рёбрами, параллельными осям декартовой прямоугольной системы координат (x, y, z) (б)

ты будем говорить о малой (элементарной) области. Очевидно, что объём последней равен $dx dy dz$, а площади граней, перпендикулярных осям x , y и z , суть $dy dz$, $dx dz$ и $dx dy$ соответственно. Также выделим на конечном промежутке времени $[t_1, t_2]$ малый (элементарный) промежуток времени dt (прошедший от мгновения t_0 до мгновения $t_0 + dt$, где $[t_0, t_0 + dt] \subset [t_1, t_2]$).

Изменение количества тепловой энергии в малой области за малый промежуток времени равно

$$\delta E(t_0, \mathbf{r}_0) = e(t_0 + dt, \mathbf{r}_0) dx dy dz - e(t_0, \mathbf{r}_0) dx dy dz = \left[e(t_0 + dt, \mathbf{r}_0) - e(t_0, \mathbf{r}_0) \right] dx dy dz, \quad (1.30)$$

где $e(t, \mathbf{r})$ — объёмная плотность тепловой энергии среды. Из термодинамики известно, что

$$e(t, \mathbf{r}) = \rho(\mathbf{r}) c_V(t, \mathbf{r}) T(t, \mathbf{r}), \quad (1.31)$$

где ρ — плотность среды, c_V — удельная массовая теплоёмкость среды при постоянном объёме (определяется опытным путём), T — абсолютная температура среды.

Упростим выражение в квадратных скобках (1.30), применив разложение в ряд *Тейлора* с точностью до члена первого порядка по δt

$$e(t_0 + dt, \mathbf{r}_0) - e(t_0, \mathbf{r}_0) = \frac{\partial e(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial t} \frac{dt}{1!} + \frac{\partial^2 e(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial t^2} \frac{(dt)^2}{2!} + \frac{\partial^3 e(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial t^3} \frac{(dt)^3}{3!} + \dots \approx \frac{\partial e(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial t} dt,$$

тогда изменение количества тепловой энергии (1.30) можем приближенно записать так

$$\delta E(t_0, \mathbf{r}_0) \approx \frac{\partial e(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial t} dx dy dz dt = \left[\rho \frac{\partial (c_V T)}{\partial t} \right]_{(t_0, \mathbf{r}_0)} dx dy dz dt. \quad (1.32)$$

Поток тепловой энергии через границу малой области (составленную из шести граней) за малый промежуток времени равен

$$\begin{aligned}\delta Q(t_0, \mathbf{r}_0) = & - \left[q_x(t_0, \mathbf{r}_1) - q_x(t_0, \mathbf{r}_0) \right] dy dz dt - \\ & - \left[q_y(t_0, \mathbf{r}_2) - q_y(t_0, \mathbf{r}_0) \right] dx dz dt - \\ & - \left[q_z(t_0, \mathbf{r}_3) - q_z(t_0, \mathbf{r}_0) \right] dx dy dt ,\end{aligned}\quad (1.33)$$

где $\mathbf{r}_1 = (x_0 + dx, y_0, z_0)$, $\mathbf{r}_2 = (x_0, y_0 + dy, z_0)$, $\mathbf{r}_3 = (x_0, y_0, z_0 + dz)$, $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$ — вектор поверхностной плотности потока тепловой энергии. Этот вектор «отвечает» за перенос тепловой энергии так же, как вектор поверхностной плотности потока количества движения (импульса) материальной среды $\rho \mathbf{v}$ «отвечает» за перенос среды. Применив для величин в квадратных скобках соответствующие разложения в ряд Тейлора с точностью до членов первого порядка по dx , dy и dz

$$\begin{aligned}q_x(t_0, \mathbf{r}_1) - q_x(t_0, \mathbf{r}_0) & \approx \frac{\partial q_x(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial x} dx , \\ q_y(t_0, \mathbf{r}_2) - q_y(t_0, \mathbf{r}_0) & \approx \frac{\partial q_y(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial y} dy , \\ q_z(t_0, \mathbf{r}_3) - q_z(t_0, \mathbf{r}_0) & \approx \frac{\partial q_z(t_0, \mathbf{r}_0)}{\partial z} dz ,\end{aligned}$$

запишем приближённо величину потока тепловой энергии (1.33) таким образом

$$\delta Q(t_0, \mathbf{r}_0) = -\nabla \cdot \mathbf{q}(t_0, \mathbf{r}_0) dx dy dz dt , \quad (1.34)$$

где ∇ — ранее введённый дифференциальный оператор *Гамильтона* (1.9), а $\nabla \cdot \mathbf{q}$ — дивергенция вектора $\mathbf{q} = (q_x, q_y, q_z)$

$$\nabla \cdot \mathbf{q} = \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} . \quad (1.35)$$

Закон теплопроводности *Фурье* устанавливает следующую дифференциальную связь вектора $\mathbf{q}(t, \mathbf{r})$ и температурного поля $T(t, \mathbf{r})$

$$\mathbf{q}(t, \mathbf{r}) = -\lambda(t, \mathbf{r}) \nabla T(t, \mathbf{r}) = -\lambda \left(\frac{\partial T}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \mathbf{k} \right) , \quad (1.36)$$

где $\lambda(t, \mathbf{r})$ — коэффициент теплопроводности (определяется опытным путём). Для компонентов векторов \mathbf{q} и ∇T закон *Фурье* имеет следующий вид

$$q_x = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x} , \quad q_y = -\lambda \frac{\partial T}{\partial y} , \quad q_z = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z} . \quad (1.37)$$

Поясним физический смысл закон теплопроводности *Фурье*, для чего рассмотрим семейство изотерм $T(t, \mathbf{r}) = \text{const}$, то есть поверхностей, на которых температура принимает постоянные значения. Возьмём изотерму, проходящую через точку \mathbf{r}_0 в мгновение времени t_0 , и составим выражение для дифференциала функции $T(t, \mathbf{r})$ на изотерме (очевидно, что дифференциал тождественно равен нулю)

$$dT(t_0, \mathbf{r}_0) = \left[\frac{\partial T}{\partial x} dx + \frac{\partial T}{\partial y} dy + \frac{\partial T}{\partial z} dz \right]_{(t_0, \mathbf{r}_0)} = d\mathbf{r} \cdot \nabla T(t_0, \mathbf{r}_0) = 0,$$

где $d\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = (dx, dy, dz)$ — малый вектор смещения вдоль изотермы (иначе — касательный изотерме малый вектор) в мгновение времени t_0 . Но отсюда мы легко заключим, что вектор ∇T перпендикулярен изотерме. Изотерма, проходящая через точку \mathbf{r}_0 , как двусторонняя поверхность, разбивает пространство в окрестности точки на две части. Остаётся выяснить, в какую сторону вектор ∇T направлен. Одну часть пространства, в которой $T(t_0, \mathbf{r}) > T(t_0, \mathbf{r}_0)$, будем называть *положительной*, а другую, в которой $T(t_0, \mathbf{r}) < T(t_0, \mathbf{r}_0)$, — *отрицательной*. Восставим из точки \mathbf{r}_0 орт нормали $\boldsymbol{\nu}$ к изотерме, направленный в положительную сторону, и введём функцию скалярной переменной s : $\bar{T}(s) = T(t_0, \mathbf{r}_0 + \boldsymbol{\nu}s)$. Очевидно, что: 1) $\bar{T}(s) > \bar{T}(0) = T(t_0, \mathbf{r}_0)$, если $s > 0$ (проще говоря, на луче, идущем из точки \mathbf{r}_0 в положительную сторону вдоль нормали к изотерме, функция $T(t_0, \mathbf{r})$ принимает значения, бóльшие значения $T(t_0, \mathbf{r}_0)$); 2) $\bar{T}(s) < \bar{T}(0) = T(t_0, \mathbf{r}_0)$, если $s < 0$. Отсюда следует, что односторонняя производная функции $\bar{T}(s)$ при $s = 0 + 0$ положительна, а при $s = 0 - 0$ — отрицательна, но для нас важны выражения для этих производных, которые мы составим с помощью разложений в ряд *Тейлора* по приведённым выше образцам в таком виде

$$\begin{aligned} \left. \frac{d\bar{T}(s)}{ds} \right|_{s=0+0} &= \lim_{s \rightarrow 0+0} \frac{T(t_0, \mathbf{r}_0 + \boldsymbol{\nu}s) - T(t_0, \mathbf{r}_0)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0+0} \frac{(+\boldsymbol{\nu}) \cdot \nabla T(t, \mathbf{r}_0) s}{s} = (+\boldsymbol{\nu}) \cdot \nabla T(t, \mathbf{r}_0) > 0, \\ \left. \frac{d\bar{T}(s)}{ds} \right|_{s=0-0} &= \lim_{s \rightarrow 0+0} \frac{T(t_0, \mathbf{r}_0 - \boldsymbol{\nu}s) - T(t_0, \mathbf{r}_0)}{s} = \lim_{s \rightarrow 0+0} \frac{(-\boldsymbol{\nu}) \cdot \nabla T(t, \mathbf{r}_0) s}{s} = (-\boldsymbol{\nu}) \cdot \nabla T(t, \mathbf{r}_0) < 0. \end{aligned}$$

Единственная возможность для согласования знаков односторонних производных состоит в том, что $\boldsymbol{\nu} \uparrow \nabla T(t_0, \mathbf{r}_0)$, то есть вектор градиента температуры в точке \mathbf{r}_0 направлен по нормали к изотерме, проходящей через точку \mathbf{r}_0 , в сторону роста температуры. Но второй закон термодинамики утверждает, что *тепловая энергия может самопроизвольно переходить только от более нагретых тел к менее нагретым*, то есть направление вектора $\mathbf{q}(t, \mathbf{r})$ противоположно направлению вектора $\nabla T(t, \mathbf{r})$. Но именно это свойство тепловой энергии и отражено в законе теплопроводности *Фурье* (1.36), (1.37).

Подставив выражения (1.37) для компонентов вектора \mathbf{q} в выражение для потока тепловой энергии (1.34), (1.35), будем иметь

$$\delta Q(t_0, \mathbf{r}_0) = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right]_{(t_0, \mathbf{r}_0)} dx dy dz dt. \quad (1.38)$$

Пусть объёмная плотность выделения (поглощения) тепловой энергии в среде (за счёт прохождения химических реакций, электрического тока и других явлений, называемых

совокупно внутренними распределёнными источниками тепловой энергии) есть $h(t, \mathbf{r})$, тогда изменение тепловой энергии в малой области за малый промежуток времени, из-за действия внутренних источников, равно

$$h(t_0, \mathbf{r}_0) dx dy dz dt. \quad (1.39)$$

Нам осталось только приравнять величину (1.32) всем выписанным вкладам (1.38), (1.39) в изменение тепловой энергии и сократить полученное равенство на общий множитель $dx dy dz dt$, чтобы получить уравнение теплопроводности

$$\left[\rho \frac{\partial(c_V T)}{\partial t} \right]_{(t_0, \mathbf{r}_0)} = \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) \right]_{(t_0, \mathbf{r}_0)} + h(t_0, \mathbf{r}_0). \quad (1.40)$$

В силу произвольности выбора мгновения времени $t_0 \in [t_1, t_2]$ и точки $\mathbf{r}_0 \in \mathcal{D}$, уравнение (1.40) далее будем записывать без указания на (t_0, \mathbf{r}_0) .

Если теплофизические свойства среды могут быть описаны постоянными величинами c_V , λ , тогда уравнение теплопроводности принимает такой вид

$$\rho c_V \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + h.$$

Более удобная форма уравнения может быть получена после деления обеих частей на произведение ρc_V и введения коэффициента температуропроводности a^2

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + g, \quad (1.41)$$

где

$$a^2 = \frac{\lambda}{\rho c_V}, \quad g(t, \mathbf{r}) = \frac{h(t, \mathbf{r})}{\rho c_V}.$$

Заметим, что уравнение теплопроводности (1.41) можно записать коротко, если применить для записи оператор *Лапласа*

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a^2 \Delta T + g. \quad (1.42)$$

Теперь рассмотрим конечную область \mathcal{D} (см. рис. 1.3, б), для которой в произвольное мгновение времени $t \in [t_1, t_2]$ запишем выражения: 1) тепловой энергии среды

$$E(t) = \iiint_{\mathcal{D}} e(t, \mathbf{r}) d\mathcal{D}; \quad (1.43)$$

2) потока тепловой энергии через границу области

$$\oint_S \boldsymbol{\nu}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}) dS; \quad (1.44)$$

3) скорости выделения тепловой энергии за счёт распределённых внутренних источников

$$\iiint_{\mathcal{D}} h(t, \mathbf{r}) d\mathcal{D}. \quad (1.45)$$

С помощью введённых величин закон сохранения тепловой энергии в области \mathcal{D} для конечного промежутка времени $[t_a, t_b] \subset [t_1, t_2]$ записывается в *интегральной форме*

$$E(t_b) - E(t_a) = - \int_{t_a}^{t_b} \left(\oint_S \boldsymbol{\nu}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}) dS \right) dt + \int_{t_a}^{t_b} \left(\iiint_{\mathcal{D}} h(t, \mathbf{r}) d\mathcal{D} \right) dt. \quad (1.46)$$

Поверхностный интеграл преобразуем по формуле *Остроградского – Гаусса*

$$\oint_S \boldsymbol{\nu}(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}) dS = \iiint_{\mathcal{D}} \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}) d\mathcal{D} \quad (1.47)$$

и перепишем закон сохранения тепловой энергии (1.46) так

$$E(t_b) - E(t_a) = \int_{t_a}^{t_b} \left(\iiint_{\mathcal{D}} [h(t, \mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r})] d\mathcal{D} \right) dt,$$

или в развёрнутом виде

$$\iiint_{\mathcal{D}} e(t_b, \mathbf{r}) d\mathcal{D} - \iiint_{\mathcal{D}} e(t_a, \mathbf{r}) d\mathcal{D} = \int_{t_a}^{t_b} \left(\iiint_{\mathcal{D}} [h(t, \mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r})] d\mathcal{D} \right) dt.$$

Изменим порядок интегрирования по времени и пространству в правой части последнего интегрального равенства

$$\iiint_{\mathcal{D}} e(t_b, \mathbf{r}) d\mathcal{D} - \iiint_{\mathcal{D}} e(t_a, \mathbf{r}) d\mathcal{D} = \iiint_{\mathcal{D}} \left(\int_{t_a}^{t_b} [h(t, \mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r})] dt \right) d\mathcal{D}$$

и запишем закон сохранения тепловой энергии в виде одного интеграла по области \mathcal{D}

$$\iiint_{\mathcal{D}} \left\{ e(t_b, \mathbf{r}) - e(t_a, \mathbf{r}) - \int_{t_a}^{t_b} [h(t, \mathbf{r}) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r})] dt \right\} d\mathcal{D} = 0,$$

к которому применим теорему о среднем значении

$$e(t_b, \mathbf{r}^*) - e(t_a, \mathbf{r}^*) = \int_{t_a}^{t_b} [h(t, \mathbf{r}^*) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}^*)] dt,$$

где $\mathbf{r}^* \in \mathcal{D}$. Далее применим теорему о среднем значении к интегралу по переменной t

$$e(t_b, \mathbf{r}^*) - e(t_a, \mathbf{r}^*) = (t_b - t_a) [h(t^*, \mathbf{r}^*) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t^*, \mathbf{r}^*)],$$

где $t^* \in [t_a, t_b]$, разделим обе части последнего равенства на $t_b - t_a$, перейдём к пределу при $t_b \rightarrow t_a = t \in [t_1, t_2]$

$$\lim_{t_b \rightarrow t_a} \frac{e(t_b, \mathbf{r}^*) - e(t_a, \mathbf{r}^*)}{t_b - t_a} = \lim_{t_b \rightarrow t_a} [h(t^*, \mathbf{r}^*) - \nabla \cdot \mathbf{q}(t^*, \mathbf{r}^*)]$$

и получим *дифференциальную* форму закона сохранения тепловой энергии

$$\frac{\partial e(t, \mathbf{r})}{\partial t} = -\nabla \cdot \mathbf{q}(t, \mathbf{r}) + h(t, \mathbf{r}). \quad (1.48)$$

Подставив в полученное уравнение зависимость (1.31) и закон теплопроводности *Фурье* (1.36), (1.37), придём к уравнению теплопроводности (1.42).

1.4. Уравнение колебаний

Тела, с которыми имеет дело механика, бывают самых разных типов: точечные массы, занимающие в каждый данный момент времени лишь одну точку; абсолютно твердые тела, которые никогда не деформируются; струны, стержни и струи, которые являются одномерными; мембраны и оболочки, которые занимают собой лишь поверхности; жидкости и твердые тела, заполняющие пространство, и многое другое. [53]

Применим законы механики *Ньютона* к выводу уравнения, описывающего поперечные колебания натянутой струны при следующих предположениях:

- 1) струна есть физическое тело, у которого принимается во внимание *протяжённость* только в *одном направлении*, для которого введём переменную $s \in \mathbb{R}$;
- 2) струна совершает колебания в плоскости (x, y) , где ось x направлена вдоль струны в состоянии покоя (в этом случае $s = x$), ось y перпендикулярна оси x ;
- 3) смещение малых участков струны и струны в целом вдоль оси x равно нулю, соответственно компонент скорости $v_x = 0$; смещение вдоль оси y зависит от времени t и положения участка струны x (или s), то есть смещение есть некоторая функция $u(t, x)$, а компонент скорости смещения вдоль оси y равен

$$v_y(t, x) = \frac{\partial u(t, x)}{\partial t}; \quad (1.49)$$

- 4) струну рассматриваем как *абсолютно гибкое* протяжённое тело, то есть на выделенный малый $(x, x + dx)$ или конечный (a, b) участки струны со стороны остальных частей




Рис. 1.4. Из струны вырезан конечный участок (a, b) , действие отброшенных частей заменено силами натяжения $Q(t, x)$ на концах участка $x = a$ и $x = b$

струны действуют силы натяжения, касательные к струне при x и $x + dx$ или $x = a$ и $x = b$ (рис. 1.4);

5) струну рассматриваем как *абсолютно упругое* протяжённое тело, то есть подчиняющееся закону *Гука* (изменение силы натяжения пропорционально изменению длины струны);

6) струна совершает *малые колебания*, то есть рассматриваем смещение $u(t, x)$ и его частные производные

$$\frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = v_y(t, x), \quad \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} = \operatorname{tg} \varphi(t, x) \approx \sin \varphi(t, x) \approx \varphi(t, x), \quad (1.50)$$

как малые величины, квадратами которых будем пренебрегать;

7) длина произвольного конечного участка (a, b) струны не меняется при совершении струной малых колебаний (см. задачу 1.4 на с. 27)

$$s(b) - s(a) = \int_a^b ds = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right)^2} dx \approx \int_a^b dx = b - a,$$

то есть с точностью до малых второго порядка малости не изменяется (следовательно, параметр s совпадает с переменной x в состоянии покоя и при совершении колебаний);

8) линейная плотность струны равна $\rho(x)$, то есть масса элемента $(x, x + dx)$ струны равна $dm = \rho(x) dx$, а масса конечного участка (a, b) равна

$$M(a, b) = \int_a^b \rho(x) dx;$$

9) линейная плотность внешних массовых сил, действующих в плоскости (x, y) параллельно оси y равна $h(t, x)$ (если сила тяжести учитывается, то вклад последней в $h(t, x)$ равен $-\rho(x)g$, где g — ускорение свободного падения), то есть величина силы, действующей на малый участок $(x, x + dx)$ струны, равна $h(t, x) dx$, а на конечный участок (a, b) струны — равна

$$F(t; a, b) = \int_a^b h(t, x) dx; \quad (1.51)$$

10) силу сопротивления внешней среды не учитываем.

Условия, при которых мы рассматриваем колебания струны, позволяют учесть только закон сохранения количества движения (второй закон *Ньютона*), поскольку законы сохранения массы и энергии выполняются очевидным образом.

Вначале выведем уравнение малых колебаний струны в *дифференциальной форме*, рассматривая малый участок $(x, x + dx)$ струны. Ускорение вертикального смещения малого участка равно частной производной скорости вертикального смещения $v_y(t, x)$ (1.49) по времени t

$$a = \frac{\partial v_y(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2}.$$

На рассматриваемый малый участок струны действует совокупная сила 1) реакции отброшенных частей струны (слева и справа от участка струны), обусловленная натяжением струны \mathbf{Q} , и 2) внешних массовых сил. Величина силы натяжения $\mathbf{Q}(t, x)$ постоянна в пределах малого участка струны, то есть $|\mathbf{Q}(t, x)| = Q_0$ (в силу неизменности длины ds участка, где $(ds)^2 = (dx)^2 + (dy)^2$), а местное направление силы натяжения определено значением угла $\varphi(t, x)$. Следовательно, для малого участка струны можем записать равнодействующую сил в направлении оси y в таком виде

$$Q_0 \sin \varphi(t, x + dx) - Q_0 \sin \varphi(t, x) + h(t, x) dx.$$

Теперь учтём связь (1.50) угла $\varphi(t, x)$ наклона касательной к струне со смещением $u(t, x)$ и применим разложение смещения в ряд *Тейлора* по пространственной переменной x , тогда для равнодействующей сил получим следующее выражение

$$\begin{aligned} & Q_0 \left[\frac{\partial u(t, x + dx)}{\partial x} - \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right] + h(t, x) dx = \\ & = Q_0 \left[\frac{\partial u(t, x)}{\partial x} + \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} \frac{dx}{1!} + \frac{\partial^3 u(t, x)}{\partial x^3} \frac{(dx)^2}{2!} + \dots - \frac{\partial u(t, x)}{\partial x} \right] + h(t, x) dx = \\ & = Q_0 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} dx + h(t, x) dx. \end{aligned}$$

Далее приравняем количество движения малого участка струны в вертикальном направлении равнодействующей сил в вертикальном направлении

$$\rho(x) dx \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = Q_0 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} dx + h(t, x) dx.$$

После сокращения на dx получим уравнение, описывающее малые поперечные колебания упругой струны

$$\rho(x) \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = Q_0 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + h(t, x).$$

Обычно это уравнение рассматривают в предположении постоянной линейной плотности $\rho(x) \equiv \rho_0$, то есть

$$\frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + f(t, x), \quad (1.52)$$

где $\rho_0 a^2 = Q_0$, $h(t, x) = \rho_0 f(t, x)$.

При тех же предположениях можно вывести уравнение, описывающее малые поперечные колебания натянутой мембраны

$$\frac{\partial^2 u(t, x, y)}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u(t, x, y)}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u(t, x, y)}{\partial y^2} \right) + f(t, x, y), \quad (1.53)$$

где $u(t, x, y)$ — отклонение мембраны от равновесного положения, $f(t, x, y)$ — функция, описывающая внешние воздействия на мембрану.

Привлекая уравнения движения сплошной среды и термодинамики идеального газа, можно вывести уравнение малых *продольных* колебаний сплошной среды. Таковыми можно считать акустические, или звуковые колебания, возникающие при распространении звука. Точнее говоря, звуки, которые мы слышим, и есть акустические колебания. Уравнение акустических колебаний имеет такой вид

$$\frac{\partial^2 \bar{p}}{\partial t^2} = a_0^2 \left(\frac{\partial^2 \bar{p}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \bar{p}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \bar{p}}{\partial z^2} \right), \quad (1.54)$$

где \bar{p} — отклонение давления воздуха в акустической волне от постоянного значения p_0 (в отсутствие колебаний), a_0 — скорость звука в воздухе (примерно 300 м/с).

1.5. Уравнения и краевые задачи математической физики

Соберем в одном месте ранее выведенные уравнения *Лапласа*, теплопроводности и колебаний

$$\Delta u(\mathbf{r}) = 0, \quad (1.55)$$

$$\frac{\partial u(t, \mathbf{r})}{\partial t} - a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}) = g(t, \mathbf{r}), \quad (1.56)$$

$$\frac{\partial^2 u(t, \mathbf{r})}{\partial t^2} - a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}) = g(t, \mathbf{r}), \quad (1.57)$$

описывающие различные явления, но представляющие, тем не менее, всего лишь некоторые отдельные виды дифференциальных уравнений в частных производных.

Определение 1.8. Дифференциальным уравнением в частных производных порядка m по независимым переменным $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathcal{D}$ относительно функции $u(\mathbf{r})$ (зависимой переменной) называется соотношение, связывающее независимые переменные, зависимую переменную и частные производные зависимой переменной по независимым (хотя бы по одной из независимых переменных), причём порядок старшей частной производной равен m . \square

Определение 1.9. Дифференциальным уравнением в частных производных порядка m по независимым переменным $t \in [t_1, t_2]$ и $\mathbf{r} = (x, y, z) \in \mathcal{D}$ относительно функции $u(t, \mathbf{r})$ (зависимой переменной) называется соотношение, связывающее независимые переменные, зависимую переменную и частные производные зависимой переменной по независимым (хотя бы по одной из независимых переменных), причём порядок старшей частной производной равен m . \square

В основном мы будем рассматривать линейные дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка.

Определение 1.10. Линейным дифференциальным уравнением в частных производных второго порядка по переменным $\mathbf{r} = (x, y, z) = (x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{D}$ относительно функции $u(\mathbf{r})$ называется соотношение вида

$$\sum_{\kappa=1}^3 \sum_{\iota=1}^3 a_{\kappa,\iota}(\mathbf{r}) \frac{\partial^2 u(\mathbf{r})}{\partial x_\kappa \partial x_\iota} + \sum_{\kappa=1}^3 a_\kappa(\mathbf{r}) \frac{\partial u(\mathbf{r})}{\partial x_\kappa} + a_\star(\mathbf{r}) u(\mathbf{r}) = g(\mathbf{r}), \quad (1.58)$$

где $a_{\kappa,\iota}(\mathbf{r})$, $a_\kappa(\mathbf{r})$, $a_\star(\mathbf{r})$, $g(\mathbf{r})$ — известные (по крайней мере, непрерывные) функции независимых переменных. \square

Определение 1.11. Линейным дифференциальным уравнением в частных производных второго порядка по переменным $(t, \mathbf{r}) = (t, x, y, z) = (x_0, x_1, x_2, x_3) \in \mathcal{D}$ относительно функции $u(t, \mathbf{r})$ называется соотношение вида

$$\sum_{\kappa=0}^3 \sum_{\iota=0}^3 a_{\kappa,\iota}(t, \mathbf{r}) \frac{\partial^2 u(t, \mathbf{r})}{\partial x_\kappa \partial x_\iota} + \sum_{\kappa=0}^3 a_\kappa(t, \mathbf{r}) \frac{\partial u(t, \mathbf{r})}{\partial x_\kappa} + a_\star(t, \mathbf{r}) u(t, \mathbf{r}) = g(t, \mathbf{r}), \quad (1.59)$$

где $a_{\kappa,\iota}(t, \mathbf{r})$, $a_\kappa(t, \mathbf{r})$, $a_\star(t, \mathbf{r})$, $g(t, \mathbf{r})$ — известные (по крайней мере, непрерывные) функции независимых переменных. \square

Для дифференциальных уравнений в частных производных (даже линейных), как и для дифференциальных уравнений в обыкновенных производных, отсутствуют общие методы решения, поэтому под решениями таких уравнений понимают решения частных (так называемых краевых) задач. Поэтому важно понимать, какова степень произвола при постановке задач для уравнений в частных производных.

Напомним, что для дифференциального уравнения с обыкновенными производными порядка m (или, в более привычной форме, обыкновенного дифференциального уравнения порядка m)

$$F(x, y, y', \dots, y^{(m)}) = 0, \quad x \in I \subseteq \mathbb{R}, \quad (1.60)$$

где I — конечный или (полу-) бесконечный интервал действительной оси x , вся совокупность решений, называемая m -параметрическим семейством решений (немного устаревшее понятие — *общее решение*), может быть представлена некоторой функцией (разумеется, для каждого уравнения — «своей») независимой переменной x и параметров — произвольных постоянных C_1, C_2, \dots, C_m , а именно в явном виде

$$y = \varphi(x; C_1, C_2, \dots, C_m). \quad (1.61)$$

или неявном

$$\Phi(x, y; C_1, C_2, \dots, C_m) = 0. \quad (1.62)$$

Решения уравнения (1.60), которые не входят в семейство (1.61) или (1.62) (если они существуют), называются *особыми*.

Верно и обратное утверждение, то есть некоторому явному (1.61) или неявному (1.62) семейству функций можно поставить в соответствие обыкновенное дифференциальное уравнение (1.60) порядка m (см. пояснение).

Можно ли перенести эти утверждения на уравнения с частными производными? Для того, чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим некоторые простые примеры уравнений с частными производными.

Пример 1.3. Уравнение первого порядка

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + 1 = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad (1.63)$$

очевидно, не имеет решений. ▲

Пример 1.4. Уравнение первого порядка

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad (1.64)$$

имеет только постоянные решения $u(x, y) = \text{const}$. ▲

Пример 1.5. Для уравнения второго порядка

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2, \quad (1.65)$$

после первого интегрирования по переменной y получим

$$\frac{\partial u(x, y)}{\partial x} = u_1(x), \quad (1.66)$$

где $u_1(x)$ — произвольная функция x , а после второго интегрирования по переменной x найдём семейство решений

$$u(x, y) = \int u_1(x) dx + v_2(y) = v_1(x) + v_2(y), \quad (1.67)$$

зависящее от двух произвольных функций (см. задачу 1.5 на с. 27). ▲

Пример 1.6. Для уравнения третьего порядка

$$\frac{\partial^3 u}{\partial x \partial y \partial z} = 0, \quad (x, y, z) \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^3, \quad (1.68)$$

после первого интегрирования по переменной z имеем

$$\frac{\partial^2 u(x, y, z)}{\partial x \partial y} = u_1(x, y), \quad (1.69)$$

после второго интегрирования по переменной y

$$\frac{\partial u(x, y, z)}{\partial x} = \int u_1(x, y) dy + v_2(x, z) = v_1(x, y) + v_2(x, z), \quad (1.70)$$

и после третьего интегрирования найдём семейство решений

$$u(x, y, z) = \int v_1(x, y) dx + \int v_2(x, z) dx + w_3(y, z) = w_1(x, y) + w_2(x, z) + w_3(y, z), \quad (1.71)$$

зависящее от трёх произвольных функций (см. задачу 1.5 на с. 27). ▲

Рассмотренные примеры показывают, что для однозначного нахождения функции, подчинённой дифференциальному уравнению в частных производных, следует задавать в качестве некоторых дополнительных условий вспомогательные функции, позволяющие выделить искомую функцию из (вообще говоря) неизвестного семейства решений дифференциального уравнения. Задание таких вспомогательных функций на всей или части границы пространственной (то есть независимых переменных \mathbf{r}) или пространственно-временной (то есть независимых переменных (t, \mathbf{r})) области составляет суть постановки краевых задач теории дифференциальных уравнений в частных производных.

1.6. Задачи

К разделу 1.1. на с. 6

Задача 1.1. Если мы развили геометрические представления и понятия настолько, что можем «измерить» размерность пространства, то что нам для этого нужно и как это сделать? ▲

К разделу 1.2. на с. 9

К разделу 1.3. на с. 13

Задача 1.2. Каковы размерности величин E , e , c_V , Q , λ , a^2 , h , g в уравнении теплопроводности?

Задача 1.3. Происходит ли перенос тепловой энергии вдоль изотерм?

К разделу 1.4. на с. 20

Задача 1.4. Докажите, что длина струны при совершении малых колебаний не меняется с точностью до величин второго порядка малости.

Решение.

К разделу 1.5. на с. 23

Задача 1.5. Насколько произвольны функции $v_1(x)$, $v_2(y)$ в решении $u(x, y)$ уравнения (1.65) из примера 1.5 на с. 25 и функции $w_1(x, y)$, $w_2(x, z)$, $w_3(y, z)$ в решении $u(x, y, z)$ уравнения (1.68) из примера 1.6 на с. 26?

Ответ. Поскольку решение $u(x, y)$ уравнения (1.65) и решение $u(x, y, z)$ уравнения (1.68) суть непрерывны в соответствующих областях \mathcal{D} (это следует из дифференцируемости функций $u(x, y)$ и $u(x, y, z)$), то произвольные функции $v_1(x)$, $v_2(y)$ и $w_1(x, y)$, $w_2(x, z)$, $w_3(y, z)$ должны быть непрерывными в \mathcal{D} , однако последние могут быть неограниченными в замыканиях областей \mathcal{D} . Если на решения наложены дополнительные условия (другими словами, поставлены соответствующие граничные задачи), например, в виде принятия на границах областей значений, заданных непрерывными функциями, то произвольные функции должны быть непрерывными (а значит ограниченными) в замыканиях областей \mathcal{D} . При совпадении области \mathcal{D} с плоскостью (пример 1.5) или с пространством (пример 1.6) из ограниченности решений $u(x, y)$ и $u(x, y, z)$ сразу же следует ограниченность произвольных функций на плоскости или в пространстве.

1.7. Пояснения

К разделу 1.1. на с. 6

Пояснение 1.1 к с. 8. Во времена Ньютона «силой» (лат. *vis*) назывались многие объекты, например, ускорение точки. Произведение массы точки на квадрат ее скорости Лейбниц (G.W. Leibnitz) назвал *vis viva* (живая сила). Современный термин «сила» соответствует *vis motrix* (ускоряющая сила) у Ньютона [4].

... Лейбницу принадлежит введение в механику живой силы или, как стали говорить в XIX столетии, меры кинетической энергии в ее механической форме. Это было ... результатом целенаправленного поиска. Материя должна была быть наделена активностью, чем-то таким, что, как выражался Лейбниц, находится на полпути между способностью действовать и самим действием [41].

... Лейбниц вел длительную полемику со сторонниками Декарта, настаивая на том, что произведение массы тела на квадрат его скорости (живая сила по Лейбницу) является истинной мерой движения, а не произведение массы на скорость (импульс), как считал Декарт [21].

... Лейбниц живой силой называл произведение mv^2 без делителя 2. Такое определение живой силы встречается и до сих пор у французских авторов, но его следует признать неудачным, так как это определение влечёт за собой необходимость при формулировании закона изменения кинетической энергии, или живой силы, говорить о «половине живой силы» [37].

В старых учебниках эта величина называлась «живой силой»; этой величиной воспользовались впервые Х. Гюйгенс и Г. Лейбниц; термин «живая сила» ввел впервые Бернулли И. [9], стр. 72: «Живая сила есть та сила, которая пребывает в равномерно движущемся теле. Наоборот, мертвая сила — та, которую получает тело без движения, если оно побуждается и принуждается к движению, или же которая побуждает двигаться быстрее или медленнее, если тело уже находится в движении» [?].

К разделу 1.2. на с. 9

Пояснение 1.2 к с. ??.

Помимо рассказа об экспериментах, в этом письме Гука содержатся такие важные слова: «Я предполагаю, что притяжение обратно пропорционально квадрату расстояния до центра, соответственно предположению Кеплера о зависимости скорости от расстояния. Галлей, вернувшись с острова св. Елены, рассказал мне, что маятник качается медленнее на вершине горы, чем у подножья, и не мог понять причины. Я сказал ему, что он решил давно занимавший меня вопрос об убывании тяготения с удалением от центра... Говоря о падении внутри Земли, я не думаю что закон притяжения будет таким же до самого центра Земли, но, напротив, я считаю, что, чем ближе тело будет к центру, тем слабее будет притяжение, возможно, подобно тому, как это происходит с маятником или телом внутри вогнутой поверхности, где сила уменьшается по мере приближения к нижней точке... Притяжение на значительных расстояниях [от небесных тел] можно вычислять по указанной пропорции [обратных квадратов] как притяжение самим центром.

<...>

... Гук нарисовал орбиты и увидел, что они похожи на эллипсы... Назвать их эллипсами ему не позволила научная честность, так как доказать эллиптичность он не смог. Сделать это Гук предложил Ньютону, сказав, что он не сомневается, что Ньютон с его превосходными методами справится с этой задачей и убедится также и в том, что первый закон Кеплера (утверждающий, что планеты движутся по эллипсам) тоже следует из закона обратных квадратов.

Отправив Ньютону письмо с таким предложением, Гук перешел к следующим открытиям, так как времени заниматься математическими подробностями у него не было. Ньютон же замолчал и больше никогда ничего Гуку не писал (за исключением одного случая, когда он переслал Гуку просьбу одного итальянского врача, желающего сотрудничать с Королевским обществом, и, пользуясь случаем, поблагодарил за сведения об экспериментах с падающими шарами), о переписке с ним нигде не упоминал (хотя письма хранил) и о том, что Гук поставил перед ним задачу о тяготении, никому не говорил.

Но за задачу эту Ньютон взялся, исследовал закон движения, убедился, что действительно получаются эллиптические орбиты, доказал, что, и наоборот, из закона Кеплера об эллиптичности орбит следует закон обратных квадратов... Для того, чтобы все это как следует оформить и изложить в доступном виде, ему потребовалось сформулировать основные принципы, относящиеся к общим понятиям, таким

как масса, сила, ускорение. Так появились знаменитые «три закона Ньютона», на которые сам Ньютон, правда, не претендовал (первый закон — это всем давно и хорошо известный закон инерции Галилея, а остальные два никак не могли быть открыты позже чем, скажем, закон упругости Гука или формула Гюйгенса для центробежной силы). А вот в связи с законом всемирного тяготения Ньютон повел себя весьма неаккуратно. [5]

Я сейчас расскажу, как в математической физике появилось уравнение Лапласа. Его появление на свет вызвано совсем нетривиальным ходом развития естественнонаучных идей. Неожиданный поворот мыслей Лапласа предопределил, как мне кажется, ряд важных соображений, следствием которых явились уравнения Максвелла для электромагнитного поля и, в настоящее время, уравнения полей, связанных с элементарными частицами.

Как известно, Кеплер, обрабатывая наблюдения Тихо Браге над движением планет, установил... три удивительных закона

<...>

1. Каждая планета движется по эллипсу, в одном из фокусов которого находится Солнце.
2. Радиус-вектор от Солнца до планеты заметает равные площади в равные интервалы времени.
3. Квадраты времен обращения двух планет пропорциональны кубам больших полуосей их орбит.

Законы эти, хотя и красивые, но довольно сложные. В дальнейшем Ньютон нашел для этих законов более простое, хотя и не менее удивительное, выражение, называемое законом всемирного тяготения:

Между любыми двумя телами действует сила притяжения, прямо пропорциональная их массам и обратно пропорциональная квадрату расстояния между ними.

<...>

Очевидно, что отсюда... вытекает равенство..., которое и называется уравнением Лапласа. Таким образом, Лаплас предложил отказаться от явной формулы для сил дальнего действия и заменить ее на дифференциальное уравнение для поля потенциала u . Можно считать, что дифференциальное уравнение описывает взаимодействие между соседними элементами поля u . Таким образом, введение этого поля подменяет задачу о дальнем действии между реальными телами задачей о «ближнем действии» взаимодействии между соседними областями пространства, залитого некоторым, искусственно придуманным, полем величины u . Лапласу мы обязаны идеей введения уравнений для описания этого поля u , уравнений, которые действуют всюду вне тех точек, в которых сосредоточены сами притягивающие массы. [15]

Природа силовой функции U или потенциала V , вообще говоря, непонятна; в современной физике принято говорить в таких случаях о действии некоторого поля и о совершаемой им работе. Различные явления (гравитационные, электрические, магнитные и др.) порождаются различными полями, описание которых (но не объяснений!) возможно на языке дифференциальных уравнений. *Тодхантер* [51] изложил историю появления в механике понятия потенциала (§§ 779, 789) и названия потенциала (§ 790).

То, что тяготение вне шара или сферической оболочки с массой M можно заменить тяготением точки той же массы в центре шара или оболочки, известно со времен Ньютона. Доказательство основано на геометрических построениях. Пример такого доказательства можно найти во втором томе книги *Томсона* [52]. В книге *Арнольда* [5] приведено современное доказательство.

Как не существует определения массы (в аксиоматике классической механики это числовой параметр), так не существует определения электрического заряда, но законы, описывающие электрические явления и свойства, позволяют (как и в случае массы) ввести числовую меру заряда. Таковыми служат закон *Кулона*, свойство заряда распределяться поровну между одинаковыми телами, а также существование двух видов заряда, которые принято различать по знаку (исторически — по способу получения и накопления, так называемое «кошачье» и «янтарное» []). Таким образом можно разделить заряд на достаточно малые части.

К разделу 1.5. на с. 23

Возникновение и развитие понятия корректности краевых задач математической физики рассмотрено в статье *Симонова* [45].

2. Канонический вид линейных уравнений второго порядка с двумя независимыми переменными

2.0. Προλεγόμενα

... в настоящее время самым важным из методов, при помощи которых математик приносит своими работами наибольшую пользу исследователю природы, является систематическая классификация величин. [29]

Вид дифференциальных уравнений в определенных рамках можно менять посредством различных преобразований зависимых и независимых переменных. Простейшие формы, достижимые с помощью неособых преобразований независимых переменных, принято называть каноническими. В этих формах накапливаются результаты теоретических исследований, ими же обычно удобно пользоваться и при практическом решении задач. [8]

Помимо уравнений *Лапласа* (??), теплопроводности (??) и колебаний (??), существуют другие линейные уравнения математической физики второго порядка, различающиеся количеством производных первого и второго порядков, а также видом коэффициентов перед производными, тем не менее, решения таких уравнений обладают свойствами, сходными со свойствами решений уравнений (??), (??) и (??), что позволяет включать уравнения в соответствующие классификационные единицы. В данном разделе мы рассмотрим одну из таких классификаций по типам (*эллиптические, параболические и гиперболические*) для уравнений от двух независимых переменных, основанную на преобразовании независимых переменных $(x, y) \leftrightarrow (\xi, \eta)$. Классификация по типам возможна и для уравнений от трёх независимых переменных, однако способ отнесения к типам для таких уравнений имеет мало общего со способом, рассмотренным в данном разделе.

Из соображений удобства и единообразия записи уравнений будем обозначать независимые переменные как x, y , то есть как декартовы ортогональные координаты на плоскости (полагая, что x, y изменяются в пределах области $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^2$), тогда уравнения (??), (??) и (??) примут следующий вид

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0,$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0.$$

Для того, чтобы сделать освоение классификации по типам независимым от предыдущего раздела, приведём определения дифференциальных уравнений в частных производных первого и второго порядков, включая различные виды линейных уравнений (квазилинейные, линейные с переменными и постоянными коэффициентами).

2.1. Основные определения

Определение 2.1. Соотношение вида

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{D}, \quad (2.1)$$

где все производные функции F по двум последним аргументам не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} , называется дифференциальным уравнением с частными производными первого порядка относительно функции $u(x, y)$. \square

Определение 2.2. Дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.1) называется *линейным относительно производных* или *квазилинейным*, если оно имеет вид

$$a_1(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + a_2(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = \Phi_1(x, y, u), \quad (2.2)$$

где коэффициенты a_1, a_2 при производных и член Φ_1 суть функции одних и тех же переменных, причём все коэффициенты a_1, a_2 не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} . \square

Определение 2.3. Дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.1) называется *линейным (с переменными коэффициентами)*, если оно имеет вид

$$a_1(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} + a_2(x, y) \frac{\partial u}{\partial y} + a_*(x, y) u = g(x, y), \quad (2.3)$$

где коэффициенты уравнения a_1, a_2, a_* и свободный член g (ещё — функция правой части или просто правая часть (уравнения)) суть функции одних и тех же переменных, причём все коэффициенты a_1, a_2 не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} . \square

Определение 2.4. Дифференциальное уравнение с частными производными первого порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.1) называется *линейным с постоянными коэффициентами*, если оно имеет вид

$$a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + a_2 \frac{\partial u}{\partial y} + a_* u = g(x, y), \quad (2.4)$$

где коэффициенты уравнения a_1, a_2, a_* суть постоянные, а функция $g(x, y)$ определена в области \mathcal{D} . \square

Иногда будем записывать линейные дифференциальные уравнения с переменными (2.3) или с постоянными (2.4) коэффициентами подобно линейному дифференциальному уравнению (2.2)

$$a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + a_2 \frac{\partial u}{\partial y} = \Phi_1, \quad (2.5)$$

где функция Φ_1 такова

$$\Phi_1(x, y, u) = g(x, y) - a_* u, \quad (2.6)$$

а коэффициенты a_1 , a_2 , a_* суть функции независимых переменных $(x, y) \in \mathcal{D}$ или постоянные.

Определение 2.5. Линейное дифференциальное уравнение в частных производных первого порядка (с переменными (2.3) или постоянными (2.4) коэффициентами) называется *однородным*, если $g(x, y) \equiv 0$. \square

Определение 2.6. Соотношение вида

$$F\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y}\right) = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{D}, \quad (2.7)$$

где все производные функции F по трём последним аргументам не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} , называется дифференциальным уравнением в частных производных второго порядка относительно функции $u(x, y)$. \square

Определение 2.7. Дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.7) называется *линейным относительно старших производных*, или *квазилинейным*, если оно имеет вид

$$a_{1,1}\left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}\right) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2}\left(\dots\right) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a_{2,2}\left(\dots\right) \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = \Phi_2\left(\dots\right), \quad (2.8)$$

где коэффициенты $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$ при вторых производных и член Φ_2 суть функции одних и тех же переменных, причём все коэффициенты $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$ не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} . \square

Определение 2.8. Дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.7) называется *линейным (с переменными коэффициентами)*, если оно имеет вид

$$a_{1,1}(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2}(\cdot) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a_{2,2}(\cdot) \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + a_1(\cdot) \frac{\partial u}{\partial x} + a_2(\cdot) \frac{\partial u}{\partial y} + a_*(\cdot) u = g(\cdot), \quad (2.9)$$

где коэффициенты уравнения $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$, a_1 , a_2 , a_* и свободный член g (ещё — функция правой части или просто правая часть (уравнения)) суть функции одних и тех же переменных, причём все коэффициенты $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$ не обращаются в нуль ни в одной точке области \mathcal{D} . \square

Определение 2.9. Дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка относительно функции $u(x, y)$ (2.7) называется *линейным с постоянными коэффициентами*, если оно имеет вид

$$a_{1,1} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial u}{\partial x} + a_2 \frac{\partial u}{\partial y} + a_* u = g(x, y), \quad (2.10)$$

где коэффициенты уравнения $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$, a_1 , a_2 , a_* суть постоянные, а функция $g(x, y)$ определена в области \mathcal{D} (см. пояснение 2.1 на с. 58). \square

Иногда будем записывать линейные дифференциальное уравнение с переменными (2.9) или постоянными (2.10) коэффициентами подобно линейному относительно старших производных дифференциальному уравнению (2.8)

$$a_{1,1} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = \Phi_2, \quad (2.11)$$

где функция Φ_2 такова

$$\Phi_2 \left(x, y, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y} \right) = g(x, y) - a_* u - a_1 \frac{\partial u}{\partial x} - a_2 \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.12)$$

а коэффициенты $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$, a_1 , a_2 , a_* суть функции независимых переменных $(x, y) \in \mathcal{D}$ или постоянные.

Определение 2.10. Линейное дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка (с переменными (2.9) или постоянными (2.10) коэффициентами) называется *однородным*, если $g(x, y) \equiv 0$. \square

2.2. Общее преобразование независимых переменных

Сделаем в окрестности $\mathcal{O}(x_0, y_0) \subset \mathcal{D}$ произвольной точки (x_0, y_0) непрерывно дифференцируемое преобразование независимых переменных

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y), \\ \eta = \psi(x, y), \end{cases} \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0). \quad (2.13)$$

Теорема 2.1. Пусть: 1) функции $\xi = \phi(x, y)$ и $\eta = \psi(x, y)$ (2.13) задают (прямое) непрерывно дифференцируемое отображение $\mathcal{O}(x_0, y_0) \rightarrow \mathcal{O}(\xi_0, \eta_0)$; 2) якобиан (прямого) отображения отличен от нуля или бесконечности в $\mathcal{O}(x_0, y_0)$

$$J(x, y) = \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} & \frac{\partial \psi}{\partial y} \end{vmatrix}, \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0), \quad (2.14)$$

тогда существует задаваемое функциями

$$\begin{cases} x = p(\xi, \eta), \\ y = q(\xi, \eta), \end{cases} \quad (\xi, \eta) \in \mathcal{O}(\xi_0, \eta_0), \quad (2.15)$$

обратное непрерывно дифференцируемое отображение $\mathcal{O}(\xi_0, \eta_0) \rightarrow \mathcal{O}(x_0, y_0)$. \square

Замечание 2.1. Пусть посылки теоремы 2.1 выполнены, тогда якобиан обратного отображения $\mathcal{O}(\xi_0, \eta_0) \rightarrow \mathcal{O}(x_0, y_0)$ отличен от нуля или бесконечности в $\mathcal{O}(\xi_0, \eta_0)$

$$I(\xi, \eta) = \left| \frac{\partial(p, q)}{\partial(\xi, \eta)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial p}{\partial \xi} & \frac{\partial p}{\partial \eta} \\ \frac{\partial q}{\partial \xi} & \frac{\partial q}{\partial \eta} \end{vmatrix}, \quad (\xi, \eta) \in \mathcal{O}(\xi', \eta'), \quad (2.16)$$

поскольку $J(x, y) I(\xi, \eta) \equiv 1$ (см. пояснение 2.2 на с. 58). \square

Пример 2.1. Пусть задано обратное преобразование независимых переменных $(\xi, \eta) = (r, \varphi) \rightarrow (x, y)$, известных как полярные координаты на плоскости,

$$\begin{cases} x = p(r, \varphi) = r \cos \varphi, \\ y = q(r, \varphi) = r \sin \varphi, \end{cases} \quad r \in [0, c], \quad \varphi \in [0, 2\pi), \quad (2.17)$$

$$\begin{cases} r = \phi(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ \varphi = \psi(x, y) = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \operatorname{arcctg} \frac{x}{y}, \end{cases} \quad 0 < x^2 + y^2 \leq c. \quad (2.18)$$

Вычислим якобианы преобразований




Рис. 2.1. Круг радиуса c с центром в начале прямоугольной декартовой системы координат (x, y) плоскости \mathbb{R}^2 отображается на прямоугольную область полярной системы координат (центр круга отображается на левую сторону прямоугольника, это особая точка отображения (2.18)) (б)

$$J(x, y) = \left| \frac{\partial(\phi, \psi)}{\partial(x, y)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial\phi}{\partial x} & \frac{\partial\phi}{\partial y} \\ \frac{\partial\psi}{\partial x} & \frac{\partial\psi}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ -\frac{y}{x^2 + y^2} & +\frac{x}{x^2 + y^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad (2.19)$$

$$I(r, \varphi) = \left| \frac{\partial(p, q)}{\partial(r, \phi)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial p}{\partial r} & \frac{\partial p}{\partial \phi} \\ \frac{\partial q}{\partial r} & \frac{\partial q}{\partial \phi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \phi & -r \sin \phi \\ \sin \phi & +r \cos \phi \end{vmatrix} = r. \quad (2.20)$$

В особой точке якобиан $J = \infty$, а якобиан $I = 0$, но всегда $JJ = 1$. ▲

Пусть дважды непрерывно дифференцируемая в области \mathcal{D} функция $u(x, y)$ удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению (2.11), (2.12). Выразим производные функции $u(x, y)$ первого и второго порядков по переменным x, y в $\mathcal{O}(x_0, y_0)$ через производные функции $v(\xi, \eta) := u(p(\xi, \eta), q(\xi, \eta))$ по переменным ξ, η в $\mathcal{O}(\xi_0, \eta_0)$ (при дифференцировании применяем обратную замену переменных, то есть $u(x, y) := v(\phi(x, y), \psi(x, y))$)

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x}}_1 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x}}_2, & \frac{\partial u}{\partial y} &= \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y}}_1 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y}}_2, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \\ &= \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x}}_{1,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x}}_{1,2} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x}}_{2,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x}}_{2,2} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial x}}_1 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial x}}_2, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) = \\ &= \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y}}_{1,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y}}_{1,2} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y}}_{2,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y}}_{2,2} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}}_1 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y}}_2, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) = \\ &= \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y}}_{1,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y}}_{1,2} \right) \frac{\partial \phi}{\partial y} + \left(\underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y}}_{2,1} + \underbrace{\frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y}}_{2,2} \right) \frac{\partial \psi}{\partial y} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y}}_1 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial y}}_2. \end{aligned}$$

Подставим полученные выражения для производных первого и второго порядков в дифференциальное уравнение (2.11), (2.12), проведём группировку членов с одинаковыми вторыми производными (обозначены парами индексов $_{1,1}$, $_{1,2}$, $_{2,1}$ и $_{2,2}$), учитывая при этом, что для дважды непрерывно дифференцируемой функции вторые смешанные производные равны, и запишем дифференциальное уравнение в независимых переменных ξ, η

$$b_{1,1} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \xi} + 2b_{1,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + b_{2,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \eta} = \Psi_2 \left(\xi, \eta, v, \frac{\partial v}{\partial \xi}, \frac{\partial v}{\partial \eta} \right), \quad (2.21)$$

где

$$\begin{cases} b_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y}, \\ b_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y}, \\ b_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y}, \end{cases} \quad (2.22)$$

$$\begin{aligned} \Psi_2 = & g - a_{\star} v - a_1 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - a_2 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) - \\ & - a_{1,1} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial x} \right) - 2a_{1,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} \right) - a_{2,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial y} \right). \end{aligned} \quad (2.23)$$

С помощью дифференциальных операторов

$$\begin{cases} R[\varphi, \omega] = a_{1,1} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \omega}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \frac{\partial \omega}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial \omega}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \varphi}{\partial y} \frac{\partial \omega}{\partial y}, \\ S[\varphi] = a_{1,1} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \varphi}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \end{cases} \quad (2.24)$$

коэффициенты (2.22) и функция (2.23) допускают краткую запись

$$b_{1,1} = R[\phi, \phi], \quad b_{1,2} = R[\phi, \psi], \quad b_{2,2} = R[\psi, \psi], \quad (2.25)$$

$$\Psi_2 = g - a_{\star} v - S[\phi] \frac{\partial v}{\partial \xi} - S[\psi] \frac{\partial v}{\partial \eta}. \quad (2.26)$$

Приведение дифференциального уравнения (2.11), (2.12) к виду (2.21) подразумевает зависимость коэффициентов (2.22) и функции (2.23) от переменных ξ, η , в силу существования обратного преобразования (2.15), которое не всегда имеет явное представление.

2.3. Приведение к каноническому виду

Поставим задачу упрощения преобразованного уравнения (2.21), (2.22), (2.23) как задачу обращения в нуль одного или двух его коэффициентов, например, коэффициента $b_{1,1}$. Для этого за независимую переменную $\xi = \phi(x, y)$ выберем решение нелинейного уравнения в частных производных первого порядка

$$R[\phi, \phi] = a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0). \quad (2.27)$$

Решая задачу обращения в нуль коэффициента $b_{2,2}$, получим такое же уравнение относительно функции $\psi(x, y)$

$$R[\psi, \psi] = a_{1,1} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + a_{2,2} \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0). \quad (2.28)$$

Существует связь между нелинейным дифференциальным уравнением в частных производных первого порядка вида (2.27), (2.28), и соответствующим обыкновенным уравнением. Эту связь указывает следующее

Утверждение 2.1. Для того, чтобы решением нелинейного дифференциального уравнения в частных производных первого порядка

$$a_{1,1} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + a_{2,2} \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial z}{\partial y} = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0), \quad (2.29)$$

была функция $z = \omega(x, y)$, необходимо и достаточно, чтобы обыкновенное дифференциальное уравнение

$$a_{1,1} dy dy - 2a_{1,2} dy dx + a_{2,2} dx dx = 0, \quad (x, y) \in \mathcal{O}(x_0, y_0), \quad (2.30)$$

имело 1-параметрическое семейство решений $\omega(x, y) = C$. □

Доказательство. Начнём с обоснования *необходимости* утверждения. Итак, пусть функция $z = \omega(x, y)$ есть решение уравнения в частных производных (2.29). Запишем тождество $\omega(x, y) - C = 0$, которое будем рассматривать как неявную функцию $y = y(x)$, тогда

$$\frac{d}{dx} (\omega(x, y(x)) - C) = \frac{\partial \omega}{\partial x} + \frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0, \quad \frac{\partial \omega}{\partial x} = -\frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{dy}{dx}, \quad \frac{\partial \omega}{\partial y} \neq 0, \quad (2.31)$$

или как неявную функцию $x = x(y)$, тогда

$$\frac{d}{dy} (\omega(x(y), y) - C) = \frac{\partial \omega}{\partial y} \frac{dx}{dy} + \frac{\partial \omega}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \omega}{\partial y} = -\frac{\partial \omega}{\partial x} \frac{dx}{dy}, \quad \frac{\partial \omega}{\partial x} \neq 0. \quad (2.32)$$

Теперь подставим полученные выражения для частной производной функции $\omega(x, y)$ по x в дифференциальное уравнение в частных производных (2.29). В первом случае будем иметь обыкновенное дифференциальное уравнение

$$a_{1,1} \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{1,2} \left(\frac{dy}{dx} \right) + a_{2,2} = 0, \quad (2.33)$$

а во втором — обыкновенное дифференциальное уравнение

$$a_{2,2} \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 - 2 a_{1,2} \left(\frac{dx}{dy} \right) + a_{1,1} = 0. \quad (2.34)$$

Оба обыкновенных дифференциальных уравнения приводимы к симметричной форме (2.30). Это означает, что *необходимость* утверждения доказана.

Перейдем к обоснованию *достаточности* утверждения. Итак, пусть 1-параметрическим семейством решений обыкновенного дифференциального уравнения (2.30) есть тождество $\omega(x, y) - C = 0$. Тогда в произвольной точке окрестности $\mathcal{O}(x_0, y_0)$ это тождество определяет неявную функцию $y = y(x)$ или неявную функцию $x = x(y)$. Тогда для дифференциала зависимой переменной, согласно (2.31), имеем выражение

$$dy = - \frac{\partial \phi}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)^{-1} dx,$$

а согласно (2.32) — выражение

$$dx = - \frac{\partial \phi}{\partial y} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)^{-1} dy.$$

Подставим найденные выражения для dy и для dx в обыкновенное дифференциальное уравнение (2.30), откуда сразу же получим дифференциальное уравнение в частных производных (2.29). Это означает, что *достаточность* утверждения доказана. ■

Определение 2.11. *Характеристиками* линейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка (2.11), (2.12), называются 1-параметрические семейства решений обыкновенного дифференциального уравнения (2.30) (или, что то же самое, обыкновенных дифференциальных уравнений (2.33) или (2.34)); сами дифференциальные уравнения (2.30), (2.33) и (2.34) называются *уравнениями характеристик*. □

Определение 2.12. Величина

$$D(x, y) = a_{1,2}^2 - a_{1,1}a_{2,2} \quad (2.35)$$

называется *дискриминантом* линейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка (2.11), (2.12). □

Пусть $a_{1,1} \neq 0$, тогда можем решить уравнение характеристик (2.33) относительно производной

$$\frac{dy}{dx} = \frac{a_{1,2} \mp \sqrt{D}}{a_{1,1}}, \quad (2.36)$$

пусть $a_{2,2} \neq 0$, тогда можем решить уравнение характеристик (2.34) относительно производной

$$\frac{dx}{dy} = \frac{a_{1,2} \mp \sqrt{D}}{a_{2,2}}, \quad (2.37)$$

и отнесём линейное дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка (2.11), (2.12) к одному из трёх типов, в зависимости от знака дискриминанта D (2.35) (см. табл. 2.1).

Табл. 2.1. Тип линейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка (2.11), (2.12)

$D = a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$	число и тип характеристик	тип уравнения
$D > 0$	две действительные	гиперболический
$D = 0$	одна действительная	параболический
$D < 0$	две комплексно-сопряжённые	эллиптический

Утверждение 2.2. При невырожденном преобразовании (2.13), (2.15) независимых переменных, дискриминанты уравнений в исходных и новых независимых переменных связаны равенствами

$$\begin{cases} D(x, y) = a_{1,2}^2 - a_{1,1} a_{2,2} = I^2(\xi, \eta) (b_{1,2}^2 - b_{1,1} b_{2,2}) = I^2(\xi, \eta) E(\xi, \eta), \\ E(\xi, \eta) = b_{1,2}^2 - b_{1,1} b_{2,2} = J^2(x, y) (a_{1,2}^2 - a_{1,1} a_{2,2}) = J^2(x, y) D(x, y), \end{cases} \quad (2.38)$$

где J (2.14), I (2.16) — соответственно якобианы прямого (2.13) и обратного (2.15) преобразований. \square

Доказательство. Вычислим дискриминант уравнения (2.21) в новых независимых переменных ξ, η

$$\begin{aligned} E(\xi, \eta) \equiv b_{1,2}^2 - b_{1,1} b_{2,2} = & \left[a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right] \times \\ & \times \left[a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right] - \\ & - \left[a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y} \right] \times \\ & \times \left[a_{1,1} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right], \end{aligned}$$

откуда сразу же получим второе равенство (2.38)

$$E(\xi, \eta) = \dots = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 \left(a_{1,2}^2 - a_{1,1} a_{2,2} \right) \equiv J^2(x, y) D(x, y).$$

Первое равенство (2.38) может быть доказано подобным образом. ■

Утверждение 2.3. При невырожденном преобразовании (2.13), (2.15) независимых переменных тип линейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка (2.11), (2.12) не меняется. □

Доказательство основано на равенствах (2.38), из которых следует, что при невырожденном преобразовании независимых переменных знак дискриминанта, который положен в основу выделения типов линейного дифференциального уравнения в частных производных второго порядка, согласно табл. 2.1, не меняется. ■

В области гиперболичности $D > 0$, поэтому уравнение (2.30) имеет два действительных 1-параметрических семейства решений $\phi(x, y) = C_1$ и $\psi(x, y) = C_2$. В силу утверждения 2.1, имеем $R[\phi, \phi] = 0$ (2.27) и $R[\psi, \psi] = 0$ (2.28). Следовательно, если ввести новые независимые переменные $\xi = \phi(x, y)$ и $\eta = \psi(x, y)$, то получим $b_{1,1}(\xi, \eta) \equiv 0$, $b_{2,2}(\xi, \eta) \equiv 0$. Это значит, что от старших членов уравнения (2.21), (2.22) останется только вторая смешанная производная

$$2 b_{1,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = \Psi_2 \left(\xi, \eta, v, \frac{\partial v}{\partial \xi}, \frac{\partial v}{\partial \eta} \right).$$

Разделив обе части последнего уравнения на $2 b_{1,2}(\xi, \eta) \neq 0$ приведём уравнение к *первому каноническому виду* в области гиперболичности

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = \Psi'_H \left(\xi, \eta, v, \frac{\partial v}{\partial \xi}, \frac{\partial v}{\partial \eta} \right), \quad \Psi'_H = \frac{\Psi_2}{2 b_{1,2}}. \quad (2.39)$$

Введём ещё одну пару независимых переменных (α, σ)

$$\begin{cases} \xi = \alpha + \sigma, \\ \eta = \alpha - \sigma, \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} (\xi + \eta), \\ \sigma = \frac{1}{2} (\xi - \eta), \end{cases} \quad (2.40)$$

и соответствующую зависимую $w(\alpha, \sigma) := v(\xi(\alpha, \sigma), \eta(\alpha, \sigma))$, тогда для производных функции $v(\xi, \eta) = w(\alpha(\xi, \eta), \sigma(\xi, \eta))$ получим следующие выражения

$$\begin{aligned}
\frac{\partial v}{\partial \xi} &= \frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial \xi} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \xi} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \\
\frac{\partial v}{\partial \eta} &= \frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial \eta} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \frac{\partial \sigma}{\partial \eta} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} - \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \\
\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} &= \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \right) = \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \right) \frac{\partial \alpha}{\partial \eta} + \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \right) \frac{\partial \sigma}{\partial \eta} = \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right) \right] - \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right) \right] = \\
&= \frac{1}{4} \left[\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha \partial \alpha} + \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma \partial \alpha} - \frac{\partial^2 w}{\partial \alpha \partial \sigma} - \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma \partial \sigma} \right] = \frac{1}{4} \left(\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} \right).
\end{aligned}$$

После подстановки выражения для смешанной производной функции $v(\xi, \eta)$ в первый канонический вид (2.39) уравнения в области гиперболичности получим *второй канонический вид* уравнения в области гиперболичности

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} - \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} = \Psi''_H \left(\alpha, \sigma, w, \frac{\partial w}{\partial \alpha}, \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \quad (2.41)$$

где

$$\begin{aligned}
&\Psi''_H \left(\alpha, \sigma, w, \frac{\partial w}{\partial \alpha}, \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right) = \\
&= 4\Psi'_H \left[\xi(\alpha, \sigma), \eta(\alpha, \sigma), v(\xi(\alpha, \sigma), \eta(\alpha, \sigma)), \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} + \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial \alpha} - \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right) \right].
\end{aligned}$$

В области параболичности $D = 0$, поэтому уравнение (2.30) имеет одно действительное 1-параметрическое решение $\phi(x, y) = C$, с помощью которого можно обратить в нуль только один из двух коэффициентов $b_{1,1}$, $b_{2,2}$ (2.22); пусть для определённости: $b_{1,1} = 0$, $b_{2,2} \neq 0$. Тогда, в силу утверждение 2.2, имеем $b_{1,2} = 0$, поскольку $b_{1,2}^2 - b_{1,1}b_{2,2} = 0$. Если ввести новую независимую переменную $\xi = \phi(x, y)$, а вторую независимую переменную $\eta = \psi(x, y)$ выбрать так, чтобы якобиан J (2.14) был отличен от нуля, то задача упрощения уравнения в области параболичности будет решена. Действительно, после обращения в нуль коэффициентов $b_{1,1}$ и $b_{1,2}$, уравнение принимает вид

$$b_{2,2} \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Psi_2 \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right),$$

и после деления его обеих частей на $b_{2,2} \neq 0$ получим *канонический вид* в области параболичности

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} = \Psi_P \left(\xi, \eta, u, \frac{\partial u}{\partial \xi}, \frac{\partial u}{\partial \eta} \right), \quad \Psi_P = \frac{\Psi_2}{b_{2,2}}. \quad (2.42)$$

В области *эллиптичности* $D < 0$, поэтому правые части уравнений (2.36), (2.37) и соответствующие 1-параметрические семейства решений суть комплексно сопряжённые

$$\begin{cases} \phi(x, y) = C, \\ \bar{\phi}(x, y) = \psi(x, y) = \bar{C}. \end{cases}$$

Если ввести *комплексные* независимые переменные

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y), \\ \eta = \bar{\phi}(x, y), \end{cases}$$

то уравнение (2.21) можно привести к такому же виду, что и в области гиперболичности

$$2b_{12} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = \Psi_2 \left(\xi, \eta, v, \frac{\partial v}{\partial \xi}, \frac{\partial v}{\partial \eta} \right).$$

Получим каноническую форму в области эллиптичности, введя *действительные* независимые переменные α, σ

$$\begin{cases} \xi = \alpha + i\sigma, \\ \eta = \alpha - i\sigma, \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2} (\xi + \eta), \\ \sigma = \frac{1}{2i} (\xi - \eta). \end{cases} \quad (2.43)$$

Далее найдём входящие в выражения для коэффициентов $b_{1,1}, b_{1,2}, b_{2,2}$ (2.22) производные комплексных независимых переменных ξ, η через производные действительных независимых переменных α, σ по исходным независимым переменным x и y

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} + i \frac{\partial \sigma}{\partial x}, & \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} - i \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial y} + i \frac{\partial \sigma}{\partial y}, & \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial y} - i \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \end{cases}$$

образуем произведения найденных производных

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \\ \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial y} - \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \\ \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial y} - \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial x} - \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} - i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} - i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial y} - \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} - i \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} - i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \\ \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial y} - \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} - i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} - i \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \end{cases}$$

и подставим их в выражения для коэффициентов $b_{1,1}$, $b_{1,2}$, $b_{2,2}$ (2.25)

$$\begin{cases} b_{1,1} = R[\alpha, \alpha] - R[\sigma, \sigma] + 2i R[\alpha, \sigma] = 0, \\ b_{1,2} = R[\alpha, \alpha] + R[\sigma, \sigma] \neq 0, \\ b_{2,2} = R[\alpha, \alpha] - R[\sigma, \sigma] - 2i R[\alpha, \sigma] = 0. \end{cases}$$

Из полученных выражений и комплексной сопряженности коэффициентов $b_{1,1}$ и $b_{2,2}$ следует, что равны нулю действительная и мнимая части последних

$$R[\alpha, \alpha] = R[\sigma, \sigma] \neq 0, \quad R[\alpha, \sigma] = 0. \quad (2.44)$$

Отсюда заключаем, что при введении действительных независимых переменных α и σ дифференциальное уравнение (2.21) принимает вид

$$c_{1,1} \frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} + c_{2,2} \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} = \Omega_2 \left(\alpha, \sigma, w, \frac{\partial w}{\partial \alpha}, \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \quad (2.45)$$

где $w(\alpha, \sigma) := u(x(\alpha, \sigma), y(\alpha, \sigma))$, а коэффициенты и правая часть таковы

$$c_{1,1} = R[\alpha, \alpha], \quad c_{1,2} = R[\alpha, \sigma], \quad c_{2,2} = R[\sigma, \sigma], \quad \Omega_2 = g - a_* w - S[\alpha] \frac{\partial w}{\partial \alpha} - S[\sigma] \frac{\partial w}{\partial \sigma}. \quad (2.46)$$

Разделив левую и правую части дифференциального уравнения (2.46) на коэффициенты $c_{1,1} = c_{2,2} \neq 0$, получим *канонический вид* дифференциального уравнения в области эллиптичности, записанный в действительных независимых переменных

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} = \Omega_E \left(\alpha, \sigma, w, \frac{\partial w}{\partial \alpha}, \frac{\partial w}{\partial \sigma} \right), \quad \Omega_E = \frac{\Omega_2}{c_{11}} = \frac{\Omega_2}{c_{22}}. \quad (2.47)$$

2.4. Алгоритм приведения к каноническому виду

Подведём итог приведения линейного уравнения в частных производных второго порядка от двух независимых переменных

$$a_{1,1}(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2}(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + a_{2,2}(x, y) \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = \Phi_2, \quad (2.48)$$

где функция Φ_2 такова

$$\Phi_2 = g(x, y) - a_*(x, y) u - a_1(x, y) \frac{\partial u}{\partial x} - a_2(x, y) \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.49)$$

к каноническому виду, составив следующий алгоритм.

1. Выписать коэффициенты уравнения (2.48), (2.49), то есть $a_{1,1}(x, y)$, $a_{1,2}(x, y)$, $a_{2,2}(x, y)$, $a_1(x, y)$, $a_2(x, y)$, $a_*(x, y)$.

2. Составить выражение для дискриминанта $D(x, y) = a_{1,2}^2 - a_{1,1}a_{2,2}$ и найти области в плоскости переменных (x, y) , в которых: а) $D > 0$ (область гиперболичности); б) $D = 0$ (область параболичности); в) $D < 0$ (область эллиптичности).

3. Составить дифференциальное уравнение (в обыкновенных производных) характеристик одного из таких видов:

а) относительно производной $y' = \frac{dy}{dx}$

$$a_{1,1}(x, y) \left(\frac{dy}{dx} \right)^2 - 2a_{1,2}(x, y) \left(\frac{dy}{dx} \right) + a_{2,2}(x, y) = 0; \quad (2.50)$$

б) относительно производной $x' = \frac{dx}{dy}$

$$a_{1,1}(x, y) - 2a_{1,2}(x, y) \left(\frac{dx}{dy} \right) + a_{2,2}(x, y) \left(\frac{dx}{dy} \right)^2 = 0; \quad (2.51)$$

4. Решить уравнение характеристик относительно производной, как квадратное, например, для уравнения (2.50) будут получены два решения в областях гиперболичности (действительные) и эллиптичности (комплексно сопряжённые) уравнения (2.48), (2.49)

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\mp} = \frac{a_{1,2}(x, y) \mp \sqrt{D(x, y)}}{a_{1,1}(x, y)} \quad (2.52)$$

и одно решение в области параболичности

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\mp} = \frac{a_{1,2}(x, y)}{a_{1,1}(x, y)}; \quad (2.53)$$

5. Решить полученные обыкновенные дифференциальные уравнения, то есть найти:

а) два 1-параметрических семейства решений в областях гиперболичности и эллиптичности уравнения (2.48), (2.49)

$$\begin{cases} \phi(x, y) = C_1, \\ \psi(x, y) = C_2; \end{cases} \quad (2.54)$$

б) одно 1-параметрическое семейство решений $\phi(x, y) = C_1$ в области параболичности уравнения (2.48), (2.49), дополнив найденное семейство таким 1-параметрическим семейством $\psi(x, y) = C_2$, чтобы было выполнено условие невырожденности преобразования;

6. Ввести новые независимые переменные

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y), \\ \eta = \psi(x, y), \end{cases} \quad (2.55)$$

после чего:

а) в областях гиперболичности и параболичности уравнения (2.48), (2.49) найти производные

$$\begin{aligned} & \frac{\partial \phi}{\partial x}, \quad \frac{\partial \phi}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial x}, \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y}, \\ & \frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad \frac{\partial \psi}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial x}, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial y}, \end{aligned} \quad (2.56)$$

и записать уравнение (2.48), (2.49) в каноническом виде

$$b_{1,1} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \xi} + 2b_{1,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} + b_{2,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \eta \partial \eta} = \Psi_2, \quad (2.57)$$

где

$$\begin{cases} b_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \phi}{\partial y}, \\ b_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \phi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y}, \\ b_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y}, \end{cases} \quad (2.58)$$

$$\begin{aligned} \Psi_2 = & g - a_* v - a_1 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - a_2 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \phi}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) - \\ & - a_{1,1} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial x} \right) - 2a_{1,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} \right) - a_{2,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \phi}{\partial y \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial y \partial y} \right), \end{aligned} \quad (2.59)$$

либо так (первые производные выделены из всех слагаемых (2.59) и множители перед ними собраны вместе, как коэффициенты c_1, c_2)

$$\Psi_2 = g - a_* v - b_1 \frac{\partial v}{\partial \xi} - b_2 \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad (2.60)$$

где

$$\begin{aligned} b_1 = S[\xi] &= a_{1,1} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \xi}{\partial y}, \\ b_2 = S[\eta] &= a_{1,1} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \eta}{\partial y}; \end{aligned} \quad (2.61)$$

б) в области эллиптичности уравнения (2.48), (2.49) ещё раз ввести новые независимые переменные

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\xi+\eta}{2} = \frac{\phi(x,y) + \psi(x,y)}{2}, \\ \sigma = \frac{\xi-\eta}{2} = \frac{\phi(x,y) - \psi(x,y)}{2i}, \end{cases} \quad (2.62)$$

найти производные

$$\begin{aligned} \frac{\partial \alpha}{\partial x}, \quad \frac{\partial \alpha}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x}, \quad \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y}, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \quad \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \quad \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x}, \quad \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y}, \end{aligned} \quad (2.63)$$

и записать уравнение (2.48), (2.49) в каноническом виде

$$c_{1,1} \frac{\partial^2 v}{\partial \alpha \partial \alpha} + 2 c_{1,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \alpha \partial \sigma} + c_{2,2} \frac{\partial^2 v}{\partial \sigma \partial \sigma} = \Omega_2, \quad (2.64)$$

где

$$\begin{cases} c_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial y}, \\ c_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \\ c_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y}, \end{cases} \quad (2.65)$$

а функция Ω_2 может быть записана либо так (слагаемые, включающие первые производные в новых независимых переменных, преобразованы «одной пачкой», поэтому каждая из таких производных присутствует пять раз)

$$\begin{aligned} \Omega_2 = g - a_* v - a_1 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \alpha}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) - a_2 \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial \sigma}{\partial y} \right) - \\ - a_{1,1} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x} \right) - 2a_{1,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y} \right) - a_{2,2} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y} \right), \end{aligned} \quad (2.66)$$

либо так (первые производные выделены из всех слагаемых (2.66) и множители перед ними собраны вместе, как коэффициенты c_1, c_2)

$$\Omega_2 = g - a_* v - c_1 \frac{\partial v}{\partial \xi} - c_2 \frac{\partial v}{\partial \eta}, \quad (2.67)$$

где

$$\begin{aligned} c_1 = S[\alpha] &= a_{1,1} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \alpha}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \alpha}{\partial y}, \\ c_2 = S[\sigma] &= a_{1,1} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \sigma}{\partial y}. \end{aligned} \quad (2.68)$$

Сделаем некоторые пояснения к алгоритму.

1. Если уравнение (2.48), (2.49) есть однородное, то оно останется таким и после приведения к каноническому виду, то же верно и в отношении члена (производной) нулевого порядка $a_* u \rightarrow a_* v$ (никакая замена переменных не может уничтожить или породить этот член уравнения); члены с первыми производными могут порождаться или уничтожаться вследствие замены независимых переменных.

2. Из общей теории приведения уравнений к каноническому виду однозначно следует, что после преобразования независимых переменных коэффициенты при вторых производных уравнения: а) *гиперболического* типа (2.57) суть $b_{1,1} = b_{2,2} = 0$, $b_{1,2} \neq 0$ (первый канонический вид) или $b_{1,1} + b_{2,2} = 0$, $b_{1,2} = 0$ (второй канонический вид); б) *эллиптического* типа (2.64) суть $c_{1,1} = c_{2,2} \neq 0$, $c_{1,2} = 0$, тем не менее, для проверки правильности введения новых независимых переменных, следует вычислить все коэффициенты при вторых производных.

3. Формулы преобразования уравнений к каноническому виду (в новых независимых переменных) дают выражения для коэффициентов в исходных независимых переменных x, y , поэтому везде, где это возможно, следует выполнить явную замену независимых переменных вида

$$\begin{cases} x = p(\xi, \eta), \\ y = q(\xi, \eta), \end{cases} \quad (2.69)$$

или вида

$$\begin{cases} x = r(\alpha, \sigma), \\ y = s(\alpha, \sigma), \end{cases} \quad (2.70)$$

которые суть следствия обращения зависимостей (2.55) или (2.62).

2.5. Примеры приведения к каноническому виду

Пример 2.2. Для дифференциального уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad (2.71)$$

найдем области, в которых уравнение сохраняет тип, и в каждой такой области приведем уравнение к каноническому виду.

1. Коэффициенты при вторых производных линейного однородного уравнения (2.71) суть $a_{1,1} = 1$, $a_{1,2} = 0$, $a_{2,2} = y$; первые производные и функция u отсутствуют, поэтому коэффициенты при них тождественно равны нулю: $a_1 = 0$, $a_2 = 0$, $a_* = 0$; правая часть g также есть тождественно равная нулю функция.

2. По известным коэффициентам вычислим дискриминант $D = a_{1,2}^2 - a_{1,1}a_{2,2} = -y$. Следовательно, на плоскости переменных (x, y) существуют две области, в которых уравнение сохраняет тип: I) $y > 0$ (область *эллиптичности*, $D < 0$); II) $y < 0$ (область *гиперболичности*, $D > 0$). На прямой $y = 0$ имеем $D = 0$, но говорить о параболическом типе уравнения мы не можем, поскольку прямая на плоскости не является областью. В таких случаях говорят, что на прямой $y = 0$, разделяющей области эллиптичности и гиперболичности, уравнение *вырождается*.

3. Уравнение характеристик получим подстановкой в общее уравнение (2.30) коэффициентов $a_{1,1}$, $a_{1,2}$, $a_{2,2}$ уравнения (2.71)

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = -y. \quad (2.72)$$

1. Перейдём к рассмотрению области *эллиптичности*.

4. Уравнение характеристик (2.72) здесь распадается на две комплексные ветви с разделяющимися переменными

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\mp} = \mp i\sqrt{y}.$$

5. Разделим переменные в обеих комплексных ветвях

$$\frac{dy}{\sqrt{y}} = \mp i dx \quad \Leftrightarrow \quad y^{-\frac{1}{2}} dy = \mp i dx$$

и найдём непосредственным интегрированием соответствующие ветвям 1-параметрические комплексно сопряжённые семейства решений

$$\frac{y^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \mp ix + C_{\mp} \quad \Leftrightarrow \quad 2\sqrt{y} = \mp ix + C_{\mp}.$$

6. Запишем переменные x, y в этих семействах в левой части и введём новые комплексные независимые переменные

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = 2\sqrt{y} + ix, \\ \eta = \psi(x, y) = 2\sqrt{y} - ix, \end{cases} \quad (2.73)$$

и, в соответствии с правилом введения новых действительных независимых переменных (2.43), положим для последних

$$\begin{cases} \alpha = \frac{\xi + \eta}{2} = 2\sqrt{y}, \\ \sigma = \frac{\xi - \eta}{2i} = x. \end{cases} \quad (2.74)$$

Теперь найдём первые и вторые производные переменных α, σ (2.74) по переменным x, y

$$\begin{cases} \frac{\partial \alpha}{\partial x} = 0, & \frac{\partial \alpha}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{y}}, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y} = -\frac{1}{2y\sqrt{y}}, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 1, & \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y} = 0. \end{cases}$$

Далее вычислим коэффициенты (2.65) при вторых производных по переменным α, σ

$$\begin{cases} c_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial y} = 1, \\ c_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 0, \\ c_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 1, \end{cases}$$

и функцию (2.66)

$$\begin{aligned} -\tilde{\Omega}_2 &= a_{1,1} \left(\underbrace{\frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x}}_0 + \underbrace{\frac{\partial w}{\partial \sigma} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x}}_0 \right) + 2a_{1,2} \left(\underbrace{\frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y}}_0 + \underbrace{\frac{\partial w}{\partial \sigma} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y}}_0 \right) + a_{2,2} \left(\underbrace{\frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y}}_{\neq 0} + \underbrace{\frac{\partial w}{\partial \sigma} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y}}_0 \right) = \\ &= a_{2,2} \frac{\partial w}{\partial \alpha} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y^2} = y \left(-\frac{1}{2} y^{-3/2} \right) \frac{\partial w}{\partial \alpha} = -\frac{1}{2} \frac{y}{y\sqrt{y}} \frac{\partial w}{\partial \alpha} = -\frac{1}{2\sqrt{y}} \frac{\partial w}{\partial \alpha} \stackrel{(2.74)}{=} -\frac{1}{\alpha} \frac{\partial w}{\partial \alpha}. \end{aligned}$$

Следовательно, канонический вид уравнения (2.71) в области *эллиптичности* таков

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} = \frac{1}{\alpha} \frac{\partial w}{\partial \alpha}. \quad (2.75)$$

II. Перейдём к рассмотрению области *гиперболичности*.

4. Уравнение характеристик (2.72) здесь расщепляется на две действительные ветви с разделяющимися переменными

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\mp} = \mp \sqrt{-y}.$$

5. Разделим переменные в обеих действительных ветвях

$$\frac{dy}{\sqrt{-y}} = \mp dx \quad \Leftrightarrow \quad -(-y)^{-\frac{1}{2}} d(-y) = \mp dx$$

и найдём непосредственным интегрированием соответствующие ветвям 1-параметрические семейства решений

$$-\frac{(-y)^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \mp x + C_{\mp} \quad \Leftrightarrow \quad -2\sqrt{-y} = \mp x + C_{\mp}.$$

6. Запишем переменные x, y в этих семействах в правой части, введём новые независимые переменные

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = 2\sqrt{-y} - x, \\ \eta = \psi(x, y) = 2\sqrt{-y} + x, \end{cases} \quad (2.76)$$

а затем найдём первые и вторые производные переменных ξ, η (2.76) по переменным x, y

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial x} = -1, & \frac{\partial \xi}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{-y}}, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} = \frac{1}{2y\sqrt{-y}}, \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} = +1, & \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{1}{\sqrt{-y}}, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} = \frac{1}{2y\sqrt{-y}}. \end{cases}$$

Далее вычислим коэффициенты (2.58) при вторых производных функции v по переменным ξ, η

$$\begin{cases} b_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial y} = 0, \\ b_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 2, \\ b_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0, \end{cases}$$

и функцию (2.59)

$$\begin{aligned} -\tilde{\Psi}_2 &= a_{1,1} \left(\underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x}}_0 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x}}_0 \right) + 2a_{1,2} \left(\underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y}}_0 + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y}}_0 \right) + a_{2,2} \left(\underbrace{\frac{\partial v}{\partial \xi} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y}}_{\neq 0} + \underbrace{\frac{\partial v}{\partial \eta} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y}}_{\neq 0} \right) = \\ &= \frac{y}{2y\sqrt{-y}} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \right) \stackrel{(2.76)}{=} \frac{2}{\xi + \eta} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \right), \end{aligned}$$

откуда следует первый канонический вид уравнения (2.71) в области гиперболичности

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \xi \partial \eta} = -\frac{1}{2} \frac{1}{\xi + \eta} \left(\frac{\partial v}{\partial \xi} + \frac{\partial v}{\partial \eta} \right). \quad (2.77)$$

Итак, уравнение (2.71) имеет канонический вид (2.75) в области эллиптичности ($y > 0$) и первый канонический вид (2.77) в области гиперболичности ($y < 0$), а на прямой линии $y = 0$ происходит параболическое вырождение (см. задачу 2.8 на с. 57). \blacktriangle

Пример 2.3. Для дифференциального уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} = 0 \quad (2.78)$$

найдем области, в которых уравнение сохраняет тип, и в каждой такой области приведем уравнение к каноническому виду.

1. Коэффициенты линейного однородного уравнения (2.78) суть $a_{1,1} = 1$, $a_{1,2} = -1$, $a_{2,2} = 2$, $a_1 = 0$, $a_2 = 0$, $a_* = 0$, функция правой части $g = 0$.

2. Поскольку дискриминант $D = a_{1,2}^2 - a_{1,1}a_{2,2} = (-1)^2 - 1 \cdot 2 = -1 < 0$, то приходим к заключению об эллиптичности уравнения на всей плоскости переменных (x, y) .

3. Составим уравнение характеристик в виде квадратного уравнения

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 + 2 \frac{dy}{dx} + 2 = 0.$$

4. Решим уравнение характеристик относительно производной в виде двух комплексно сопряженных ветвей

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\mp} = -1 \mp i.$$

5. Разделим переменные в найденных ветвях

$$dy = (-1 \mp i) dx$$

и после интегрирования найдем два 1-параметрических комплексно-сопряженных семейства

$$y = (-1 \mp i)x + C_{\mp}.$$

6. Запишем переменные x, y в этих семействах в левой части и введём последовательно новые комплексные независимые переменные ξ, η , а затем новые действительные переменные α, σ

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = x + y + ix, \\ \eta = \psi(x, y) = x + y - ix, \end{cases} \quad \begin{cases} \alpha = \frac{\xi + \eta}{2} = x + y, \\ \sigma = \frac{\xi - \eta}{2i} = x. \end{cases} \quad (2.79)$$

Найдём первые и вторые производные переменных α, σ (2.79) по переменным x, y

$$\begin{cases} \frac{\partial \alpha}{\partial x} = 1, & \frac{\partial \alpha}{\partial y} = 1, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y} = 0, \\ \frac{\partial \sigma}{\partial x} = 1, & \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y} = 0. \end{cases} \quad (2.80)$$

Далее вычислим коэффициенты (2.65) при вторых производных функции w по переменным α, σ

$$\begin{cases} c_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \alpha}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \alpha}{\partial y} = 1, \\ c_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \alpha}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \alpha}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 0, \\ c_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \sigma}{\partial x} \frac{\partial \sigma}{\partial y} + \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \sigma}{\partial y} \frac{\partial \sigma}{\partial y} = 1, \end{cases}$$

коэффициенты (2.68) при первых производных функции w по переменным α, σ

$$\begin{cases} c_1 = a_{1,1} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \alpha}{\partial y \partial y} = 0, \\ c_2 = a_{1,1} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \sigma}{\partial y \partial y} = 0, \end{cases}$$

и функцию (2.67)

$$\Omega_2 = -c_1 \frac{\partial u}{\partial \alpha} - c_2 \frac{\partial u}{\partial \sigma} = 0.$$

Следовательно, канонический вид уравнения (2.78)

$$\frac{\partial^2 w}{\partial \alpha^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial \sigma^2} = 0 \quad (2.81)$$

совпадает с уравнением *Лапласа*. ▲

Пример 2.4. Для дифференциального уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 2x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} - 2 \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (2.82)$$

найдем области, в которых уравнение сохраняет тип, и в каждой такой области приведем уравнение к каноническому виду.

1. Коэффициенты уравнения (2.82) суть $a_{1,1}=1$, $a_{1,2}=-x$, $a_{2,2}=x^2$, $a_1=0$, $a_2=-2$, $a_*=0$, а функция правой части $g=0$ (коэффициенты и правая часть определены на всей плоскости).

2. Из выражения для дискриминанта $D(x,y)=a_{1,2}^2-a_{1,1}a_{2,2}=x^2-x^2\equiv 0$ заключаем о *параболичности* уравнения во всей его области определения.

3. Составим уравнение характеристик

$$dy dy + 2x dy dx + x^2 dx dx = 0, \quad (2.83)$$

которое перепишем в виде квадратного уравнения относительно производной y по x

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2x \frac{dy}{dx} + x^2 = 0.$$

4. Решим уравнение относительно производной (квадратное уравнение имеет один корень кратности два) в виде одной действительной ветви

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_{\mp} = -x.$$

5. Разделим переменные в полученном дифференциальном уравнении

$$dy = -x dx$$

и после интегрирования найдём 1-параметрическое семейство, при записи которого поместим переменные x, y в левой части

$$x^2 + 2y = C_1. \quad (2.84)$$

6. 1-параметрическое семейство решений (2.84) уравнения характеристик позволяет ввести одну новую независимую переменную, например $\xi = \phi(x, y)$, а другую переменную, соответственно $\eta = \psi(x, y)$, введём так, чтобы преобразование от (x, y) к (ξ, η) было невырожденным. Геометрически это означает, что 1-параметрические семейства линий $\phi(x, y) = C_1$ и $\psi(x, y) = C_2$ пересекаются, но не касаются друг друга.

Геометрическое истолкование невырожденности преобразования $(x, y) \leftrightarrow (\xi, \eta)$ упрощает подбор подходящих функций $\psi(x, y)$. Например, преобразование

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = x^2 + 2y, \\ \eta = \psi(x, y) = y, \end{cases} \quad J(x, y) = \begin{vmatrix} 2x & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x, \quad (2.85)$$

оказывается вырожденным (рис. 2.2, а), поскольку линии обоих семейств $\xi = \text{const}$ и $\eta = \text{const}$ касаются в точках оси ординат. Напротив, преобразование

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = x^2 + 2y, \\ \eta = \psi(x, y) = x, \end{cases} \quad J(x, y) = \begin{vmatrix} 2x & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -2 \neq 0, \quad (2.86)$$

оказывается невырожденным (рис. 2.2, б), поскольку линии обоих семейств $\xi = \text{const}$ и $\eta = \text{const}$ пересекаются, но нигде не касаются. Следовательно, данное преобразование вводит новые независимые переменные должным образом (см. задачу 2.9 на с. 57).

Найдём первые и вторые производные переменных ξ, η (2.86) по переменным x, y

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial x} = 2x, & \frac{\partial \xi}{\partial y} = 2, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} = 2, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} = 0, \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} = 1, & \frac{\partial \eta}{\partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} = 0, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} = 0. \end{cases}$$




Рис. 2.2. Преобразование независимых переменных для уравнения (2.82) параболического типа в примере 2.4: первое семейство линий (синий цвет, a , b) образовано 1-параметрическим семейством решений (2.84) уравнения характеристик (2.83); второе семейство (коричневый цвет, a , b) может быть выбрано достаточно произвольно. Критерий отбора второго допустимого семейства состоит в том, что якобиан преобразования (2.14) на с. 33 принимает отличные от нуля или бесконечности значения. 1-параметрическое семейство $\psi(x, y) = y = C_2$ (2.85) не позволяет ввести всюду в плоскости (x, y) невырожденного преобразования, поскольку касается 1-параметрического семейства (2.84) в точках оси $x = 0$ (a) (якобиан здесь равен нулю). 1-параметрическое семейство $\psi(x, y) = x = C_2$ (2.86) (b) удовлетворяет критерию отбора

Далее вычислим коэффициенты (2.61) при вторых производных функции v по переменным ξ, η

$$\begin{cases} b_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial y} = 4x^2 - 2x \cdot 4x + 4x^2 = 0, \\ b_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 2x - 2x = 0, \\ b_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = 1, \end{cases}$$

коэффициенты (2.61) при первых производных функции v

$$\begin{cases} b_1 = a_{11} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} + 2a_{12} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \xi}{\partial y} = -1 \cdot 2 - 2 \cdot 2 = -2, \\ b_2 = a_{11} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} + 2a_{12} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + a_{22} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \eta}{\partial y} = -2 \cdot 0 = 0, \end{cases}$$

и функцию (2.60)

$$\Psi_2 = -b_1 \frac{\partial v}{\partial \xi} - b_2 \frac{\partial v}{\partial \eta} = 2 \frac{\partial v}{\partial \xi}.$$

Следовательно, можем записать канонический вид уравнения (2.82)

$$\frac{\partial^2 v}{\partial \eta^2} = 2 \frac{\partial v}{\partial \xi}. \quad (2.87)$$

Какое уравнение напоминает уравнение (2.87)? ▲

Пример 2.5. Для дифференциального уравнения

$$x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - 2y \frac{\partial u}{\partial y} = 0 \quad (2.88)$$

найдем области, в которых уравнение сохраняет тип, и в каждой такой области приведем уравнение к каноническому виду.

1. Коэффициенты уравнения (2.88) суть $a_{11} = x^2$, $a_{12} = 0$, $a_{22} = -y^2$, $a_1 = 0$, $a_2 = -2y$, $a_* = 0$, а функция правой части $g = 0$ (коэффициенты и правая часть определены на всей плоскости).

2. Выражение для дискриминанта $D = x^2 y^2 \geq 0$ указывает на *гиперболический* тип уравнения во всей плоскости, кроме прямых $x = 0$ и $y = 0$ (то есть в четырех квадрантах плоскости).

3. Составим уравнение характеристик

$$x^2 dy dy - y^2 dx dx = 0, \quad (2.89)$$

которое запишем в виде квадратного уравнения относительно производной y по x

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)^2 = \left(\frac{y}{x} \right)^2.$$

4. Решим полученное уравнение относительно производной в виде двух действительных ветвей

$$\left(\frac{dy}{dx} \right)_{\mp} = \mp \frac{y}{x}.$$

5. Разделим переменные в каждой из ветвей и проинтегрируем

$$\begin{cases} \frac{dy}{y} = -\frac{dx}{x}, \\ \frac{dy}{y} = +\frac{dx}{x}, \end{cases} \quad \begin{cases} xy = C_-, \\ \frac{y}{x} = C_+. \end{cases} \quad (2.90)$$

6. На основе двух 1-параметрических семейств решений (2.90) введем новые независимые переменные ξ, η

$$\begin{cases} \xi = \phi(x, y) = xy, \\ \eta = \psi(x, y) = \frac{y}{x}, \end{cases} \quad (2.91)$$

и найдем первые и вторые производные переменных ξ, η по переменным x, y

$$\begin{cases} \frac{\partial \xi}{\partial x} = y, & \frac{\partial \xi}{\partial y} = x, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} = 0, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} = 1, & \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} = 0, \\ \frac{\partial \eta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, & \frac{\partial \eta}{\partial y} = \frac{1}{x}, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} = 2 \frac{y}{x^3}, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{x^2}, & \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} = 0. \end{cases}$$

Далее вычислим коэффициенты (2.61) при вторых производных функции v по переменным ξ, η

$$\begin{cases} b_{1,1} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \xi}{\partial y} = x^2 y^2 - y^2 x^2 = 0, \\ b_{1,2} = a_{1,1} \frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \xi}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = x^2 \frac{y^2}{x^4} - y^2 \frac{1}{x^2} = 0, \\ b_{2,2} = a_{1,1} \frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_{1,2} \left(\frac{\partial \eta}{\partial x} \frac{\partial \eta}{\partial y} + \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial x} \right) + a_{2,2} \frac{\partial \eta}{\partial y} \frac{\partial \eta}{\partial y} = -x^2 \frac{y^2}{x^2} - y^2 = -2y^2, \end{cases}$$

коэффициенты (2.61) при первых производных функции v

$$\begin{cases} b_1 = a_{1,1} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \xi}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \xi}{\partial y} = -2xy, \\ b_2 = a_{1,1} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial x} + 2a_{1,2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial x \partial y} + a_{2,2} \frac{\partial^2 \eta}{\partial y \partial y} + a_1 \frac{\partial \eta}{\partial x} + a_2 \frac{\partial \eta}{\partial y} = 2x^2 \frac{y}{x^3} - y^2 \cdot 0 - 2y \cdot \frac{1}{x} = 0, \end{cases}$$

и функцию (2.60)

$$\Psi_2 = -b_1 \frac{\partial u}{\partial \xi} - b_2 \frac{\partial u}{\partial \eta} = 2xy \frac{\partial u}{\partial \xi}.$$

Теперь запишем уравнение (2.88) в переменных ξ, η

$$2(-2y^2) \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 2xy \frac{\partial u}{\partial \xi},$$

выполним очевидные сокращения в левой и правой частях

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = -\frac{1}{2} \frac{x}{y} \frac{\partial u}{\partial \xi}$$

и выразим отношение переменных x и y через переменную η (2.91)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = -\frac{1}{2\eta} \frac{\partial u}{\partial \xi}. \quad (2.92)$$

Уравнение (2.92) есть окончательная запись первого канонического вида уравнения (2.88) (см. задачу 2.10 на с. 57). ▲

2.6. Задачи

Задача 2.1. Для линейного дифференциального уравнения второго порядка с переменными коэффициентами (2.9) найдите области, в которых уравнение сохраняет тип, и приведите уравнение к каноническому виду в каждой такой области:

- 1) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 4 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 5 \frac{\partial u}{\partial x} + 3 \frac{\partial u}{\partial y} + 2u = 0;$
- 2) $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 6x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 5 \frac{\partial u}{\partial y} + 3u = 0;$
- 3) $x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + y \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} + 5 \frac{\partial u}{\partial y} - 3 \frac{\partial u}{\partial y} + 6u = 0;$
- 4) $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 8xy \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 6 \frac{\partial u}{\partial x} - 8 \frac{\partial u}{\partial y} + 2u = 0;$
- 5) $\text{sign } y \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \text{sign } x \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 3 \frac{\partial u}{\partial x} - 5 \frac{\partial u}{\partial y} + 7u = 0;$
- 6) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 2 \cos x \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + (4 - \sin^2 x) \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} - 9 \frac{\partial u}{\partial y} + 3u = 0;$
- 7) $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} - 2x\sqrt{y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} - x^2 y \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + x \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} - y \frac{\partial u}{\partial y} = 0;$
- 8) $\frac{1}{y^2} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x} + 2 \frac{x}{y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y} + \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0.$

Задача 2.2. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) гиперболического типа приведено к каноническому виду следующим преобразованием независимых переменных: $\xi = y + x$, $\eta = y - x$. Найдите коэффициент $a_{1,2}$.

Задача 2.3. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) гиперболического типа приведено к каноническому виду следующим преобразованием независимых переменных $\xi = y + x$, $\eta = y - x$. Каковы коэффициенты $a_{1,1}$, $a_{2,2}$?

Задача 2.4. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) гиперболического типа приведено к каноническому виду следующим преобразованием независимых переменных $\xi = y + x$, $\eta = y - x$. Найдите коэффициент $b_{1,2}$.

Задача 2.5. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) эллиптического типа приведено к каноническому виду следующим преобразованием независимых переменных $\alpha = y - x$, $\sigma = x$. Каков знак коэффициента $a_{1,1}$?

Задача 2.6. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) эллиптического типа приведено к каноническому виду следующим преобразованием независимых переменных $\alpha = y - x$, $\sigma = x$. Каков знак произведения $a_{1,1} a_{2,2}$?

Задача 2.7. Линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами (2.10) эллиптического типа приведено к каноническому виду следующим

преобразованием независимых переменных $\alpha = y - x$, $\sigma = x$. Выразите дискриминант D через один из коэффициентов уравнения.

Задача 2.8. Для уравнения (2.71) в примере 2.2 на с. 47 получите второй канонический вид уравнения.

Задача 2.9. Предложите несколько 1-параметрических семейств функций двух переменных $\psi(x, y) = C_2$, дополняющих 1-параметрическое семейство $\phi(x, y) = C_1$ (2.84) в примере 2.4 на с. 51 до невырожденного преобразования независимых переменных $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ при приведении уравнения параболического типа (2.82) к каноническому виду и выпишите соответствующие канонические виды.

Задача 2.10. Для уравнения (2.88) в примере 2.5 на с. 54 получите второй канонический вид уравнения.

2.7. Пояснения

К разделу 2.1. на с. 31

Пояснение 2.1 к с. 33. Следует различать линейное уравнение с постоянными коэффициентами и линейное уравнение с постоянными коэффициентами a_{11} , a_{12} , a_{22} при старших производных. ▼

К разделу 2.2. на с. 33

Пояснение 2.2 к с. 34.

3. Метод разделения переменных и специальные функции

3.0. Προλεγόμενα

3.1. Введение в метод разделения переменных

Эффективным методом решения краевых задач (в областях, обладающих определенной симметрией) для уравнений Лапласа и Гельмгольца является метод разделения переменных. Общая идея метода заключается в нахождении множества решений однородного уравнения с частными производными, удовлетворяющих определенным граничным условиям. Эти решения являются теми «атомами», из которых строится «общее» решение на основе принципа линейной суперпозиции. Поскольку каждый из «атомов» — решение соответствующего однородного уравнения, то их линейная комбинация также есть решение этого же уравнения. [40]

Всем, кто хоть раз пытался решить какое-либо дифференциальное уравнение, известно, что такое разделение переменных. Обычно этот метод представляется как множество всяческих ловких приемов, лежащих на грани математики. [43]

Метод разделения переменных для решения уравнений в частных производных, который легко продемонстрировать при решении некоторых важных задач, в общем виде оказывается весьма тонким, и описать его довольно трудно. Поэтому мы начнем с наиболее простых случаев, а затем постепенно перейдем к случаям, все более и более сложным.

Пока мы удовлетворимся несколько расплывчатым определением, утверждающим, что метод разделения переменных — это метод нахождения решений некоторого уравнения второго порядка в частных производных с n переменными, который состоит в сведении этого уравнения к некоторой системе из n (самое большее) обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. [34]

... основная идея метода разделения переменных состоит в представлении решения краевой задачи в виде разложения по собственным функциям задачи Штурма–Лиувилля, образующим полную систему функций в соответствующей пространственной области. Зная собственные значения и собственные функции соответствующего оператора, можно построить решения начально-краевых задач как для уравнения теплопроводности, так и для уравнения колебаний в ограниченной области. [44]

$$\begin{cases} \frac{\partial u(t, \mathbf{r})}{\partial t} = a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}), & (t, \mathbf{r}) \in (0, T] \times \mathcal{D}, \\ u(0, \mathbf{r}) = u_0(\mathbf{r}), & \mathbf{r} \in \mathcal{D}, \end{cases} \quad (3.1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u(t, \mathbf{r})}{\partial t^2} = a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}), & (t, \mathbf{r}) \in (0, T] \times \mathcal{D}, \\ \frac{\partial u(0, \mathbf{r})}{\partial t} = u_1(\mathbf{r}) \\ u(0, \mathbf{r}) = u_0(\mathbf{r}) \end{cases}, \quad \mathbf{r} \in \mathcal{D}, \quad (3.2)$$

$$\frac{\partial u(t, \mathbf{r})}{\partial t} = a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}), \quad (3.3)$$

$$\frac{\partial^2 u(t, \mathbf{r})}{\partial t^2} = a^2 \Delta u(t, \mathbf{r}). \quad (3.4)$$

$$O'(t) v(\mathbf{r}) = a^2 O(t) \Delta v(\mathbf{r}), \quad (3.5)$$

$$O''(t) v(\mathbf{r}) = a^2 O(t) \Delta v(\mathbf{r}). \quad (3.6)$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{O'(t)}{O(t)} = \frac{\Delta v(\mathbf{r})}{v(\mathbf{r})} = -\lambda, \quad (3.7)$$

$$\frac{1}{a^2} \frac{O''(t)}{O(t)} = \frac{\Delta v(\mathbf{r})}{v(\mathbf{r})} = -\lambda. \quad (3.8)$$

$$O'(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \quad (3.9)$$

$$O''(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \quad (3.10)$$

$$\Delta v(\mathbf{r}) + \lambda v(\mathbf{r}) = 0. \quad (3.11)$$

$$v(\mathbf{r}) (\Delta v(\mathbf{r}) + \lambda v(\mathbf{r})) = 0 \quad (3.12)$$

$$\int_{\mathcal{D}} v \Delta v(\mathbf{r}) d\mathcal{D} + \lambda \int_{\mathcal{D}} v^2(\mathbf{r}) d\mathcal{D} = 0 \quad (3.13)$$

$$\int_{\mathcal{D}} [u(\mathbf{r}) \Delta u(\mathbf{r}) + (\nabla u(\mathbf{r}))^2] d\mathcal{D} = \oint_{\mathcal{S}} u(\mathbf{r}) \frac{\partial u(\mathbf{r})}{\partial \boldsymbol{\nu}} d\mathcal{S} \quad (3.14)$$

$$\oint_{\mathcal{S}} v(\mathbf{r}) \frac{\partial v(\mathbf{r})}{\partial \boldsymbol{\nu}} d\mathcal{S} + \lambda \int_{\mathcal{D}} v^2(\mathbf{r}) d\mathcal{D} = \int_{\mathcal{D}} (\nabla v(\mathbf{r}))^2 d\mathcal{D}, \quad (3.15)$$

$$\lambda = \frac{\int_{\mathcal{D}} (\nabla v(\mathbf{r}))^2 d\mathcal{D}}{\int_{\mathcal{D}} v^2(\mathbf{r}) d\mathcal{D}} \geq 0. \quad (3.16)$$

Уравнение Гельмгольца

$$\Delta u(\mathbf{r}) + c^2 u(\mathbf{r}) = 0. \quad (3.17)$$

3.2. Операторы ∇ и Δ в криволинейных ортогональных координатах

Пусть пространство \mathbb{R}^3 параметризовано с помощью декартовой ортогональной системы координат, то есть $\mathbf{r} = (x_1, x_2, x_3)$. Рассмотрим параметризацию пространства с помощью системы криволинейных координат $\mathbf{q} = (q_1, q_2, q_3)$

$$\mathbf{r} = \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{q}) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x_1 = \varphi_1(q_1, q_2, q_3), \\ x_2 = \varphi_2(q_1, q_2, q_3), \\ x_3 = \varphi_3(q_1, q_2, q_3), \end{cases} \quad (3.18)$$

причём зависимость (3.18) будем полагать обратимой

$$\mathbf{q} = \boldsymbol{\psi}(\mathbf{r}) \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} q_1 = \psi_1(x_1, x_2, x_3), \\ q_2 = \psi_2(x_1, x_2, x_3), \\ q_3 = \psi_3(x_1, x_2, x_3), \end{cases} \quad (3.19)$$

то есть якобианы прямого (3.19)

$$J = \left| \frac{\partial(\psi_1, \psi_2, \psi_3)}{\partial(x_1, x_2, x_3)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial\psi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial\psi_1}{\partial x_2} & \frac{\partial\psi_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial\psi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial\psi_2}{\partial x_2} & \frac{\partial\psi_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial\psi_3}{\partial x_1} & \frac{\partial\psi_3}{\partial x_2} & \frac{\partial\psi_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.20)$$

и обратного (3.18)

$$I = \left| \frac{\partial(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3)}{\partial(q_1, q_2, q_3)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial\varphi_1}{\partial q_1} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial q_2} & \frac{\partial\varphi_1}{\partial q_3} \\ \frac{\partial\varphi_2}{\partial q_1} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial q_2} & \frac{\partial\varphi_2}{\partial q_3} \\ \frac{\partial\varphi_3}{\partial q_1} & \frac{\partial\varphi_3}{\partial q_2} & \frac{\partial\varphi_3}{\partial q_3} \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3.21)$$

преобразований отличны от нуля, тогда $J(\mathbf{r}) I(\mathbf{q}) = 1$, за исключением разве что отдельных точек или линий.

Пусть система координат \mathbf{q} есть ортогональная, это значит, что базисные векторы $\mathbf{e}_1(\mathbf{q})$, $\mathbf{e}_2(\mathbf{q})$, $\mathbf{e}_3(\mathbf{q})$ в каждой точке $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ подчинены условиям

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{\partial \varphi}{\partial q_1} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial q_2} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_2} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_2} + \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_2} = 0, \\ \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{\partial \varphi}{\partial q_1} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial q_3} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_3} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_3} + \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_1} \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_3} = 0, \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{\partial \varphi}{\partial q_2} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial q_3} = \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_2} \frac{\partial \varphi_1}{\partial q_3} + \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_2} \frac{\partial \varphi_2}{\partial q_3} + \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_2} \frac{\partial \varphi_3}{\partial q_3} = 0. \end{cases} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} ds^2 = dx_1^2 + dx_2^2 + dx_3^2 &= \left(\frac{\partial x_1}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x_1}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial x_1}{\partial q_3} dq_3 \right)^2 + \\ &+ \left(\frac{\partial x_2}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x_2}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial x_2}{\partial q_3} dq_3 \right)^2 + \\ &+ \left(\frac{\partial x_3}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x_3}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial x_3}{\partial q_3} dq_3 \right)^2 \stackrel{??}{=} \\ &= H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2, \end{aligned} \quad (3.23)$$

$$\begin{aligned} dx_1^2 &= \left(\frac{\partial x_1}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial x_1}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial x_1}{\partial q_3} dq_3 \right)^2 = \\ &= \frac{\partial x_1}{\partial q_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_1} dq_1 dq_1 + \frac{\partial x_1}{\partial q_2} \frac{\partial x_1}{\partial q_2} dq_2 dq_2 + \frac{\partial x_1}{\partial q_3} \frac{\partial x_1}{\partial q_3} dq_3 dq_3 + \\ &+ 2 \frac{\partial x_1}{\partial q_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_2} dq_1 dq_2 + 2 \frac{\partial x_1}{\partial q_1} \frac{\partial x_1}{\partial q_3} dq_1 dq_3 + 2 \frac{\partial x_1}{\partial q_2} \frac{\partial x_1}{\partial q_3} dq_2 dq_3 \end{aligned} \quad (3.24)$$

где функции $H_1(q_1, q_2, q_3)$, $H_2(q_1, q_2, q_3)$, $H_3(q_1, q_2, q_3)$ — коэффициенты *Ламе*:

$$\begin{cases} H_1^2 = \left(\frac{\partial x_1}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_2}{\partial q_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_3}{\partial q_1} \right)^2, \\ H_2^2 = \left(\frac{\partial x_1}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_2}{\partial q_2} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_3}{\partial q_2} \right)^2, \\ H_3^2 = \left(\frac{\partial x_1}{\partial q_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_2}{\partial q_3} \right)^2 + \left(\frac{\partial x_3}{\partial q_3} \right)^2, \end{cases} \quad (3.25)$$

$$\Delta u(q_1^*, q_2^*, q_3^*) = \frac{1}{|\mathcal{D}|} \oint\!\!\!\oint_S \boldsymbol{\nu} \cdot \frac{\partial u}{\partial \boldsymbol{\nu}} dS, \quad (q_1^*, q_2^*, q_3^*) \in \mathcal{D}. \quad (3.26)$$

$$\Delta_{(q_1, q_2, q_3)} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial}{\partial q_1} \left(\frac{H_2 H_3}{H_1} \frac{\partial}{\partial q_1} \right) + \frac{\partial}{\partial q_2} \left(\frac{H_1 H_3}{H_2} \frac{\partial}{\partial q_2} \right) + \frac{\partial}{\partial q_3} \left(\frac{H_1 H_2}{H_3} \frac{\partial}{\partial q_3} \right) \right]. \quad (3.27)$$

Пример 3.1. В (круговой) цилиндрической системе координат имеем $q_1 = r$, $q_2 = \varphi$, $q_3 = z$:

$$\begin{cases} x_1 = r \cos \varphi, \\ x_2 = r \sin \varphi, \\ x_3 = z, \end{cases} \quad (3.28)$$

где $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, $-\infty < z < +\infty$, коэффициенты *Ламе* суть

$$\begin{cases} H_1 = r \cos \varphi, \\ H_2 = r \sin \varphi, \\ H_3 = z, \end{cases} \quad (3.29)$$

и оператор *Лапласа* принимает вид

$$\Delta_{(r, \varphi, z)} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}. \quad (3.30)$$

В особой точке $r = 0$ преобразования (3.28) оператор Лапласа (3.30) не может быть записан. ▲

Пример 3.2. В полярной системе координат имеем $q_1 = r$, $q_2 = \varphi$:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad (3.31)$$

где $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, коэффициенты *Ламе* суть

$$\begin{cases} H_1 = r \cos \varphi, \\ H_2 = r \sin \varphi, \end{cases} \quad (3.32)$$

и оператор *Лапласа* получается из (3.30) исключением производной по z

$$\Delta_{(r, \varphi)} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}. \quad (3.33)$$

▲

Пример 3.3. В сферической системе координат имеем $q_1 = r$, $q_2 = \psi$, $q_3 = \varphi$:

$$\begin{cases} x = r \sin \psi \cos \varphi, \\ y = r \sin \psi \sin \varphi, \\ z = r \cos \psi, \end{cases} \quad (3.34)$$

где $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \psi \leq \pi$, $0 \leq \varphi < 2\pi$, коэффициенты *Ламе* суть

$$\begin{cases} H_1 = r \cos \varphi, \\ H_2 = r \sin \varphi, \\ H_3 = z, \end{cases} \quad (3.35)$$

и оператор *Лапласа* принимает вид

$$\Delta_{(r, \psi, \varphi)} = \frac{1}{r^2 \sin \psi} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \sin \psi \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \psi} \left(\sin \psi \frac{\partial}{\partial \psi} \right) + \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\frac{1}{\sin \psi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right) \right]. \quad (3.36)$$

В особых точках $r = 0$ и $\psi = 0, \pi$ преобразования (3.34) оператор Лапласа (3.36) не может быть записан. ▲

3.3. Задача Штурма – Лиувилля на отрезке

Определение 3.1. Граничная задача Штурма – Лиувилля на отрезке $[0, \ell]$ заключается в нахождении:

1) нетривиальных (ненулевых) 1-параметрических решений $X_\lambda(x) \in \mathbb{R}$ линейного однородного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

$$X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad x \in (0, \ell); \quad (3.37)$$

удовлетворяющих однородным граничным условиям на концах отрезка

$$\begin{cases} \alpha_0 X(0) + \sigma_0 X'(0) = 0, & \alpha_0^2 + \sigma_0^2 > 0, \\ \alpha_\ell X(\ell) + \sigma_\ell X'(\ell) = 0, & \alpha_\ell^2 + \sigma_\ell^2 > 0; \end{cases} \quad (3.38)$$

2) значений параметра $\lambda \in \mathbb{R}$, при которых такие решения существуют. Решения $X_\lambda(x)$ называются *собственными функциями* задачи Штурма – Лиувилля (3.37), (3.38), а соответствующие им значения параметра λ — *собственными значениями* задачи. (см. пояснение) □

Мы ограничимся рассмотрением четырёх наборов граничных условий задачи (3.37), (3.38), приведённые во втором и третьем столбцах табл. 3.1.

Табл. 3.1. Собственные значения λ_μ и собственные функции $X_\mu(x)$ задачи (3.37), (3.38)

Задача	$x = 0$	$x = \ell$	λ_μ	X_μ
SL ₁ $\mu = 1, 2, 3, \dots$	$X(0) = 0$	$X(\ell) = 0$	$\left(\frac{\pi\mu}{\ell}\right)^2$	$\sin\left(\frac{\pi\mu x}{\ell}\right)$
SL ₂ $\mu = 0, 1, 2, \dots$	$X'(0) = 0$	$X'(\ell) = 0$	$\left(\frac{\pi\mu}{\ell}\right)^2$	$\cos\left(\frac{\pi\mu x}{\ell}\right)$
SL ₃ $\mu = 1, 2, 3, \dots$	$X(0) = 0$	$X'(\ell) = 0$	$\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2$	$\sin\left(\frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}\right)$
SL ₄ $\mu = 1, 2, 3, \dots$	$X'(0) = 0$	$X(\ell) = 0$	$\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2$	$\cos\left(\frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}\right)$

Покажем, что можно указать область допустимых значений параметра λ (но не самые значения), не решая задачу *Штурма – Лувилля*. Действительно, умножим уравнение задачи (3.37) на собственную функцию $X_\lambda(x)$ и проинтегрируем по отрезку $[0, \ell]$, выполняя интегрирование по частям и учитывая граничные условия, приведённые в табл. 3.1.

$$\begin{aligned} \int_0^\ell X(x) (X''(x) + \lambda X(x)) dx &= \int_0^\ell X(x) X''(x) dx + \lambda \int_0^\ell X^2(x) dx = \\ &= X(x) X'(x) \Big|_0^\ell - \int_0^\ell X'^2(x) dx + \lambda \int_0^\ell X^2(x) dx = - \int_0^\ell X'^2(x) dx + \lambda \int_0^\ell X^2(x) dx = 0. \end{aligned}$$

Тогда из последнего равенства получим следующую оценку для λ

$$\lambda = \frac{\int_0^\ell X_\lambda'^2(x) dx}{\int_0^\ell X_\lambda^2(x) dx} \geq 0. \quad (3.39)$$

Значению параметра $\lambda = 0$ соответствует уравнение $X''(x) = 0$, 2-параметрическое семейство решений которого найдём двукратным интегрированием

$$X(x) = A_1 + A_2 x. \quad (3.40)$$

Подстановка граничных условий в общее решение (3.40) даёт тривиальное решение $X_0(x) \equiv 0$ (такое решение не учитываем) для задач SL_1 , SL_3 , SL_4 , и решение $X_0(x) = A_1$ для задачи SL_2 , где A_1 — произвольная постоянная (при $A_1 = 0$ получим решение, которое не учитываем).

2-параметрическое семейство решений уравнения (3.37) (второго порядка, однородного и линейного, с постоянным коэффициентом) при $\lambda > 0$ построим методом *Эйлера*, образуя линейные комбинации частных решений вида $e^{\kappa_1 x}$ и $e^{\kappa_2 x}$

$$X(x) = A_1 e^{\kappa_1 x} + A_2 e^{\kappa_2 x}, \quad (3.41)$$

где $\kappa_{1,2} = \mp i\sqrt{\lambda}$ суть корни *характеристического уравнения* $\kappa^2 + \lambda = 0$. Поскольку

$$\begin{aligned} X'(x) &= \kappa_1 A_1 e^{\kappa_1 x} + \kappa_2 A_2 e^{\kappa_2 x}, \\ X''(x) &= \kappa_1^2 A_1 e^{\kappa_1 x} + \kappa_2^2 A_2 e^{\kappa_2 x} = -\lambda X(x), \end{aligned}$$

то семейство функций (3.41), очевидно, удовлетворяет уравнению (3.37).

Теперь запишем семейство (3.41) в таком виде

$$X(x) = +A_1 e^{-i\sqrt{\lambda}x} + A_2 e^{+i\sqrt{\lambda}x},$$

найдем производную семейства

$$X'(x) = -i\sqrt{\lambda} A_1 e^{-i\sqrt{\lambda}x} + i\sqrt{\lambda} A_2 e^{+i\sqrt{\lambda}x} = i\sqrt{\lambda} \left(-A_1 e^{-i\sqrt{\lambda}x} + A_2 e^{+i\sqrt{\lambda}x} \right)$$

и составим системы линейных алгебраических однородных уравнений относительно неопределённых коэффициентов A_1 и A_2 согласованием семейства с каждым из четырёх наборов граничных условий

$$\begin{aligned} \text{SL}_1 : \quad & \begin{cases} +e^{-i\sqrt{\lambda}0} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}0} A_2 = 0, \\ +e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} A_2 = 0, \end{cases} & \text{SL}_2 : \quad & \begin{cases} -e^{-i\sqrt{\lambda}0} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}0} A_2 = 0, \\ -e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} A_2 = 0, \end{cases} \\ \text{SL}_3 : \quad & \begin{cases} +e^{-i\sqrt{\lambda}0} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}0} A_2 = 0, \\ -e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} A_2 = 0, \end{cases} & \text{SL}_4 : \quad & \begin{cases} -e^{-i\sqrt{\lambda}0} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}0} A_2 = 0, \\ +e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} A_1 + e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} A_2 = 0, \end{cases} \end{aligned} \quad (3.42)$$

где вместо показательной функции мнимого аргумента следует подставлять соответствующее выражение из формулы Эйлера

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi. \quad (3.43)$$

Ненулевые решения ($A_1^2 + A_2^2 \neq 0$) каждой из четырёх систем линейных однородных уравнений (3.42) существуют только при выполнении следующих необходимых условий

$$\begin{aligned} \text{SL}_1 : \quad & \begin{vmatrix} +e^{-i\sqrt{\lambda}0} & +e^{+i\sqrt{\lambda}0} \\ +e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} & +e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} \end{vmatrix} = +2i \sin(\sqrt{\lambda}\ell) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}\ell = \mu\pi, \quad \mu = 1, 2, 3, \dots, \\ \text{SL}_2 : \quad & \begin{vmatrix} -e^{-i\sqrt{\lambda}0} & +e^{+i\sqrt{\lambda}0} \\ -e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} & +e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} \end{vmatrix} = -2i \sin(\sqrt{\lambda}\ell) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}\ell = \mu\pi, \quad \mu = 1, 2, 3, \dots, \\ \text{SL}_3 : \quad & \begin{vmatrix} +e^{-i\sqrt{\lambda}0} & +e^{+i\sqrt{\lambda}0} \\ -e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} & +e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} \end{vmatrix} = +2 \cos(\sqrt{\lambda}\ell) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}\ell = \frac{\pi}{2} + \mu\pi, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots, \\ \text{SL}_4 : \quad & \begin{vmatrix} -e^{-i\sqrt{\lambda}0} & +e^{+i\sqrt{\lambda}0} \\ +e^{-i\sqrt{\lambda}\ell} & +e^{+i\sqrt{\lambda}\ell} \end{vmatrix} = -2 \cos(\sqrt{\lambda}\ell) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda}\ell = \frac{\pi}{2} + \mu\pi, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots, \end{aligned}$$

которые дают искомые собственные значения задачи *Штурма – Лиувилля*, помещённые в четвёртом столбце табл. 3.1, причем счётный индекс μ для задач SL_3 и SL_4 сдвинут так, чтобы $\mu \in \mathbb{N}$.

Один из двух неопределённых коэффициентов A_1 и A_2 линейно выразим через второй, а при выборе значения последнего учтём, что собственные функции $X_\mu(x)$ задачи *Штурма – Лиувилля* обычно применяют как базис для построения решений дифференциальных уравнений в обыкновенных и частных производных, поэтому выбор значения свободного коэффициента проводят из условия простоты выражения $X_\mu(x)$.

В задаче SL_1 имеем $\sqrt{\lambda} = \frac{\mu\pi}{\ell}$, тогда для собственных функций получим

$$X_\mu(x) = A_1 e^{-i\frac{\mu\pi x}{\ell}} + A_2 e^{+i\frac{\mu\pi x}{\ell}} = (A_1 + A_2) \cos \frac{\mu\pi x}{\ell} + i(A_2 - A_1) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (3.44)$$

где коэффициенты A_1 и A_2 должны быть найдены из соответствующей вырожденной системы уравнений (3.42)

$$\begin{cases} + & A_1 + & A_2 = 0, \\ + \cos \mu\pi & A_1 + \cos \mu\pi & A_2 = 0. \end{cases} \quad (3.45)$$

Выразив из (3.45) $A_2 = -A_1$, перепишем (3.44)

$$X_\mu(x) = -2iA_1 \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (3.46)$$

Поскольку выбор коэффициента A_1 открыт, выберем $2iA_1 = -1$ и получим собственные функции задачи SL_1 в таком виде

$$X_\mu(x) = \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (3.47)$$

В задаче SL_2 имеем $\sqrt{\lambda} = \frac{\mu\pi}{\ell}$, тогда для собственных функций $X_\mu(x)$ получим то же выражение (3.44), что и в задаче SL_1 , в котором коэффициенты A_1 и A_2 должны быть найдены из соответствующей вырожденной системы уравнений (3.42)

$$\begin{cases} - & A_1 + & A_2 = 0, \\ - \cos \mu\pi & A_1 + \cos \mu\pi & A_2 = 0. \end{cases} \quad (3.48)$$

Выразив из (3.48) $A_2 = A_1$, перепишем (3.44)

$$X_\mu(x) = 2A_1 \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (3.49)$$

Выберем $2A_1 = 1$ и получим собственные функции задачи SL_2 в таком виде

$$X_\mu(x) = \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (3.50)$$

В задаче SL_3 имеем $\sqrt{\lambda} = \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell}$, тогда для собственных функций получим

$$X_\mu(x) = (A_1 + A_2) \cos \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell} + i(A_2 - A_1) \sin \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell}, \quad (3.51)$$

где коэффициенты A_1 и A_2 должны быть найдены из соответствующей вырожденной системы уравнений (3.42)

$$\begin{cases} + & A_1 + & A_2 = 0, \\ + i \sin \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell} A_1 + i \sin \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell} A_2 = 0. \end{cases} \quad (3.52)$$

Выразив из (3.52) $A_2 = -A_1$, перепишем (3.51)

$$X_\mu(x) = -2iA_1 \sin \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell}. \quad (3.53)$$

Выберем $2iA_1 = -1$ и получим собственные функции задачи SL_3 в таком виде

$$X_\mu(x) = \sin \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell}. \quad (3.54)$$

В задаче SL_4 имеем $\sqrt{\lambda} = \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell}$, тогда для собственных функций $X_\mu(x)$ получим то же выражение (3.51), что и в задаче SL_3 , в котором коэффициенты A_1 и A_2 должны быть найдены из соответствующей вырожденной системы уравнений (3.42)

$$\begin{cases} - & A_1 + & A_2 = 0, \\ - i \sin \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell} A_1 + i \sin \frac{(2\mu - 1)\pi}{2\ell} A_2 = 0. \end{cases} \quad (3.55)$$

Выразив из (3.55) $A_2 = A_1$, перепишем (3.51)

$$X_\mu(x) = 2A_1 \cos \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell}. \quad (3.56)$$

Выберем $2A_1 = 1$ и получим собственные функции задачи SL_4 в таком виде

$$X_\mu(x) = \cos \frac{(2\mu - 1)\pi x}{2\ell}. \quad (3.57)$$

Найденные собственные функции задачи *Штурма – Лиувилля* для каждого из четырёх наборов граничных условий помещены в пятом столбце табл. 3.1.

3.4. Общее решение уравнения Лапласа в полярных переменных

Будем искать решение уравнения Лапласа на плоскости \mathbb{R}^2 в полярной системе координат (3.31)

$$\Delta u(r, \varphi) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, \quad (3.58)$$

представляя искомую гармоническую функцию $u(r, \varphi)$ в виде произведения неизвестных функций $R(r)$ и $\Phi(\varphi)$

$$u(r, \varphi) = R(r) \Phi(\varphi). \quad (3.59)$$

Из представления (3.59) получим выражения для производных искомого решения по переменным r и φ

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = R' \Phi, & \frac{\partial u}{\partial \varphi} = R \Phi', \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = R'' \Phi, & \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = R \Phi'', \end{cases}$$

которые подставим в уравнение Лапласа (3.58)

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \equiv \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \frac{R'}{r} \Phi + R'' \Phi + \frac{R}{r^2} \Phi'' = 0.$$

Разделим последнее уравнение на $r^{-2} R(r) \Phi(\varphi)$ и разнесём в левую и правую части члены, зависящие от r и φ

$$\frac{r^2 R''(r) + r R'(r)}{R(r)} = - \frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)}. \quad (3.60)$$

Равенство (3.60) выполняется в произвольной точке (r, φ) плоскости, откуда заключаем, что левая и правая части (3.60) равны порознь постоянной величине

$$\underbrace{\frac{r^2 R''(r) + r R'(r)}{R(r)}}_1 = - \underbrace{\frac{\Phi''(\varphi)}{\Phi(\varphi)}}_2 = \underbrace{\text{const}}_3 \equiv \lambda, \quad (3.61)$$

называемой *параметром разделения*. Сочетание составляющих 1 и 3, 2 и 3 равенства (3.61) приводит к двум зависимым (через параметр разделения λ) обыкновенным дифференциальным уравнениям (*третий шаг*)

$$\Phi''(\varphi) + \lambda \Phi(\varphi) = 0, \quad (3.62)$$

$$r^2 R''(r) + r R'(r) - \lambda R(r) = 0. \quad (3.63)$$

Уравнение (3.62) относится к типу линейных однородных уравнений с постоянными коэффициентами, его общее решение таково

$$\Phi_\lambda(\varphi) = \begin{cases} A_\lambda \cos \sqrt{\lambda}\varphi + B_\lambda \sin \sqrt{\lambda}\varphi, & \lambda > 0, \\ A_0 + B_0 \varphi, & \lambda = 0, \\ A_\lambda \exp(-\sqrt{\lambda}\varphi) + B_\lambda \exp(+\sqrt{\lambda}\varphi), & \lambda < 0. \end{cases} \quad (3.64)$$

Очевидно, что условие периодичности решений $u_\lambda(\rho, \varphi) = R_\lambda(\rho) \Phi_\lambda(\varphi)$ может быть выполнено за счёт периодичности функций $\Phi_\lambda(\varphi)$ (3.64), последнее же достигается выбором: 1) значения $\lambda = 0$ (линейная функция), которому соответствует постоянное при $B_0 = 0$ решение

$$\Phi_0(\varphi) = A_0, \quad (3.65)$$

и 2) значений $\lambda > 0$ (тригонометрические функции). В последнем случае периодичность тригонометрических решений

$$A_\lambda \cos \sqrt{\lambda}\varphi + B_\lambda \sin \sqrt{\lambda}\varphi \equiv \Phi_\lambda(\varphi) = \Phi_\lambda(\varphi + 2\pi),$$

имеет место при

$$\sqrt{\lambda} 2\pi = \mu 2\pi, \quad \lambda = \mu^2, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (3.66)$$

откуда заключаем, что *множество допустимых положительных значений параметра разделения λ счётно*, а соответствующие им частные решения таковы

$$\Phi_\mu(\varphi) = A_\mu \cos \mu\varphi + B_\mu \sin \mu\varphi, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (3.67)$$

Перейдём к решению уравнения (3.63), которое относится к типу линейных однородных уравнений, его общее решение строится как суперпозиция (линейная комбинация) частных решений.

При допустимом значении параметра $\lambda = 0$ приведём уравнение (3.63) к виду

$$rR_0''(r) + R_0'(r) = (rR_0'(r))' = 0, \quad (3.68)$$

допускающему решение двумя последовательными квадратурами

$$R_0(r) = C_0 + D_0 \ln r. \quad (3.69)$$

При допустимых значениях параметра $\lambda > 0$ частные решения уравнения (3.63) ищем в виде степенных функций r^q

$$q(q-1)r^2r^{q-2} + qr r^{q-1} - \mu^2 r^q = r^q (q(q-1) + q - \mu^2) = r^q (q^2 - \mu^2) = 0,$$

откуда получаем алгебраическое уравнение относительно показателя степени q : $q^2 = \mu^2$. Соответствующие значениям $q = \mp\mu \neq 0$ частные решения уравнения (3.63) суть

$$R_\mu(r) = C_\mu r^{-\mu} + D_\mu r^{+\mu}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (3.70)$$

Общее решение уравнения *Лапласа* в полярной системе координат (3.31), периодическое по переменной φ , получим сложением частных решений вида (3.59) для допустимых значений параметра разделения $\lambda = 0$ и $\lambda = \mu^2$, $\mu \in \mathbb{N}$

$$u(r, \varphi) = R_0(r) \Phi_0(\varphi) + \sum_{\mu=1}^{\infty} R_\mu(r) \Phi_\mu(\varphi), \quad (3.71)$$

или, после подстановки полученных выражений для $R_0(r)$ (3.69), $\Phi_0(\varphi)$ (3.65), $R_\mu(r)$ (3.70), $\Phi_\mu(\varphi)$ (3.67), в виде

$$u(r, \varphi) = (C_0 + D_0 \ln r) A_0 + \sum_{\mu=1}^{\infty} (C_\mu r^{-\mu} + D_\mu r^{+\mu}) (A_\mu \cos \mu\varphi + B_\mu \sin \mu\varphi). \quad (3.72)$$

Общее решение (3.72) уравнения *Лапласа* в полярной системе координат (3.31), периодичное по переменной φ , имеет две особые точки, в которых оно неограничено:

1) начало координат ($r = 0$), за счёт логарифмического члена и членов с отрицательными степенями переменной r ;

2) бесконечно удаленную точку ($r = \infty$), за счёт логарифмического члена и членов с положительными степенями переменной r .

3.5. Задачи

К разделу 3.2. на с. 61

Задача 3.1. Вывести выражения (3.32) для коэффициентов *Ламе* в полярной системе координат (3.31).

Задача 3.2. Вывести выражения (3.29) для коэффициентов *Ламе* в (круговой) цилиндрической системе координат (3.28).

Задача 3.3. Вывести выражения (3.35) для коэффициентов *Ламе* в сферической системе координат (3.34).

Задача 3.4. Вывести выражение (3.33) для оператора *Лапласа* в полярной системе координат (3.31).

Задача 3.5. Вывести выражение (3.30) для оператора *Лапласа* в (круговой) цилиндрической системе координат (3.28).

Задача 3.6. Вывести выражение (3.36) для оператора *Лапласа* в сферической системе координат (3.34).

Задача 3.7. Вывести выражение (3.33) для оператора *Лапласа* в полярной системе координат (3.31), применяя замену переменных.

Решение.

Задача 3.8. Вывести выражения для коэффициентов *Ламе*:

- 1) в параболической цилиндрической системе координат;
- 2) в конической системе координат;
- 3) в параболической системе координат вращения;
- 4) в вытянутой сфероидальной системе координат вращения;
- 5) в сплюсненной сфероидальной системе координат вращения;
- 6) в эллипсоидальной системе координат вращения;
- 7) в параболоидальной системе координат вращения;
- 8) в эллиптической цилиндрической системе координат.

Задача 3.9. Рассмотреть задачу *Штурма – Лиувилля* и непосредственно показать, что при $\lambda \leq 0$ задача не имеет решения.

Задача 3.10. Допустимо ли при построении частного решения уравнения (??) в виде ряда (??) выбрать в качестве определяющего второе уравнение системы (??)?

3.6. Пояснения

4. Задачи для уравнений эллиптического типа

4.0. Προλεγόμενα

4.1. Постановки основных задач для уравнений Лапласа и Пуассона

4.2. Задачи Дирихле для уравнения Лапласа внутри и вне круга

4.2.1. Постановка внутренней задачи Дирихле

Внутренняя задача Дирихле для круга состоит в том, чтобы найти дважды непрерывно дифференцируемую в круге и непрерывную в замыкании круга гармоническую функцию u , принимающую заданные значения на границе круга

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & (x, y) \in \mathcal{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < c^2\}, \\ u(x, y) = g(x, y), & (x, y) \in \mathcal{S} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = c^2\}, \end{cases} \quad (4.1)$$

где $g(x, y) \in \mathcal{C}(\mathcal{S})$.




Рис. 4.1. Круг радиуса c с центром в начале прямоугольной декартовой системы координат (x, y) плоскости \mathbb{R}^2 , для которого ставится задача Дирихле (4.1) (а); образ круга в полярной системе координат (r, φ) (центр круга отображается на левую сторону прямоугольника, это особая точка отображения (3.31)) (б)

Введём полярную систему координат (3.31), в которой образ круга — прямоугольник $\mathcal{D} = \{0 \leq r < c\} \times \{0 \leq \varphi < 2\pi\}$, а образ границы круга — одна из сторон прямоугольника $\mathcal{S} = \{r = c\} \times \{0 \leq \varphi < 2\pi\}$ (рис. 4.1, б), тогда постановка задачи (4.1) принимает следующий вид

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \dot{u}}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \dot{u}}{\partial \varphi^2} = 0, & (r, \varphi) \in \mathcal{D}, \\ \dot{u}(c, \varphi) = \dot{g}(\varphi), & 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ \dot{u}(r, 0) = \dot{u}(r, 2\pi), & 0 \leq r \leq c, \end{cases} \quad (4.2)$$

где $\dot{u}(r, \varphi) := u(r \cos \varphi, r \sin \varphi)$, $\dot{g}(\varphi) := g(c \cos \varphi, c \sin \varphi)$. Отметим появление дополнительного условия в постановке задачи (4.2) — *периодичности* решения (непрерывности на обеих сторонах разреза, см. рис. 4.1, б): $\dot{u}(r, 0) = \dot{u}(r, 2\pi)$, обусловленного выбором полярной системы координат (3.31).

4.2.2. Решение внутренней задачи Дирихле методом разделения переменных

Для решения задачи (4.2) обратимся к общему решению (3.72) на с. 71 уравнения Лапласа (3.58) в полярной системе координат. Легко видеть, что общее решение в круге $r \leq c$ есть неограниченное, из-за функций $\ln r$ и $r^{-\mu}$, $\mu \in \mathbb{N}$. Следовательно, в постановку задачи (4.2) следует включить второе дополнительное условие — *ограниченности* решения. Положив в (3.72) $C_0 = 1$, $D_0 = 0$, $C_\mu = 0$, $D_\mu = 1$, получим ограниченное в круге общее решение уравнения Лапласа в переменных (r, φ)

$$\dot{u}(r, \varphi) = A_0 + \sum_{\mu=1}^{\infty} r^\mu \left(A_\mu \cos \mu\varphi + B_\mu \sin \mu\varphi \right). \quad (4.3)$$

Выберем неизвестные коэффициенты A_0 , A_μ , B_μ в общем решении (4.3) так, чтобы удовлетворить граничному условию $\dot{u}(c, \varphi) = \dot{g}(\varphi)$ задачи (4.2). Для этого разложим граничную функцию $\dot{g}(\varphi)$ в ряд Фурье на $[0, 2\pi]$

$$\dot{g}(\varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(a_\mu \cos \mu\varphi + b_\mu \sin \mu\varphi \right), \quad (4.4)$$

где коэффициенты Фурье суть

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \dot{g}(\phi) d\phi, \quad a_\mu = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \dot{g}(\phi) \cos \mu\phi d\phi, \quad b_\mu = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \dot{g}(\phi) \sin \mu\phi d\phi. \quad (4.5)$$

Сопоставляя ряд (4.3) при $r = c$ и ряд (4.4) получим выражения, связывающие коэффициенты этих рядов

$$a_0 = 2A_0, \quad a_\mu = c^\mu A_\mu, \quad b_\mu = c^\mu B_\mu, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (4.6)$$

Подставляя выражения (4.6) для коэффициентов A_0 , A_μ , B_μ через коэффициенты a_0 , a_μ , b_μ в общее решение (4.3) получим решение задачи (4.2)

$$\dot{u}(r, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{r}{c} \right)^\mu \left(a_\mu \cos \mu\varphi + b_\mu \sin \mu\varphi \right). \quad (4.7)$$

4.2.3. Решение внутренней задачи Дирихле с помощью интеграла Пуассона

Подставим в решение (4.7) задачи (4.2) вместо коэффициентов Фурье интегральные выражения (4.5); тогда будем иметь следующее представление для решения

$$\begin{aligned}
\dot{u}(r, \varphi) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{r}{c} \right)^{\mu} \left[\cos \mu \phi \cos \mu \varphi + \sin \mu \phi \sin \mu \varphi \right] \right\} \dot{g}(\phi) d\phi = \\
&= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \left\{ \frac{1}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{r}{c} \right)^{\mu} \cos \mu(\phi - \varphi) \right\} \dot{g}(\phi) d\phi.
\end{aligned} \tag{4.8}$$

Преобразуем выражение в фигурных скобках представления (4.8) при $r < c$ с помощью формулы *Эйлера* $2 \cos \mu(\phi - \varphi) = \exp \{-i\mu(\phi - \varphi)\} + \exp \{+i\mu(\phi - \varphi)\}$

$$\begin{aligned}
\frac{1}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{r}{c} \right)^{\mu} \cos \mu(\phi - \varphi) &= \left\{ \varrho := \frac{r}{c} \right\} = \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\varrho e^{-i(\phi - \varphi)} \right)^{\mu} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\varrho e^{+i(\phi - \varphi)} \right)^{\mu} \right] = \\
&= \frac{1}{2} \left[1 + \frac{\varrho e^{-i(\phi - \varphi)}}{1 - \varrho e^{-i(\phi - \varphi)}} + \frac{\varrho e^{+i(\phi - \varphi)}}{1 - \varrho e^{+i(\phi - \varphi)}} \right] = \\
&= \frac{1}{2} \frac{1 - \varrho^2}{1 + \varrho^2 - 2\varrho \cos(\phi - \varphi)} = \frac{1}{2} \frac{c^2 - r^2}{c^2 + r^2 - 2cr \cos(\phi - \varphi)}.
\end{aligned}$$

Заменяя выражение в фигурных скобках в (4.8) получим интегральную формулу для решения задачи (4.2) (интеграл *Пуассона*)

$$\dot{u}(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(c^2 - r^2) \dot{g}(\phi) d\phi}{c^2 + r^2 - 2cr \cos(\phi - \varphi)}. \tag{4.9}$$

4.2.4. Обоснование решения внутренней задачи *Дирихле*

4.2.5. Постановка внешней задачи *Дирихле*

Внешняя задача *Дирихле* для круга состоит в том, чтобы найти дважды непрерывно дифференцируемую вне круга и непрерывную в замыкании внешности круга гармоническую функцию u , принимающую заданные значения на границе круга (рис. 4.2, б)

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & (x, y) \in \mathcal{D} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > c^2\}, \\ u(x, y) = g(x, y), & (x, y) \in \mathcal{S} = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = c^2\}, \end{cases} \tag{4.10}$$

где $g(x, y) \in \mathcal{C}(\mathcal{S})$.

В полярной системе координат (3.31) постановка задачи (4.10) принимает следующий вид




Рис. 4.2. Область для задачи *Дирихле*, в которой искомая функция $u(x, y)$ удовлетворяет уравнению *Лапласа*: внутренность круга для задачи (4.1) (а), внешность круга для задачи (4.10) (б); на границе круга функция $u(x, y)$ принимает заданные значения $g(x, y)$

$$\begin{cases} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = 0, & (r, \varphi) \in \mathcal{D}, \\ u(c, \varphi) = \dot{g}(\varphi), & 0 \leq \varphi < 2\pi, \\ u(r, 0) = u(r, 2\pi), & c \leq r < \infty, \end{cases} \quad (4.11)$$

где $\dot{g}(\varphi) := g(c \cos \varphi, c \sin \varphi)$. Постановка внешней задачи (4.11), как и внутренней задачи (4.2), включает два дополнительных условия: *периодичности* и *ограниченности* решения.

4.2.6. Решение внешней задачи *Дирихле* методом разделения переменных

Решение задачи (4.11) может быть получено из общего решения (3.72) на с. 71 уравнения Лапласа (3.58) в полярной системе координат, подобно решению (4.7) внутренней задачи (4.2)

$$u(r, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{c}{r} \right)^{\mu} \left(a_{\mu} \cos \mu \varphi + b_{\mu} \sin \mu \varphi \right). \quad (4.12)$$

4.2.7. Решение внешней задачи *Дирихле* методом *Кельвина*

Решение задачи (4.11) методом *Кельвина* основано на *преобразовании инверсии*

$$r\rho = c^2, \quad (4.13)$$

отображающем внутренность круга (рис. 4.2, а) на его внешность (рис. 4.2, б) и наоборот.

Преобразуем уравнение *Лапласа* (3.58) в полярной системе координат к новым переменным (ρ, φ) , для чего вычислим производные функции u первого и второго порядков по r

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial r} = \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right) \left(\frac{d\rho}{dr} \right) = -\frac{c^2}{r^2} \frac{\partial u}{\partial \rho} = -\frac{\rho^2}{c^2} \frac{\partial u}{\partial \rho}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} = \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right) \left(\frac{d\rho}{dr} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial \rho} \right) \left(\frac{d^2 \rho}{dr^2} \right) = \frac{\rho^4}{c^4} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + 2 \frac{\rho^3}{c^4} \frac{\partial u}{\partial \rho}, \end{cases}$$

а затем подставим их в уравнение (3.58)

$$\begin{aligned} 0 = \Delta u(r, \varphi) &= -\frac{\rho^3}{c^4} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\rho^4}{c^4} \frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + 2 \frac{\rho^3}{c^4} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{\rho^2}{c^4} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} = \\ &= \frac{\rho^4}{c^4} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \rho^2} + \frac{1}{\rho} \frac{\partial u}{\partial \rho} + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) = \frac{\rho^4}{c^4} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} \right) = \frac{\rho^4}{c^4} \Delta u(\rho, \varphi). \end{aligned}$$

Следовательно, преобразование инверсии не изменяет уравнения *Лапласа*, а, значит, сводит внешнюю задачу (4.11) к внутренней задаче (4.2), решение которой представлено рядом (4.7). Выполнив в последнем преобразование инверсии (4.13), получим решение (4.12) внешней задачи (4.11).

4.2.8. Обоснование решения внешней задачи *Дирихле*

4.2.9. Примеры решения внутренней и внешней задач Дирихле

Пример 4.1. Рассмотрим внутреннюю задачу Дирихле

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 + 4x < 0, \\ u(x, y) = x^2, & x^2 + y^2 + 4x = 0. \end{cases} \quad (4.14)$$

Преобразуем уравнение границы области, дополнив квадратный двучлен $x^2 + 4x$ до полного квадрата

$$x^2 + y^2 + 4x = (x^2 + 4x + 4) + y^2 - 4 = (x + 2)^2 + y^2 - 4 = 0, \quad (4.15)$$

откуда заключим, что область \mathcal{D} , в которой поставлена задача Дирихле (4.14), есть круг радиуса 2 с центром в точке $(-2, 0)$. В полярной системе координат опишем область \mathcal{D}

$$\mathcal{D}: \begin{cases} x = r \cos \varphi - 2, \\ y = r \sin \varphi, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq r \leq 2, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi, \end{cases} \quad (4.16)$$

и запишем граничное условие

$$\begin{aligned} \dot{g}(\varphi) &= x^2 \Big|_{(x+2)^2+y^2=4} \stackrel{(4.16)}{=} (r \cos \varphi - 2)^2 \Big|_{r=2} = 4 \cos^2 \varphi - 8 \cos \varphi + 4 = \\ &= 2(1 + \cos 2\varphi) - 8 \cos \varphi + 4 = 2 \cos 2\varphi - 8 \cos \varphi + 6. \end{aligned} \quad (4.17)$$

Выражение в правой части равенства (4.17) есть разложение в ряд Фурье (4.4) граничной функции $\dot{g}(\varphi)$ задачи Дирихле (4.14). Следовательно, ненулевые коэффициенты ряда Фурье суть

$$\frac{a_0}{2} = 6, \quad a_1 = -8, \quad a_2 = 2,$$

а составленное по ним решение (4.7) внутренней задачи Дирихле (4.2) в переменных (r, φ) таково

$$\dot{u}(r, \varphi) = \frac{a_0}{2} + \left(\frac{r}{2}\right) a_1 \cos \varphi + \left(\frac{r}{2}\right)^2 a_2 \cos 2\varphi = 6 - 4r \cos \varphi + \frac{1}{2} r^2 \cos 2\varphi, \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi. \quad (4.18)$$

Вернёмся к исходным переменным (x, y) в решении (4.18), для чего применим формулу для косинуса двойного аргумента

$$\dot{u}(r, \varphi) = 6 - 4r \cos \varphi + \frac{1}{2} r^2 (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 6 - 4r \cos \varphi + \frac{1}{2} r^2 \cos^2 \varphi - \frac{1}{2} r^2 \sin^2 \varphi, \quad (4.19)$$

а затем применим формулы (4.16)

$$u(x, y) = 6 - 4(x + 2) + \frac{1}{2} (x + 2)^2 - \frac{1}{2} y^2 = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} y^2 - 2x. \quad (4.20)$$

Следовательно, решение задачи Дирихле (4.14) в переменных (x, y) таково (см. рис. 4.3)

$$u(x, y) = \frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} y^2 - 2x. \quad (4.21)$$

Обоснуем решение (4.21), показав, что оно удовлетворяет: 1) уравнению Лапласа; 2) граничному условию. Вначале найдём вторые повторные частные производные функции $u(x, y)$ (4.21)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = +x - 2, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = +1, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -y, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -1,$$




Рис. 4.3. Решение $u(x, y)$ (4.21) внутренней задачи Дирихле (4.14)

и убедимся, что функция $u(x, y)$ (4.21) удовлетворяет уравнению Лапласа. Далее вычислим значение функции $u(x, y)$ (4.21) на границе круга

$$\begin{aligned} u(x, y) \Big|_{x^2+y^2+4x=0} &= u(x, y) \Big|_{y^2=-x^2-4x} = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}y^2 - 2x \right) \Big|_{y^2=-x^2-4x} = \\ &= \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}(-x^2 - 4x) - 2x = \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^2 + 2x - 2x = x^2, \end{aligned}$$

и убедимся, что функция $u(x, y)$ (4.21) удовлетворяет граничному условию. Следовательно, внутренняя задача Дирихле (4.14) решена правильно. ▲

Пример 4.2. Для внешней задачи Дирихле

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 + 4x > 0, \\ u(x, y) = x^2, & x^2 + y^2 + 4x = 0, \end{cases} \quad (4.22)$$

решение получается из разложения граничной функции в ряд Фурье (4.17) и решения (4.12) внешней задачи Дирихле (4.11)

$$\dot{u}(r, \varphi) = 6 - \frac{16}{r} \cos \varphi + \frac{8}{r^2} \cos 2\varphi, \quad 2 \leq r \leq +\infty, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi. \quad (4.23)$$

Решение (4.23) показано на рис. 4.4 и 4.5.

В силу какого свойства решения (4.12) внешней задачи Дирихле (4.11) решение (4.23) задачи (4.22) асимптотически выходит на постоянное значение? Чему равняется это постоянное значение? ▲




Рис. 4.4. Решение $u(x, y)$ (4.23) внешней задачи Дирихле (4.22): $2 \leq r \leq 10$




Рис. 4.5. Решение $u(x, y)$ (4.23) внешней задачи Дирихле (4.22): $2 \leq r \leq 50$

Пример 4.3. Рассмотрим внутреннюю задачу *Дирихле*

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 < 0, \\ u(x, y) = g(x, y), & x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0, \end{cases} \quad (4.24)$$

граничные функции $g(x, y)$ которой записаны в табл. 4.1.

Табл. 4.1. Граничные функции для задачи (4.24)

№	Граничная функция
1	$g_1(x, y) = xy$
2	$g_2(x, y) = x^2y$
3	$g_3(x, y) = x^2y^2$
4	$g_4(x, y) = x^3y^2$

Преобразуем уравнение границы области, дополнив квадратные двучлены $x^2 + 4x$ и $y^2 - 2y$ до полных квадратов

$$x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = (x^2 + 4x + 4) + (y^2 - 2y + 1) - 9 = (x + 2)^2 + (y - 1)^2 - 9 = 0, \quad (4.25)$$

откуда заключим, что область \mathcal{D} , в которой поставлена задача *Дирихле* (4.24), есть круг радиуса 3 с центром в точке $(-2, 1)$. В полярной системе координат область \mathcal{D} имеет следующее описание

$$\mathcal{D}: \quad \begin{cases} x = r \cos \varphi - 2, \\ y = r \sin \varphi + 1, \end{cases} \quad \begin{cases} 0 \leq r \leq 3, \\ 0 \leq \varphi < 2\pi. \end{cases} \quad (4.26)$$

Дальнейшее изложение данного примера построено таким образом. Все окончательные выражения для решений $u(x, y)$ внутренней задачи *Дирихле* (4.24), а также вспомогательные выражения, позволяющие проследить за последовательностью действий и проверить их, сведены в табл. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, соответственно для наборов 1–4 граничного условия из табл. 4.1. Развёрнутый ход решения приведён только для граничного условия 4.

В полярной системе координат граничное условие 4 принимает вид

$$\begin{aligned} \check{g}(\varphi) &\equiv x^3y^2 \Big|_{(x+2)^2+(y-1)^2=9} = (r \cos \varphi - 2)^3(r \sin \varphi + 1)^2 \Big|_{r=3} = \\ &= -\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \\ &\quad - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi. \end{aligned} \quad (4.27)$$

Посмотрим на выражение (4.27) как на разложение в ряд *Фурье* (4.4) граничной функции $\check{g}(\varphi)$ задачи *Дирихле* (4.24). Тогда ненулевые коэффициенты ряда *Фурье* суть

$$\begin{aligned} \frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = +9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \\ a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}, \end{aligned} \quad (4.28)$$

Табл. 4.2. Решение задачи Дирихле (4.24) в круге $F(x, y) = (x + 1)^2 + (y - 1)^2 - 9 < 0$ для граничного условия 1

	$g(x, y)$	xy
1	$g(r, \varphi)$	$\underbrace{-2 + 3 \cos \varphi - 6 \sin \varphi}_0 + \underbrace{6 \sin \varphi + \frac{9}{2} \sin 2 \varphi}_1 + \underbrace{\frac{9}{2} \sin 2 \varphi}_2$
	a_μ, b_μ	$\frac{a_0}{2} = -2, \quad \underbrace{a_1 = +3, b_1 = -6}_0, \quad \underbrace{b_2 = +\frac{9}{2}}_1 + \underbrace{\frac{9}{2}}_2$
	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{-2 + r \cos \varphi - 2r \sin \varphi}_0 + \underbrace{2r \sin \varphi + \frac{1}{2} r^2 \sin 2 \varphi}_1 + \underbrace{\frac{1}{2} r^2 \sin 2 \varphi}_2$
	$u(x, y)$	\underbrace{xy}_2

Табл. 4.3. Решение задачи Дирихле (4.24) в круге $F(x, y) = (x+1)^2 + (y-1)^2 - 9 < 0$ для граничного условия 2

$g(x, y)$	$x^2 y$
$g(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{17}{2} - 12 \cos \varphi + \frac{75}{4} \sin \varphi}_{0} + \underbrace{\frac{9}{2} \cos 2\varphi - 18 \sin 2\varphi}_{2} + \underbrace{\frac{27}{4} \sin 3\varphi}_{3}$
a_μ, b_μ	$\underbrace{\frac{a_0}{2} = +\frac{17}{2}}_0, \quad \underbrace{a_1 = -12, b_1 = +\frac{75}{4}}_1, \quad \underbrace{a_2 = +\frac{9}{2}, b_2 = -18}_{2}, \quad \underbrace{b_3 = +\frac{27}{4}}_3$
$u(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{17}{2} - 4r \cos \varphi + \frac{25}{4} r \sin \varphi}_{0} + \underbrace{\frac{1}{2} r^2 \cos 2\varphi - 2r^2 \sin 2\varphi}_{2} + \underbrace{\frac{1}{4} r^3 \sin 3\varphi}_{3}$
$u(x, y)$	$\underbrace{+\frac{3}{4} x^2 y - \frac{1}{4} y^3 - \frac{1}{4} x^2 - xy + \frac{1}{4} y^2 - x + \frac{3}{2} y + 1}_{3} = F(x, y)P(x, y) + g(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4)}_2 \underbrace{\left(-\frac{1}{4}y - \frac{1}{4}\right)}_1 \underbrace{\left(-\frac{1}{4}y - \frac{1}{4}\right)}_0 + \underbrace{x^2 y}_3$

Табл. 4.4. Решение задачи Дирихле (4.24) в круге $F(x, y) = (x+1)^2 + (y-1)^2 - 9 < 0$ для граничного условия 3

	$g(x, y)$	$x^2 y^2$
	$g(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{293}{8} - 39 \cos \varphi + \frac{75}{2} \sin \varphi - \frac{27}{2} \cos 2\varphi - 36 \sin 2\varphi + 27 \cos 3\varphi + \frac{27}{2} \sin 3\varphi - \frac{81}{8} \cos 4\varphi}_{0} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 39 \cos \varphi + \frac{75}{2} \sin \varphi - \frac{27}{2} \cos 2\varphi - 36 \sin 2\varphi + 27 \cos 3\varphi + \frac{27}{2} \sin 3\varphi - \frac{81}{8} \cos 4\varphi}}_1 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 39 \cos \varphi + \frac{75}{2} \sin \varphi - \frac{27}{2} \cos 2\varphi - 36 \sin 2\varphi + 27 \cos 3\varphi + \frac{27}{2} \sin 3\varphi - \frac{81}{8} \cos 4\varphi}}_2 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 39 \cos \varphi + \frac{75}{2} \sin \varphi - \frac{27}{2} \cos 2\varphi - 36 \sin 2\varphi + 27 \cos 3\varphi + \frac{27}{2} \sin 3\varphi - \frac{81}{8} \cos 4\varphi}}_3 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 39 \cos \varphi + \frac{75}{2} \sin \varphi - \frac{27}{2} \cos 2\varphi - 36 \sin 2\varphi + 27 \cos 3\varphi + \frac{27}{2} \sin 3\varphi - \frac{81}{8} \cos 4\varphi}}_4$
	a_μ, b_μ	$\underbrace{\frac{a_0}{2} = +\frac{293}{8}}_0, \underbrace{a_1 = -39, b_1 = +\frac{75}{2}}_1, \underbrace{a_2 = -\frac{27}{2}, b_2 = -36, a_3 = +27, b_3 = +\frac{27}{2}}_2, \underbrace{a_4 = -\frac{81}{8}}_4$
3	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{293}{8} - 13 r \cos \varphi + \frac{25}{2} r \sin \varphi - \frac{3}{2} r^2 \cos 2\varphi - 4 r^2 \sin 2\varphi + r^3 \cos 3\varphi + \frac{1}{2} r^3 \sin 3\varphi - \frac{1}{8} r^4 \cos 4\varphi}_{0} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 13 r \cos \varphi + \frac{25}{2} r \sin \varphi - \frac{3}{2} r^2 \cos 2\varphi - 4 r^2 \sin 2\varphi + r^3 \cos 3\varphi + \frac{1}{2} r^3 \sin 3\varphi - \frac{1}{8} r^4 \cos 4\varphi}}_1 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 13 r \cos \varphi + \frac{25}{2} r \sin \varphi - \frac{3}{2} r^2 \cos 2\varphi - 4 r^2 \sin 2\varphi + r^3 \cos 3\varphi + \frac{1}{2} r^3 \sin 3\varphi - \frac{1}{8} r^4 \cos 4\varphi}}_2 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 13 r \cos \varphi + \frac{25}{2} r \sin \varphi - \frac{3}{2} r^2 \cos 2\varphi - 4 r^2 \sin 2\varphi + r^3 \cos 3\varphi + \frac{1}{2} r^3 \sin 3\varphi - \frac{1}{8} r^4 \cos 4\varphi}}_3 \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 13 r \cos \varphi + \frac{25}{2} r \sin \varphi - \frac{3}{2} r^2 \cos 2\varphi - 4 r^2 \sin 2\varphi + r^3 \cos 3\varphi + \frac{1}{2} r^3 \sin 3\varphi - \frac{1}{8} r^4 \cos 4\varphi}}_4$
	$u(x, y)$	$\underbrace{-\frac{1}{8} x^4 + \frac{3}{4} x^2 y^2 - \frac{1}{8} y^4 + \frac{3}{4} x^2 - 2 xy - \frac{3}{4} y^2 - 9 x + \frac{9}{2} y + 7}_{4} \underbrace{\phantom{-\frac{1}{8} x^4 + \frac{3}{4} x^2 y^2 - \frac{1}{8} y^4 + \frac{3}{4} x^2 - 2 xy - \frac{3}{4} y^2 - 9 x + \frac{9}{2} y + 7}}_1 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{8} x^4 + \frac{3}{4} x^2 y^2 - \frac{1}{8} y^4 + \frac{3}{4} x^2 - 2 xy - \frac{3}{4} y^2 - 9 x + \frac{9}{2} y + 7}}_2 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{8} x^4 + \frac{3}{4} x^2 y^2 - \frac{1}{8} y^4 + \frac{3}{4} x^2 - 2 xy - \frac{3}{4} y^2 - 9 x + \frac{9}{2} y + 7}}_0$
	$u(x, y)$	$= F(x, y)P(x, y) + g(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4)}_2 \underbrace{}_1 \underbrace{}_0 \underbrace{\left(-\frac{1}{8} x^2 - \frac{1}{8} y^2 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} y - \frac{7}{4}\right)}_1 \underbrace{\phantom{\left(-\frac{1}{8} x^2 - \frac{1}{8} y^2 + \frac{1}{2} x - \frac{1}{4} y - \frac{7}{4}\right)}}_0 + \underbrace{x^2 y^2}_4$

Табл. 4.5. Решение задачи Дирихле (4.24) в круге $F(x, y) = (x+1)^2 + (y-1)^2 - 9 < 0$ для граничного условия 4

	$x^3 y^2$
$g(x, y)$	
$\dot{g}(\varphi)$	$\underbrace{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}_{0} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}}_1 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}}_2 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}}_3 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}}_4 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{1341}{8} \cos \varphi - 129 \sin \varphi + 9 \cos 2\varphi + \frac{297}{2} \sin 2\varphi - \frac{1431}{16} \cos 3\varphi - 81 \sin 3\varphi + \frac{243}{4} \cos 4\varphi + \frac{81}{4} \sin 4\varphi - \frac{243}{16} \cos 5\varphi}}_5$
a_μ, b_μ	$\underbrace{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}_0 \underbrace{\phantom{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}}_1 \underbrace{\phantom{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}}_2 \underbrace{\phantom{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}}_3 \underbrace{\phantom{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}}_4 \underbrace{\phantom{\frac{a_0}{2} = -\frac{527}{4}, \quad a_1 = +\frac{1341}{8}, \quad b_1 = -129, \quad a_2 = 9, \quad b_2 = +\frac{297}{2}, \quad a_3 = -\frac{1431}{16}, \quad b_3 = -81, \quad a_4 = +\frac{243}{4}, \quad b_4 = +\frac{81}{4}, \quad a_5 = -\frac{243}{16}}}_5$
$\dot{u}(r, \varphi)$	$\underbrace{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}_{0} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}}_1 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}}_2 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}}_3 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}}_4 \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi}}_5$
$u(x, y)$	$\underbrace{-\frac{1}{16} x^5 + \frac{5}{8} x^3 y^2 - \frac{5}{16} xy^4 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{4} x^3 y - \frac{3}{4} x^2 y^2 + \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{16} y^4 - \frac{3}{16} x^3 + \frac{1}{2} y^3 + \frac{9}{16} xy^2 - \frac{3}{2} x^2 y - \frac{29}{8} x^2 + \frac{67}{8} xy + \frac{29}{8} y^2 + \frac{121}{4} x - \frac{57}{4} y - \frac{45}{2}}_1 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^5 + \frac{5}{8} x^3 y^2 - \frac{5}{16} xy^4 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{4} x^3 y - \frac{3}{4} x^2 y^2 + \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{16} y^4 - \frac{3}{16} x^3 + \frac{1}{2} y^3 + \frac{9}{16} xy^2 - \frac{3}{2} x^2 y - \frac{29}{8} x^2 + \frac{67}{8} xy + \frac{29}{8} y^2 + \frac{121}{4} x - \frac{57}{4} y - \frac{45}{2}}}_2 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^5 + \frac{5}{8} x^3 y^2 - \frac{5}{16} xy^4 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{4} x^3 y - \frac{3}{4} x^2 y^2 + \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{16} y^4 - \frac{3}{16} x^3 + \frac{1}{2} y^3 + \frac{9}{16} xy^2 - \frac{3}{2} x^2 y - \frac{29}{8} x^2 + \frac{67}{8} xy + \frac{29}{8} y^2 + \frac{121}{4} x - \frac{57}{4} y - \frac{45}{2}}}_3 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^5 + \frac{5}{8} x^3 y^2 - \frac{5}{16} xy^4 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{4} x^3 y - \frac{3}{4} x^2 y^2 + \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{16} y^4 - \frac{3}{16} x^3 + \frac{1}{2} y^3 + \frac{9}{16} xy^2 - \frac{3}{2} x^2 y - \frac{29}{8} x^2 + \frac{67}{8} xy + \frac{29}{8} y^2 + \frac{121}{4} x - \frac{57}{4} y - \frac{45}{2}}}_4 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^5 + \frac{5}{8} x^3 y^2 - \frac{5}{16} xy^4 + \frac{1}{8} x^4 - \frac{1}{4} x^3 y - \frac{3}{4} x^2 y^2 + \frac{1}{4} xy^3 + \frac{1}{16} y^4 - \frac{3}{16} x^3 + \frac{1}{2} y^3 + \frac{9}{16} xy^2 - \frac{3}{2} x^2 y - \frac{29}{8} x^2 + \frac{67}{8} xy + \frac{29}{8} y^2 + \frac{121}{4} x - \frac{57}{4} y - \frac{45}{2}}}_5$
$u(x, y)$	$F(x, y)P(x, y) + g(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4)}_2 \underbrace{}_1 \underbrace{}_0 \left(\underbrace{-\frac{1}{16} x^3 - \frac{5}{16} xy^2 + \frac{3}{8} x^2 - \frac{3}{8} xy + \frac{1}{8} y^2 - \frac{31}{16} x + \frac{3}{4} y + \frac{45}{8}}_3 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^3 - \frac{5}{16} xy^2 + \frac{3}{8} x^2 - \frac{3}{8} xy + \frac{1}{8} y^2 - \frac{31}{16} x + \frac{3}{4} y + \frac{45}{8}}}_2 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^3 - \frac{5}{16} xy^2 + \frac{3}{8} x^2 - \frac{3}{8} xy + \frac{1}{8} y^2 - \frac{31}{16} x + \frac{3}{4} y + \frac{45}{8}}}_1 \underbrace{\phantom{-\frac{1}{16} x^3 - \frac{5}{16} xy^2 + \frac{3}{8} x^2 - \frac{3}{8} xy + \frac{1}{8} y^2 - \frac{31}{16} x + \frac{3}{4} y + \frac{45}{8}}}_0 \right) + \underbrace{x^3 y^2}_5$

и составленное по ним решение (4.7) таково

$$\begin{aligned} \dot{u}(r, \varphi) = & \frac{a_0}{2} + \left(\frac{r}{3}\right)^1 (a_1 \cos 1\varphi + b_1 \sin 1\varphi) + \left(\frac{r}{3}\right)^2 (a_2 \cos 2\varphi + b_2 \sin 2\varphi) + \\ & + \left(\frac{r}{3}\right)^3 (a_3 \cos 3\varphi + b_3 \sin 3\varphi) + \left(\frac{r}{3}\right)^4 (a_4 \cos 4\varphi + b_4 \sin 4\varphi) + \left(\frac{r}{3}\right)^5 a_5 \cos 5\varphi. \end{aligned} \quad (4.29)$$

Подставляя значения ненулевых коэффициентов (4.28) в правую часть (4.29), получим решение задачи Дирихле (4.24) в переменных (r, φ)

$$\begin{aligned} \dot{u}(r, \varphi) = & -\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + r^2 \cos 2\varphi + \frac{33}{2} r^2 \sin 2\varphi - \\ & - \frac{53}{16} r^3 \cos 3\varphi - 3r^3 \sin 3\varphi + \frac{3}{4} r^4 \cos 4\varphi + \frac{1}{4} r^4 \sin 4\varphi - \frac{1}{16} r^5 \cos 5\varphi. \end{aligned} \quad (4.30)$$

С помощью известных тригонометрических формул кратного аргумента

$$\begin{aligned} \cos 2\varphi &= \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi, & \sin 2\varphi &= 2 \cos \varphi \sin \varphi, \\ \cos 3\varphi &= \cos^3 \varphi - 3 \cos \varphi \sin^2 \varphi, & \sin 3\varphi &= 3 \cos^2 \varphi \sin \varphi - \sin^3 \varphi, \\ \cos 4\varphi &= \cos^4 \varphi - 6 \cos^2 \varphi \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi, & \sin 4\varphi &= 4 \cos^3 \varphi \sin \varphi - 4 \cos \varphi \sin^3 \varphi, \\ \cos 5\varphi &= \cos^5 \varphi - 10 \cos^3 \varphi \sin^2 \varphi + 5 \cos \varphi \sin^4 \varphi, & \sin 5\varphi &= 5 \cos^4 \varphi \sin \varphi - 10 \cos^2 \varphi \sin^3 \varphi + \sin^5 \varphi, \end{aligned}$$

перейдём в записи решения (4.30) к тригонометрическим функциям одинарного аргумента

$$\begin{aligned} \dot{u}(r, \varphi) = & -\frac{527}{4} + \frac{447}{8} r \cos \varphi - 43r \sin \varphi + (r \cos \varphi)^2 - (r \sin \varphi)^2 + \\ & + 33(r \cos \varphi)(r \sin \varphi) - \frac{53}{16} (r \cos \varphi)^3 + \frac{159}{16} (r \cos \varphi)(r \sin \varphi)^2 - \\ & - 9(r \cos \varphi)^2(r \sin \varphi) + 3(r \sin \varphi)^3 + \frac{3}{4} (r \cos \varphi)^4 - \\ & - \frac{9}{2} (r \cos \varphi)^2(r \sin \varphi)^2 + \frac{3}{4} (r \sin \varphi)^4 + (r \cos \varphi)^3(r \sin \varphi) - \\ & - (r \cos \varphi)(r \sin \varphi)^3 - \frac{1}{16} (r \cos \varphi)^5 + \frac{5}{8} (r \cos \varphi)^3(r \sin \varphi)^2 - \frac{5}{16} (r \cos \varphi)(r \sin \varphi)^4. \end{aligned}$$

К последнему выражению применим формулы (4.26) перехода к декартовым переменным

$$\begin{aligned} u(x, y) = & -\frac{527}{4} + \frac{447}{8} (x+2) - 43(y-1) + (x+2)^2 - (y-1)^2 + \\ & + 33(x+2)(y-1) - \frac{53}{16} (x+2)^3 + \frac{159}{16} (x+2)(y-1)^2 - \\ & - 9(x+2)^2(y-1) + 3(y-1)^3 + \frac{3}{4} (x+2)^4 - \\ & - \frac{9}{2} (x+2)^2(y-1)^2 + \frac{3}{4} (y-1)^4 + (x+2)^3(y-1) - \\ & - (x+2)(y-1)^3 - \frac{1}{16} (x+2)^5 + \frac{5}{8} (x+2)^3(y-1)^2 - \frac{5}{16} (x+2)(y-1)^4. \end{aligned}$$

Раскрыв скобки и проведя очевидные упрощения получим решение задачи Дирихле (4.24) в переменных (x, y) в виде многочлена пятой степени

$$\begin{aligned}
u(x, y) = & -\frac{1}{16}x^5 + \frac{5}{8}x^3y^2 - \frac{5}{16}xy^4 + \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{4}x^3y - \frac{3}{4}x^2y^2 + \frac{1}{4}xy^3 + \frac{1}{8}y^4 - \\
& -\frac{3}{16}x^3 + \frac{1}{2}y^3 + \frac{9}{16}xy^2 - \frac{3}{2}x^2y - \frac{29}{8}x^2 + \frac{67}{8}xy + \frac{29}{8}y^2 + \frac{121}{4}x - \frac{57}{4}y - \frac{45}{2}.
\end{aligned} \tag{4.31}$$

Обоснуем решение (4.31), показав, что оно удовлетворяет: 1) уравнению *Лапласа*; 2) граничному условию. По найденным вторым повторным частным производным функции $u(x, y)$ (4.31)

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial x} = & -\frac{5}{16}x^4 + \frac{15}{8}x^2y^2 - \frac{5}{16}y^4 + \frac{1}{2}x^3 - \frac{3}{4}x^2y - \frac{3}{2}xy^2 + \frac{1}{4}y^3 - \\
& -\frac{9}{16}x^2 + \frac{9}{16}y^2 - 3xy - \frac{29}{4}x + \frac{67}{8}y + \frac{121}{4}, \\
\frac{\partial u}{\partial y} = & +\frac{5}{4}x^3y - \frac{5}{4}xy^3 - \frac{1}{4}x^3 - \frac{3}{2}x^2y + \frac{3}{4}xy^2 + \frac{1}{2}y^3 + \\
& +\frac{3}{2}y^2 + \frac{9}{8}xy - \frac{3}{2}x^2 - \frac{67}{8}x + \frac{29}{4}y - \frac{57}{4}, \\
\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = & -\frac{5}{4}x^3 + \frac{15}{4}xy^2 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{3}{2}xy - \frac{3}{2}y^2 - \frac{9}{8}x - 3y - \frac{29}{4}, \\
\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = & +\frac{5}{4}x^3 - \frac{15}{4}xy^2 - \frac{3}{2}x^2 + \frac{3}{2}xy + \frac{3}{2}y^2 + 3y + \frac{9}{8}x + \frac{29}{4},
\end{aligned}$$

убеждаемся, что функция $u(x, y)$ (4.31) удовлетворяет уравнению *Лапласа*.

Представим функцию $u(x, y)$ (4.31) в виде (без доказательства)

$$u(x, y) = F(x, y)P_3(x, y) + g(x, y) = (x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4)P_3(x, y) + x^3y^2, \tag{4.32}$$

где $F(x, y)$ — многочлен степени 2 (4.25), задающий границу области (окружность радиуса 3 с центром в точке $(-2, +1)$: $(x+2)^2 + (y-1)^2 - 9 = 0$), $P_3(x, y)$ — подлежащий определению многочлен степени 3, $g(x, y)$ — многочлен степени 5, задающий граничное условие 4. Многочлен $P_3(x, y)$ найдём, разделив разность $u(x, y) - g(x, y)$ на $F(x, y)$ без остатка

$$P_3(x, y) = \frac{u(x, y) - g(x, y)}{F(x, y)} = -\frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{16}xy^2 + \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{8}xy + \frac{1}{8}y^2 - \frac{31}{16}x + \frac{3}{4}y + \frac{45}{8}. \tag{4.33}$$

Из представления (4.32) сразу же убеждаемся, что функция $u(x, y)$ удовлетворяет граничному условию. Следовательно, задача *Дирихле* (4.24) решена правильно.

Решения задачи (4.24) для граничных условий 1–4 показаны на рис. 4.6 — 4.9.

Данный пример показывает влияние граничной функции на решение внутренней задачи Дирихле и возможность представления последнего в виде (4.32). Сложные вычисления с многочленами могут быть выполнены в любой системе аналитических вычислений. ▲

Пример 4.4. Рассмотрим внешнюю задачу *Дирихле*

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 > 0 \\ u(x, y) = g(x, y), & x^2 + y^2 + 4x - 2y - 4 = 0, \end{cases} \tag{4.34}$$

с четырьмя наборами граничного условия, помещёнными в табл. 4.1 на с. 82.

Поскольку граничные условия *внешней* задачи такие же, как и для подробно рассмотренной *внутренней* задачи из примера 4.3, из последней заимствуются разложения граничных функций $\dot{g}(\varphi)$ в ряд *Фурье*, самое же решение *внешней* задачи строится по образцу решения внешней задачи из примера 4.2.

Решения внешней задачи (4.34) помещены в табл. 4.6 и показаны на рис. 4.10 — 4.13. ▲




Рис. 4.6. Решение внутренней задачи Дирихле (4.24): граничное условие 1 (табл. 4.1, 4.2)




Рис. 4.7. Решение внутренней задачи Дирихле (4.24): граничное условие 2 (табл. 4.1, 4.3)




Рис. 4.8. Решение внутренней задачи *Дирихле* (4.24): граничное условие 3 (табл. 4.1, 4.4)




Рис. 4.9. Решение внутренней задачи *Дирихле* (4.24): граничное условие 4 (табл. 4.1, 4.5)

Табл. 4.6. Решения задачи Дирихле (4.34) вне круга $F(x, y) = (x+1)^2 + (y-1)^2 - 9 > 0$ для граничных условий 1–4

1	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{-2 + 9 \frac{1}{r} \cos \varphi - 18 \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi}_{0} \underbrace{\phantom{-2 + 9 \frac{1}{r} \cos \varphi - 18 \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi}}_{1} \underbrace{\phantom{-2 + 9 \frac{1}{r} \cos \varphi - 18 \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi}}_{2}$
2	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{17}{2} - 36 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{4} \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 162 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + \frac{729}{4} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi}_{0} \underbrace{\phantom{+\frac{17}{2} - 36 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{4} \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 162 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + \frac{729}{4} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi}}_{1} \underbrace{\phantom{+\frac{17}{2} - 36 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{4} \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 162 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + \frac{729}{4} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi}}_{2} \underbrace{\phantom{+\frac{17}{2} - 36 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{4} \frac{1}{r} \sin \varphi + \frac{81}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 162 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + \frac{729}{4} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi}}_{3}$
3	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{+\frac{293}{8} - 117 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{2} \frac{1}{r} \sin \varphi - \frac{243}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 324 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + 729 \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi + \frac{729}{2} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi - \frac{6561}{8} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi}_{0} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 117 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{2} \frac{1}{r} \sin \varphi - \frac{243}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 324 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + 729 \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi + \frac{729}{2} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi - \frac{6561}{8} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi}}_{1} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 117 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{2} \frac{1}{r} \sin \varphi - \frac{243}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 324 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + 729 \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi + \frac{729}{2} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi - \frac{6561}{8} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi}}_{2} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 117 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{2} \frac{1}{r} \sin \varphi - \frac{243}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 324 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + 729 \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi + \frac{729}{2} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi - \frac{6561}{8} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi}}_{3} \underbrace{\phantom{+\frac{293}{8} - 117 \frac{1}{r} \cos \varphi + \frac{225}{2} \frac{1}{r} \sin \varphi - \frac{243}{2} \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi - 324 \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi + 729 \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi + \frac{729}{2} \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi - \frac{6561}{8} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi}}_{4}$
4	$u(r, \varphi)$	$\underbrace{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}_{0} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}}_{1} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}}_{2} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}}_{3} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}}_{4} \underbrace{\phantom{-\frac{527}{4} + \frac{4023}{8} \frac{1}{r} \cos \varphi - 387 \frac{1}{r} \sin \varphi + 81 \frac{1}{r^2} \cos 2 \varphi + \frac{2673}{2} \frac{1}{r^2} \sin 2 \varphi - \frac{38637}{16} \frac{1}{r^3} \cos 3 \varphi - 2187 \frac{1}{r^3} \sin 3 \varphi + \frac{19683}{4} \frac{1}{r^4} \cos 4 \varphi + \frac{6561}{4} \frac{1}{r^4} \sin 4 \varphi - \frac{59049}{16} \frac{1}{r^5} \cos 5 \varphi}}_{5}$




Рис. 4.10. Решение внешней задачи *Дирихле* (4.34): граничное условие 1 (табл. 4.1, 4.6)




Рис. 4.11. Решение внешней задачи *Дирихле* (4.34): граничное условие 2 (табл. 4.1, 4.6)




Рис. 4.12. Решение внешней задачи *Дирихле* (4.34): граничное условие 3 (табл. 4.1, 4.6)




Рис. 4.13. Решение внешней задачи *Дирихле* (4.34): граничное условие 4 (табл. 4.1, 4.6)

4.3. Задачи

Задача 4.1. Решите внешнюю задачу *Дирихле* (4.11) методом разделения переменных.

Задача 4.2. Какова связь преобразования инверсии *Кельвина* (4.13) с преобразованием инверсии в комплексном анализе?

Задача 4.3. Решите внутреннюю задачу *Дирихле* в областях с границами \mathcal{C} и граничными условиями, сведёнными в табл. 4.7 на с. 94. Запишите решения в полярной и декартовой системах координат. Обоснуйте решения, показав, что они удовлетворяют: а) уравнению *Лапласа*; б) граничному условию.

Задача 4.4. Решите внешнюю задачу *Дирихле* в областях с границами \mathcal{C} и граничными условиями, сведёнными в табл. 4.7 на с. 94. Запишите решения в полярной системе координат. Обоснуйте решения, показав, что они удовлетворяют: а) уравнению *Лапласа*; б) граничному условию.

Табл. 4.7. Граничные условия для задачи *Дирихле* $\Delta u = g_k(x, y)$, $g_{k+1} = g_k + \delta g_{k+1}$, $k = 1, 2, 3$

№	$g_1(x, y)$	$\delta g_2(x, y)$	$\delta g_3(x, y)$	$\delta g_4(x, y)$	\mathcal{C}
1	x^2	$x^3 + y^3 + x^2y + xy^2$	x^4	x^5	$x^2 + y^2 - x - 2y - 1 = 0$
2	y^2	$x^3 + y^3 + x^2y + xy^2$	y^4	y^5	$x^2 + y^2 + x + 6y + 7 = 0$
3	xy	$x^3 + y^3 + x^2y + xy^2$	x^3y	x^4y	$x^2 + y^2 - 2x + 3y + 1 = 0$
4	$x^2 + x$	$x^3 + y^3 + x^2y$	xy^3	xy^4	$x^2 + y^2 + 2x - 5y + 5 = 0$
5	$y^2 + x$	$x^3 + y^3 + xy^2$	x^2y^2	x^3y^2	$x^2 + y^2 - 3x - 4y + 4 = 0$
6	$xy + x$	$x^3 + x^2y + xy^2$	x^4	x^2y^3	$x^2 + y^2 + 4x + y + 2 = 0$
7	$x^2 + y$	$y^3 + x^2y + xy^2$	y^4	x^5	$x^2 + y^2 - 5x + 4y + 8 = 0$

4.4. Пояснения

5. Задачи для уравнений параболического типа

5.0. Προλεγόμενα

5.1. Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями *Дирихле*

5.1.1. Постановка задачи

Физическая постановка задачи состоит в нахождении температуры в каждом сечении тонкого стержня конечной длины ℓ в любое мгновение конечного промежутка времени $[0, T]$, если: 1) боковая поверхность стержня теплоизолирована; 2) внутри стержня действуют распределенные источники тепла заданной мощности; 3) температура стержня в начальное мгновение $t = 0$ известна; 4) температура на концах стержня известна в течение промежутка времени $[0, T]$.

Математическая постановка есть краевая задача нахождения функции: 1) непрерывной в замкнутом пространственно-временном прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$; 2) один раз непрерывно дифференцируемой по переменной t и дважды непрерывно дифференцируемой по переменной x в $(0, T] \times (0, \ell)$; 3) удовлетворяющей пространственно одномерному неоднородному уравнению теплопроводности и соответствующим начальным условиям (при $t=0$) и граничным условиям *Дирихле* (на концах стержня $x=0$, $x=\ell$ при $0 \leq t \leq T$), именно

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ u(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} u(t, 0) = \psi_1(t) \\ u(t, \ell) = \psi_2(t) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \end{array} \right. \quad (5.1)$$

причём начальное и граничные условия согласованы

$$\left\{ \begin{array}{l} u_0(0) = \psi_1(0), \\ u_0(\ell) = \psi_2(0). \end{array} \right. \quad (5.2)$$

5.1.2. Решение задачи методом разделения переменных

Решение краевой задачи (5.1), (5.2) будем разыскивать в виде суммы трёх функций

$$u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x), \quad (5.3)$$

причём функцию $q(t, x)$ выберем так

$$q(t, x) = \psi_1(t) + [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \frac{x}{\ell}, \quad (5.4)$$

чтобы удовлетворить граничным условиям задачи: $q(t, 0) = \psi_1(t)$, $q(t, \ell) = \psi_2(t)$.

Подстановка представления (??), (??) для искомого решения $u(t, x)$ в задачу (??) показывает, что сумма функций $v(t, x) + w(t, x)$ есть решение следующей краевой задачи с однородными (нулевыми) граничными условиями

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial w(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ v(0, x) + w(0, x) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} v(t, 0) + w(t, 0) = 0 \\ v(t, \ell) + w(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \end{array} \right. \quad (5.5)$$

где правая часть и начальное условие суть таковы

$$\left\{ \begin{array}{l} h(t, x) = g(t, x) - \left[\frac{\partial q(t, x)}{\partial t} - a^2 \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2} \right], \\ v_0(x) = u_0(x) - q(0, x). \end{array} \right. \quad (5.6)$$

Краевую задачу (5.5), (5.6) для суммы $v(t, x) + w(t, x)$, в силу линейности последней по $v(t, x)$ и $w(t, x)$, разделим на две:

1) краевую задачу для функции $v(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ v(0, x) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} v(t, 0) = 0 \\ v(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T; \end{array} \right. \quad (5.7)$$

2) краевую задачу для функции $w(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial w(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ w(0, x) = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} w(t, 0) = 0 \\ w(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \end{array} \right. \quad (5.8)$$

1) Решение краевой задачи (5.7) будем разыскивать методом разделения переменных:

а) представим искомую функцию $v(t, x)$ в виде произведения двух функций соответственно независимой переменной t и независимой переменной x

$$v(t, x) = O(t) X(x); \quad (5.9)$$

б) найдём производные представления функции $v(t, x)$ (5.9), первую по переменной t и вторую по переменной x

$$\begin{cases} \frac{\partial v(t, x)}{\partial t} = O'(t) X(x) , \\ \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2} = O(t) X''(x) , \end{cases}$$

и подставим в уравнение задачи (??);

в) введём *параметр разделения* λ

$$\frac{1}{a^2} \frac{O'(t)}{O(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda = \text{const};$$

г) составим две задачи, связанные между собой через параметр λ (см. пояснение ?? на с. ??): I) задачу *Штурма–Лиувилля* нахождения собственных значений λ и собственных функций $X(x)$ (см. раздел ?? на с. ??)

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < \ell, \\ X(0) = 0, & X(\ell) = 0; \end{cases} \quad (5.10)$$

II) задачу *Коши* нахождения функции $O(t)$ (начальное условие далее будет уточнено)

$$\begin{cases} O'(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, & 0 < t \leq T, \\ O(0) = ? \end{cases} \quad (5.11)$$

I) Вначале рассмотрим задачу *Штурма–Лиувилля* (5.10), счётное множество решений которой нам известно (см. раздел ?? на с. ??), поэтому просто выпишем собственные значения

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\mu\pi}{\ell} \right)^2, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (5.12)$$

и соответствующие им собственные функции

$$X_\mu(x) = \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (5.13)$$

II) Теперь обратимся к задаче *Коши* (5.11), в которую последовательно будем подставлять собственные значения (5.12), так что получим счётное множество задач *Коши*

$$\begin{cases} O'_\mu(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 O_\mu(t) = 0, & 0 < t \leq T, \\ O(0) = ? \end{cases} \quad (5.14)$$

1-параметрические семейства решений линейных с постоянными коэффициентами однородных обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка задач *Koши* (5.14) найдём методом разделения переменных (здесь «разделение переменных» применяется только к обыкновенным дифференциальным уравнениям задач (5.14) «внутри» применения «разделение переменных» для краевой задачи (5.7)):

а) запишем производные в обыкновенных дифференциальных уравнениях с помощью обозначения *Лейбница* (без указания аргумента t функций $O_\mu(t)$)

$$\frac{dO_\mu}{dt} + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 O_\mu = 0;$$

б) перенесём вторые слагаемые в левых частях последних уравнений в правые части, разделим на O_μ и умножим на dt обе части полученных уравнений

$$\frac{dO_\mu}{O_\mu} = - \left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 dt;$$

в) выполним интегрирование в обеих частях последних равенств

$$\ln |O_\mu| = - \left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t + \ln |A_\mu|$$

или

$$\ln |O_\mu| = \ln e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} + \ln |A_\mu|;$$

г) выполним потенцирование

$$O_\mu(t) = A_\mu e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t};$$

д) подставим значение $t = 0$ в полученные равенства и выразим постоянные интегрирования A_μ (произвольные постоянные) через значения $O_\mu(0)$ функций $O_\mu(t)$: $A_\mu = O_\mu(0)$;

е) запишем искомые 1-параметрические семейства решений уравнений задач *Koши* (5.14)

$$O_\mu(0) = O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t}. \quad (5.15)$$

Сборка (5.9), (5.13), (5.15) образует частные решения уравнения задачи (5.7), именно

$$v_\mu(t, x) = O_\mu(t) X_\mu(x) = O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

суммирование всех частных решений образует параметрическое семейство функций

$$\bar{v}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{\mu}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (5.16)$$

которые: а) определены в прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$; б) удовлетворяют уравнению краевой задачи (5.7); в) удовлетворяют граничным условиям краевой задачи; г) вообще не удовлетворяют начальным условиям.

Выберем величины $O_{\mu}(0)$ (начальные условия задач *Коши* (5.14)) так, чтобы из семейства (5.16) выделить функцию, удовлетворяющую начальным условиям краевой задачи (5.7), то есть получить решение последней:

а) подставим в семейство значение $t = 0$

$$\bar{v}(0, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell};$$

б) разложим начальное условие (5.6) краевой задачи (5.7) в ряд по собственным функциям $X_{\mu}(x)$ (5.13) (то есть в тригонометрический ряд *Фурье* «по синусам»)

$$v_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

где коэффициенты разложений суть

$$v_{0,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} v_0(\xi) \sin \frac{\mu\pi \xi}{\ell} d\xi, \quad (5.17)$$

в) из сравнения коэффициентов рядов «по синусам» заключим, что $O_{\mu}(0) = v_{0,\mu}$. Следовательно, функция

$$v(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell} \quad (5.18)$$

есть искомое решение краевой задачи (5.7).

2) Решение краевой задачи (5.8), по образцу найденного решения (5.18) краевой задачи (5.7), сразу будем искать в виде ряда по собственным функциям (5.13) (то есть в виде тригонометрического ряда *Фурье* «по синусам»)

$$\bar{w}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (5.19)$$

в котором коэффициенты $w_{\mu}(t)$ суть неизвестные функции переменной t , но при этом ряд определён в прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$.

Для того, чтобы найти функции $w_{\mu}(t)$:

а) вычислим частные производные ряда (??), первого порядка по переменной t и второго порядка по переменной x

$$\begin{aligned}\frac{\partial \bar{w}(t, x)}{\partial t} &= \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}'(t) \sin \frac{\mu \pi x}{\ell}, \\ \frac{\partial^2 \bar{w}(t, x)}{\partial x^2} &= - \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{\mu \pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) \sin \frac{\mu \pi x}{\ell};\end{aligned}$$

б) разложим правую часть $h(t, x)$ (5.6) уравнения краевой задачи (5.8) в ряд по собственным функциям $X_{\mu}(x)$ (5.13)

$$h(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) \sin \frac{\mu \pi x}{\ell}, \quad (5.20)$$

где коэффициенты разложения суть

$$h_{\mu}(t) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} h(t, \xi) \sin \frac{\mu \pi \xi}{\ell} d\xi; \quad (5.21)$$

в) подставим найденные производные ряда (5.19) и разложение правой части $h(t, x)$ в уравнение краевой задачи (5.8), откуда получим ряд по собственным функциям $X_{\mu}(x)$, тождественно равный нулю ряд в прямоугольнике $(0, T] \times [0, \ell]$

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} \left\{ w_{\mu}'(t) + \left(\frac{\mu \pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) - h_{\mu}(t) \right\} \sin \frac{\mu \pi x}{\ell} \equiv 0,$$

что возможно лишь при обращении в нуль всех коэффициентов ряда

$$w_{\mu}'(t) + \left(\frac{\mu \pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) - h_{\mu}(t) = 0, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (5.22)$$

Присоединим к линейным с постоянными коэффициентами неоднородным обыкновенным дифференциальным уравнениям первого порядка (5.22) относительно функций $w_{\mu}(t)$ соответствующие начальные условия:

а) подставим в ряд (5.19) значение $t = 0$

$$\bar{w}(0, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(0) \sin \frac{\mu \pi x}{\ell};$$

б) сопоставим полученный ряд с начальным условием краевой задачи (5.8), откуда заключим, что $w_{\mu}(0) = 0$;

в) составим счётную последовательность задач Коши

$$\begin{cases} w_{\mu}'(t) + \left(\frac{\mu \pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) = h_{\mu}(t), \\ w_{\mu}(0) = 0, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (5.23)$$

Задачи *Коши* (5.23) будем решать так:

а) запишем 1-параметрические решения

$$\dot{w}_\mu(t) = B_\mu e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t}, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (5.24)$$

однородных уравнений, где B_μ — неопределённые (произвольные) постоянные (см. решения (5.15) уравнений задач *Коши* (5.14))

$$w'_\mu(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 w_\mu(t) = 0, \quad \mu \in \mathbb{N};$$

б) к решениям (5.24) однородных уравнений применим методом вариации произвольных постоянных для нахождения семейств решений вида

$$\bar{w}_\mu(t) = B_\mu(t) e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t}, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (5.25)$$

в) подставим представления (5.25) в задачи *Коши* (5.23) и получим счётные последовательности задач *Коши* для нахождения функций $B_\mu(t)$

$$\begin{cases} B'_\mu(t) = e^{+\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} h_\mu(t), \\ B_\mu(0) = 0, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N};$$

г) решим полученные задачи *Коши* непосредственным интегрированием

$$B_\mu(t) = \int_0^t e^{+\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 \tau} h_\mu(\tau) d\tau; \quad (5.26)$$

д) подставим найденные функции $B_\mu(t)$ (5.26) в семейства (5.25) и запишем решения задач *Коши* (5.23)

$$w_\mu(t) = e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 t} \int_0^t e^{+\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 \tau} h_\mu(\tau) d\tau = \int_0^t e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 (t-\tau)} h_\mu(\tau) d\tau. \quad (5.27)$$

Сборка (5.19), (5.21), (5.27) даёт решение краевой задачи (5.8)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left\{ \int_0^t e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2 (t-\tau)} h_\mu(\tau) d\tau \right\} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (5.28)$$

5.1.3. Обоснование метода разделения переменных

5.1.4. Примеры решения задачи методом разделения переменных

Пример 5.1. Применим метод разделения переменных к решению следующей краевой задачи

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 5, \quad 0 < t \leq 9, \\ u(x, 0) = u_0(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 4, \\ 8(5 - x), & 4 \leq x \leq 5, \end{cases} \\ \left. \begin{array}{l} u(t, 0) = \tau^2 \\ u(t, 5) = 2\tau^2 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq 9. \end{array} \right. \quad (5.29)$$

где $\tau = t/T$.

Выберем функцию $q(t, x)$ согласно выражению (5.4)

$$q(t, x) = \tau^2 + \frac{x}{5} \tau^2 = \frac{(5+x)t^2}{5 \cdot 81} = \frac{(5+x)t^2}{405} \quad (5.30)$$

и запишем решение краевой задачи согласно представлению (5.3)

$$u(t, x) = v(t, x) + w(t, x) + \frac{(5+x)t^2}{405}, \quad (5.31)$$

откуда для производных и начального условия имеем

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial t} + \frac{2(5+x)t}{405}, \\ \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}, \\ u(0, x) = v(0, x) + w(0, x) = u_0(x). \end{array} \right. \quad (5.32)$$

Следовательно, для суммы функций $v(t, x) + w(t, x)$ получим следующую краевую задачу

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{2(5+x)t}{405}, \quad 0 < x < 5, \quad 0 < t \leq 9, \\ v(0, x) + w(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq 5, \\ \left. \begin{array}{l} v(t, 0) + w(t, 0) = 0 \\ v(t, 5) + w(t, 5) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 < t \leq 9, \end{array} \right. \quad (5.33)$$

которую разделим на две вспомогательные краевые задачи

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} = \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 5, \quad 0 < t \leq 9, \\ v(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq 5, \\ \left. \begin{array}{l} v(t, 0) = 0 \\ v(t, 5) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq 9, \end{array} \right. \quad (5.34)$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \frac{\partial w}{\partial t} = \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} - \frac{2(5+x)t}{405}, & 0 < x < 5, \quad 0 < t \leq 9, \\ w(0, x) = 0, & 0 \leq x \leq 5, \\ w(t, 0) = 0 \\ w(t, 5) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq 9. \quad (5.35)$$

Запишем решение вспомогательной задачи (5.34) согласно (5.18)

$$v(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} u_{0,\mu} e^{-A_{\mu}^2 t} \sin(A_{\mu} x), \quad (5.36)$$

где коэффициенты разложения функции $u_0(x)$ суть (см. разложение (??) на с. ??)

$$u_{0,\mu} = 4B_{\mu}^2 \sin(4A_{\mu}), \quad (5.37)$$

причём для удобства и краткости записи введены вспомогательные величины

$$A_{\mu} := \frac{\mu\pi}{5}, \quad B_{\mu} := \frac{5}{\mu\pi}. \quad (5.38)$$

На всякий случай, поясним происхождение выражений (5.37), (5.38) в разложении (??), последнее приведём здесь для удобства

$$u_0(x) = \frac{2h}{\pi^2} \frac{\ell^2}{c(\ell-c)} \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{1}{\mu^2} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell} = \sum_{\mu=1}^{\infty} u_{0,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

откуда

$$u_{0,\mu} = \frac{2h}{\pi^2} \frac{\ell^2}{c(\ell-c)} \frac{1}{\mu^2} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} = \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \frac{2h}{c(\ell-c)} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell}.$$

Теперь учтём, что $\ell = 5$, $c = 4$, $h = 8$, тогда имеем для коэффициентов разложения функции $u_0(x)$

$$u_{0,\mu} = \left(\frac{5}{\mu\pi} \right)^2 \frac{2 \cdot 8}{4(5-4)} \sin \left(4 \cdot \frac{\mu\pi}{5} \right) = \frac{16}{4} B_{\mu}^2 \sin(4A_{\mu}) = 4B_{\mu}^2 \sin(4A_{\mu}).$$

Следовательно, решение вспомогательной задачи (5.34) есть ряд

$$v(t, x) = 4 \sum_{\mu=1}^{\infty} B_{\mu}^2 \sin(4A_{\mu}) e^{-A_{\mu}^2 t} \sin(A_{\mu} x). \quad (5.39)$$

Запишем решение вспомогательной задачи (5.35) согласно (5.28)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) \sin(A_{\mu} x), \quad (5.40)$$

где функции $w_{\mu}(t)$ выражаются в квадратурах, согласно (5.27)

$$w_{\mu}(t) = \int_0^t e^{-A_{\mu}^2(t-\tau)} h_{\mu}(\tau) d\tau = e^{-A_{\mu}^2 t} \int_0^t e^{+A_{\mu}^2 \tau} h_{\mu}(\tau) d\tau, \quad (5.41)$$

$h_{\mu}(t)$ — коэффициенты разложения функции

$$h(t, x) = -\frac{2(5+x)t}{405} = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) \sin(A_{\mu}x). \quad (5.42)$$

Вычислим коэффициенты $h_{\mu}(t)$

$$h_{\mu}(t) = \frac{2}{5} \int_0^5 h(t, x) \sin(A_{\mu}x) dx = -\frac{2}{5} \frac{2t}{405} \int_0^5 (5+x) \sin(A_{\mu}x) dx = -\left(\frac{2}{5 \cdot 9}\right)^2 t I_1. \quad (5.43)$$

Определённый интеграл I_1 вычислим по частям

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^5 (5+x) \sin A_{\mu} x dx = \left\{ \begin{array}{l} u = x + 5, \quad du = dx, \\ dv = \sin A_{\mu} x dx, \quad v = -B_{\mu} \cos A_{\mu} x \end{array} \right\} = \\ &= -B_{\mu} (5+x) \cos A_{\mu} x \Big|_0^5 + B_{\mu}^2 \sin A_{\mu} x \Big|_0^5 = \\ &= -B_{\mu} [10(-1)^{\mu} - 5] = -5B_{\mu} [2(-1)^{\mu} - 1]. \end{aligned} \quad (5.44)$$

Возвращаясь к коэффициентам $h_{\mu}(t)$ будем иметь для последних

$$h_{\mu}(t) = -\left(\frac{2}{5 \cdot 9}\right)^2 t I_1 \stackrel{(5.44)}{=} \frac{4B_{\mu}}{405} [2(-1)^{\mu} - 1] t =: b_{\mu} t. \quad (5.45)$$

Обратимся к нахождению функций $w_{\mu}(t)$, согласно (5.41)

$$w_{\mu}(t) = b_{\mu} e^{-A_{\mu}^2 t} \int_0^t \tau e^{+A_{\mu}^2 \tau} d\tau = b_{\mu} e^{-A_{\mu}^2 t} I_2(t), \quad (5.46)$$

где определённый интеграл вычислим по частям

$$\begin{aligned} I_2(t) &= \int_0^t \tau e^{+A_{\mu}^2 \tau} d\tau = \left\{ \begin{array}{l} u = \tau, \quad du = d\tau, \\ dv = e^{+A_{\mu}^2 \tau}, \quad v = B_{\mu}^2 e^{+A_{\mu}^2 \tau} \end{array} \right\} = \tau B_{\mu}^2 e^{+A_{\mu}^2 \tau} \Big|_0^t - B_{\mu}^2 \int_0^t e^{+A_{\mu}^2 \tau} d\tau = \\ &= B_{\mu}^2 e^{+A_{\mu}^2 \tau} (\tau - B_{\mu}^2) \Big|_0^t = B_{\mu}^2 e^{+A_{\mu}^2 t} (t - B_{\mu}^2) - B_{\mu}^4 = B_{\mu}^2 \left[e^{+A_{\mu}^2 t} (t - B_{\mu}^2) - B_{\mu}^2 \right]. \end{aligned} \quad (5.47)$$

Следовательно,

$$w_{\mu}(t) \stackrel{(5.46), (5.47)}{=} b_{\mu} B_{\mu}^2 \left\{ t - B_{\mu}^2 - B_{\mu}^2 e^{-A_{\mu}^2 t} \right\}, \quad (5.48)$$

и решение вспомогательной задачи (5.35) примет вид

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} b_{\mu} B_{\mu}^2 \left\{ t - B_{\mu}^2 - B_{\mu}^2 e^{-A_{\mu}^2 t} \right\} \sin(A_{\mu}x). \quad (5.49)$$

Решение же исходной краевой задачи (5.29) получим путём сборки решений вспомогательных задач, то есть по формуле (5.31). ▲

5.2. Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями *Неймана*

5.2.1. Постановка задачи

Физическая постановка задачи состоит в нахождении температуры в каждом сечении тонкого стержня длины ℓ в любое мгновение конечного промежутка времени $[0, T]$, если: 1) боковая поверхность стержня теплоизолирована; 2) внутри стержня действуют распределенные источники тепла заданной мощности; 3) начальная температура стержня известна; 4) тепловые потоки на концах стержня известны.

Математическая постановка задачи состоит в нахождении в пространственно-временном прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$ функции $u(t, x)$, являющейся решением следующей краевой задачи

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ u(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, 0)}{\partial x} = \psi_1(t) \\ \frac{\partial u(t, \ell)}{\partial x} = \psi_2(t) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \end{array} \right. \quad (5.50)$$

5.2.2. Решение задачи методом разделения переменных

Решение задачи (5.50) будем разыскивать в виде суммы трёх функций

$$u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x), \quad (5.51)$$

причём функцию $q(t, x)$ выберем так, чтобы удовлетворить неоднородным (ненулевым) граничным условиям задачи (5.50)

$$q(t, x) = \psi_1(t) x + [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \frac{x^2}{2\ell}. \quad (5.52)$$

Подстановка представления (5.51), (5.52) для искомого решения $u(t, x)$ в задачу (5.50) показывает, что сумма функций $v(t, x) + w(t, x)$ есть решение следующей краевой задачи с однородными (нулевыми) граничными условиями

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ v(0, x) + w(0, x) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \frac{\partial v(t, 0)}{\partial x} + \frac{\partial w(t, 0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v(t, \ell)}{\partial t} + \frac{\partial w(t, \ell)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad t \geq 0, \quad (5.53)$$

и „новыми“ правой частью $h(t, x)$ и начальным условием $v_0(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} h(t, x) := g(t, x) - \frac{\partial q(t, x)}{\partial t} + a^2 \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial q(t, x)}{\partial t} = \psi'_1(t) x + [\psi'_2(t) - \psi'_1(t)] \frac{x^2}{2\ell}, \\ \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2} = [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \frac{1}{\ell}, \\ v_0(x) := u_0(x) - q(x, 0), \\ q(x, 0) = \psi_1(0) x + [\psi_2(0) - \psi_1(0)] \frac{x^2}{2\ell}. \end{array} \right. \quad (5.54)$$

Краевую задачу (5.53), (5.54), в силу линейности последней, разделим на две — *вспомогательную краевую задачу* для функции $v(t, x)$ (в этой задаче уравнение однородно, т. е. не содержит функции $h(t, x)$, а начальное условие неоднородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ v(0, x) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \frac{\partial v(t, 0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial v(t, \ell)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (5.55)$$

и *вспомогательную краевую задачу* для функции $w(t, x)$ (в этой задаче уравнение неоднородно, т. е. содержит функцию $h(t, x)$, а начальное условие однородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ w(0, x) = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \frac{\partial w(t, 0)}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial w(t, \ell)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5.56)$$

Решение вспомогательной задачи (5.55) будем разыскивать *методом разделения переменных*, подобно решению вспомогательной задачи (??) на с. ??, то есть в виде

$$v(t, x) = O(t) X(x), \quad (5.57)$$

тогда получим две задачи, связанные между собой через параметр разделения λ : задачу *Штурма – Лувилля* для функции $X(x)$ (см. разд. ?? на с. ??)

$$\text{SL}_2(X) : \quad \left\{ \begin{array}{l} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X'(\ell) = 0, \end{array} \right. \quad (5.58)$$

и задачу *Коши* для функции $O(t)$ (начальное условие далее будет уточнено)

$$C(O) : \quad \left\{ \begin{array}{l} O'(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \\ O(0) = ? \end{array} \right. \quad (5.59)$$

Собственные значения задачи (5.58) равны (см. табл. ?? на с. ??)

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\mu\pi}{\ell} \right)^2, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.60)$$

а соответствующие им *собственные функции* суть

$$X_\mu(x) = \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (5.61)$$

Подставим теперь допустимые значения (5.60) параметра разделения λ в задачу *Коши* (5.59), разделим переменные и проинтегрируем уравнение, учитывая начальное условие (которое снабдим нижним индексом μ)

$$O_\mu(t) = O_\mu(0) e^{-\lambda_\mu a^2 t} = O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi}{\ell}\right)^2 a^2 t}. \quad (5.62)$$

Для решения краевой задачи (5.55) получаем счётное семейство функций

$$v_\mu(t, x) = X_\mu(x) O_\mu(t), \quad (5.63)$$

удовлетворяющих уравнению и граничным условиям, но не удовлетворяющих начальному условию.

Сумма функций (5.63)

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} v_{\mu}(t, x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} X_{\mu}(x) O_{\mu}(t) = \sum_{\mu=0}^{\infty} O_{\mu}(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi}{\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell} \quad (5.64)$$

также удовлетворяет уравнению (формально!) и граничным условиям. Постараемся подобрать постоянные $O_{\mu}(0)$ так, чтобы ряд (5.64) был согласован с начальным условием краевой задачи (5.55). Для этого сопоставим ряд (5.64) при $t = 0$

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} v_{\mu}(x, 0) = \sum_{\mu=0}^{\infty} O_{\mu}(0) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} O_{\mu}(0) \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}$$

и разложение начального условия задачи (5.55) в ряд по собственным функциям (5.61)

$$v_0(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} v_{0,\mu} X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} v_{0,\mu} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

откуда

$$O_0(0) \equiv v_{0,0} = \frac{1}{\ell} \int_0^{\ell} v_0(\xi) d\xi, \quad O_{\mu}(0) \equiv v_{0,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} v_0(\xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (5.65)$$

Следовательно, решением вспомогательной краевой задачи (5.55) есть ряд

$$v(t, x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} O_{\mu}(0) e^{-\left(\frac{\mu\pi}{\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (5.66)$$

коэффициенты которого равны коэффициентам (5.65) разложения начального условия $v_0(x)$ в ряд по собственным функциям (5.61).

Решение вспомогательной краевой задачи (5.56) сразу будем разыскивать в виде ряда по собственным функциям (5.61)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} w_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} w_{\mu}(t) \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (5.67)$$

в котором коэффициенты $w_{\mu}(t)$ суть неизвестные функции времени. Соответственно, разложим правую часть $h(t, x)$ уравнения задачи (5.56) в ряд по собственным функциям (5.61)

$$h(t, x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} h_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} h_{\mu}(t) \cos \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

$$h_0(t) = \frac{1}{\ell} \int_0^\ell h(\xi, t) d\xi, \quad h_\mu(t) = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell h(\xi, t) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (5.68)$$

В результате, вместо уравнения задачи (5.56) получаем ряд по собственным функциям (5.61), тождественно равный нулю

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} \left\{ w'_\mu(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_\mu(t) - h_\mu(t) \right\} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell} = 0,$$

что возможно лишь при обращении в нуль всех коэффициентов ряда

$$w'_\mu(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_\mu(t) - h_\mu(t) = 0, \quad \mu = 0, 1, 2, \dots \quad (5.69)$$

Подобно решению вспомогательной задачи (??) на с. ??, для нахождения функций $w_\mu(t)$ имеем счётную последовательность задач Коши

$$\begin{cases} w'_\mu(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_\mu(t) = h_\mu(t), \\ w_\mu(0) = 0, \end{cases} \quad \mu = 0, 1, 2, \dots, \quad (5.70)$$

решения которых суть

$$w_\mu(t) = \int_0^t e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2(t-\tau)} h_\mu(\tau) d\tau. \quad (5.71)$$

Сборка (5.67), (5.68) и (5.71) даёт решение вспомогательной краевой задачи (5.56)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=0}^{\infty} \left\{ \int_0^t e^{-\left(\frac{\mu\pi a}{\ell}\right)^2(t-\tau)} h_\mu(\tau) d\tau \right\} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (5.72)$$

5.3. Краевая задача для пространственно одномерного уравнения теплопроводности с граничными условиями Робена

5.3.1. Постановка задачи

Физическая постановка задачи состоит в нахождении температуры в каждом сечении тонкого стержня длины ℓ в любое мгновение конечного промежутка времени $[0, T]$, если: 1) боковая поверхность стержня теплоизолирована; 2) внутри стержня действуют распределенные источники тепла заданной мощности; 3) начальная температура стержня известна; 4) на одном конце стержня известна температура, а на другом — тепловой поток.

Математическая постановка задачи состоит в нахождении в пространственно-временном прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$ функции $u(t, x)$, являющейся решением краевой задачи, которую рассмотрим в двух разновидностях. Первая разновидность такова

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ u(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} u(t, 0) = \psi_1(t) \\ \frac{\partial u(t, \ell)}{\partial x} = \psi_2(t) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \end{array} \right. \quad (5.73)$$

а вторая получается зеркальной перестановкой граничных условий

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, x)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ u(0, x) = u_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} \frac{\partial u(t, 0)}{\partial x} = \psi_1(t) \\ u(t, \ell) = \psi_2(t) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \end{array} \right. \quad (5.74)$$

5.3.2. Решение задачи методом разделения переменных

Решение задачи (5.73) будем разыскивать в виде суммы трёх функций

$$u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x), \quad (5.75)$$

причём функцию $q(t, x)$ выберем так, чтобы удовлетворить неоднородным (ненулевым) граничным условиям задачи (5.73)

$$q(t, x) = \psi_1(t) + \psi_2(t) x. \quad (5.76)$$

Подстановка представления (5.75), (5.76) для искомого решения $u(t, x)$ в задачу (5.73) показывает, что сумма функций $v(t, x) + w(t, x)$ есть решение следующей краевой задачи с однородными (нулевыми) граничными условиями

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad t > 0, \\ v(x, 0) + w(x, 0) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} v(0, t) + w(0, t) = 0 \\ \frac{\partial v(\ell, t)}{\partial t} + \frac{\partial w(\ell, t)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad t \geq 0, \end{array} \right. \quad (5.77)$$

и „новыми“ правой частью $h(t, x)$ и начальным условием $v_0(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} h(t, x) := f(t, x) - \frac{\partial q(t, x)}{\partial t} + a^2 \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2}, \\ \frac{\partial q(t, x)}{\partial t} = \psi'_1(t) + \psi'_2(t) x, \\ \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2} \equiv 0, \\ v_0(x) := u_0(x) - q(x, 0), \\ q(x, 0) = \psi_1(0) + \psi_2(0) x. \end{array} \right. \quad (5.78)$$

Краевую задачу (5.77), (5.78), в силу линейности последней, разделим на две — *вспомогательную краевую задачу* для функции $v(t, x)$ (в этой задаче уравнение однородно, т. е. не содержит функции $h(t, x)$, а начальное условие неоднородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ v(x, 0) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \left. \begin{array}{l} v(0, t) = 0 \\ \frac{\partial v(\ell, t)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \end{array} \right. \quad (5.79)$$

и *вспомогательную краевую задачу* для функции $w(t, x)$ (в этой задаче уравнение неоднородно, т. е. содержит функцию $h(t, x)$, а начальное условие однородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ w(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ w(0, t) = 0 \\ \frac{\partial w(\ell, t)}{\partial x} = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5.80)$$

Решение вспомогательной задачи (5.79) будем разыскивать *методом разделения переменных*, подобно решению вспомогательной задачи (??) на с. 112, тогда будем иметь две задачи, связанные между собой через параметр λ : I) задачу *Штурма – Лиувилля* для функции $X(x)$ (см. разд. ?? на с. ??)

$$\text{SL}_3(X) : \quad \left\{ \begin{array}{l} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X(0) = 0, \quad X'(\ell) = 0, \end{array} \right. \quad (5.81)$$

и II) задачу *Коши* для функции $O(t)$ (начальное условие далее будет уточнено)

$$C(O) : \quad \left\{ \begin{array}{l} O'(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \\ O(0) = ? \end{array} \right. \quad (5.82)$$

Собственные значения задачи (5.81) равны (см. табл. ?? на с. ??)

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\pi(2\mu - 1)}{2\ell} \right)^2, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (5.83)$$

а соответствующие им *собственные функции* —

$$X_\mu(x) = \sin \frac{\pi(2\mu - 1)x}{2\ell}. \quad (5.84)$$

Подставим теперь допустимые значения (5.83) параметра разделения λ в задачу *Коши* (5.82), разделим переменные и проинтегрируем уравнение, учитывая начальное условие (которое снабдим нижним индексом μ)

$$O_\mu(t) = O_\mu(0) e^{-\lambda_\mu a^2 t} = O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2 a^2 t}. \quad (5.85)$$

Для решения краевой задачи (5.79) получаем счётное семейство функций

$$v_\mu(t, x) = X_\mu(x) O_\mu(t), \quad (5.86)$$

удовлетворяющих уравнению и граничным условиям, но не удовлетворяющих начальному условию.

Сумма функций (5.86)

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} v_{\mu}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} X_{\mu}(x) O_{\mu}(t) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell} \quad (5.87)$$

также удовлетворяет уравнению (формально!) и граничным условиям. Постараемся подобрать постоянные $O_{\mu}(0)$ так, чтобы ряд (5.87) был согласован с начальным условием краевой задачи (5.79). Для этого сопоставим ряд (5.87) при $t = 0$

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} v_{\mu}(x, 0) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}$$

и разложение начального условия задачи (5.79) в ряд по собственным функциям (5.84)

$$v_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell},$$

откуда

$$O_{\mu}(0) \equiv v_{0,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} v_0(\xi) \sin \frac{\pi(2\mu-1)\xi}{2\ell} d\xi. \quad (5.88)$$

Следовательно, решением вспомогательной краевой задачи (5.79) есть ряд

$$v(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_{\mu}(0) e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2 a^2 t} \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}, \quad (5.89)$$

коэффициенты которого равны коэффициентам (5.88) разложения начального условия $v_0(x)$ в ряд по собственным функциям (5.84).

Решение вспомогательной краевой задачи (5.80) сразу будем разыскивать в виде ряда по собственным функциям (5.84)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}, \quad (5.90)$$

в котором коэффициенты $w_{\mu}(t)$ суть неизвестные функции времени.

Последовательность решения задачи (5.80) такая же, как и для задачи (??), поэтому запишем окончательное выражение для решения

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left\{ \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)a}{2\ell}\right)^2 (t-\tau)} h_{\mu}(\tau) d\tau \right\} \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}. \quad (5.91)$$

где $h_{\mu}(t)$ — коэффициенты разложения правой части уравнения задачи (5.80) в ряд по собственным функциям (5.84):

$$\begin{aligned}
h(t, x) &= \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) \sin \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}, \\
h_{\mu}(t) &= \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} h(\xi, t) \sin \frac{\pi(2\mu-1)\xi}{2\ell} d\xi.
\end{aligned} \tag{5.92}$$

Решение задачи (5.74) будем разыскивать в виде суммы трёх функций

$$u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x), \tag{5.93}$$

причём функцию $q(t, x)$ выберем так, чтобы удовлетворить неоднородным (ненулевым) граничным условиям задачи (5.74)

$$q(t, x) = \psi_1(t)(x - \ell) + \psi_2(t). \tag{5.94}$$

Подстановка представления (5.93), (5.94) для искомого решения $u(t, x)$ в задачу (5.74) показывает, что сумма функций $v(t, x) + w(t, x)$ есть решение следующей краевой задачи с однородными (нулевыми) граничными условиями

$$\left\{ \begin{aligned} &\frac{\partial v}{\partial t} + \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), & 0 < x < \ell, & t > 0, \\ &v(x, 0) + w(x, 0) = v_0(x), & 0 \leq x \leq \ell, \\ &\frac{\partial v(0, t)}{\partial x} + \frac{\partial w(0, t)}{\partial x} = 0 \\ &v(\ell, t) + w(\ell, t) = 0 \end{aligned} \right\}, \quad t \geq 0, \tag{5.95}$$

и „новыми“ правой частью $h(t, x)$ и начальным условием $v_0(x)$

$$\left\{ \begin{aligned} &h(t, x) := f(t, x) - \frac{\partial q(t, x)}{\partial t} + a^2 \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2}, \\ &\frac{\partial q(t, x)}{\partial t} = \psi_1'(t)(x - \ell) + \psi_2'(t), \\ &\frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2} \equiv 0, \\ &v_0(x) := u_0(x) - q(x, 0), \\ &q(x, 0) = \psi_1(0)(x - \ell) + \psi_2(0)x. \end{aligned} \right. \tag{5.96}$$

Краевую задачу (5.95), (5.96), в силу линейности последней, разделим на две — *вспомогательную краевую задачу* для функции $v(t, x)$ (в этой задаче уравнение однородно, т. е. не содержит функции $h(t, x)$, а начальное условие неоднородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial v}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ v(x, 0) = v_0(x), \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \frac{\partial v(0, t)}{\partial x} = 0 \\ v(\ell, t) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T, \quad (5.97)$$

и *вспомогательную краевую задачу* для функции $w(t, x)$ (в этой задаче уравнение неоднородно, т. е. содержит функцию $h(t, x)$, а начальное условие однородно)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial w}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ w(x, 0) = 0, \quad 0 \leq x \leq \ell, \\ \frac{\partial w(0, t)}{\partial x} = 0 \\ w(\ell, t) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T. \quad (5.98)$$

Решение вспомогательной задачи (5.97) будем разыскивать *методом разделения переменных*, подобно решению вспомогательной задачи (5.79) на с. 112, тогда будем иметь две задачи, связанные между собой через параметр λ : I) задачу *Штурма – Лиувилля* для функции $X(x)$ (см. разд. ?? на с. ??)

$$\text{SL}_4(X) : \quad \left\{ \begin{array}{l} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \\ X'(0) = 0, \quad X(\ell) = 0, \end{array} \right. \quad (5.99)$$

и II) задачу *Коши* для функции $O(t)$ (начальное условие далее будет уточнено)

$$C(O) : \quad \left\{ \begin{array}{l} O'(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \\ O(0) = ? \end{array} \right. \quad (5.100)$$

Собственные значения задачи (5.99) равны (см. табл. ?? на с. ??)

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\pi(2\mu - 1)}{2\ell} \right)^2, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (5.101)$$

а соответствующие им *собственные функции* —

$$X_\mu(x) = \cos \frac{\pi(2\mu - 1)x}{2\ell}. \quad (5.102)$$

Подставим теперь допустимые значения (5.101) параметра разделения λ в задачу Коши (5.100), разделим переменные и проинтегрируем уравнение, учитывая начальное условие (которое снабдим нижним индексом μ)

$$O_\mu(t) = O_\mu(0) e^{-\lambda_\mu a^2 t} = O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2 a^2 t}. \quad (5.103)$$

Для решения краевой задачи (5.97) получаем счётное семейство функций

$$v_\mu(t, x) = X_\mu(x) O_\mu(t), \quad (5.104)$$

удовлетворяющих уравнению и граничным условиям, но не удовлетворяющих начальному условию.

Сумма функций (5.104)

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} v_\mu(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} X_\mu(x) O_\mu(t) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell} \quad (5.105)$$

также удовлетворяет уравнению (формально!) и граничным условиям. Постараемся подобрать постоянные $O_\mu(0)$ так, чтобы ряд (5.105) был согласован с начальным условием краевой задачи (5.97). Для этого сопоставим ряд (5.105) при $t = 0$

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} v_\mu(x, 0) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) \cos \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell}$$

и разложение начального условия задачи (5.97) в ряд по собственным функциям (5.102)

$$v_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} \cos \frac{\pi(2\mu-1)x}{2\ell},$$

откуда

$$O_\mu(0) \equiv v_{0,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell v_0(\xi) \cos \frac{\pi(2\mu-1)\xi}{2\ell} d\xi. \quad (5.106)$$

Следовательно, решением вспомогательной краевой задачи (5.97) есть ряд

$$v(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) e^{-\left(\frac{(2\mu-1)\pi}{2\ell}\right)^2 a^2 t} \cos \frac{(2\mu-1)\pi x}{2\ell}, \quad (5.107)$$

коэффициенты которого равны коэффициентам (5.106) разложения начального условия $v_0(x)$ в ряд по собственным функциям (5.102).

Решение вспомогательной краевой задачи (5.98) сразу будем разыскивать в виде ряда по собственным функциям (5.102)

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(t) \cos \frac{(2\mu-1)\pi x}{2\ell}, \quad (5.108)$$

в котором коэффициенты $w_{\mu}(t)$ суть неизвестные функции времени.

Последовательность решения задачи (5.98) такая же, как и для задачи (??), поэтому запишем окончательное выражение для решения

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left\{ \int_0^t e^{-\left(\frac{\pi(2\mu-1)a}{2\ell}\right)^2 (t-\tau)} h_{\mu}(\tau) d\tau \right\} \cos \frac{(2\mu-1)\pi x}{2\ell}. \quad (5.109)$$

где $h_{\mu}(t)$ — коэффициенты разложения правой части уравнения задачи (5.98) в ряд по собственным функциям (5.102):

$$h(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) X_{\mu}(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_{\mu}(t) \cos \frac{(2\mu-1)\pi x}{2\ell},$$

$$h_{\mu}(t) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} h(\xi, t) \cos \frac{(2\mu-1)\pi \xi}{2\ell} d\xi. \quad (5.110)$$

5.4. Сводные сведения о решении краевых задач для пространственно одномерного уравнения теплопроводности

Краевые задачи I (5.1), II (5.50), III (5.73) и IV (5.74) решаются методом разделения переменных единообразно, но некоторая путаница может возникать при выборе функции $q(t, x)$ (5.4), (5.52), (5.76), (5.94), собственных значений λ_{μ} и собственных функций $X_{\mu}(x)$ задачи *Штурма – Лиувилля*. Для упрощения работы, все необходимые сведения собраны в табл. 5.1.

Табл. 5.1. Начальные и граничные условия, собственные значения и собственные функции основных I (5.1), II (??), III (5.73), IV (5.74) и вспомогательных ([5.7], (5.8)], [(5.55), (5.56)], [(5.79), (5.80)], [(5.97), (5.98)] краевых задач для неоднородного пространственно одномерного уравнения теплопроводности $u_t = a^2 u_{xx} + g(t, x)$. Решения основных краевых задач разыскиваются в виде $u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x)$, где функции $q(t, x)$ удовлетворяют граничным условиям, $v(t, x)$, $w(t, x)$ — решения соответствующих вспомогательных задач ($v_0(x) = u_0(x) - q(x, 0)$, $h(t, x) = f(t, x) - q_t(t, x) + a^2 q_{xx}(t, x)$, п. ч. \equiv правая часть уравнения краевой задачи, для задач I, II, IV $\mu = 1, 2, 3, \dots$, для задачи II $\mu = 0, 1, 2, \dots$)

№	$(0, t)$	(l, t)	$(x, 0)$	п. ч.	$q(t, x)$	λ_μ	$X_\mu(x)$
I	$u(0, t) = \psi_1(t)$ $v(0, t) = 0$ $w(0, t) = 0$	$u(l, t) = \psi_2(t)$ $v(l, t) = 0$ $w(l, t) = 0$	$u(x, 0) = u_0(x)$ $v(x, 0) = v_0(x)$ $w(x, 0) = 0$	$g(t, x)$ 0 $h(t, x)$	$\psi_1(t) + [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \left(\frac{x}{l}\right)$	$\left(\frac{\pi\mu}{l}\right)^2$	$\sin\left(\sqrt{\lambda_\mu}x\right)$
II	$u_x(0, t) = \psi_1(t)$ $v_x(0, t) = 0$ $w_x(0, t) = 0$	$u_x(l, t) = \psi_2(t)$ $v_x(l, t) = 0$ $w_x(l, t) = 0$	$u(x, 0) = u_0(x)$ $v(x, 0) = v_0(x)$ $w(x, 0) = 0$	$g(t, x)$ 0 $h(t, x)$	$\psi_1(t)x + [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \left(\frac{x^2}{2l}\right)$	$\left(\frac{\pi\mu}{l}\right)^2$	$\cos\left(\sqrt{\lambda_\mu}x\right)$
III	$u(0, t) = \psi_1(t)$ $v(0, t) = 0$ $w(0, t) = 0$	$u_x(l, t) = \psi_2(t)$ $v_x(l, t) = 0$ $w_x(l, t) = 0$	$u(x, 0) = u_0(x)$ $v(x, 0) = v_0(x)$ $w(x, 0) = 0$	$g(t, x)$ 0 $h(t, x)$	$\psi_1(t) + \psi_2(t)x$	$\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2l}\right)^2$	$\sin\left(\sqrt{\lambda_\mu}x\right)$
IV	$u_x(0, t) = \psi_1(t)$ $v_x(0, t) = 0$ $w_x(0, t) = 0$	$u(l, t) = \psi_2(t)$ $v(l, t) = 0$ $w(l, t) = 0$	$u(x, 0) = u_0(x)$ $v(x, 0) = v_0(x)$ $w(x, 0) = 0$	$g(t, x)$ 0 $h(t, x)$	$\psi_1(t)(x-l) + \psi_2(t)$	$\left(\frac{\pi(2\mu-1)}{2l}\right)^2$	$\cos\left(\sqrt{\lambda_n}x\right)$

5.5. Задачи

5.6. Пояснения

6. Задачи для уравнений гиперболического типа

6.0. Προλεγόμενα

6.1. Краевая задача для пространственно одномерного волнового уравнения с граничными условиями Дирихле

6.1.1. Постановка задачи

Физическая постановка задачи такова: известны положение и распределение скорости упругой струны конечной длины ℓ в начальное мгновение времени $t = 0$, в последующие мгновения $t > 0$ струна под действием известной распределённой силы и вследствие известного движения концов струны совершает малые плоские поперечные колебания. Описать движение струны на конечном промежутке времени $[0, T]$.

Математическая постановка есть краевая задача в замкнутом пространственно-временном прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$: найти непрерывную в прямоугольнике и дважды непрерывно-дифференцируемую в $(0, T] \times (0, \ell)$ функцию, удовлетворяющую пространственно одномерному неоднородному волновому уравнению (уравнению малых колебаний струны) и соответствующим начальным условиям (при $t = 0$) и граничным условиям Дирихле (на концах струны $x = 0$ и $x = \ell$ при $0 \leq t \leq T$), именно

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ \frac{\partial u(0, x)}{\partial t} = u_1(x) \\ u(0, x) = u_0(x) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq x \leq \ell, \quad (6.1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} u(t, 0) = \psi_1(t) \\ u(t, \ell) = \psi_2(t) \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T,$$

причём выполнены условия согласования начальных и граничных условий (см. задачу 6.1 на с. 134)

$$\left\{ \begin{array}{l} u_0(0) = \psi_1(0), \\ u_0(\ell) = \psi_2(0), \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} u_1(0) = \psi_1'(0), \\ u_1(\ell) = \psi_2'(0). \end{array} \right. \quad (6.2)$$

6.1.2. Решение задачи методом разделения переменных

Решение задачи (6.1) будем разыскивать в виде суммы трёх функций

$$u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x), \quad (6.3)$$

из которых первая ответственна за выполнение граничных условий задачи (6.1), то есть $q(t, 0) = \psi_1(t)$, $q(t, \ell) = \psi_2(t)$. Функция $q(t, x)$ может быть введена множеством способов (см. задачу 6.2 на с. 134), например, в виде линейной по независимой переменной x

$$q(t, x) = \psi_1(t) + [\psi_2(t) - \psi_1(t)] \frac{x}{\ell}. \quad (6.4)$$

Подстановка представления (6.3) в задачу (6.1) показывает, что «остаток» представления, то есть функция $v(t, x) + w(t, x) = u(t, x) - q(t, x)$, есть решение краевой задачи

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2} + a^2 \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ \frac{\partial v(0, x)}{\partial t} + \frac{\partial w(0, x)}{\partial t} = v_1(x) \\ v(0, x) + w(0, x) = v_0(x) \end{array} \right\}, \quad 0 < x < \ell, \quad (6.5)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v(t, 0) + w(t, 0) = 0 \\ v(t, \ell) + w(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T,$$

где правая часть уравнения и начальные условия суть следующие функции

$$\left\{ \begin{array}{l} h(t, x) = g(t, x) - \left[\frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 q(t, x)}{\partial x^2} \right], \\ v_1(x) = u_1(x) - \frac{\partial q(0, x)}{\partial t}, \\ v_0(x) = u_0(x) - q(0, x). \end{array} \right. \quad (6.6)$$

Краевую задачу (6.5), (6.6) для суммы $v(t, x) + w(t, x)$, в силу линейности по $v(t, x)$ и $w(t, x)$, разделим на две вспомогательные:

1) краевую задачу для функции $v(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ \frac{\partial v(0, x)}{\partial t} = v_1(x) \\ v(0, x) = v_0(x) \end{array} \right\}, \quad 0 < x < \ell, \quad (6.7)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v(t, 0) = 0 \\ v(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T;$$

2) краевую задачу для функции $w(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} + h(t, x), \quad 0 < x < \ell, \quad 0 < t \leq T, \\ \frac{\partial w(0, x)}{\partial t} = 0 \\ w(0, x) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 < x < \ell, \quad (6.8)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w(t, 0) = 0 \\ w(t, \ell) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq T.$$

1) Решение задачи (6.7) будем разыскивать методом разделения переменных:

а) представим искомую функцию $v(t, x)$ в виде произведения двух функций соответственно независимой переменной t и независимой переменной x

$$v(t, x) = O(t) X(x); \quad (6.9)$$

б) найдём вторые повторные производные представления функции $v(t, x)$ (6.9)

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial t^2} = O''(t) X(x), \\ \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2} = O(t) X''(x), \end{array} \right.$$

и подставим в уравнение задачи (6.7);

в) введём параметр разделения λ

$$\frac{1}{a^2} \frac{O''(t)}{O(t)} = \frac{X''(x)}{X(x)} = -\lambda = \text{const};$$

г) составим две задачи, связанные между собой через параметр λ : I) краевую задачу *Штурма – Лиувилля* нахождения собственных значений λ и собственных функций $X(x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} X''(x) + \lambda X(x) = 0, \quad 0 < x < \ell, \\ X(0) = 0, \quad X(\ell) = 0; \end{array} \right. \quad (6.10)$$

II) задачу *Коши* нахождения функции $O(t)$ (начальные условия далее будут уточнены)

$$\left\{ \begin{array}{l} O''(t) + \lambda a^2 O(t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \\ O'(0) = ?, \quad O(0) = ? \end{array} \right. \quad (6.11)$$

I) Вначале рассмотрим задачу *Штурма – Лиувилля* (6.10), счётное множество решений которой нам известно (см. раздел ?? на с. ??), поэтому просто выпишем собственные значения

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\mu\pi}{\ell} \right)^2, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (6.12)$$

и соответствующие им собственные функции

$$X_\mu(x) = \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (6.13)$$

II) Теперь обратимся к задаче *Коши* (6.11), в которую последовательно будем подставлять собственные значения (6.12), так что получим счётное множество задач *Коши*

$$\begin{cases} O_\mu''(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 O_\mu(t) = 0, & 0 < t \leq T, \\ O_\mu'(0) = ?, \quad O_\mu(0) = ? \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (6.14)$$

2-параметрические семейства решений линейных с постоянными коэффициентами однородных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка в составе задач *Коши* (6.14) найдём так (см. пояснение 6.1 на с. 134):

а) составим характеристические уравнения обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\kappa^2 + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 = 0,$$

сопряжённые чисто мнимые корни которых суть

$$\kappa_{1,2} = \mp i \frac{\mu\pi a}{\ell};$$

б) составим комплекснозначные фундаментальные системы решений обыкновенных дифференциальных уравнений (то есть полные системы линейно независимых частных комплекснозначных решений обыкновенных дифференциальных уравнений) и запишем их с помощью формулы *Эйлера*

$$\exp \left\{ \mp i \frac{\mu\pi a t}{\ell} \right\} = \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} \mp i \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell};$$

в) составим действительнзначные фундаментальные системы решений обыкновенных дифференциальных уравнений

$$\cos \frac{\mu\pi a t}{\ell}, \quad \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell};$$

г) составим линейные комбинации действительнзначных решений фундаментальных систем

$$O_\mu(t) = A_\mu \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} + B_\mu \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell}, \quad (6.15)$$

где A_μ, B_μ — произвольные постоянные (параметры семейств).

Теперь подставим полученные семейства (6.15) и их производные по переменной t в начальные условия задач (6.14) и найдём связь параметров семейств с неопределёнными пока величинами $O_\mu(0)$ и $O'_\mu(0)$

$$\begin{aligned} O_\mu(0) &= \left(A_\mu \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + B_\mu \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} \right) \Big|_{t=0} = A_\mu, \\ O'_\mu(0) &= \left(-\frac{\mu\pi a}{\ell} A_\mu \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} + \frac{\mu\pi a}{\ell} B_\mu \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} \right) \Big|_{t=0} = \frac{\mu\pi a}{\ell} B_\mu. \end{aligned} \quad (6.16)$$

Сборка (6.9), (6.13), (6.15), (6.16) образует частные решения уравнения задачи (6.7), именно

$$v_\mu(t, x) = O_\mu(t) X_\mu(x) = \left(O_\mu(0) \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + \frac{\ell}{\mu\pi a} O'_\mu(0) \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} \right) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell},$$

суммирование всех частных решений образует параметрическое семейство функций

$$\bar{v}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_\mu(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(O_\mu(0) \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + \frac{\ell}{\mu\pi a} O'_\mu(0) \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} \right) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (6.17)$$

которые: а) определены в прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$; б) удовлетворяют уравнению краевой задачи (6.7); в) удовлетворяют граничным условиям краевой задачи; г) вообще не удовлетворяют начальным условиям.

Выберем величины $O_\mu(0)$ и $O'_\mu(0)$ (начальные условия задач *Коши* (6.14)) так, чтобы из семейства (6.17) выделить функцию, удовлетворяющую начальным условиям краевой задачи (6.7), то есть получить решение последней:

а) подставим в семейство и его производную по переменной t значение $t = 0$

$$\begin{cases} \bar{v}(0, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(0) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \\ \frac{\partial \bar{v}(0, x)}{\partial t} = \sum_{\mu=1}^{\infty} O'_\mu(0) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O'_\mu(0) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}; \end{cases}$$

б) разложим начальные условия (6.6) краевой задачи (6.7) в ряд по собственным функциям $X_\mu(x)$ (6.13) (то есть в тригонометрический ряд *Фурье* «по синусам»)

$$\begin{cases} v_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{0,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \\ v_1(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{1,\mu} X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} v_{1,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \end{cases}$$

где коэффициенты разложений суть

$$v_{0,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} v_0(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad v_{1,\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} v_1(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi; \quad (6.18)$$

в) из сравнения коэффициентов соответствующих рядов «по синусам» заключим, что $O_\mu(0) = v_{0,\mu}$, $O'_\mu(0) = v_{1,\mu}$.

Следовательно, функция

$$v(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(v_{0,\mu} \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + \frac{\ell}{\mu\pi a} v_{1,\mu} \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} \right) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell} \quad (6.19)$$

есть искомое решение краевой задачи (6.7).

2) Решение краевой задачи (6.8), по образцу найденного решения (6.19) краевой задачи (6.7), сразу будем искать в виде ряда по собственным функциям (6.13) (то есть в виде тригонометрического ряда Фурье «по синусам»)

$$\bar{w}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_\mu(t) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (6.20)$$

в котором коэффициенты $w_\mu(t)$ суть неизвестные функции переменной t , но при этом ряд определён в прямоугольнике $[0, T] \times [0, \ell]$.

Для того, чтобы найти функции $w_\mu(t)$:

а) вычислим вторые повторные производные ряда (6.20)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \bar{w}(t, x)}{\partial t^2} &= \sum_{\mu=1}^{\infty} w''_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \\ \frac{\partial^2 \bar{w}(t, x)}{\partial x^2} &= - \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}; \end{aligned}$$

б) разложим правую часть $h(t, x)$ уравнения краевой задачи (6.8) в ряд по собственным функциям $X_\mu(x)$ (6.13)

$$h(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_\mu(t) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} h_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (6.21)$$

где коэффициенты разложения суть

$$h_\mu(t) = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} h(t, \xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi; \quad (6.22)$$

в) подставим найденные производные ряда (6.20) и разложение правой части $h(t, x)$ в уравнение краевой задачи (6.8), откуда получим ряд по собственным функциям $X_\mu(x)$, тождественно равный нулю ряд в прямоугольнике $(0, T] \times [0, \ell]$

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} \left\{ w_{\mu}''(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) - h_{\mu}(t) \right\} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell} \equiv 0,$$

что возможно лишь при тождественном обращении в нуль всех коэффициентов ряда

$$w_{\mu}''(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) - h_{\mu}(t) = 0, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (6.23)$$

Присоединим к линейным с постоянными коэффициентами неоднородным обыкновенным дифференциальным уравнениям второго порядка (6.23) относительно функций $w_{\mu}(t)$ соответствующие начальные условия:

а) подставим в ряд (6.20) и его производную по переменной t значение $t = 0$

$$\begin{cases} \bar{w}(0, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}(0) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \\ \frac{\partial \bar{w}(0, x)}{\partial t} = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_{\mu}'(0) \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}; \end{cases}$$

б) сопоставим полученные ряды с начальными условиями краевой задачи (6.8), откуда заключим, что $w_{\mu}(0) = 0, w_{\mu}'(0) = 0$;

в) составим счётную последовательность задач *Коши*

$$\begin{cases} w_{\mu}''(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) = h_{\mu}(t), & 0 < t \leq T, \\ w_{\mu}'(0) = 0 \\ w_{\mu}(0) = 0 \end{cases}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (6.24)$$

Задачи *Коши* (6.24) будем решать так:

а) запишем 2-параметрические решения

$$\dot{w}_{\mu}(t) = C_{\mu} \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + D_{\mu} \sin \frac{\mu\pi at}{\ell}, \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (6.25)$$

однородных уравнений, де C_{μ}, D_{μ} — неопределённые (произвольные) постоянные (см. пояснение 6.1 на с. 134 и решения (6.15) уравнений задач *Коши* (6.14))

$$w_{\mu}''(t) + \left(\frac{\mu\pi a}{\ell} \right)^2 w_{\mu}(t) = 0, \quad \mu \in \mathbb{N};$$

б) к решениям (6.25) однородных уравнений применим методом вариации произвольных постоянных для нахождения семейств решений вида

$$\bar{w}_{\mu}(t) = C_{\mu}(t) \cos \frac{\mu\pi at}{\ell} + D_{\mu}(t) \sin \frac{\mu\pi at}{\ell} \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (6.26)$$

неоднородных уравнений задач *Коши* (6.24), где $C_\mu(t), D_\mu(t)$ — неопределённые функции (см. пояснение 6.2 на с. 139);

в) наложим на функции $C_\mu(t), D_\mu(t)$, следуя методу вариации произвольных постоянных, ограничения в виде счётных последовательностей систем линейных алгебраических уравнений относительно производных функций $C_\mu(t), D_\mu(t)$

$$\begin{cases} \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} C'_\mu(t) + \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell} D'_\mu(t) = 0, \\ -\frac{\mu\pi a}{\ell} \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell} C'_\mu(t) + \frac{\mu\pi a}{\ell} \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} D'_\mu(t) = h_\mu(t), \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N},$$

из которых получим системы линейных дифференциальных уравнений первого порядка

$$\begin{cases} C'_\mu(t) = -\frac{\ell}{\mu\pi a} h_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell}, \\ D'_\mu(t) = +\frac{\ell}{\mu\pi a} h_\mu(t) \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell}, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}; \quad (6.27)$$

з) присоединим к системам дифференциальных уравнений (6.27) относительно функций $C_\mu(t), D_\mu(t)$ соответствующие начальные условия, которые получим подстановкой семейств (6.26) и их производных по переменной t в начальные условия задач *Коши* (6.24)

$$\begin{cases} w_\mu(0) = \left(C_\mu(t) \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} + D_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell} \right) \Big|_{t=0} = C_\mu(0) = 0, \\ w'_\mu(0) = \left(-\frac{\mu\pi a}{\ell} C_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell} + \frac{\mu\pi a}{\ell} D_\mu(t) \cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} \right) \Big|_{t=0} = \frac{\mu\pi a}{\ell} D_\mu(0) = 0, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N};$$

откуда имеем $C_\mu(0) = 0, D_\mu(0) = 0$;

д) решим полученные задачи *Коши* непосредственным интегрированием уравнений (6.27)

$$\begin{cases} C_\mu(t) = -\frac{\ell}{\mu\pi a} \int_0^t h_\mu(\tau) \sin \frac{\mu\pi a \tau}{\ell} d\tau, \\ D_\mu(t) = +\frac{\ell}{\mu\pi a} \int_0^t h_\mu(\tau) \cos \frac{\mu\pi a \tau}{\ell} d\tau, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}; \quad (6.28)$$

е) подставим найденные функции $C_\mu(t), D_\mu(t)$ (6.28) в семейства (6.26) и запишем решения задач *Коши* (6.24)

$$w_\mu(t) = \frac{\ell}{\mu\pi a} \left\{ -\cos \frac{\mu\pi a t}{\ell} \int_0^t h_\mu(\tau) \sin \frac{\mu\pi a \tau}{\ell} d\tau + \sin \frac{\mu\pi a t}{\ell} \int_0^t h_\mu(\tau) \cos \frac{\mu\pi a \tau}{\ell} d\tau \right\}, \quad \mu \in \mathbb{N}.$$

Упростим выражение в фигурных скобках с помощью известной тригонометрической формулы $\sin(\alpha \mp \sigma) = \sin \alpha \cos \sigma \mp \cos \alpha \sin \sigma$

$$\begin{aligned} \frac{\mu \pi a}{\ell} w_{\mu}(t) &= -\cos \frac{\mu \pi a t}{\ell} \int_0^t h_{\mu}(\tau) \sin \frac{\mu \pi a \tau}{\ell} d\tau + \sin \frac{\mu \pi a t}{\ell} \int_0^t h_{\mu}(\tau) \cos \frac{\mu \pi a \tau}{\ell} d\tau = \\ &= \int_0^t h_{\mu}(\tau) \left(\sin \frac{\mu \pi a t}{\ell} \cos \frac{\mu \pi a \tau}{\ell} - \cos \frac{\mu \pi a t}{\ell} \sin \frac{\mu \pi a \tau}{\ell} \right) d\tau = \\ &= \int_0^t h_{\mu}(\tau) \sin \frac{\mu \pi a (t - \tau)}{\ell} d\tau, \end{aligned}$$

тогда для для решений задач Коши (6.24) получим такие выражения

$$w_{\mu}(t) = \frac{\ell}{\mu \pi a} \int_0^t h_{\mu}(\tau) \sin \frac{\mu \pi a (t - \tau)}{\ell} d\tau, \quad (6.29)$$

либо, для тех, кто знает, что такое свёртка функций, такие

$$w_{\mu}(t) = \frac{\ell}{\mu \pi a} h_{\mu}(t) * \sin \frac{\mu \pi a t}{\ell}. \quad (6.30)$$

Сборка (6.20), (6.22), (6.29) даёт решение краевой задачи (6.8) в виде

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{\ell}{\mu \pi a} \left\{ \int_0^t h_{\mu}(\tau) \sin \frac{\mu \pi a (t - \tau)}{\ell} d\tau \right\} \sin \frac{\mu \pi x}{\ell}, \quad (6.31)$$

а сборка (6.20), (6.22), (6.30) — в виде

$$w(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{\ell}{\mu \pi a} h_{\mu}(t) * \sin \frac{\mu \pi a t}{\ell} \sin \frac{\mu \pi x}{\ell}. \quad (6.32)$$

Итак, решением краевой задачи (6.1) есть функция $u(t, x) = q(t, x) + v(t, x) + w(t, x)$, где функция $q(t, x)$ дана выражением (6.4), функция $v(t, x)$ дана выражением (6.19), а функция $w(t, x)$ — выражением (6.31) или выражением (6.32) (см. задачу 6.3 на с. 134).

6.1.3. Обоснование метода разделения переменных

6.1.4. Примеры решения задачи

Пример 6.1. Решим краевую задачу (6.1), в которой $\ell = 7$, $T = 9$, $a^2 = 4$, а функции суть $\psi_1(t) \equiv 0$, $\psi_2(t) \equiv 0$, $u_1(x) \equiv 0$,

$$g(t, x) = -2 \cos \frac{t}{4} \sin \frac{4\pi x}{7}, \quad u_0(x) = \begin{cases} \frac{4x}{3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ 7 - x, & 3 \leq x \leq 7, \end{cases}$$

то есть постановка краевой задачи такова

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 u(t, x)}{\partial x^2} - 2 \cos \frac{t}{4} \sin \frac{4\pi x}{7}, \quad 0 < x < 7, \quad 0 < t \leq 9, \\ \frac{\partial u(0, x)}{\partial t} = 0 \\ u(0, x) = \begin{cases} \frac{4x}{3}, & 0 \leq x \leq 3, \\ 7 - x, & 3 \leq x \leq 7, \end{cases} \\ u(t, 0) = 0 \\ u(t, 7) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq x \leq 7, \quad 0 \leq t \leq 9, \quad (6.33)$$

Будем разыскивать решение краевой задачи в виде $u(t, x) = v(t, x) + w(t, x)$; запишем краевую задачу для функции $v(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < 7, \quad 0 < t \leq 9, \\ \frac{\partial v(0, x)}{\partial t} = 0 \\ v(0, x) = u_0(x) \end{array} \right\}, \quad 0 < x < 7, \quad (6.34)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} v(0, t) = 0 \\ v(7, t) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq 9,$$

и краевую задачу для функции $w(t, x)$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial t^2} = 4 \frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} + g(t, x), \quad 0 < x < 7, \quad 0 < t \leq 9, \\ \frac{\partial w(t, x)}{\partial t} = 0 \\ w(t, x) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 < x < 7, \quad (6.35)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} w(0, t) = 0 \\ w(7, t) = 0 \end{array} \right\}, \quad 0 \leq t \leq 9.$$

Для решения краевой задачи (6.34) нам понадобится разложение функции $u_0(x)$ в тригонометрический ряд по синусам

$$u_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} u_{0,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{7},$$

коэффициенты которого суть

$$u_{0,\mu} = \frac{2}{7} \int_0^7 u_0(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{7} d\xi = \frac{2}{7} \left(\int_0^3 \frac{4\xi}{3} \sin \frac{\mu\pi\xi}{7} d\xi + \int_3^7 (7-\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{7} d\xi \right) = \frac{8}{21} I_1 + \frac{2}{7} I_2. \quad (6.36)$$

Вычислим интегралы I_1 и I_2 по частям

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \left\{ \begin{array}{l} p = x, \quad dp = dx \\ dq = \sin \frac{\mu\pi x}{7} dx, \quad q = -\frac{7}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi x}{7} \end{array} \right\} = \\
 &= -\frac{7}{\mu\pi} x \cos \frac{\mu\pi x}{7} \Big|_0^3 + \frac{7}{\mu\pi} \int_0^3 \cos \frac{\mu\pi x}{7} dx = -\frac{21}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{\mu\pi x}{7} \Big|_0^3 = \\
 &= -\frac{21}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7}, \\
 I_2 &= \left\{ \begin{array}{l} p = 7-x, \quad dp = -dx \\ dq = \sin \frac{\mu\pi x}{7} dx, \quad q = -\frac{7}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi x}{7} \end{array} \right\} = \\
 &= -\frac{7}{\mu\pi} (7-x) \cos \frac{\mu\pi x}{7} \Big|_3^7 - \frac{7}{\mu\pi} \int_3^7 \cos \frac{\mu\pi x}{7} dx = \frac{28}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} - \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{\mu\pi x}{7} \Big|_3^7 = \\
 &= \frac{28}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7}.
 \end{aligned}$$

Подставляя в правую часть выражения (6.36) вычисленные интегралы I_1 и I_2 , будем иметь

$$\begin{aligned}
 u_{0,\mu} &= \frac{8}{21} I_1 + \frac{2}{7} I_2 = -\frac{8}{21} \frac{21}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{8}{21} \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{2}{7} \frac{28}{\mu\pi} \cos \frac{3\mu\pi}{7} + \frac{2}{7} \frac{49}{\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7} = \\
 &= \frac{98}{3\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7}.
 \end{aligned} \tag{6.37}$$

Перейдём к решению краевой задачи (6.34), положив $v(t, x) = O(t) X(x)$. Тогда для функции $X(x)$ получим краевую задачу *Штурма – Лиувилля*

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < 7, \\ X(0) = 0, \quad X(7) = 0, \end{cases} \tag{6.38}$$

счётные последовательности собственных значений и собственных функций которой суть

$$\lambda_\mu = \left(\frac{\mu\pi x}{7} \right)^2, \quad X_\mu(x) = \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \tag{6.39}$$

Для нахождения соответствующих функций $O_\mu(t)$ составим задачи *Коши*

$$\begin{cases} O_\mu''(t) + \left(\frac{\mu\pi x}{7} \right)^2 O_\mu(t) = 0, & 0 < t \leq 9, \\ O_\mu(0) = ?, \quad O_\mu'(0) = ?, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}, \tag{6.40}$$

и запишем 2-параметрические семейства решений линейных однородных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка с постоянными коэффициентами, входящих в задачи *Коши* (6.40),

$$O_\mu(t) = A_\mu \cos \frac{2\mu\pi t}{7} + B_\mu \sin \frac{2\mu\pi t}{7}, \quad \mu \in \mathbb{N}, \tag{6.41}$$

с неопределёнными (произвольными) коэффициентами A_μ, B_μ .

Далее составим линейную комбинацию частных решений $v_\mu(t, x) = O_\mu(t) X_\mu(x)$ уравнения краевой задачи (6.34) как 2-параметрическое семейство функций

$$\bar{v}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} O_\mu(t) X_\mu(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(A_\mu \cos \frac{2\mu\pi t}{7} + B_\mu \sin \frac{2\mu\pi t}{7} \right) \sin \frac{\mu\pi x}{7}. \quad (6.42)$$

Для нахождения постоянных A_μ, B_μ подставим в семейство (6.42) и его производную по переменной t

$$\frac{\partial \bar{v}(t, x)}{\partial t} = \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{2\mu\pi}{7} \left(-A_\mu \sin \frac{2\mu\pi t}{7} + B_\mu \cos \frac{2\mu\pi t}{7} \right) \sin \frac{\mu\pi x}{7}$$

значение $t = 0$ и приравняем соответствующим начальным условиям краевой задачи (6.34)

$$\begin{cases} \bar{v}(0, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} A_\mu \sin \frac{\mu\pi x}{7} = u_0(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} u_{0,\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{7} = \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{98}{3\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7} \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \\ \frac{\partial \bar{v}(0, x)}{\partial t} = \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{2\mu\pi}{7} B_\mu \sin \frac{\mu\pi x}{7} = 0. \end{cases} \quad (6.43)$$

Сравнение соответствующих коэффициентов тригонометрических рядов (6.43) позволяет найти постоянные

$$\begin{cases} A_\mu = \frac{98}{3\mu^2\pi^2} \sin \frac{3\mu\pi}{7}, \\ B_\mu = 0, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad (6.44)$$

и окончательно записать решение краевой задачи (6.34)

$$v(t, x) = \frac{98}{3\pi^2} \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{1}{\mu^2} \cos \frac{2\mu\pi t}{7} \sin \frac{\mu\pi x}{7}. \quad (6.45)$$

Перейдём к решению краевой задачи (6.35), которое будем искать в виде ряда по собственным функциям (6.39)

$$\bar{w}(t, x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} w_\mu(t) \sin \frac{\mu\pi x}{7}. \quad (6.46)$$

Найдём вторые повторные производные семейства (6.46)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 \bar{w}(t, x)}{\partial t^2} &= \sum_{\mu=1}^{\infty} w_\mu''(t) \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \\ \frac{\partial^2 \bar{w}(t, x)}{\partial x^2} &= \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(\frac{\mu\pi}{7} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \end{aligned}$$

и подставим в уравнение задачи (6.46)

$$\sum_{\mu=1}^{\infty} \left[w_\mu''(t) + \left(\frac{2\mu\pi}{7} \right)^2 w_\mu(t) \right] \sin \frac{\mu\pi x}{7} = -2 \cos \frac{t}{4} \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \quad (6.47)$$

откуда получим задачи Коши для нахождения функций $w_\mu(t)$

$$\begin{cases} w''_{\mu}(t) + \left(\frac{2\mu\pi}{7}\right)^2 w_{\mu}(t) = 0, \\ w'_{\mu}(t) = 0, \\ w_{\mu}(t) = 0, \end{cases} \quad \mu \in \mathbb{N}, \quad \mu \neq 4, \quad (6.48)$$

$$\begin{cases} w''_4(t) + \left(\frac{8\pi}{7}\right)^2 w_4(t) = -2 \cos \frac{t}{4}, \\ w'_4(t) = 0, \\ w_4(t) = 0. \end{cases} \quad (6.49)$$

Решения задач (6.48), очевидно, тождественно равны нулю, а для решения задачи (6.49) применим формулу (6.29) на с. 129

$$w_4(t) = \frac{7}{8\pi} \int_0^t h_4(\tau) \sin \frac{8\pi(t-\tau)}{7} d\tau = -\frac{7}{8\pi} \int_0^t 2 \cos \frac{\tau}{4} \sin \frac{8\pi(t-\tau)}{7} d\tau. \quad (6.50)$$

Далее преобразуем подынтегральную функцию с помощью известной тригонометрической формулы $2 \cos \alpha \sin \sigma = \sin(\alpha + \sigma) - \sin(\alpha - \sigma)$

$$2 \cos \frac{\tau}{4} \sin \frac{8\pi(t-\tau)}{7} = \sin \left(\frac{\tau}{4} - \frac{8\pi\tau}{7} + \frac{8\pi t}{7} \right) - \sin \left(\frac{\tau}{4} + \frac{8\pi\tau}{7} - \frac{8\pi t}{7} \right)$$

и выполним интегрирование в формуле (6.50)

$$\begin{aligned} w_4(t) &= -\frac{7}{8\pi} \int_0^t \sin \left(\frac{\tau}{4} - \frac{8\pi\tau}{7} + \frac{8\pi t}{7} \right) d\tau + \frac{7}{8\pi} \int_0^t \sin \left(\frac{\tau}{4} + \frac{8\pi\tau}{7} - \frac{8\pi t}{7} \right) d\tau = \\ &= +\frac{7}{8\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \cos \left(\frac{\tau}{4} - \frac{8\pi\tau}{7} + \frac{8\pi t}{7} \right) \Big|_0^t - \frac{7}{8\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \cos \left(\frac{\tau}{4} + \frac{8\pi\tau}{7} - \frac{8\pi t}{7} \right) \Big|_0^t = \\ &= +\frac{7}{8\pi} \left(\frac{1}{4} - \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right) - \frac{7}{8\pi} \left(\frac{1}{4} + \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right) = \\ &= 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \left(\frac{1}{4} + \frac{8\pi}{7} \right)^{-1} \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right) = \\ &= 2 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \right]^{-1} \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right). \end{aligned}$$

Итак, можем записать решение краевой задачи (6.35) в таком виде

$$w(t, x) = 2 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \right]^{-1} \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right) \sin \frac{4\pi x}{7}. \quad (6.51)$$

Решение краевой задачи (6.33) есть сумма функций $v(t, x)$ (6.52) и $w(t, x)$ (6.51).

Проверим выполнение начальных условий для функции $u(t, x) = v(t, x) + w(t, x)$. Очевидно, что в мгновение $t = 0$ функция $v(0, x) = u_0(x)$, в силу (6.43), а функция $w(0, x) = 0$, то есть $u(0, x) = u_0(x)$. Теперь найдём производную функции $u(t, x)$ по переменной t и подставим значение $t = 0$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u(0, x)}{\partial t} &= \frac{\partial v(0, x)}{\partial t} + \frac{\partial w(0, x)}{\partial t} = \\
&= \left(\sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{98}{3\pi^2\mu^2} \frac{2\mu\pi}{7} \sin \frac{2\mu\pi t}{7} \sin \frac{\mu\pi x}{7} \right) \Big|_{t=0} + \\
&+ \left(2 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \right]^{-1} \left(\frac{8\pi}{7} \sin \frac{8\pi t}{7} - \frac{1}{4} \sin \frac{t}{4} \right) \sin \frac{4\pi x}{7} \right) \Big|_{t=0} = 0,
\end{aligned}$$

откуда заключим, что производная функции $u(t, x)$ по переменной t обращается в нуль при $t = 0$. Итак, начальные условия краевой задачи (6.33) выполнены.

$$\begin{aligned}
\frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial t^2} &= -\frac{8}{3} \sum_{\mu=1}^{\infty} \cos \frac{2\mu\pi t}{7} \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \\
\frac{\partial^2 v(t, x)}{\partial x^2} &= -\frac{2}{3} \sum_{\mu=1}^{\infty} \cos \frac{2\mu\pi t}{7} \sin \frac{\mu\pi x}{7}, \\
\frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial t^2} &= -2 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \right]^{-1} \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 \cos \frac{t}{4} - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \cos \frac{8\pi t}{7} \right] \sin \frac{4\pi x}{7}, \\
\frac{\partial^2 w(t, x)}{\partial x^2} &= -2 \left[\left(\frac{1}{4} \right)^2 - \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \right]^{-1} \frac{1}{4} \left(\frac{8\pi}{7} \right)^2 \left(\cos \frac{t}{4} - \cos \frac{8\pi t}{7} \right) \sin \frac{4\pi x}{7},
\end{aligned} \tag{6.52}$$

подставим их в уравнение краевой задачи (6.33) и убедимся в том, что уравнение выполнено.

Следовательно краевая задача (6.33) решена правильно. ▲

6.2. Задачи

Задача 6.1. Дайте истолкование условиям согласования начальных и граничных условий (6.2) краевой задачи (6.1) на с. 121.

Задача 6.2. Предложите семейства функций $q(t, x)$ в представлении (6.3) на с. 121, отличные от линейной (6.4).

Задача 6.3. Замените линейную функцию $q(t, x)$ (6.4) в представлении (6.3) на с. 121 другой функцией из допустимого семейства функций $q(t, x)$ (см. задачу 6.2) и поясните, как это повлияет на функции $v(t, x)$ и $w(t, x)$.

6.3. Пояснения

Пояснение 6.1 к с. 124. Для линейного однородного с постоянными коэффициентами обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка

$$a_0 y'' + a_1 y' + a_2 y = 0, \quad x \in \mathcal{I}, \tag{6.53}$$

2-параметрическое семейство решений (иначе — *общее решение*, см. книги [Степанова \[48\]](#), [Матвеева \[33\]](#), [Эльсгольца \[59\]](#)) имеет вид суперпозиции линейно независимых (частных) решений $y_1(x), y_2(x)$ (иначе — *фундаментальной системы* дифференциального уравнения)

$$y = \varphi_c(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), \quad x \in \mathcal{I}. \tag{6.54}$$

Теорема 6.1. Пусть $y_1(x), y_2(x)$ суть два (частных) решения линейного однородного дифференциального уравнения (6.53), тогда отличие определителя *Вронского* от нуля, то есть выполнение условия

$$W[y_1(x), y_2(x)] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0, \quad x \in \mathcal{I}, \quad (6.55)$$

необходимо и достаточно для того, чтобы решения были линейно независимы. \square

Следовательно, задача построения семейства (6.54) сводится к нахождению двух линейно независимых (частных) решений дифференциального уравнения (6.53). Последнее можно толковать как линейную зависимость искомой функции и её первой и второй производных. Среди элементарных функций только показательная вида

$$y = \varphi(x) = e^{\kappa x}, \quad x \in \mathcal{I}. \quad (6.56)$$

где κ — действительное или комплексное число, обладает тем свойством, что её производная любого порядка равна функции с точностью до множителя. На этом свойстве показательной функции основан метод *Эйлера*:

1) найдём производные функции (6.56) первого и второго порядков

$$\varphi'(x) = \kappa e^{\kappa x}, \quad \varphi''(x) = \kappa^2 e^{\kappa x}, \quad x \in \mathcal{I}.$$

полагая число κ неизвестным;

2) подставим производные в дифференциальное уравнение (6.53)

$$(a_0 \kappa^2 + a_1 \kappa + a_2) e^{\kappa x} = 0, \quad x \in \mathcal{I}, \quad (6.57)$$

разделим обе части полученного тождества на $e^{\kappa x}$ и получим *характеристическое уравнение* (левая часть последнего называется *характеристическим многочленом*)

$$a_0 \kappa^2 + a_1 \kappa + a_2 = 0; \quad (6.58)$$

3) найдём корни κ_1, κ_2 характеристического уравнения (6.58):

а) если корни суть действительные и различные, то линейно независимые решения дифференциального уравнения (6.53) суть

$$y_1(x) = e^{\kappa_1 x}, \quad y_2(x) = e^{\kappa_2 x}, \quad x \in \mathcal{I}; \quad (6.59)$$

б) если корни суть действительные и кратные, то есть $\kappa_1 = \kappa_2 = \kappa$, то линейно независимые решения дифференциального уравнения (6.53) суть

$$y_1(x) = e^{\kappa x}, \quad y_2(x) = x e^{\kappa x}, \quad x \in \mathcal{I}; \quad (6.60)$$

в) если корни суть комплексные (а значит, комплексно сопряжённые), то есть $\kappa_{1,2} = p \mp iq$, то линейно независимые комплекснозначные решения дифференциального уравнения (6.53) суть

$$\begin{cases} y_1(x) = e^{(p-iq)x} = e^{px} e^{-iqx} = e^{px} (\cos qx - i \sin qx), \\ y_2(x) = e^{(p+iq)x} = e^{px} e^{+iqx} = e^{px} (\cos qx + i \sin qx), \end{cases} \quad x \in \mathcal{I}; \quad (6.61)$$

а линейно независимые действительнзначные решения дифференциального уравнения (6.53) суть

$$y_1(x) = e^{px} \cos qx, \quad y_2(x) = e^{px} \sin qx, \quad x \in \mathcal{I}, \quad (6.62)$$

то есть действительная и мнимая (крест накрест) части решений (6.61).

Покажем, что условие (6.55) для решений (6.59), (6.60), (6.61) и (6.62) выполнено. В самом деле

$$\begin{aligned}
 W[y_1(x), y_2(x)] &= \begin{vmatrix} e^{\kappa_1 x} & e^{\kappa_2 x} \\ \kappa_1 e^{\kappa_1 x} & \kappa_2 e^{\kappa_2 x} \end{vmatrix} = (\kappa_2 - \kappa_1) e^{(\kappa_1 + \kappa_2)x} \neq 0, & x \in \mathcal{I}, \\
 W[y_1(x), y_2(x)] &= \begin{vmatrix} e^{\kappa x} & x e^{\kappa x} \\ \kappa e^{\kappa x} & e^{\kappa x} + \kappa x e^{\kappa x} \end{vmatrix} = e^{2\kappa x} \neq 0, & x \in \mathcal{I}, \\
 W[y_1(x), y_2(x)] &= \begin{vmatrix} e^{(p-iq)x} & e^{(p+iq)x} \\ (p-iq)e^{(p-iq)x} & (p+iq)e^{(p+iq)x} \end{vmatrix} = e^{2\kappa x} \neq 0, & x \in \mathcal{I}, \\
 W[y_1(x), y_2(x)] &= \begin{vmatrix} \cos qx e^{px} & \sin qx e^{px} \\ (p \cos qx - q \sin qx) e^{px} & (p \sin qx + q \cos qx) e^{px} \end{vmatrix} = q e^{2px} \neq 0, & x \in \mathcal{I}.
 \end{aligned}$$

Пример 6.2. Найдём 2-параметрическое семейство решений однородного дифференциального уравнения

$$y'' + y' - 2y = 0. \quad (6.63)$$

Продифференцировав дважды подстановку Эйлера (6.56) и заменив неизвестную функцию, её первую и вторую производные соответственно на $\exp(\kappa x)$, $\kappa \exp(\kappa x)$, $\kappa^2 \exp(\kappa x)$ получим характеристическое уравнение

$$\kappa^2 + \kappa - 2 = 0.$$

Корни последнего суть действительные и различные $\kappa_1 = -2$, $\kappa_2 = +1$, соответствующие им линейно независимые (частные) решения таковы

$$y_1(x) = e^{-2x}, \quad y_2(x) = e^{+x}. \quad (6.64)$$

Следовательно, линейная комбинация функций (6.64)

$$y = \varphi_c(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{+x} \quad (6.65)$$

есть 2-параметрическое семейство решений дифференциального уравнения (6.63). \blacktriangle

Пример 6.3. Найдём 2-параметрическое семейство решений однородного дифференциального уравнения

$$y'' - 6y' + 9y = 0. \quad (6.66)$$

Характеристическое уравнение дифференциального уравнения (6.66)

$$\kappa^2 - 6\kappa + 9 = 0$$

имеет два равных корня (или, что то же самое, один корень кратности 2) $\kappa_{1,2} = 3$, соответствующие им линейно независимые (частные) решения таковы

$$y_1(x) = e^{3x}, \quad y_2(x) = x e^{3x}. \quad (6.67)$$

Следовательно, линейная комбинация функций (6.67)

$$y = \varphi_c(x) = (C_1 + C_2 x) e^{3x} \quad (6.68)$$

есть 2-параметрическое семейство решений дифференциального уравнения (6.66). ▲

Пример 6.4. Для однородного дифференциального уравнения

$$y'' + y = 0, \quad (6.69)$$

найдем: 1) 2-параметрическое семейство решений; 2) решение задачи *Коши* со следующими начальными условиями: $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

Характеристическое уравнение

$$\kappa^2 + 1 = (\kappa - i)(\kappa + i) = 0$$

имеет два комплексно сопряженных мнимых корня $\kappa_{1,2} = \mp i$, соответствующие им линейно независимые комплексно сопряженные (частные) решения дифференциального уравнения (6.69) таковы

$$\begin{cases} y_1(x) = e^{-ix} = \cos x - i \sin x, \\ y_2(x) = e^{+ix} = \cos x + i \sin x. \end{cases} \quad (6.70)$$

Составим линейную комбинацию решений (6.70)

$$y = \varphi_c(x) = (C_1 + C_2) \cos x + i(C_2 - C_1) \sin x = D_1 \cos x + D_2 \sin x, \quad (6.71)$$

чтобы получить 2-параметрическое семейство решений дифференциального уравнения (6.69). Но данное дифференциальное уравнение имеет действительные коэффициенты, поэтому мы разыскиваем 2-х параметрическое семейство его действительных решений, между тем решения (6.70) суть комплекснозначные функции переменной x .

Попробуем прояснить суть возникшего затруднения, обратившись к задаче *Коши*. Подставив в семейство (6.71) и его первую производную начальные условия

$$\begin{cases} y(0) = \left[(C_1 + C_2) \cos x + i(C_2 - C_1) \sin x \right] \Big|_{x=0} = 0, \\ y'(0) = \left[-(C_1 + C_2) \sin x + i(C_2 - C_1) \cos x \right] \Big|_{x=0} = 1, \end{cases}$$

получим систему линейных алгебраических уравнений относительно постоянных C_1, C_2 и D_1, D_2

$$\begin{cases} (C_1 + C_2) = D_1 = 0, \\ i(C_2 - C_1) = D_2 = 1, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} 2C_1 = +i, \\ 2C_2 = -i. \end{cases}$$

Найденные значения постоянных $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ (причем постоянные C_1, C_2 суть комплексно сопряженные) подставим в семейство (6.71) и получим действительное решение задачи *Коши*

$$y = \sin x, \quad (6.72)$$

как частное решение семейства (6.71). ▲

Пример 6.5. Для однородного дифференциального уравнения

$$y'' - 2y' + 5y = 0, \quad (6.73)$$

найдем: 1) 2-параметрическое семейство решений; 2) решение задачи *Коши* со следующими начальными условиями: $y(0) = \alpha_1$, $y'(0) = \alpha_2$, где $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$.

Характеристическое уравнение

$$\kappa^2 - 2\kappa + 5 = 0$$

имеет два комплексно сопряженных корня $\kappa_{1,2} = 1 \mp i$, которым соответствуют два линейно независимых комплексно сопряженных (частных) решения

$$\begin{cases} y_1(x) = e^{(1-i)x} = e^x (\cos x - i \sin x), \\ y_2(x) = e^{(1+i)x} = e^x (\cos x + i \sin x). \end{cases} \quad (6.74)$$

Составим линейную комбинацию решений (6.74)

$$y = \varphi_c(x) = e^x \left[(C_1 + C_2) \cos x + i(C_2 - C_1) \sin x \right] = e^x (D_1 \cos x + D_2 \sin x), \quad (6.75)$$

чтобы получить 2-параметрическое семейство решений дифференциального уравнения (6.73).

Для решения задачи *Коши* подставим начальные условия в семейство (6.75) и его производную по x при $x = 0$ и получим следующую систему линейных алгебраических уравнений относительно параметров C_1 и C_2

$$\begin{cases} y(0) = e^x \left[(C_1 + C_2) \cos x + i(C_2 - C_1) \sin x \right] \Big|_{x=0} = \alpha_1, \\ y'(0) = e^x \left[(C_1 + C_2) \cos x + i(C_2 - C_1) \sin x \right] \Big|_{x=0} + \\ + e^x \left[-(C_1 + C_2) \sin x + i(C_2 - C_1) \cos x \right] \Big|_{x=0} = \alpha_2, \end{cases}$$

или после упрощения

$$\begin{cases} (C_1 + C_2) = \alpha_1, \\ (C_1 + C_2) + i(C_2 - C_1) = \alpha_2. \end{cases}$$

Единственное решение этой системы

$$\begin{cases} (C_1 + C_2) = D_1 = \alpha_1, \\ i(C_2 - C_1) = D_2 = \alpha_2 - \alpha_1, \end{cases}$$

где $D_1, D_2 \in \mathbb{R}$, $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ (причем постоянные C_1, C_2 суть комплексно сопряженные), задает искомое решение задачи *Коши*

$$y = e^x \left[\alpha_1 \cos x + (\alpha_2 - \alpha_1) \sin x \right] \quad (6.76)$$

как частное действительное решение семейства (6.75). ▲

Рассмотренные примеры полностью раскрывают способы построения фундаментальной системы линейного однородного с постоянными коэффициентами обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка (6.53). ▼

Пояснение 6.2 к с. 128. Метод вариации произвольной постоянной для неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами порядка выше первого поясним на примере уравнения второго порядка

$$y a_0''(x) + a_1 y'(x) + a_2 y(x) = g(x), \quad x \in \mathcal{I}, \quad (6.77)$$

для которого известны линейно независимые решения $y_1(x)$, $y_2(x)$ (то есть *фундаментальная система* решений, см. книги [Степанова](#) [48], [Матвеева](#) [33], [Эльсгольца](#) [59]) соответствующего однородного уравнения (см. пояснение 6.1 на с. 134)

$$a_0 y''(x) + a_1 y'(x) + a_2 y(x) = 0, \quad x \in \mathcal{I}. \quad (6.78)$$

Это означает, *во-первых*, что определитель *Вронского* тождественно отличен от нуля

$$W[y_1(x), y_2(x)] = \begin{vmatrix} y_1(x) & y_2(x) \\ y_1'(x) & y_2'(x) \end{vmatrix} \neq 0, \quad x \in \mathcal{I}. \quad (6.79)$$

во-вторых, что любое решение однородного уравнения (6.78) может быть получено из 2-параметрического семейства (называемого также общим решением)

$$y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) \quad (6.80)$$

при подходящем выборе произвольных постоянных C_1, C_2 . Заметим, что семейство (6.80) удовлетворяет однородному уравнению (6.78) при любых значениях постоянных C_1, C_2 . В самом деле

$$\begin{aligned} a_0 y''(x) + a_1 y'(x) + a_2 y(x) &= a_0 (C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x))'' + a_1 (C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x))' + a_2 (C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)) = \\ &= a_0 (C_1 y_1''(x) + C_2 y_2''(x)) + a_1 (C_1 y_1'(x) + C_2 y_2'(x)) + a_2 (C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)) = \\ &= C_1 (a_0 y_1''(x) + a_1 y_1'(x) + a_2 y_1(x)) + C_2 (a_0 y_2''(x) + a_1 y_2'(x) + a_2 y_2(x)) \equiv 0. \end{aligned}$$

Будем разыскивать 2-х параметрическое семейство решений неоднородного уравнения (6.77) в виде

$$y(x) = C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x), \quad (6.81)$$

где $C_1(x)$, $C_2(x)$ — функции, подлежащие определению (устоявшееся обыкновение обозначать постоянные C_1, C_2 в семействе (6.80) и функции $C_1(x), C_2(x)$ в семействе (6.81) нельзя признать удачным).

Продифференцируем дважды семейство (6.81), накладывая на производные функций $C_1(x)$, $C_2(x)$ условия, указанные в фигурных скобках, тогда будем иметь

$$\begin{aligned} y'(x) &= C_1'(x) y_1(x) + C_1(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2(x) + C_2(x) y_2'(x) = \left\{ C_1'(x) y_1(x) + C_2'(x) y_2(x) = 0 \right\} = \\ &= C_1(x) y_1'(x) + C_2(x) y_2'(x), \\ y''(x) &= C_1'(x) y_1'(x) + C_1(x) y_1''(x) + C_2'(x) y_2'(x) + C_2(x) y_2''(x) = \left\{ C_1'(x) y_1'(x) + C_2'(x) y_2'(x) = g(x) \right\} = \\ &= C_1(x) y_1''(x) + C_2(x) y_2''(x) + g(x). \end{aligned}$$

Подставив семейство (6.81) и полученные выражения для первой и второй производных семейства

$$\begin{cases} y'(x) = C_1(x) y_1'(x) + C_2(x) y_2'(x), \\ y''(x) = C_1(x) y_1''(x) + C_2(x) y_2''(x) + g(x), \end{cases} \quad (6.82)$$

в левую часть неоднородного дифференциального уравнения (6.77)

$$\begin{aligned}
 a_0 y''(x) + a_1 y'(x) + a_2 y(x) &= a_0 \left(C_1(x) y_1''(x) + C_2(x) y_2''(x) + g(x) \right) + \\
 &+ a_1 \left(C_1(x) y_1'(x) + C_2(x) y_2'(x) \right) + a_2 \left(C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x) \right) = \\
 &= C_1(x) \left(a_0 y_1''(x) + a_1 y_1'(x) + a_2 y_1(x) \right) + \\
 &+ C_2(x) \left(a_0 y_2''(x) + a_1 y_2'(x) + a_2 y_2(x) \right) + g(x) \equiv g(x),
 \end{aligned}$$

убедимся, что семейство тождественно удовлетворяет уравнению.

Для того, чтобы семейство (6.81) было полностью определено, нужно воспользоваться условиями, наложенными выше на неизвестные функции $C_1(x), C_2(x)$. Запишем эти условия в виде системы линейных алгебраических уравнений относительно производных $C_1'(x), C_2'(x)$

$$\begin{cases} y_1(x) C_1'(x) + y_2(x) C_2'(x) = 0, \\ y_1'(x) C_1'(x) + y_2'(x) C_2'(x) = g(x), \end{cases} \quad (6.83)$$

и найдём решение системы по формулам *Крамера*

$$C_1'(x) = \frac{W_1(x)}{W(x)} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2(x) \\ g(x) & y_2'(x) \end{vmatrix}}{W(x)}, \quad C_2'(x) = \frac{W_2(x)}{W(x)} = \frac{\begin{vmatrix} y_1(x) & 0 \\ y_1'(x) & g(x) \end{vmatrix}}{W(x)}, \quad (6.84)$$

где определитель системы есть определитель *Вронского* (6.79), то есть $W(x) = W[y_1(x), y_2(x)]$.

Далее найдём функции $C_1(x), C_2(x)$ непосредственным интегрированием выражений (6.84)

$$C_1(x) = C_{1,0} + \int \frac{W_1(x)}{W(x)} dx, \quad C_2(x) = C_{2,0} + \int \frac{W_2(x)}{W(x)} dx, \quad (6.85)$$

где $C_{1,0}, C_{2,0}$ — постоянные интегрирования.

Если для неоднородного дифференциального уравнения (6.77) поставлена задача *Коши*, то искомые функции $C_1(x), C_2(x)$ можно должным образом настроить

$$C_1(x) = C_{1,0} + \int_{x_0}^x \frac{W_1(x)}{W(x)} dx, \quad C_2(x) = C_{2,0} + \int_{x_0}^x \frac{W_2(x)}{W(x)} dx, \quad (6.86)$$

где $C_{1,0} = C_1(x_0), C_{2,0} = C_2(x_0), x_0 \in \mathcal{I}$. ▼

Пример 6.6. Найдём 2-параметрическое семейство решений неоднородного дифференциального уравнения

$$y'' + 4y' + 4y = 3x e^{-2x}. \quad (6.87)$$

Во-первых, отбросим правую часть данного дифференциального уравнения и рассмотрим соответствующее ему однородное дифференциальное уравнение

$$y'' + 4y' + 4y = 0. \quad (6.88)$$

Характеристическое уравнение последнего есть квадратное

$$\kappa^2 + 4\kappa + 4 = 0 \quad (6.89)$$

и имеет два равных корня (или, что то же самое, один корень кратности 2) $\kappa_{1,2} = -2$. Соответствующие корням линейно независимые частные решения суть

$$y_1(x) = e^{-2x}, \quad y_2(x) = x e^{-2x}. \quad (6.90)$$

Во-вторых, составим определитель Вронского

$$W(x) = \begin{vmatrix} e^{-2x} & x e^{-2x} \\ -2 e^{-2x} & (1-2x) e^{-2x} \end{vmatrix} = e^{-4x} \begin{vmatrix} 1 & x \\ -2 & 1-2x \end{vmatrix} = e^{-4x}$$

и два вспомогательных определителя

$$W_1(x) = \begin{vmatrix} 0 & x e^{-2x} \\ 3x e^{-2x} & (1-2x) e^{-2x} \end{vmatrix} = -3x^2 e^{-4x}, \quad W_2(x) = \begin{vmatrix} e^{-2x} & 0 \\ -2 e^{-2x} & 3x e^{-2x} \end{vmatrix} = 3x e^{-4x}.$$

В-третьих, найдем по формулам (6.85) функции

$$C_1(x) = C_{1,0} + \int \frac{W_1(x)}{W(x)} dx = C_{1,0} - \int 3x^2 dx = C_{1,0} - x^3,$$

$$C_2(x) = C_{2,0} + \int \frac{W_2(x)}{W(x)} dx = C_{2,0} + \int 3x dx = C_{2,0} + \frac{3}{2} x^2,$$

и составим 2-параметрическое семейство (6.81) решений линейного неоднородного дифференциального уравнения (6.87)

$$\begin{aligned} \varphi_p(x) &= C_1(x) y_1(x) + C_2(x) y_2(x) = (C_{1,0} - x^3) e^{-2x} + \left(C_{2,0} + \frac{3}{2} x^2\right) x e^{-2x} = \frac{1}{2} x^3 e^{-2x} = \\ &= (C_{1,0} + C_{2,0} x) e^{-2x} + \frac{1}{2} x^3 e^{-2x}. \end{aligned} \quad (6.91)$$

Для завершения примера следует выполнить проверку решения (6.91) с помощью подстановки в дифференциальное уравнение (6.87). ▲

7. Ряды Фурье

7.0. Προλεγόμενα

7.1. Разложение функции в ряд Фурье

... по свидетельству Римана ..., когда Фурье в 1807 г. высказал впервые теорему, что совершенно произвольно (графически) данная функция может быть представлена в виде тригонометрического ряда, это утверждение было так неожиданно для престарелого Лагранжа, что он решительным образом восстал против него. Возможно, это было одной из причин того, что работа Фурье 1811 г. была опубликована лишь в 1824–1826 гг. ... [38]

... коэффициенты ряда ... образуют счетное множество, в то время как „число“ значений функции гораздо больше, множество этих значений более мощное. Тем не менее Фурье имел смелость сказать, что совершенно произвольная (графически заданная) непрерывная функция может быть представлена в виде тригонометрического ряда. И это правильно, потому что (как теперь известно) непрерывные функции вовсе не так разнообразны, как это кажется на первый взгляд. Достаточно задать непрерывную функцию в *рациональных* точках чтобы определить ее полностью. Другими словами, непрерывные функции задаются совокупностью своих значений в рациональных точках. Но эти точки составляют множество такой же мощности, как и коэффициенты разложения (счетное множество). Если мы примем это во внимание, то нас уже не удивит возможность представить любую непрерывную функцию в виде ряда Фурье. [30]

Определение 7.1. Пусть $u(x)$ — заданная на \mathbb{R} 2ℓ -периодическая функция, абсолютно интегрируемая (в собственном или несобственном смысле) на произвольном отрезке $[x_0 - \ell, x_0 + \ell]$, где $x_0 \in \mathbb{R}$, тогда тригонометрический ряд

$$u(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} \left(a_{\mu} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell} + b_{\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell} \right), \quad (7.1)$$

коэффициенты которого (коэффициенты Фурье) вычислены по формулам

$$a_0 = \frac{1}{\ell} \int_{x_0-\ell}^{x_0+\ell} u(\xi) d\xi, \quad a_{\mu} = \frac{1}{\ell} \int_{x_0-\ell}^{x_0+\ell} u(\xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad b_{\mu} = \frac{1}{\ell} \int_{x_0-\ell}^{x_0+\ell} u(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad (7.2)$$

называется *рядом Фурье* функции $u(x)$. □

Замечание 7.1. Функция $u(x)$, заданная на отрезке $[a, b]$, имеет период, равный длине отрезка: $2\ell = b - a$; интегрирование в формулах (7.2) можно проводить по отрезку $[a, b]$, то есть полагая $x_0 - \ell = a$, $x_0 + \ell = b$, и подразумевая функцию 2ℓ -периодически продолженной на \mathbb{R} . □

Теорема 7.1. Пусть $u(x)$ — функция периода 2ℓ , кусочно-непрерывно дифференцируемая на отрезке $[-\ell, +\ell]$, тогда её ряд Фурье $S(x)$ (7.1) сходится: 1) к значениям $u(x)$ в точках $x \in (-\ell, +\ell)$ непрерывности функции; 2) к полусуммам односторонних пределов $u(x-0)$ и $u(x+0)$, то есть к значениям $\frac{1}{2}(u(x-0) + u(x+0))$ в точках $x \in (-\ell, +\ell)$ разрыва функции. □

Теорема 7.2. Пусть $u(x)$ — функция периода 2ℓ : 1) непрерывная на отрезке $[-\ell, +\ell]$; 2) удовлетворяющая условию $u(-\ell) = u(+\ell)$; 3) кусочно непрерывно дифференцируемая на отрезке $[-\ell, +\ell]$, тогда её ряд Фурье $S(x)$ (7.1) сходится к этой функции равномерно на отрезке $[-\ell, +\ell]$. \square

Теорема 7.3. Пусть на отрезке $[-\ell, +\ell]$: 1) функция $u(x)$ есть непрерывно дифференцируемая ϱ раз; 2) производная функции $u(x)$ порядка $\varrho + 1$ есть кусочно непрерывная; 3) последовательные производные функции $u(x)$ до порядка ϱ включительно принимают равные значения на концах промежутка; 4) известен ряд Фурье (7.1) функции $u(x)$, тогда: 1) числовой ряд

$$\sum_{\mu=0}^{\infty} \mu^{\varrho} (|a_{\mu}| + |b_{\mu}|), \quad (7.3)$$

сходится; 2) ряд Фурье можно почленно дифференцировать ϱ раз. \square

7.2. Различные виды записи ряда Фурье

Помимо свойств, указанных в определении 7.1 и посылках теорем 7.1, 7.2 и 7.3, разлагающаяся в ряд Фурье функция $u(x)$ обладает и другими свойствами, вообще говоря, влияющими на коэффициенты (7.2) ряда Фурье и, соответственно, на ряд Фурье (7.1).

Рассмотрим, как изменятся формулы (7.2) для вычисления коэффициентов Фурье для чётной и нечётной функции $u(x)$.

Пусть $u(x)$ есть чётная функция на отрезке $[-\ell, +\ell]$: $u(x) = u(-x)$, тогда произведение функции $u(x)$ и тригонометрической функции $\cos \frac{\mu\pi x}{\ell}$ в формуле (7.2) для a_{μ} также есть чётная функция, а произведение функции $u(x)$ и тригонометрической функции $\sin \frac{\mu\pi x}{\ell}$ в формуле (7.2) для b_{μ} есть нечётная функция, следовательно, все коэффициенты b_{μ} суть нулевые, и ряд Фурье принимает вид

$$u(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{\mu=1}^{\infty} a_{\mu} \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (7.4)$$

где коэффициенты разложения суть

$$a_0 = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} u(\xi) d\xi, \quad a_{\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} u(\xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (7.5)$$

Пусть $u(x)$ есть нечётная функция на отрезке $[-\ell, +\ell]$: $u(x) = -u(-x)$, тогда произведение функции $u(x)$ и тригонометрической функции $\cos \frac{\mu\pi x}{\ell}$ в формуле (7.2) для a_{μ} есть также нечётная функция, а произведение функции $u(x)$ и тригонометрической функции $\sin \frac{\mu\pi x}{\ell}$ в формуле (7.2) для b_{μ} есть чётная функция, следовательно, коэффициент a_0 и все коэффициенты a_{μ} суть нулевые, и ряд Фурье принимает вид

$$u(x) = \sum_{\mu=1}^{\infty} b_{\mu} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}, \quad (7.6)$$

где коэффициенты разложения суть

$$b_{\mu} = \frac{2}{\ell} \int_0^{\ell} u(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad \mu \in \mathbb{N}. \quad (7.7)$$

Представления (7.4), (7.5) и (7.6), (7.7) ряда *Фурье* соответственно для чётной и нечётной функции $u(x)$ позволяют целенаправленно управлять разложением произвольной функции $u(x)$ в ряд *Фурье*. В самом деле, пусть функция $u(x)$ задана на отрезке $[0, \ell]$. Если продолжить функцию на промежуток $[-\ell, 0)$ чётным образом, то придём к разложению в ряд *Фурье* вида (7.4), (7.5), а если продолжить нечётным образом, то — к разложению вида (7.6), (7.7).

Замечание 7.2. Если учесть, что в формулы (7.5) и (7.7) для коэффициентов ряда *Фурье* соответственно чётной и нечётной функции входят только значения последней на отрезке $[0, \ell]$, то продолжение на промежуток $[-\ell, 0)$ можно на самом деле не проводить. Достаточно только выбрать способ продолжения и применить соответствующие формулы для коэффициентов. \square

7.3. Примеры разложения функций в ряд Фурье

Пример 7.1. Дана функция

$$u(x) = x^2, \quad x \in [-1, +1], \quad (7.8)$$

разложим её в ряд Фурье, периодически продолжив на \mathbb{R} .

Поскольку заданная функция есть чётная, то имеем дело с рядом Фурье вида (7.4). Вычислив соответствующие интегралы по частям, запишем коэффициенты ряда

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 \xi^2 d\xi = \frac{2}{3} \xi^3 \Big|_0^1 = \frac{2}{3}, \\ a_\mu &= 2 \int_0^1 \xi^2 \cos(\mu\pi\xi) d\xi = 2 \left[\xi^2 \frac{\sin(\mu\pi\xi)}{\mu\pi} \Big|_0^1 - \frac{2}{\mu\pi} \int_0^1 \xi \sin(\mu\pi\xi) d\xi \right] = \\ &= \frac{4}{\mu\pi} \left[\xi \frac{\cos(\mu\pi\xi)}{\mu\pi} - \frac{1}{\mu\pi} \int_0^1 \xi \cos(\mu\pi\xi) d\xi \right] = \frac{4(-1)^\mu}{\mu^2\pi^2}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (7.9)$$

Итак, можем записать ряд Фурье функции (7.8) в таком виде

$$u(x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{(-1)^\mu}{\mu^2} \cos(\mu\pi x) = \frac{1}{3} + \frac{4}{\pi^2} \left(\frac{\cos(1\pi x)}{1^2} - \frac{\cos(2\pi x)}{2^2} + \frac{\cos(3\pi x)}{3^2} - \dots \right). \quad (7.10)$$

Графики частичных сумм ряда Фурье (7.10), показанные на рис. 7.1, дают представление о разложении функции (7.8) в ряд Фурье и о сходимости последнего. ▲

Пример 7.2. Дана функция

$$u(x) = \operatorname{sign}(x) x^2, \quad x \in [-1, +1], \quad (7.11)$$

разложим её в ряд Фурье, периодически продолжив на \mathbb{R} .

Поскольку заданная функция есть нечётная, то имеем дело с рядом Фурье вида (7.6). Перед продолжением нечётной функции сузим область её определения, удалив один из концов отрезка $[-1, +1]$, например, левый. Найдём коэффициенты ряда (7.6), вычислив соответствующие интегралы по частям

$$\begin{aligned} b_\mu &= 2 \int_0^1 \xi^2 \sin(\mu\pi\xi) d\xi = 2 \left[-\xi^2 \frac{\cos(\mu\pi\xi)}{\mu\pi} \Big|_0^1 + \frac{2}{\mu\pi} \int_0^1 \xi \cos(\mu\pi\xi) d\xi \right] = \\ &= \frac{4}{\mu\pi} \left[\xi \frac{\cos(\mu\pi\xi)}{\mu\pi} - \frac{1}{\mu\pi} \int_0^1 \xi \cos(\mu\pi\xi) d\xi \right] = \frac{4(-1)^\mu}{\mu^2\pi^2}, \quad \mu \in \mathbb{N}. \end{aligned} \quad (7.12)$$

Итак, можем записать ряд Фурье функции (7.11) в таком виде

$$\begin{aligned} u(x) &= \frac{2}{\pi} \sum_{\mu=1}^{\infty} (-1)^{\mu+1} \frac{\mu^2\pi^2 - 2}{\mu^3\pi^2} \sin(\mu\pi x) = \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{1^2\pi^2 - 2}{1^3\pi^2} \sin(1\pi x) - \frac{2^2\pi^2 - 2}{2^3\pi^2} \sin(2\pi x) + \frac{3^2\pi^2 - 2}{3^3\pi^2} \sin(3\pi x) - \dots \right). \end{aligned} \quad (7.13)$$

Графики частичных сумм ряда Фурье (7.13), показанные на рис. 7.2, 7.3, дают представление о разложении функции (7.11) в ряд Фурье и о сходимости последнего. ▲




Рис. 7.1. Разложение в ряд *Фурье* (коричневый цвет) непрерывно-дифференцируемой функции (7.8) (непрерывной и кусочно-непрерывно дифференцируемой после периодического продолжения, синий цвет): 1 (а), 3 (б), 5 (в), 10 (г) слагаемых ряда (7.10)




Рис. 7.3. Отрезки ряда Фурье (7.13) (коричневый цвет) непрерывно дифференцируемой функции (7.11) (кусочно-непрерывной и кусочно-непрерывно дифференцируемой после периодического продолжения, синий цвет): 10 (а), 25 (б) слагаемых ряда. На разрывах первого рода продолженной функции синими кружочками (залитыми и незалитыми) показаны односторонние предельные значения (левые и правые), красными кружочками — осреднённые значения односторонних пределов, через которые проходят отрезки ряда Фурье при любом количестве слагаемых. Незатухающие «всплески» отрезков ряда Фурье, приближающиеся с обеих сторон к точкам разрыва функции при увеличении количества слагаемых, составляют суть явления Гиббса

Пример 7.3. Дана непрерывная кусочно-линейная функция

$$u(x) = \begin{cases} \frac{x}{c} h, & x \in [0, c], \\ \frac{\ell - x}{\ell - c} h, & x \in [c, \ell], \end{cases} \quad (7.14)$$

разложим её в ряд *Фурье* по синусам, вначале продолжив нечётным образом на $[-\ell, 0)$, а затем периодически продолжив на \mathbb{R} .

Поскольку заданная функция есть кусочно-линейная, вычисление коэффициентов b_μ по формуле (7.7) сведём к вычислению двух определённых интегралов

$$b_\mu = \frac{2}{\ell} \int_0^\ell u(\xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \frac{2}{\ell} \int_0^c \frac{\xi}{c} h \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi + \frac{2}{\ell} \int_c^\ell \frac{\ell - \xi}{\ell - c} h \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \frac{2h}{\ell c} I_1 + \frac{2h}{\ell(\ell - c)} I_2. \quad (7.15)$$

Каждый из интегралов I_1 и I_2 , зависящих от параметров, вычислим по частям:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^c \xi \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \left\{ \begin{array}{l} u = \xi, \quad du = d\xi, \\ dv = \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad v = -\frac{\ell}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \end{array} \right\} = \\ &= -\frac{\ell}{\mu\pi} \xi \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_0^c + \frac{\ell}{\mu\pi} \int_0^c \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = -\frac{\ell c}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_0^c = \\ &= -\frac{\ell c}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi c}{\ell}, \\ I_2 &= \int_c^\ell (\ell - \xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \left\{ \begin{array}{l} u = \ell - \xi, \quad du = -d\xi, \\ dv = \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad v = -\frac{\ell}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \end{array} \right\} = \\ &= -\frac{\ell}{\mu\pi} (\ell - \xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_c^\ell - \frac{\ell}{\mu\pi} \int_c^\ell \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = +\frac{\ell}{\mu\pi} (\ell - c) \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_c^\ell = \\ &= +\frac{\ell(\ell - c)}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi c}{\ell}. \end{aligned}$$

Теперь подставим вычисленные интегралы в правую часть (7.15)

$$\begin{aligned} b_\mu &= \frac{2h}{\ell c} \left(-\frac{\ell c}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} \right) + \frac{2h}{\ell(\ell - c)} \left(\frac{\ell(\ell - c)}{\mu\pi} \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} \right) = \\ &= \frac{2h\ell}{(\mu\pi)^2} \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{\ell - c} \right) \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} = \frac{2h}{(\mu\pi)^2} \frac{\ell^2}{c(\ell - c)} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell}. \end{aligned} \quad (7.16)$$

и окончательно получим

$$u(x) = \frac{2h}{\pi^2} \frac{\ell^2}{c(\ell - c)} \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{1}{\mu^2} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} \sin \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (7.17)$$

Графики частичных сумм ряда *Фурье* (7.17), показанные на рис. 7.4, 7.5, дают представление о разложении функции (7.14) в ряд *Фурье* и о сходимости последнего. ▲




Рис. 7.4. Разложение в ряд Фурье (коричневый цвет) непрерывной кусочно-линейной функции (7.14), продолженной нечётно (синий цвет), $\ell = 1$, $c = 0.5$, $h = 1$: одно (а), три (б) слагаемых ряда (7.17)




Рис. 7.5. Разложение в ряд Фурье (коричневый цвет) непрерывной кусочно-линейной функции (7.14), продолженной нечётно (синий цвет), $\ell = 1$, $c = 0.5$, $h = 1$: 10 (а), 25 (б) слагаемых ряда (7.17)

Пример 7.4. Дана непрерывная кусочно-линейная функция (7.14), разложим её в ряд *Фурье* по косинусам, вначале продолжив её чётным образом на $[-\ell, 0)$, а затем периодически продолжив на \mathbb{R} .

Поскольку заданная функция есть кусочно-линейная, вычисление коэффициентов b_μ по формулам (7.5) сведём к вычислению двух определённых интегралов

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{\ell} \int_0^\ell u(\xi) d\xi = \frac{2}{\ell} \int_0^c \frac{\xi}{c} h d\xi + \frac{2}{\ell} \int_c^\ell \frac{\ell - \xi}{\ell - c} h d\xi = h, \\ a_\mu &= \frac{2}{\ell} \int_0^\ell u(\xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \frac{2}{\ell} \int_0^c \frac{\xi}{c} h \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi + \frac{2}{\ell} \int_c^\ell \frac{\ell - \xi}{\ell - c} h \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \frac{2h}{\ell c} I_1 + \frac{2h}{\ell(\ell - c)} I_2. \end{aligned} \quad (7.18)$$

Каждый из интегралов I_1 и I_2 вычислим по частям:

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^c \xi \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \left\{ \begin{array}{l} u = \xi, \quad du = d\xi, \\ dv = \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad v = \frac{\ell}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \end{array} \right\} = \\ &= \frac{\ell}{\mu\pi} \xi \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_0^c - \frac{\ell}{\mu\pi} \int_0^c \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \frac{\ell c}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_0^c = \\ &= \frac{\ell c}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \left[\cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - 1 \right], \\ I_2 &= \int_c^\ell (\ell - \xi) \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = \left\{ \begin{array}{l} u = \ell - \xi, \quad du = -d\xi, \\ dv = \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi, \quad v = \frac{\ell}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \end{array} \right\} = \\ &= \frac{\ell}{\mu\pi} (\ell - \xi) \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_c^\ell + \frac{\ell}{\mu\pi} \int_c^\ell \sin \frac{\mu\pi\xi}{\ell} d\xi = -\frac{\ell}{\mu\pi} (\ell - c) \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} - \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \cos \frac{\mu\pi\xi}{\ell} \Big|_c^\ell = \\ &= -\frac{\ell(\ell - c)}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \left[(-1)^\mu - \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} \right]. \end{aligned}$$

Теперь подставим вычисленные интегралы в выражение для коэффициентов a_μ (7.18)

$$\begin{aligned} a_\mu &= \frac{2h}{\ell c} \left(\frac{\ell c}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \left[\cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - 1 \right] \right) + \\ &+ \frac{2h}{\ell(\ell - c)} \left(-\frac{\ell(\ell - c)}{\mu\pi} \sin \frac{\mu\pi c}{\ell} + \left(\frac{\ell}{\mu\pi} \right)^2 \left[(-1)^\mu - \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} \right] \right) = \\ &= \frac{2h\ell}{(\mu\pi)^2} \left(\frac{1}{c} + \frac{1}{\ell - c} \right) \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - \frac{2h\ell}{(\mu\pi)^2} \frac{1}{c} - \frac{2h\ell}{(\mu\pi)^2} \frac{(-1)^\mu}{\ell - c} = \frac{2h}{(\mu\pi)^2} \frac{\ell}{c(\ell - c)} \left[\ell \cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - \ell + c - c(-1)^\mu \right] \end{aligned}$$

и запишем искомое разложение

$$u(x) = \frac{h}{2} + \frac{2h}{\pi^2} \frac{\ell^2}{c(\ell - c)} \sum_{\mu=1}^{\infty} \frac{1}{\mu^2} \left[\cos \frac{\mu\pi c}{\ell} - 1 + \frac{c}{\ell} - \frac{c}{\ell} (-1)^\mu \right] \cos \frac{\mu\pi x}{\ell}. \quad (7.19)$$

Графики частичных сумм ряда *Фурье* (7.19), показанные на рис. 7.6, дают представление о разложении функции (7.14) в ряд *Фурье* и о сходимости последнего. ▲




Рис. 7.6. Разложение в ряд Фурье (коричневый цвет) непрерывной кусочно-линейной функции (7.14), продолженной чётно (синий цвет), $\ell = 1$, $c = 0,5$, $h = 1$, количество слагаемых ряда (7.19): 1+0 (а), 1+3 (б), 1+10 (в), 1+25 (г)

7.4. Задачи

Задача 7.1. Разложить в ряд *Фурье* заданную функцию $u(x)$, $|x| \leq 1$:

1) $u(x) = |x|$;

2) $u(x) = |x|^3$;

3) $u(x) = x \cos(\pi x)$;

4) $u(x) = x \sin(\pi x)$;

5) $u(x) = |\sin(\pi x)|$;

6) $u(x) = x e^{-|x|}$.

Задача 7.2. Разложить в ряд *Фурье* по синусам заданную функцию $u(x)$, $x \in [0, 1]$:

1) $u(x) = x$;

2) $u(x) = x^3$;

3) $u(x) = x \cos(\pi x)$;

4) $u(x) = x \sin(\pi x)$;

5) $u(x) = \sin(\pi x)$;

6) $u(x) = x e^{-x}$.

7.5. Пояснения

Список литературы

1. *Агошков В. В., Дубовский П. Б., Шутяев В. П.* Методы решения задач математической физики. — М.: Физматлит, 2002. — 320 с. (*Математика и прикладная математика*)
2. *Александрова Н. В.* История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник. — 2-е изд., перераб. и испр. — М.: УРСС, 2007. — 246 с.
3. *Александрова Н. В.* История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник. — 3-е изд., испр. — М.: Изд-во ЛКИ, 2008. — 248 с.
4. *Арнольд В. И., Козлов В. В., Нейштадт А. И.* Математические аспекты классической и небесной механики // Современные проблемы математики. Фундаментальные направления. Т. 3. — М.: ВИНТИ АН СССР, 1985. — С. 5–304. (*Итоги науки и техники*)
5. *Арнольд В. И.* Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук — первые шаги математического анализа и теории катастроф, от эволюент до квазикристаллов. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1989. — 96 с. (*Современная математика для студентов*)
6. *Арнольд В. И.* Лекции об уравнениях с частными производными. — 2-е изд. — М.: Фазис, 1999. — 181 с.
7. *Бабич В. М., М. Б. Капилевич, С. Г. Михлин* и др. Линейные уравнения математической физики / Под ред. *С. Г. Михлина*. — М.: Наука, 1964. — 368 с. (*Справочная математическая библиотека*)
8. *Баранцев Р. Г.* Лекции по трансзвуковой газодинамике. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1965. — 218 с.
9. *Бицадзе А. В.* Некоторые классы уравнений в частных производных. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1981. — 448 с.
10. *Борисенко А. И., Тарапов И. Е.* Векторный анализ и начала тензорного исчисления. — 5-е изд., — Харьков: Вища школа, 1978. — 216 с.
11. *Будак Б. М., Самарский А. А., Тихонов А. Н.* Сборник задач по математической физике. — 2-е изд., испр. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1972. — 688 с.
12. *Будак Б. М., Фомин С. В.* Кратные интегралы и ряды. — 2-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1967. — 608 с. (*Курс высшей математики и математической физики*; Выпуск 2.)
13. *Владимиров В. С., Ваширин А. А., Каримова Х. Х., Михайлов В. П.* и др. Сборник задач по уравнениям математической физики. — 4-е изд., стереотип. — М.: Физматлит, 2004. — 288 с.
14. *Геронимус Я. Л.* Теоретическая механика (очерки об основных положениях). — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1973. — 512 с.

15. *Годунов С. К.* Уравнения математической физики. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971. — 416 с.
16. *Годунов С. К.* Уравнения математической физики. — 2-е изд., исправл. и дополн. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1979. — 392 с.
17. *Журавлев В. Ф.* Основы теоретической механики. — 2-е изд., перераб. — М.: Изд-во физ.-мат. лит., 2001. — 320 с.
18. *Зорич В. А.* Математический анализ: Учебник: В 2-х ч.: Часть II. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1984. — 640 с.
19. *Ильин В. А., Позняк Э. Г.* Линейная алгебра. — 2-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. — 304 с. (*Курс высшей математики и математической физики*; Выпуск 6.)
20. *Ильин В. А., Позняк Э. Г.* Основы математического анализа. Часть II. — 2-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1980. — 448 с. (*Курс высшей математики и математической физики*; Выпуск 2а.)
21. *Козлов В. В.* Общая теория вихрей. — Ижевск: Изд-во Удмуртского ун-та, 1998. — 238 с.
22. *Колесникова С. И.* Методы решения основных задач уравнений математической физики. — М.: МФТИ, 2015. — 79 с.
23. *Коллатц Л.* Задачи на собственные значения. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1968. — 504 с.
24. *Колоколов И. В., Кузнецов Е. А., Мильштейн А. И., Подивилов Е. В.* и др. Задачи по математическим методам физики. — М.: Эдиториал УРСС, 2000. — 288 с.
25. *Комеч А. И.* Практическое решение уравнений математической физики: Учеб.-метод. пособие. — М.: МГУ, 1993. — 155 с.
26. *Курант Р.* Уравнения с частными производными: Пер. с англ. — М.: Мир, 1962. — 830 с.
27. *Липтеев Г. Ф.* Элементы векторного исчисления. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1975. — 336 с.
28. *Лебедев Н. Н., Скальская И. П.* Сборник задач по математической физике. — М.: ГИТТЛ, 1955. — 420 с.
29. *Максвелл Дж.* О соотношении между физикой и математикой // *Максвелл Дж.* Речи и статьи. — 2-е изд.: Пер. с англ. — М.; Л.: Гос. изд-во техн.-теор. лит., 1940. — С. 9–26. (*Классики естествознания*)
30. *Мандельштам Л. И.* Лекции по теории колебаний. — М.: Наука, 1972. — 470 с.

31. *Мартинсон Л. К., Малов Ю. И.* Дифференциальные уравнения математической физики: Учеб. для вузов. — 2-е изд. / Под ред. *В. С. Зарубина, А. П. Крищенко.* — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. — 368 с. (*Математика в техническом университете*; Вып. XII).
32. *Матвеев А. В.* Дифференциальные уравнения. — М.: Просвещение, 1988. — 256 с.
33. *Матвеев Н. М.* Методы интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений. — 3-е изд., исправл. и дополн. — М.: — М.: Высшая школа, 1967. — 564 с.
34. *Миллер У., мл.* Симметрия и разделение переменных: Пер. с англ. — М.: Мир, 1981. — 342 с.
35. *Михлин С. Г.* Курс математической физики. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1968. — 576 с.
36. *Михлин С. Г.* Линейные уравнения в частных производных. Учебн. пособие для вузов. — М.: Высш. школа, 1977. — 432 с.
37. Некрасов А. И. Курс теоретической механики: В 2-х т. — Т. II. Динамика. — 2-е изд., перераб. — М.: ГИТТЛ, 1953. — 504 с.
38. *Паплаускас А. Б.* Тригонометрические ряды от Эйлера до Лебега. — М.: Наука, 1966. — 276 с.
39. *Петровский И. Г.* Лекции об уравнениях с частными производными. — 3-е изд., дополн. — М.: Физматлит, 1961. — 400 с.
40. *Пикулин В. П., Похожаев С. И.* Практический курс по уравнениям математической физики. — 2-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2004. — 208 с.
41. *Погребысский И. Б.* Лейбниц и классическая механика // У истоков классической науки: сб. статей. / Отв. ред. *А. Н. Боголюбов*, сост. *У. И. Франкфурт.* — М.: Наука, 1968. — С. 123–157.
42. *Положий Г. Н.* Уравнения математической физики. — М.: Высш. школа, 1964. — 560 с.
43. *Рота Дж.-К.* От редактора энциклопедии // *Миллер У., мл.* Симметрия и разделение переменных: Пер. с англ. / *У. Миллер, мл.* — М.: Мир, 1981. — С. 7.
44. *Свешников А. Г., Боголюбов А. Н., Кравцов В. В.* Лекции по математической физике: Учеб. пособие. — М.: Изд-во МГУ, 1993. — 352 с.
45. *Смирнов Н. И.* О развитии идеи корректности краевых задач математической физики // *Историко-математические исследования.* — 1980. — Вып. 25. — С. 129–155.
46. *Смирнов М. М.* Дифференциальные уравнения в частных производных второго порядка. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1964. — 208 с.
47. *Соболев С. Л.* Уравнения математической физики. — 4-е изд. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1966. — 444 с.

48. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — 8-е изд., стереотип. — М.: Гос. изд-во физ.-мат. лит., 1959. — 468 с.
49. *Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г.* Дифференциальные уравнения. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1985. — 232 с. (*Курс высшей математики и математической физики*; Выпуск 7.)
50. *Тихонов А. Н., Самарский А. А.* Уравнения математической физики. — 5-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1977. — 736 с.
51. *Тодхантер И.* История математических теорий притяжения и фигуры Земли от Ньютона до Лапласа: Пер. с англ.: В 2-х т., в одной кн. — М.: Эдиториал УРСС, 2002. — 672 с. (*Классики науки*)
52. *Томсон У., Тэт П.* Трактат по натуральной философии: В 2-х ч.: Ч. II.: Пер. с англ. — М.–Ижевск: НИЦ РХД, Ижевский институт компьютерных исследований, 2011. — 512 с.
53. *Трусделл К.* Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред: Пер. с англ. — М.: Мир, 1975. — 592 с.
54. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3-х т.: Т. I. — 7-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. — 604 с.
55. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3-х т.: Т. II. — 7-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1970. — 800 с.
56. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления: В 3-х т.: Т. III. — 5-е изд. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. — 656 с.
57. *Франк Ф., Мизес Р.* (ред.) Дифференциальные и интегральные уравнения математической физики. Часть 2: Пер. с нем. — М.; Л.: ОНТИ. Гл. ред. общетехн. лит., 1937. — 998 с.
58. *Хайрер Э., Ваннер Г.* Математический анализ в свете его истории: Пер. с англ. — М.: Научный мир, 2008. — 396 с.
59. *Эльсгольц Л. Э.* Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. — 2-е изд., стереотип. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1969. — 424 с. (*Курс высшей математики и математической физики*; Вып. 3)