



UNIVERSITÉ CLERMONT-AUVERGNE IUT D'AURILLAC

Projet pour la SAE 3-03 autour de l'étude de l'évolution du poids

Auteurs :

Valentin EVENO

Viny Presty NAKAVOUA

NSALOUMOUNA

Angélique RIVIÈRE

Professeurs référents :

Paul Marie GROLLEMUND

Chapitre 1

Approches utilisées lors du pré-traitement

1.1 Segment introductif

Dans ce projet on se propose d'étudier des données issues d'un protocole expérimental concernant un régime alimentaire combiné à une thérapie comportementale dans le but de perdre du poids. L'expérience s'est déroulée en deux étapes : une première phase préalable durant quelques jours (avant le régime et la thérapie) pendant laquelle le sujet se pèse plusieurs fois par jour, et une seconde phase de deux semaines pendant laquelle le sujet se pèse qu'une seule fois par jour (toujours durant le régime). Lors de cette seconde phase, on dispose en plus du pourcentage de matière grasse du sujet.

1.2 Pré-traitement du jeu de donnée

Après avoir importé et visualisé une première fois les données, nous avons transcrit les jeux de donnée des deux phases en deux data frame. Nous avons pu remarquer plusieurs problèmes sur les variables qu'il faut résoudre et ajuster lors du pré-traitement.

1.2.1 Variable jour

D'abord pour ce qui est de la variable jour, ces données étaient en format de date français "jour/mois/année". Nous les avons transcrites en format date de Rstudio qui correspond à "année-mois-jour" pour être plus facilement utilisables par le logiciel.

1.2.2 Variable poids

Ensuite, pour la variable poids, on a remarqué qu'il y avait des valeurs manquantes, on a donc choisit de supprimer les jours où il n'y avait pas d'observations. On a considéré qu'estimer ces poids manquants avec des méthodes d'imputation comme celles par la moyenne ou la médiane ne serait pas judicieux.

1.2.3 Variable heure

Enfin pour la variable heure, on avait des chaines de caractère, pour que ces données puissent être traitables, nous les avons mises à un format "H :M" temps de Rstudio. Mais la fonction loess ne prends pas les données sous ce format, on les a alors converties au format décimal pour qu'elles puissent être utilisées.

On a aussi remarqué une donnée aberrante au 20 mai 2020 (index 48), la pesé a été faite à minuit ce qui rendait les graphiques moins cohérents, on l'a alors remplacé par 24.

Chapitre 2

Transformations du jeu de donnée

2.1 Lissage par régression locale : le poids en fonction de l'heure

Après avoir pré-traités les données, nous pouvons désormais les étudier, ainsi dans un premier temps nous allons étudier comment le poids varie en fonction de l'heure de la journée. Nous utilisons la fonction loess qui permet de calculer une régression locale avec ici un lissage à 0,3.




FIGURE 2.1 – représentation d'une régression locale avec un lissage à 0.3

2.2 Calcul de l'évolution du poids sur le temps long en phase 2

Maintenant nous devons calculer l'évolution du poids sur le long temps indépendamment de l'heure, on va utiliser le lissage obtenu précédemment. Par exemple pour la donnée 104.7kg obtenu le 24 mars à 18h50, on cherche la valeur lissée à 18h50 dans le premier jeu de donnée ainsi que la valeur à midi de la série pour enfin obtenir l'écart entre ces deux valeurs.




FIGURE 2.2 – évolution du poids en phase 2 indépendamment de l'heure

2.3 Evolution de la quantité de matière grasse

Pour calculer l'évolution de la quantité de matière grasse lors de cette seconde phase, on doit d'abord convertir le pourcentages de matières grasses en kilogrammes avec une règle de trois.




FIGURE 2.3 – représentation de l'évolution de la quantité de matière grasse en phase 2

On observe sur ce graphique que la quantité de matière grasse subit une augmentation entre la fin du mois de mars jusqu'au 2 avril puis on remarque une baisse assez importante d'environ 5.8246 kilogrammes de matière grasse sur les données observables. La quantité de matière grasse perdue sur le temps long du régime, donc en prenant la première et dernière valeur obtenue, est de 2.4019 kilogrammes en passant de 34.3416 kilos de matière grasse au 24 mars 2021 à 31.9397 kilos le 7 avril, date de fin du régime.

2.4 Prédiction sur la matière grasse perdue

Maintenant nous devons effectuer une prédiction sur le jeu de donnée de la phase 2 pour déterminer combien de matière grasse l'individu aurait perdu si il avait continué son régime 3 jours de plus.

On observe pas de tendance sur ces données, donc on va modéliser notre prédiction en utilisant deux régressions linéaires. On sépare d'abord notre jeu de données en deux échantillons :

- Un premier échantillon du 24 mars au 1 avril.
- Un deuxième échantillon du 2 avril au 7 avril.

Ensuite sur chacun de ces deux échantillons, nous avons appliqué des régressions linéaires, pour la prédiction de perte de la quantité de matière grasse, on va utiliser la régression linéaire effectuée sur l'échantillon 2 puisque c'est la plus récente et donc la plus logique pour déterminer des prévisions à court terme.




FIGURE 2.4 – prédiction de la quantité de matière grasse perdue avec 3 jours de régime en plus

Si la personne aurait poursuivi le régime pour 3 jours de plus, selon notre prédiction, elle aurait perdu environ 4.218229 kilogrammes contre seulement 2.4019 kilos qu'elle a perdu en mettant un terme à son régime le 7 avril.