NUTRITION ET SEDENTARITE AU TRAVAIL

Résultats du questionnaire diagnostic

Ferme du Moulon - Juillet 2026

Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.

Vos réponses permettent de mieux comprendre les habitudes, les besoins et les attentes autour de l'alimentation, de l'hydratation, de l'activité physique et de la sédentarité au travail.

Ce document présente les principaux résultats, ainsi que des repères pratiques adaptés au quotidien professionnel.

SOMMAIRE

ALIMENTATION ET PAUSE DÉJEUNER

Petit-déjeuner 2

Sources d'approvisionnement 3

Déjeuner devant l'ordinateur 5

Gestion de la pause déjeuner 6

Somnolence après le déjeuner 8

L'alimentation entre les repas 9

HYDRATATION

Hydratation au travail 11

Boissons sucrées 12

Lecture croisée : eau et boissons sucrées 13

QUALITÉ ET CADRE DES REPAS

Équilibre nutritionnel des déjeuners 14

Perception et profil alimentaire 16

Environnement du repas 17

ACTIVITÉ PHYSIQUE

Activité physique et sédentarité 19

Lecture croisée : activité et sédentarité 20

REPERES ET BESOINS

Outils et repères nutritionnels 21

Freins et besoins 23

BILAN ET MÉTHODOLOGIE


Les principaux enseignements 25

Méthodologie 26

Petit-déjeuner

Constat

Fréquence de prise d'un petit-déjeuner



Un peu plus de la moitié des répondants prennent **régulièrement** un petit-déjeuner, mais les pratiques restent **variables**.

Enjeu

Après le jeûne nocturne, le petit-déjeuner peut contribuer à répartir les apports énergétiques et nutritionnels sur la journée. Lorsqu'il est consommé, sa composition influence notamment la réponse glycémique et la satiété.

Pourquoi sa composition est importante ?

Un petit-déjeuner riche en **aliments à indice glycémique élevé** et pauvre en fibres peut provoquer une hausse rapide de la glycémie, suivie d'une baisse plus marquée. Cela peut favoriser un **retour plus précoce de la faim**, une baisse d'énergie et l'envie de grignoter. À l'inverse, les **fibres**, associées à des protéines ou de bonnes matières grasses, ralentissent l'absorption des glucides et favorisent une **énergie plus progressive et une meilleure satiété**.


Recommandations

Composant	Rôle	À privilégier	À limiter
Hydratation	Réhydrater	Eau, thé, café ou infusion non sucrés	Jus de fruits, boissons sucrées
Protéines / oléagineux	Contribuer à la satiété	Œuf, fromage blanc, yaourt nature, fruits à coque non salés	Pâtes à tartiner très sucrées, produits très transformés
Féculents riches en fibres	Apporter de l'énergie et des fibres	Pain complet ou au levain, flocons d'avoine, muesli peu sucré	Pain blanc, céréales très sucrées, viennoiseries
Fruits	Apporter fibres, vitamines et eau	Fruits frais entiers	Confitures très sucrées, jus de fruits

Pas faim le matin ?
Il n'est pas nécessaire de se forcer. En cas de faim plus tard dans la matinée, une collation simple peut être prévue et emportée au travail.

Sources d’approvisionnement

Constat



Question à choix multiples

> Le **supermarché** domine nettement les modes d’approvisionnement. Le repas apporté de **chez soi** reste également fréquent, tandis que les autres solutions sont plus ponctuelles ou marginales.

Enjeu

Quel que soit le lieu d’approvisionnement, la qualité nutritionnelle dépend surtout de la composition du repas. L’enjeu est donc de disposer de repères simples pour faire des choix équilibrés, même lorsque l’offre disponible est plus riche en sel, sucres ou graisses saturées.

Recommandations

Supermarché

Point d'attention : qualité très variable. Certains plats préparés et sandwichs peuvent être riches en sel, en matières grasses ou pauvres en légumes et en fibres.

À privilégier : aliments bruts ou peu transformés, salades simples, conserves de poisson ou légumineuses, fruit, pain complet ; comparer le Nutri-Score entre produits similaires.

Repas fait maison

Point d'attention : il facilite le choix des ingrédients et la composition du repas, sans garantir à lui seul l'équilibre.

À privilégier : prévoir légumes, source de protéines et féculent ; adapter les quantités à l'appétit.

Boulangerie

Point d'attention : la formule sandwich + boisson sucrée + pâtisserie peut cumuler peu de légumes et beaucoup de produits raffinés ou sucrés.

À privilégier : pain complet/aux graines, garniture avec légumes et protéines, eau, fruit ou produit laitier nature.

Restaurant

Point d'attention : la qualité est variable selon les plats, les sauces, les portions et les accompagnements.

À privilégier : une assiette avec légumes, féculent et source de protéines, de l'eau, et des portions adaptées à l'appétit.

Restauration rapide

Point d'attention : les menus classiques sont souvent plus denses en énergie, en sel et en graisses saturées, et moins riches en fibres.

À privilégier : garder cette option occasionnelle, choisir l'eau, ajouter légumes ou fruit, et adapter les portions.

Livraison / retour à domicile


Point d'attention : ces modes d'approvisionnement ne déterminent pas à eux seuls la qualité du déjeuner.

À privilégier : appliquer les mêmes repères de composition et conserver, lorsque possible, un temps de pause suffisant et un peu de mouvement.

Déjeuner devant l'ordinateur

Constat

Fréquence de déjeuner devant l'ordinateur



Bilan positif : près de 3 répondants sur 4 ne déjeunent jamais devant leur ordinateur. Les 28 % restants le font seulement occasionnellement, et aucun répondant ne déclare déjeuner systématiquement devant son écran.

Enjeu

Préserver une vraie pause déjeuner, à la fois alimentaire et mentale : manger sans forte distraction aide à mieux percevoir ses sensations de faim et de rassasiement, tandis que s'éloigner du poste de travail favorise la récupération avant la reprise.

Pourquoi éviter les écrans pendant le repas ?

Mémoire du repas : une forte distraction peut diminuer **l'attention portée à la prise alimentaire** et favoriser une consommation plus importante ultérieurement.

Signaux de rassasiement : les signaux sensoriels et physiologiques se construisent progressivement pendant le repas ; la distraction peut en **réduire la perception**.

Récupération mentale : s'éloigner temporairement des tâches professionnelles favorise le **détachement psychologique** et la **récupération cognitive.**

Recommandations

Toujours devant l'écran	Parfois	Jamais
Le repas reste lié au travail.	Pratique ponctuelle acceptable.	Une vraie coupure avec le travail.
À privilégier : s'éloigner du poste dès que possible.	**À retenir :** éviter qu'elle devienne une habitude.	**À maintenir :** préserver ce temps de récupération.

Gestion de la pause déjeuner

Constat

Durée totale de la pause	Temps consacré au repas		
	< 15 min	15–30 min	> 30 min
30 min à 1 h	0 %	20 % **TEMPS COMPTÉ** Repas correct, mais peu de marge pour souffler ou faire autre chose.	4 % **REPAS PRÉSERVÉ** Temps de repas maintenu malgré une pause plus courte
Plus de 1 h	12 % **REPAS EXPRESS** Pause longue, mais repas pris très rapidement.	44 % **LE COMPROMIS** Bon équilibre entre temps de repas et temps pour déconnecter.	20 % **PAUSE DÉTENTE** Repas sans précipitation et temps disponible pour récupérer.

Répartition des répondants selon la durée totale de la pause et le temps consacré au repas

> La pause déjeuner est globalement confortable : **76 % disposent de plus d'une heure**. Pourtant, le temps consacré au repas reste souvent plus court : **56 % ont une pause de plus d'une heure mais mangent en moins de 30 minutes**. Le profil le plus fréquent est ainsi **« le compromis » (44 %)**, associant une longue pause à un repas de 15 à 30 minutes.

Enjeu

Préserver suffisamment de temps pour manger à son rythme et faire de la pause déjeuner un véritable temps de repas, de récupération et de convivialité.

Bénéfices d'une vraie pause déjeuner :

Digestion : bien mastiquer fragmente les aliments et **facilite le travail digestif.**

Rassasiement : les signaux sensoriels et digestifs apparaissent progressivement au cours du repas. **Manger très rapidement peut rendre leur perception plus difficile.**

Récupération mentale : s'éloigner temporairement du travail **réduit les sollicitations cognitives** et favorise une meilleure récupération avant la reprise.

Dimension sociale : la pause déjeuner peut aussi être un **moment d'échange et de convivialité** entre collègues.

Recommandations

Repas express

Éviter de manger au plus vite alors que du temps reste disponible.

Temps compté

Préserver le temps consacré au repas et profiter des quelques minutes restantes pour souffler ou s'éloigner du travail.

Le compromis

Maintenir cette organisation qui permet de prendre le temps de manger tout en conservant une marge pour déconnecter.

Pause préservée

Continuer à prendre le temps de manger à son rythme, même lorsque la pause globale est plus courte.

Pause détente

Profiter de ce temps confortable pour manger sans précipitation et conserver un moment de détente, d'échange ou de mouvement avant la reprise.

Somnolence après le déjeuner

Constat

Fréquence de la somnolence après le déjeuner



La somnolence après le déjeuner est fréquente : 84 % des répondants la ressentent au moins occasionnellement, dont 16 % systématiquement. À l'inverse, 16 % déclarent ne jamais la ressentir.

Enjeu

Limiter le coup de fatigue après le déjeuner afin de préserver le confort, l'attention et la concentration au cours de l'après-midi. Cette somnolence est multifactorielle : le rythme biologique joue un rôle important et le repas peut moduler son intensité.

> **Pourquoi ?**
>
> **Rythme biologique :** une **baisse naturelle de la vigilance** peut survenir en début d'après-midi. Elle est liée au **rythme circadien** et peut apparaître même indépendamment du repas.
>
> **Effet du repas :** la digestion s'accompagne de **réponses digestives, hormonales et métaboliques.** La **quantité, la composition et la nature du repas** peuvent ainsi moduler la sensation de somnolence, avec des effets variables selon les individus.
>
> **Un phénomène multifactoriel :** le coup de fatigue ne s'explique donc pas simplement par un **« pic de sucre ».** Le **rythme biologique, le sommeil de la nuit précédente, le repas et les caractéristiques individuelles** peuvent intervenir ensemble.

Recommandations

Quelques réflexes simples pour limiter la fatigue après le déjeuner.

Éviter les repas trop copieux

Adapter les portions à son appétit et limiter l'accumulation de plats très riches.

Composer une assiette équilibrée

Associer légumes, protéines et féculents, de préférence complets ou des légumes secs.

Choisir l'eau en priorité


Limiter les boissons sucrées et les aliments très gras, très sucrés ou très transformés.

Bouger après le repas


Marcher quelques minutes, prendre l'air ou simplement s'éloigner du poste de travail.

L’alimentation entre les repas

Constat



> Manger entre les repas est une pratique **généralisée** : 100 % des répondants déclarent le faire au moins occasionnellement, dont 36 % systématiquement au cours de leur journée de travail.



Question à choix multiples - 25 répondants, 59 choix exprimés

> Les choix sont **contrastés** : des aliments intéressants sont déjà présents (fruits frais), mais ils coexistent avec une consommation fréquente de produits sucrés.

Enjeu

Manger entre les repas n'est pas nécessairement un problème. L'enjeu est surtout de distinguer une collation répondant à une vraie faim d'un grignotage automatique lié à l'habitude, au stress, à l'ennui ou à la fatigue.

	Collation structurée	Grignotage automatique
Déclencheur	Faim réelle, souvent après un intervalle long entre deux repas.	Stress, ennui, fatigue, habitude ou envie réflexe.
Comportement	Prise choisie, portion définie, quelques minutes de vraie pause.	Prise répétée, peu consciente, souvent devant un écran.
Choix fréquents	Fruit frais, oléagineux non salés, produit laitier nature.	Biscuits, confiseries, viennoiseries ou autres produits très sucrés/salés.

> **Pourquoi le choix de l'encas compte ?**
> Les **produits très sucrés** consommés seuls apportent rapidement des glucides mais sont souvent **peu rassasiants.** À l'inverse, les **fibres des fruits** et l'apport en **protéines ou en matières grasses** des oléagineux et produits laitiers peuvent contribuer à une **satiété plus durable.**

Recommandations

Une collation n'est pas obligatoire : en l'absence de faim, il n'est pas nécessaire de manger entre les repas. Lorsqu'une faim apparaît, quelques réflexes simples permettent d'éviter le grignotage automatique.

1. Identifier le déclencheur

Distinguer une **vraie faim** d'une envie liée à la fatigue, au stress, à l'ennui ou à l'habitude.

2. Composer simplement

Associer si possible **un fruit** à des **oléagineux** ou **produit laitier nature.**

3. Anticiper la pause

Prévoir une portion et, si possible, **manger loin de l'écran.**

Exemples de collations simples


Faim modérée	1 fruit frais + 1 petite poignée d'amandes/noix non salées
Besoin plus rassasiant	Yaourt nature ou fromage blanc + quelques flocons d'avoine
Envie de sucré	1 fruit frais + 1 à 2 carrés de chocolat noir

> L'objectif n'est pas de s'interdire de manger entre les repas, mais de passer d'une prise réflexe à une collation choisie lorsqu'une vraie faim est présente.

Hydratation au travail

Constat

Quantité d'eau déclarée pendant la journée de travail



La consommation d'eau au travail est bien installée : **88 % des répondants déclarent boire au moins 500 mL** pendant leur journée de travail, dont **44 % plus de 1 L. Seuls 12 % déclarent boire moins de 500 mL.**

Enjeu

Une hydratation adaptée contribue au bon fonctionnement de l'organisme. Un manque d'eau peut notamment s'accompagner de fatigue, de maux de tête ou d'une diminution de certaines performances d'attention, avec un impact possible sur le confort au travail.

Pourquoi ?

L'eau intervient dans le **maintien du volume sanguin**, la **thermorégulation** et de nombreux **échanges cellulaires**. Les besoins varient selon **la température, l'activité physique, l'alimentation et les caractéristiques individuelles.**

Recommandations

Eau en priorité

Faire de l'eau la boisson principale.

Gourde visible

La garder à portée de main.

Boire régulièrement


Répartir les prises dans la journée.

Adapter si besoin

Boire davantage s'il fait chaud ou en cas d'activité physique.

Boissons sucrées

Constat



> La majorité des répondants **(56 %) déclare ne jamais consommer** de boissons sucrées au travail. Néanmoins, **44 % en consomment au moins parfois**, dont 16 % systématiquement**.**

Enjeu

Une consommation régulière de boissons sucrées augmente les **apports en sucres libres** et est associée, à long terme, à un risque accru de **caries, prise de poids et diabète de type 2**.

Pourquoi ?

Les bactéries buccales utilisent les sucres pour produire des acides qui déminéralisent l'émail des dents, favorisant les **caries**. Les boissons sucrées apportent des **calories peu rassasiantes**, qui peuvent s'ajouter aux apports alimentaires habituels. Si ces apports dépassent régulièrement les besoins énergétiques, l'excédent est notamment stocké sous forme de graisse, favorisant la **prise de poids**. À long terme, cette accumulation de graisse peut contribuer à une **insulinorésistance** (diminution de l'efficacité de l'insuline), augmentant le risque de **diabète de type 2**.


Recommandations

AU QUOTIDIEN	POUR VARIER	À LIMITER
Eau plate ou gazeuse comme boisson principale.	Thé, café ou infusion non sucrés, eau gazeuse ou aromatisée maison.	Sodas, sirops et autres boissons sucrées ; préférer un fruit entier au jus.

.

Lecture croisée : consommation d’eau et boissons sucrées

Constat



Lecture croisée

> Le croisement des réponses fait apparaître une **association nette dans cet échantillon** : **64 % des personnes buvant 1 L d’eau ou moins** consomment des boissons sucrées au moins occasionnellement, contre **18 % chez celles buvant plus de 1 L**.
> **À retenir :** la proportion de consommateurs de boissons sucrées est environ **3,5 fois plus élevée** dans le groupe buvant 1 L d’eau ou moins.
> *Ce résultat met en évidence une association entre les deux comportements, mais ne permet pas d’établir un lien de cause à effet.*


des réponses - 25 répondants (≤ 1 L : n = 14 ; > 1 L : n = 11)

Enjeu

La qualité de l’hydratation dépend non seulement de la quantité bue, mais aussi du **type de boissons consommées**. Les boissons sucrées augmentent les **apports en sucres libres** et ne doivent pas remplacer l’eau comme boisson habituelle, celle-ci restant la boisson de référence.

Équilibre et qualité nutritionnelle des déjeuners au travail

Constat



Fréquence de présence des principales composantes du déjeuner - 25 répondants

> Les bases du déjeuner sont **bien présentes**, mais les fruits et légumes sont **moins systématiquement consommés (52 %)** que les protéines **(88 %)** et les féculents **(76 %)**. Les desserts sucrés et les produits ultra-transformés sont **principalement consommés de façon occasionnelle**.

Profils alimentaires

Les profils alimentaires reposent sur trois composantes du déjeuner : fruit/légume, source de protéines et féculent.

28 % - Équilibré

Les **3 bases sont toujours présentes**, tandis que les desserts sucrés et les produits ultra-transformés ne sont pas systématiques.

64 % - Intermédiaire

Tous les critères du profil « équilibré » ne sont pas remplis, **sans cumul des critères du profil déséquilibré**.

8 % - Déséquilibré

Au moins 1 des 3 bases est irrégulière, avec **dessert sucré toujours** et **produit ultra-transformé au moins parfois**.

Ces profils ont été créés spécifiquement pour analyser les réponses à ce questionnaire. Ils décrivent l'échantillon et ne constituent pas un score nutritionnel ou médical validé.

Enjeu

Le déjeuner contribue à répartir les apports énergétiques et nutritionnels sur la journée. Associer régulièrement fruits et/ou légumes, une source de protéines et des féculents permet de diversifier les apports en **fibres, vitamines, minéraux, protéines et énergie**. À l'inverse, une consommation fréquente de produits très sucrés ou ultra-transformés peut augmenter les apports en **sucres, sel et graisses saturées**, au détriment de la qualité nutritionnelle globale du repas. **L'objectif est de privilégier un déjeuner varié et équilibré dans la durée, sans rechercher la perfection à chaque repas.**

Pourquoi ?

La composition du repas influence la **réponse digestive et métabolique**. Les fibres ralentissent l'absorption des glucides et favorisent une élévation plus progressive de la glycémie, tandis que les protéines participent au rassasiement. Cette réponse dépend aussi de **l'association des aliments, de leur degré de transformation et des quantités consommées**, ce qui peut influencer la satiété et le retour de la faim au cours de la journée.

Recommandations

À garder occasionnel

Produits très sucrés ou très transformés

Choisir simple et peu transformé


Favoriser les aliments bruts ou peu transformés et comparer les produits similaires.

Composer une assiette complète

Fruit et/ou légume + source de protéines + féculent.

Lecture croisée : perception et profil calculé

Constat



Croisement entre qualité perçue et profil calculé - 25 répondants

32 % – Sous-estimation

Se juge **moins équilibré** que ne l'indique le profil calculé.

Parmi les personnes qui se sous-estiment, **75 % ont pourtant un profil équilibré.**

48 % – Concordance

La perception **correspond au profil calculé.**

Près d'un répondant sur deux évalue son déjeuner de manière cohérente avec le profil calculé.

20 % – Surestimation


Se juge **plus équilibré** que ne l'indique le profil calculé.

Elle concerne uniquement des **profils intermédiaires ou déséquilibrés.**

Globalement, **la perception est plutôt cohérente avec le profil calculé**. Lorsqu'il existe un écart, **la sous-estimation est plus fréquente que la surestimation.**

Environnement du repas

Constat



25 répondants ; question à choix multiples

Le cadre est globalement fonctionnel, avec un micro-ondes utilisé par **80 %** des répondants, une salle de pause par **72 %** et un réfrigérateur par **52 %**. **Malgré ces équipements, 56 % estiment que des ajustements faciliteraient une alimentation équilibrée au travail.**

Améliorations attendues

Offre de restauration

Cantine/cafétéria, plats préparés ou service de repas sur place.

Espace et équipements

Cuisson, réfrigération, vaisselle, rangement et entretien.

56 %
souhaitent des ajustements

Accès à des choix simples

Accès plus facile à l'eau et aux fruits.

Aide à l'organisation

Idées de repas, recettes rapides et repères pour les collations.

Enjeu

L'environnement alimentaire influence directement les choix du quotidien. Un espace fonctionnel, des équipements adaptés et un accès facile à des options favorables à l'équilibre alimentaire peuvent réduire les contraintes pratiques et faciliter l'adoption de bonnes habitudes au travail.

Recommandations

Trois leviers peuvent être privilégiés pour rendre l'environnement de repas plus favorable au quotidien :

Optimiser l'espace repas

Prioriser les besoins exprimés en réfrigération, vaisselle, rangement et entretien afin de conserver un espace fonctionnel et agréable.

Faciliter l'accès à une offre adaptée

Tester une solution réaliste pour l'entreprise : partenariat local, commande groupée, repas partagés ou davantage d'options végétariennes.

Rendre les choix simples au quotidien

Faciliter l'accès à l'eau et aux fruits et proposer quelques idées de repas rapides, faciles à préparer ou à emporter.

Quelques pistes citées


Fruits frais	Fruits ou collations simples à disposition.
Espace repas	Améliorer le rangement, la vaisselle et l'entretien.
Repas collectifs	Solution de plats cuisinés à commander

Ces pistes complètent les attentes exprimées sur l'offre de restauration, les équipements et l'organisation du repas.

Activité physique et sédentarité

Constat

Temps passé assis au travail




SÉDENTARITÉ

84 %

des répondants passent **plus de 3 h assis** au cours de leur journée de travail.

Dont **44 %** passent **plus de 6 h** assis.

Fréquence d'activité physique



ACTIVITE PHYSIQUE

68 %


des répondants pratiquent une activité physique moins de 4 fois par semaine.

Dont **16 %** déclarent **ne jamais** en pratiquer.

Lecture croisée

Constat

Profils combinant activité physique et sédentarité



À risque - 28 %

Sédentarité élevée et activité physique insuffisante. Profil nécessitant une vigilance particulière.

Intermédiaire - 64 %

Situation globalement correcte, avec une marge de progression sur l'un ou les deux leviers.

Optimal - 8 %

Équilibre favorable entre activité physique et temps assis. Profil le plus protecteur.

Ces profils sont indicatifs : ils décrivent une tendance dans l'échantillon, mais ne permettent pas à eux seuls d'évaluer précisément l'atteinte des recommandations d'activité physique.

Enjeu

L'activité physique et la sédentarité sont **deux déterminants distincts et complémentaires de la santé**. L'activité physique contribue à préserver la santé cardiovasculaire, musculaire et métabolique, tandis qu'un temps assis prolongé est associé à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. **Il est donc possible d'être actif tout en restant très sédentaire** si une grande partie de la journée est passée assis.

Pourquoi ?

Lors d'une position assise prolongée, les muscles sont peu sollicités et la dépense énergétique diminue. Les recommandations françaises invitent à **limiter le temps assis, à marcher ou s'étirer après environ 2 heures consécutives**, et à viser progressivement **au moins 30 minutes d'activité physique dynamique par jour.**

Recommandations

ROMPRE
LE TEMPS ASSIS

Se lever ou marcher quelques minutes au moins toutes les 2 h.

BOUGER
CHAQUE JOUR

Viser progressivement 30 min d'activité physique dynamique par jour.


SAISIR
LES OCCASIONS

Escaliers, marche après le déjeuner, appels debout et déplacements à pied.

Outils et repères nutritionnels

Constat

Des repères inégalement connus



> **Le Nutri-Score est bien identifié (84 %),** alors que le **Programme national nutrition santé (PNNS) l'est beaucoup moins : 16 % le connaissent** et **16 % en ont entendu parler.** Le PNNS rassemble les recommandations publiques françaises sur **l'alimentation, l'activité physique et la sédentarité.**


Un outil connu, mais pas encore un réflexe



Utilisation du Nutri-Score parmi les salariés qui le connaissent (n = 21)

> Même lorsqu'il est connu, le **Nutri-Score n'est pas un réflexe systématique : 86 % des salariés qui le connaissent ne l'utilisent pas toujours** lors de leurs achats.

Perception de ses connaissances en nutrition



Auto-évaluation des connaissances en nutrition – 25 répondants

> **60 % se situent dans la partie haute de l'échelle** (scores 3 ou 4), contre **40 % aux niveaux 1 ou 2.**

Lecture croisée

Les connaissances perçues suivent la familiarité avec le PNNS

Connaissances jugées insuffisantes Scores 1–2	Connaissances jugées plutôt suffisantes Scores 3–4
0 % sont familiers du PNNS	**53 %** sont familiers du PNNS

« Familier du PNNS » = connaît le PNNS ou en a déjà entendu parler.

La familiarité avec le PNNS est **plus fréquente chez les salariés qui jugent leurs connaissances nutritionnelles plutôt suffisantes.**

Mais se sentir mieux informé ne signifie pas forcément mieux manger

30 % **ont un profil alimentaire équilibré** parmi les scores 1–2	**27 %** **ont un profil alimentaire équilibré** parmi les scores 3–4

Dans cet échantillon, le niveau de connaissances déclaré est peu associé au profil alimentaire observé.

Mieux connaître les repères peut aider, mais **l'information seule ne suffit pas toujours à modifier les pratiques alimentaires.**

Enjeu

Des repères nutritionnels fiables permettent de mieux orienter les choix alimentaires, mais leur connaissance ne garantit pas leur mise en pratique. L'enjeu est donc de rendre ces repères simples, concrets et facilement mobilisables au quotidien.

Recommandations


Comparer
Utiliser le Nutri-Score entre des produits similaires pour guider ses choix.

Se repérer
S'appuyer sur les recommandations du PNNS pour construire l'équilibre alimentaire dans son ensemble.

Passer à la pratique
Retenir quelques repères simples et applicables au quotidien, plutôt que chercher à tout modifier en même temps.


Freins et besoins

Constat



Question à choix multiples, 25 répondants

Les difficultés rencontrées sont avant tout **pratiques et organisationnelles** : **le manque de temps, l'offre alimentaire autour de l'entreprise, l'organisation et le manque d'idées de repas** sont les freins les plus cités.



Question à choix multiples, 25 répondants

Les attentes portent surtout sur des solutions concrètes et directement applicables, notamment autour de **la composition des repas, de l'énergie au quotidien et du lien avec l'activité physique**.

88 %	se disent **intéressés ou potentiellement intéressés** par une action autour de la nutrition.

Enjeu

Les **contraintes** du quotidien peuvent rendre **plus difficile** la mise en pratique de **bonnes habitudes alimentaires**. Les **identifier** permet de trouver des **solutions** plus simples et **plus adaptées au rythme de travail**.

Recommandations

Prévoir une solution de secours

Garder sous la main une option simple pour les journées où le temps manque : repas préparé, conserve, pain complet, fruit, produit laitier...

Avoir quelques repas « réflexes »

Retenir 3 ou 4 associations faciles à reproduire permet de gagner du temps et d'éviter le manque d'idées.

Repérer les options pratiques autour du travail

Identifier à l'avance quelques choix satisfaisants au supermarché ou à proximité facilite les décisions quand la pause est courte.

Les principaux enseignements

Vos réponses font ressortir des habitudes déjà favorables et plusieurs leviers concrets pour faciliter, au quotidien, une alimentation équilibrée et un mode de vie plus actif au travail.

Points d'appui

Une vraie coupure au déjeuner

72 % ne déjeunent jamais devant leur ordinateur.

Une pause déjeuner longue

76 % disposent de plus d'une heure de pause déjeuner.

Des bases de déjeuner solides

88 % consomment systématiquement une source de protéines et 76 % des féculents au déjeuner.

Priorités à travailler

Fruits et légumes à renforcer

48 % n'en consomment pas systématiquement au déjeuner.

Temps assis

44 % passent plus de 6 h assis au travail.

Activité physique à encourager

68 % pratiquent une activité physique moins de 4 fois par semaine.

Organisation des repas

72 % citent le manque de temps.

Composition des collations

84 % citent biscuits, viennoiseries ou confiseries.

Agir sur l'environnement

56 % pensent que des ajustements du cadre faciliteraient une alimentation équilibrée.

Répondre aux besoins exprimés

Les thèmes les plus attendus sont le repas équilibré, le lien nutrition & activité physique et la concentration.

Orientations pour la suite

Le diagnostic ne montre pas seulement un besoin d'information. Les actions les plus utiles pourront combiner des repères nutritionnels simples, des outils pratiques et, lorsque c'est possible, un environnement de travail qui facilite les bons choix.

Méthodologie

Participation : 25 répondants

Données déclaratives : les réponses reflètent les pratiques et perceptions déclarées, sans mesure objective des consommations ou de l'activité physique.

Petit effectif : les croisements sont descriptifs et exploratoires ; ils ne permettent pas de généraliser les résultats ni d'établir des relations de cause à effet.

Hydratation : la quantité d'eau a été recueillie uniquement pendant la journée de travail, sans durée précise de présence ni apports hors travail.

Profils calculés : les profils alimentaires et activité/sédentarité ont été créés pour ce diagnostic ; ils ne sont pas des scores médicaux validés.

Sources

1. Santé publique France - Recommandations pour les adultes : alimentation, activité physique et sédentarité

2. Manger Bouger - Les recommandations alimentaires pour les adultes

3. Manger Bouger - Réduire les boissons sucrées et les aliments ultra-transformés

4. Manger Bouger - Augmenter l'activité physique

5. Manger Bouger - Réduire le temps passé assis

6. Anses (2016) - Relations aliments-santé : boissons sucrées, poids et diabète de type 2.

7. OMS (2025) - Sucres et caries dentaires.

8. Assurance Maladie - Indice glycémique des aliments et équilibre alimentaire.

9. Inserm - Chronobiologie : rythmes circadiens et vigilance.

10. Anses (2024) - Impacts sur la santé des aliments dits ultratransformés.

11. INRS - Travail sur écran : pauses actives et prévention des risques.

12. Manger Bouger - Rythme des repas et choix des collations.