

高数 A 第 3 次作业

2025 年 9 月 25 日

9.23 日作业

习题 1.4:5

给出

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty \text{ 及 } \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

的严格定义。

解:

- $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ 的定义: 对于任意给定的正数 M , 都存在一个对应的正数 δ , 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时, 就有 $f(x) > M$ 。
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 的定义: 对于任意给定的负数 N , 都存在一个对应的负数 M , 当 $x < M$ 时, 就有 $f(x) < N$ 。

习题 1.5:4 适当选取 a , 使下列函数处处连续

$$(1) f(x) = \begin{cases} \sqrt{1+x^2}, & x < 0, \\ a+x, & x \geq 0; \end{cases}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 1, \\ a \cos(\pi x), & x < 1. \end{cases}$$

解: 对于 (1), 由连续性的定义, 需满足

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0).$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \sqrt{1+0^2} = 1, \quad f(0) = a+0 = a,$$

所以 $a = 1$ 时, 函数处处连续。

对于 (2), 同样由连续性的定义, 需满足

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1).$$

注意到

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = a \cos(\pi \cdot 1) = -a, \quad f(1) = \ln(1+1) = \ln 2,$$

所以 $a = -\ln 2$ 时, 函数处处连续。

习题 1.5:5 利用初等函数的连续性定理 3 求下列极限

• (2) $\lim_{x \rightarrow 2} x^{\sqrt{x}}$

解:

$$\lim_{x \rightarrow 2} x^{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 2} e^{\sqrt{x} \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 2} \sqrt{x} \ln x} = e^{\sqrt{2} \ln 2} = 2^{\sqrt{2}}.$$

• (5) $\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-2})|x|}$

解:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{(\sqrt{x^2+1} - \sqrt{x^2-2})|x|} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{3|x|}{\sqrt{x^2+1} + \sqrt{x^2-2}}} \\ &= \sqrt{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}} + \sqrt{1-\frac{2}{x^2}}}} = \sqrt{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}. \end{aligned}$$

习题 1.5 :7 指出下列函数的间断点及其类型, 若是可去间断点, 请去掉间断性

• (1) $f(x) = \cos(\pi(x - [x]))$

解: 第一类不可去间断点, 间断点为 $x \in \mathbb{Z}$ 。

• (2) $f(x) = \operatorname{sgn}(\sin x)$

解: 第一类不可去间断点, 间断点为 $x = n\pi$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 。

例 3

设函数 $f(x)$ 在区间 (a, b) 上连续。若 $f(x)$ 在 (a, b) 上是一一映射, 即

$$x \neq x' \implies f(x) \neq f(x'),$$

则 $f(x)$ 在 (a, b) 上是严格单调的。

证明. 反证法。假设 $f(x)$ 在 (a, b) 上不严格单调, 则存在 $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$, 使得 $x_1 < x_2 < x_3$ 且

$$f(x_1) \leq f(x_2), \quad f(x_2) \geq f(x_3).$$

或

$$f(x_1) \geq f(x_2), \quad f(x_2) \leq f(x_3).$$

不妨假设是前者, 取 y 使得 $\max\{f(x_1), f(x_3)\} < y < f(x_2)$, 则由介值定理, 存在 $c_1 \in (x_1, x_2), c_2 \in (x_2, x_3)$, 使得 $f(c_1) = y = f(c_2) \geq \max\{f(x_1), f(x_3)\}$

我们发现, 这与 $f(x)$ 在 (a, b) 上是一一映射矛盾, 因此 $f(x)$ 在 (a, b) 上是严格单调的。□

习题 1.6:1

证明: 任意一个奇数次实数系多项式至少有一个实根

证明. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$, 其中 n 为奇数, $a_n \neq 0$ 。

$f(x)$ 可化为:

$$f(x) = x^n \left(a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \frac{a_{n-2}}{x^2} + \cdots + \frac{a_1}{x^{n-1}} + \frac{a_0}{x^n} \right).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$ 。由介值定理, 存在 $c \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f(c) = 0$ 。因此, 任意一个奇数次实数系多项式至少有一个实根。□

习题 1.6:2

设 $0 < \epsilon < 1$, 证明: 对于任意一个实数 y_0 , 方程

$$y_0 = x - \epsilon \sin x$$

有解, 并且解是唯一的。

证明. 定义函数 $f(x) = x - \epsilon \sin x$, 显然 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \rightarrow +\infty$; 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $f(x) \rightarrow -\infty$ 。由介值定理, 存在 $c \in (-\infty, +\infty)$ 使得 $f(c) = y_0$, 即方程 $y_0 = x - \epsilon \sin x$ 有解。

下证解的唯一性，等价于证明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是一一映射。
我们任取 $x_1, x_2 \in (-\infty, +\infty)$ ，且 $x_1 \neq x_2$ ，不妨设 $x_1 < x_2$ ，则

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1) - \epsilon(\sin x_2 - \sin x_1).$$

由于 $\epsilon \in (0, 1)$ ，所以 $|\sin x_2 - \sin x_1| \leq |x_2 - x_1|$ ，因此

$$f(x_2) - f(x_1) \geq (x_2 - x_1) - \epsilon|x_2 - x_1| = (1 - \epsilon)(x_2 - x_1) > 0.$$

这说明 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上是严格单调的，因此解是唯一的。

□

1 9.25 日作业

习题 2.1:6

离地球中心 r 处的重力加速度 g 是 r 的函数, 其表达式为

$$g(r) = \begin{cases} \frac{GM}{R^3} r, & r < R, \\ \frac{GM}{r^2}, & r \geq R, \end{cases}$$

其中 R 是地球半径, M 是地球质量, G 为万有引力常数。

- (1) 问: $g(r)$ 在 $r = R$ 处连续吗?


解: $g(R) = \frac{GM}{R^2}$, 计算左极限和右极限:

$$\lim_{r \rightarrow R^-} g(r) = \frac{GM}{R^3} R = \frac{GM}{R^2},$$

$$\lim_{r \rightarrow R^+} g(r) = \frac{GM}{R^2}.$$

因此 $g(r)$ 在 $r = R$ 处连续。

- (2) 做出 $g(r)$ 的草图。



- (3) $g(r)$ 是否为 r 的可导函数?

解: 只需考虑 $r = R$ 处的可导性, 计算左导数和右导数:

$$\lim_{r \rightarrow R^-} \frac{g(r) - g(R)}{r - R} = \lim_{r \rightarrow R^-} \frac{\frac{GM}{R^3} r - \frac{GM}{R^2}}{r - R} = \lim_{r \rightarrow R^-} \frac{GM}{R^3} = \frac{GM}{R^3},$$

$$\lim_{r \rightarrow R^+} \frac{g(r) - g(R)}{r - R} = \lim_{r \rightarrow R^+} \frac{\frac{GM}{r^2} - \frac{GM}{R^2}}{r - R} = \lim_{r \rightarrow R^+} GM \frac{R^2 - r^2}{r^2 R^2 (r - R)} = \lim_{r \rightarrow R^+} GM \frac{-(r + R)}{r^2 R^2} = -\frac{2GM}{R^3}.$$

由于左导数和右导数不相等, $g(r)$ 在 $r = R$ 处不可导, 因此 $g(r)$ 不是 r 的可导函数。

习题 2.1:10

若函数 $f(x)$ 在区间 $(-a, a)$ 上有定义, 并且满足 $f(-x) = f(x)$, 则称 $f(x)$ 为偶函数。设 $f(x)$ 是偶函数, 且 $f'(0)$ 存在, 证明: $f'(0) = 0$ 。

证明. 我们计算左导数和右导数:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(-h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-(f(-h) - f(0))}{-h} = - \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h}.$$

由于 $f'(0)$ 存在, 左导数和右导数相等, 因此

$$f'(0) = -f'(0) \implies f'(0) = 0.$$

□

习题 2.1:13

求函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{1 + e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

在点 $x = 0$ 处的左、右导数

解: 计算左导数:

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{\frac{h}{1 + e^{\frac{1}{h}}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{h}}} = 1.$$

计算右导数:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{h}{1 + e^{\frac{1}{h}}} - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{h}}} = 0.$$

例 11, 例 12

- 例 11 求函数 $y = x^x$ 的导数

解:

$$y = x^x = e^{x \ln x}$$
$$\frac{dy}{dx} = e^{x \ln x} (\ln x + 1) = x^x (\ln x + 1).$$

- 例 12 设函数

$$y = \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2(2-x)}{(3-x)^2(x-4)}},$$

求 y' 。

解： 取对数：

$$\ln y = \frac{1}{3} (2 \ln(x+1) + \ln(2-x) - 2 \ln(3-x) - \ln(x-4)).$$

两边求导：

$$\frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4} \right).$$

因此

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= y \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4} \right) \\ &= \sqrt[3]{\frac{(x+1)^2(2-x)}{(3-x)^2(x-4)}} \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{2}{x+1} - \frac{1}{2-x} + \frac{2}{3-x} - \frac{1}{x-4} \right). \end{aligned}$$

习题 2.2:3

求下列函数的导数：

• (8) $y = \cos(\sqrt[5]{1+x^2})$

解：

$$\frac{dy}{dx} = -\sin(\sqrt[5]{1+x^2}) \cdot \frac{1}{5}(1+x^2)^{-\frac{4}{5}} \cdot 2x = -\frac{2x \sin(\sqrt[5]{1+x^2})}{5(1+x^2)^{\frac{4}{5}}}.$$

• (9) $y = \ln |\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})|$

解：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})} \cdot \sec^2(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}) \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2 \sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}) \cos(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})}.$$

习题 2.2:4

求下列函数的导数：

• (5) 设 $a > 0$, 函数

$$y = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} \quad (a > 0).$$

解：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{-x}{\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sqrt{a^2 - x^2} \quad (|x| < a).$$

• (6) 设 $a > 0$, 函数

$$y = \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2} \ln \frac{x + \sqrt{x^2 + a^2}}{a} \quad (a > 0).$$

解:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2+a^2} + \frac{x}{2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}} + \frac{a^2}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}} = \sqrt{x^2+a^2} \quad (x \in \mathbb{R}).$$

- (8) 设 $a > b \geq 0$, 函数

$$y = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \arctan\left(\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2}\right), \quad (a > b \geq 0).$$

解: 设 $u = \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{\sqrt{a^2-b^2}} \cdot \frac{1}{1+u^2} \cdot \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} = \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \cdot \frac{\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} \sec^2 \frac{x}{2}}{1 + \frac{a-b}{a+b} \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{a+b \cos x}.$$

习题 2.2:6

6. 在图 2.8 的装置中, 飞轮的半径为 2 m, 且以每秒旋转 4 圈的匀角速度按顺时针方向旋转. 问: 当飞轮的旋转角 $\alpha(t) = \frac{\pi}{2}$ 时, 活塞向右移动的速度是多少?




图 2.8

解: 角速度 $\dot{\alpha}$ 为:

$$\dot{\alpha} = 4 \cdot 2\pi = 8\pi \text{ rad/s}$$

由余弦定理得:

$$6^2 = x^2 + 2^2 - 2 \cdot x \cdot 2 \cdot \cos \alpha,$$

即

$$x^2 - 4x \cos \alpha - 32 = 0.$$

对上式求导:

$$2x\dot{x} - 4\dot{x} \cos \alpha + 4x \sin \alpha \dot{\alpha} = 0,$$

注意到此时 $\alpha = \frac{\pi}{2}, \dot{\alpha} = 8\pi, x = 4\sqrt{2}$, 解得

$$\dot{x} = -16\pi \text{ m/s}.$$

解得速度大小为 $16\pi \text{ m/s}$ 。