

# FONCTIONS POLYNÔMIALES DE DEGRÉ 2

## PROGRAMME

- représentations graphiques des fonctions :  $x \mapsto ax^2, x \mapsto ax^2 + b, x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$
- axes de symétrie ;
- racines et signe d'un polynôme de degré 2 donné sous forme factorisée (le calcul des racines à l'aide du discriminant ne figure pas au programme).
- Compétences
  - Associer une parabole à une expression algébrique de degré 2
  - Déterminer des éléments caractéristiques de la fonction  $x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$  : Signe, extremum, allure, axes de symétrie
  - Vérifier qu'une valeur conjecturée est racine d'un polynôme de degré 2
  - Savoir factoriser dans des cas simples une expression du second degré connaissant une racine.
  - Utiliser la forme factorisée d'un poly pour trouver ses racines et étudier son signe.
- déterminer le signe d'une expression factorisée du second degré
- résoudre une équation ou une inéquation du premier degré, une équation du type  $x^2 = a$  avec  $a \geq 0$ .

## I - Généralités

### DÉFINITION

On appelle fonction polynômiale de degré 2 toute fonction

$$\begin{array}{ccc} f : \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & ax^2 + bx + c \end{array}$$

Où  $a, b, c \in \mathbb{R}$  et  $a \neq 0$ .

### EXEMPLES

$f : x \mapsto x^2$ ,  $g : x \mapsto 3x^2 - 4$  et  $h : x \mapsto 2 - 0,3x^2$  sont des fonctions polynômiales de degré 2.

► Fonctions polynômiales de degré 2 un peu lourd... On dira plutôt polynômes de degré 2 même si ce n'est techniquement pas tout à fait le même objet


## II - Fonctions $x \mapsto ax^2 + b$

► On s'intéresse maintenant à des cas plus simples. Les propositions suivantes sont généralisables.

### PROPOSITION

La représentation graphique d'une fonction polynômiale du second degré est une parabole.

## EXEMPLES



► Montrer sur geogebra l'effet obtenu en changeant  $a$  et  $b$

## REMARQUE

$b$  est l'ordonnée à l'origine de la parabole. Changer  $b$  décale la parabole vers le haut ou vers le bas.


## PROPRIÉTÉS

Soit  $f : x \mapsto ax^2 + b$  avec  $a \neq 0$ .

- Si  $a \geq 0$ ,  $f$  est décroissante puis croissante : elle branche vers le haut.
- Si  $a \leq 0$ ,  $f$  est croissante puis décroissante : elle branche vers le bas.

## DÉFINITION

On appelle sommet d'une parabole le point où elle change de direction. C'est le point le plus bas si  $a > 0$ , le point le plus haut sinon.



## PROPRIÉTÉS

Soit  $f : x \mapsto ax^2 + b$  avec  $a \neq 0$ .

- Les paraboles d'équation  $y = ax^2 + b$  ont pour axe de symétrie l'axe des ordonnées.
- Le sommet de la parabole associée est le point  $(0; b)$ .

► Exos 20,21,23 p120

## MÉTHODE

Pour déterminer l'expression d'une fonction  $f : x \mapsto ax^2 + b$  à partir de sa représentation graphique, on lit d'abord  $b$  en regardant l'ordonnée à l'origine, puis on détermine  $a$  en résolvant une équation.


## EXEMPLE

On a représenté  $f : x \mapsto ax^2 + b$  sur le repère ci-contre.

On voit directement que  $b = 1$ , d'où  $f : x \mapsto ax + 1$ .

On se donne maintenant un point sur la courbe de  $f$ , par exemple  $A(1; 3)$ . Cela signifie que  $f(1) = 3$ , autrement dit  $a \times 1 + 1 = 3$ , soit donc  $a + 1 = 3$ , d'où  $a = 2$ .

On a alors  $f : x \mapsto 2x^2 + 1$ .



► Exo 22p121, prévoir un autre exo du type sur fiche

## III - Fonctions $x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$

### 1. Généralités

#### PROPOSITION

Les fonctions du type  $f : x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$  sont des fonctions polynômiales du second degré.

$$\begin{aligned} \text{En effet, } a(x - x_1)(x - x_2) &= a(x^2 - xx_2 - xx_1 + x_1x_2) \\ &= ax^2 - axx_2 - axx_1 + ax_1x_2 \\ &= ax^2 - (ax_1 + ax_2)x + ax_1x_2 \end{aligned}$$

Donc  $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 + bx + c$  avec  $b = -(ax_1 + ax_2)$  et  $c = ax_1x_2$ .

#### DÉFINITION

Soit  $f$  une fonction polynômiale de degré 2. On appelle **racines** de  $f$  les solutions de l'équation  $f(x) = 0$ . Ce sont donc les abscisses des points d'intersection entre la courbe représentative de  $f$  et l'axe des abscisses.

## REMARQUE

Si  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$  ( $a \neq 0$ ), les racines de  $f$  sont  $x_1$  et  $x_2$ .

En effet,  $a(x - x_1)(x - x_2) = 0 \Leftrightarrow a = 0$  ou  $x - x_1 = 0$  ou  $x - x_2 = 0$   
 $\Leftrightarrow x = x_1$  ou  $x = x_2$

## EXEMPLE

Les racines de la fonction  $f : x \mapsto -3(x - 2)(x + 4)$  sont 2 et  $-4$ .

## PROPRIÉTÉS

Soit  $f : x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$  avec  $a \neq 0$ .


- On pose  $s = \frac{x_1 + x_2}{2}$ . Le sommet de la parabole associée a pour coordonnées  $(s, f(s))$ .
- La parabole associée a pour axe de symétrie la droite parallèle à l'axe des ordonnées (verticale) passant par son sommet.
- On en déduit le tableau de variations de  $f$  :

Si  $a > 0$  :

$x$	$-\infty$	$s$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$f(s)$	$+\infty$

Si  $a < 0$  :

$x$	$-\infty$	$s$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$f(s)$	$-\infty$



► Exos 26,27,29 p121

## 2. Factorisation

Soit  $f : x \mapsto ax^2 + b + c$ . On souhaite retrouver l'écriture factorisée  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ .

## MÉTHODE

Si l'on connaît une racine  $x_1$  de  $f$ , on peut retrouver l'écriture factorisée de  $f$  par identification.

### EXEMPLE

Soit  $f : x \mapsto x^2 - 3x + 2$ . Cherchons d'abord une racine dite "évidente" de  $f$ .

On remarque que  $f(1) = 0$  donc on peut prendre  $x_1 = 1$ .

On sait alors qu'on peut écrire  $f(x) = a(x - 1)(x - x_2)$  avec  $a, x_2 \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \text{Développons cette expression : } f(x) &= a(x^2 - x \times x_2 - x + x_2) \\ &= ax^2 + (a - ax_2)x + ax_2 \end{aligned}$$

On a de plus  $f(x) = 1x^2 - 3x + 2$ .

$$\text{On a alors } \begin{cases} a = 1 \\ a - ax_2 = -3 \\ ax_2 = 2 \end{cases} \text{ donc } a = 1 \text{ et } ax_2 = 2 \Rightarrow x_2 = 2.$$

On en déduit que  $f(x) = 1(x - 1)(x - 2) = (x - 1)(x - 2)$ .

### REMARQUE

Le  $a$  qui apparaît dans la forme développée et factorisée est le même !

### EXEMPLE

Soit  $f : x \mapsto 3x^2 - 9x + 6$ . On a  $a = 3$  donc la forme développée de  $f$  sera de la forme  $f(x) = 3(x - x_1)(x - x_2)$ .

- Prévoir exos de factorisation
- Exo 28 p121

## 3. Etude du signe

### REMARQUE

Une fonction du type  $f : x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$  peut être vue comme un produit d'un nombre réel et de deux fonctions affines.

### MÉTHODE

Pour dresser algébriquement le tableau de signes d'une fonction du type  $f : x \mapsto a(x - x_1)(x - x_2)$ , on peut étudier le signe des deux fonctions affines qui la composent et d'utiliser la règle des signes.

### EXEMPLE

Soit  $f : x \mapsto 0,5(x - 1)(x + 3)$ . Cette fonction est donc composée des deux fonctions affines  $x \mapsto x - 1$  et  $x \mapsto x + 3$ . On peut d'abord dresser le tableau de signes de ces deux fonctions :


$x$	$-\infty$	$1$	$+\infty$
$x - 1$	$-$	$0$	$+$

$x$	$-\infty$	$-3$	$+\infty$
$x + 3$	$-$	$0$	$+$

On peut alors combiner ces tableaux pour dresser le tableau de signes de  $f$  :

$x$	$-\infty$	$-3$	$1$	$+\infty$
$x - 1$	$-$	$-$	$0$	$+$
$x + 3$	$-$	$0$	$+$	$+$
$(x - 1)(x + 3)$	$+$	$0$	$-$	$+$
$f(x)$	$+$	$0$	$-$	$+$

On peut vérifier que l'on obtient le même tableau par lecture graphique.



► Prévoir exos