

DROITES DU PLAN

PROGRAMME


- Vecteur directeur d'une droite
- Equation de droite : Equation cartésienne, *réduite*
- Pente (ou coefficient directeur) d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées
- Capacités :
 - Déterminer une équation de droite à partir de deux points, un point et un vecteur directeur ou un point et la pente.
 - Déterminer la pente ou un vecteur directeur d'une droite donnée par une équation ou une représentation graphique
 - Tracer une droite connaissant son équation cartésienne ou réduite.
 - Etablir que trois points sont alignés ou non
 - Déterminer si deux droites sont parallèles ou sécantes
 - Résoudre un système de deux équations linéaires à deux inconnues, déterminer le point d'intersection de deux droites sécantes

I - Equation cartésienne de droite et vecteur directeur

On se place dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ du plan.

DÉFINITION

Soit \mathcal{D} une droite, et A et B deux points de \mathcal{D} . On appelle **vecteur directeur** de \mathcal{D} tout vecteur \vec{u} non nul colinéaire à \overrightarrow{AB} . Autrement dit, le vecteur \vec{u} donne la direction de la droite \mathcal{D} .



REMARQUE

Un vecteur directeur n'est pas unique : Ici, \vec{u} et \vec{v} sont des vecteurs directeurs de la droite (AB) .

EXEMPLE


Donner les coordonnées de **plusieurs** vecteurs directeurs des droites \mathcal{D}_1 , \mathcal{D}_2 , \mathcal{D}_3 et \mathcal{D}_4 .

— \mathcal{D}_1 :

— \mathcal{D}_2 :

— \mathcal{D}_3 :

— \mathcal{D}_4 :



PROPOSITION

Une équation cartésienne de la droite passant par le point $A(x_A; y_A)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ est de la forme $ax + by + c = 0$.

Un point $M(x; y)$ appartient à cette droite ssi $\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x - x_A \\ y - y_A \end{pmatrix}$ et $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ sont colinéaires.

Il faut donc que $\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = 0$. Cela donne alors :

$$\det(\overrightarrow{AM}; \vec{u}) = a(x - x_A) - (-b)(y - y_A) = 0$$

En développant, l'équation peut s'écrire :

$$ax + by + (-ax_A - by_A) = 0$$

En posant $c = -ax_A - by_A$, on trouve bien la forme voulue : $\boxed{ax + by + c = 0}$.

COROLLAIRE

Si les coordonnées $(x; y)$ d'un point M vérifient l'équation $ax + by + c = 0$, alors M appartient à la droite dont un vecteur directeur est $\vec{u} \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.

EXEMPLES

— Soit \mathcal{D}_1 la droite passant par le point $A(3; 1)$ et de vecteur directeur $\vec{u} \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \end{pmatrix}$.

On sait alors qu'une équation cartésienne de \mathcal{D}_1 est $5x + y + c = 0$ où c reste à trouver.

De plus, en remplaçant x et y par les coordonnées de A , on obtient :

$$5 \times 3 + 1 + c = 0$$

$$16 + c = 0$$

$$c = -16$$

Une équation cartésienne de \mathcal{D}_1 est donc $5x + y - 16 = 0$.

— Soit \mathcal{D}_2 passant par les points $B(5; 3)$ et $C(1; -3)$.

$\overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -4 \\ -6 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de \mathcal{D}_2 . On obtient alors l'équation $-6x + 4y + c = 0$.

Pour trouver c , on remplace x et y par les coordonnées de A ou B . Avec A , cela donne :

$$-6 \times 5 + 4 \times 3 + c = 0$$

$$-30 + 12 + c = 0$$

$$c = 18$$

Une équation cartésienne de \mathcal{D}_2 est donc $-6x + 4y + 18 = 0$. A noter que l'on peut simplifier cette équation pour obtenir $-3x + 2y + 9 = 0$.

II - Systèmes de deux équations à deux inconnues

Résoudre un système à deux inconnues, c'est trouver le ou les couples $(x; y)$ qui vérifie(nt) à la fois les deux équations.

EXEMPLE

Le couple $(2; 3)$ vérifie le système d'équations $\begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ -x + y = 1 \end{cases}$

En effet, en remplaçant x et y par 2 et 3, on trouve $\begin{cases} 5 \times 2 - 2 \times 3 = 10 - 6 = 4 \\ -2 + 3 = 1 \end{cases}$

1. Résolution graphique

On se ramène à deux équations de droites que l'on trace.

L'unique solution du système est alors les coordonnées du point d'intersection des deux droites.

EXEMPLE

On reprend le système précédent :


$$\begin{cases} 5x - 2y = 4 \\ -x + y = 1 \end{cases}$$

Après avoir tracé les des deux droites

$$\mathcal{D}_1 : 5x - 2y - 4 = 0$$

$$\mathcal{D}_2 : -x + y - 1 = 0$$

On constate que leur point d'intersection a pour coordonnées $(2; 3)$, ce qui correspond à la solution testée dans l'exemple précédent.



2. Résolution algébrique

a) Méthode par combinaison linéaire

Le but est de faire des opérations entre les lignes pour faire disparaître des inconnues.

EXEMPLE

Réolvons dans \mathbb{R} le système suivant :
$$\begin{cases} 2x - 3y = 9 & (L_1) \\ 2x + y = -1 & (L_2) \end{cases}$$

On voit que les deux lignes contiennent le terme $2x$. On peut donc l'annuler en soustrayant la première ligne à la seconde ligne :

$$\begin{array}{ccccc} \begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ 2x + y = -1 \end{cases} & \xleftrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} & \begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ 4y = -10 \end{cases} & \xleftrightarrow{\text{On résoud } L_2} & \begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ y = -2,5 \end{cases} \\ & \xleftrightarrow{\text{On remplace } y} & \begin{cases} 2x - 7,5 = 9 \\ y = -2,5 \end{cases} & \xleftrightarrow{\text{On résoud } L_1} & \begin{cases} 2x = 1,5 \\ y = -2,5 \end{cases} \\ & \xleftrightarrow{\quad} & \begin{cases} x = 0,75 \\ y = -2,5 \end{cases} & & \end{array}$$

b) Méthode par substitution

Le but est d'exprimer une variable en fonction d'une autre pour pouvoir l'éliminer dans une autre ligne.

EXEMPLE

Réolvons dans \mathbb{R} le système suivant :
$$\begin{cases} 6x - 7y = 1 & (L_1) \\ x - 3y = 2 & (L_2) \end{cases}$$

On va isoler x dans la seconde ligne pour le « réinjecter » dans la première.

$$\begin{array}{ccccc} \begin{cases} 6x - 7y = 1 \\ x - 3y = 2 \end{cases} & \xleftrightarrow{\text{On isole } x} & \begin{cases} 6x - 7y = 1 \\ x = 2 + 3y \end{cases} & \xleftrightarrow{\text{On réinjecte}} & \begin{cases} 6(2 + 3y) - 7y = 1 \\ x = 2 + 3y \end{cases} \\ & \xleftrightarrow{\text{On résoud } L_1} & \begin{cases} 12 + 18y - 7y = 1 \\ x = 2 + 3y \end{cases} & \xleftrightarrow{\quad} & \begin{cases} 11y = -11 \\ x = 2 + 3y \end{cases} \\ & \xleftrightarrow{\quad} & \begin{cases} y = -1 \\ x = -2 + 3y \end{cases} & \xleftrightarrow{\text{On remplace } y} & \begin{cases} y = -1 \\ x = -2 - 3 = -5 \end{cases} \end{array}$$