

Fonctions : Généralités


I - Définitions, notations

Définition : Soit $D \subset \mathbb{R}$. On appelle fonction f sur l'ensemble D le processus qui à tout nombre $x \in D$ associe un **unique** réel noté $f(x)$. On note $f: D \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto f(x)$$

Valeur d'entrée (dans D)

Valeur de sortie (dans \mathbb{R})



On dit alors que :

- $f(x)$ est l'image de x
- x est un antécédent de $f(x)$
- D est l'ensemble (ou domaine) de définition de f

Exemple : On définit la fonction $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto x^2 - x$$

- L'ensemble de définition de f est \mathbb{R} .
- L'image de 2 par la fonction f est 2 : $f(2) = 2^2 - 2 = 2$.
- 2 est un antécédent de 2 par la fonction f . -1 en est aussi un car $f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$.


Remarque : Chaque nombre dans D possède une unique image, mais plusieurs antécédents d'un même nombre peuvent exister.

II - Représentation graphique d'une fonction

Définition : Dans un repère du plan, l'ensemble des points $(x, f(x))$ pour $x \in D$ constitue la courbe de f . L'équation de la courbe de f est $y = f(x)$ pour $x \in D$.

Dans la pratique, il faut placer plusieurs points pour tracer la courbe d'une fonction le plus précisément possible. On peut s'aider d'une table de valeurs.


x	-1.5	-1	-0.5	0	0.5	1	1.5	2	2.5
$f(x)$									




Les points $(-1; 2)$ et $(1; 0)$ appartiennent à la courbe de f , mais pas le point $(0; 1)$.

III - Résolution graphique d'équations


1) Equations du type $f(x) = k$




Exemples :




2) Equations du type $f(x) = g(x)$



Exemples :



IV - Résolution graphique d'inéquations



V - Etude du signe

Méthode : Dresser le tableau de signes d'une fonction f , c'est indiquer sur quels intervalles la fonction est négative, positive ou nulle.

Avec la même fonction que précédemment, on obtient :

x	-2	-1	2	5
$f(x)$	+	○	○	+

VI - Parité d'une fonction

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I centré en 0 ($I = [-a; a],]-a; a[$ ou \mathbb{R}). On dit que f est :

- **paire** lorsque pour tout $x \in I$, $f(-x) = f(x)$.
- **impaire** lorsque pour tout $x \in I$, $f(-x) = -f(x)$.

Exemples :

- La fonction $f : [-2; 2] \longrightarrow \mathbb{R}$ est paire car pour tout $x \in [-2; 2]$,


$$x \longmapsto x^2 - 1$$

$$[-2; 2], f(-x) = (-x)^2 - 1 = x^2 - 1 = f(x).$$
- La fonction $g :]3; 3[\longrightarrow \mathbb{R}$ est impaire.

$$x \longmapsto 0.5x$$

Propriétés :

- f est paire si et seulement si \mathcal{C}_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si \mathcal{C}_f est symétrique par rapport à l'origine du repère (0; 0).



Remarque : Une fonction peut être ni paire ni impaire !