

Formulario general

Virgilio Murillo Ochoa

5 de mayo de 2021

Índice

1. Algebra	6
1.1. factorization	6
1.2. Sintetic divition	7
1.3. cubic differences	8
1.4. general formula	8
1.5. Logarithms	8
2. Boolean Algebra	9
2.1. Simple Formulas	9
3. Complex Algebra	9
3.1. Polar coordinates	9
3.2. Basic identiies and formulas	10
3.3. Euler identity	10
3.4. Multiplicative cycles	11
3.5. Graphs	11
3.6. Triangle inequality	12
3.7. Golden Triangle	12
4. Linear Algebra	12
4.1. dot and cross product	12
4.2. Crammer Rule	13
4.3. Gauss jordan Algorithm	13
4.4. simetry on matrices	13
5. Trigonometry	14
5.1. Basic Identities	14
5.2. Double Angle	14
5.3. Sin in terms of e	14
5.4. hyperbolic functions	15
5.5. square reduction	15
5.6. Polar Coordinates	15
6. Diferential Calculus	18
6.1. basic formulas	18
6.2. Limits	18
6.3. Derivatives of inverse trigonometric functions	18

6.4. Derivatives of Hiperbolic functions	19
7. Integral Calculus	20
7.1. basic integral formulas	20
7.2. Weirestrass substitution	20
7.3. Reduction formulas	21
7.4. integrals of Hiperbolic functions	22
7.5. Particular Integrals	22
7.6. Taylor series	23
7.7. Riemann z function	23
7.8. Gamma Function	23
8. Vector Calculus	23
8.1. basic formulas	23
8.2. 3d Line equation	24
9. Differential Ecuations	25
9.1. linearity	25
9.2. homogeneous ecuations	26
9.3. homogeneous function of grade n	26
9.4. Exact ED	26
9.5. Bernouully ecuation	27
9.6. Ricat Ecuation	27
9.7. Cauchy Euler ecuation	27
9.8. integrant factor	27
9.9. Linear differential equations	28
9.10. Order Reduction	28
9.11. Constant coefficients Ecuation	29
9.12. parameter variation	30
9.13. Indeterminate Coefficients	31
10. probability and statistics	32
10.1. Independent Events	32
10.2. morgan laws	32
10.3. separated probabilities	34
11. Numerical Calculus	35
11.1. Taylor Polinomial	35
11.2. Newton Raphson	35

11.3. Complement to one	35
11.4. complement to two	35
11.5. complemento a dos	35
11.6. convertir de punto flotante a decimal	36
11.7. convert decimal to float	37
11.8. Convert decimal fraction to float	38
11.9. Fixed point iteration	39
11.10 Divided differences	40
11.11 Lagrange Polinomial	40
12. Arch Linux	41
12.1. Mantainance	41
12.2. Print in arch linux	42
12.3. configure date and time	42
12.4. Configure wireless	42
12.5. mount devices	43
13. Latex	44
13.1. commonly used special symbols	44
13.2. Greek and Hebrew Letters	44
13.3. math constructs	45
13.4. Delimiters	45
13.5. Variable Sized simbols	46
13.6. binary operation relation symbols	46
13.7. arrow symbols	46
13.8. miscelanious	47
13.9. Matrices	47
14. Electronics	48
14.1. Logic Gates	48
14.2. MinTerminos y max terminos	49
15. Physics	50
15.1. Motion with constant acceleration	50

1. Algebra

1.1. factorization

1. common factor
2. common factor by agroupation of terms
3. cubic differences
4. perfect square trinomial
5. trinomial of the form $x^2 + bx + c$
6. trinomial of the form $ax^2 + bx + c$
7. sum and difference of cubes
8. sintetic divition
9. general formula

1.2. Sintetic divition

Example:

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8$$

Taking the divisors of the independent term

$$p = D_8 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$$


and the divisors of the term with the highest exponent

$$q = D_1 = \{\pm 1\}$$

$$p/q = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$$

now all the possibilities are in the space p/q that are integers

so:

$$\begin{array}{r}
 x^3 \quad x^2 \quad x \quad TI \\
 1 \quad -5 \quad 2 \quad 8 \\
 \quad -1 \quad 6 \quad -8 \\
 \hline
 1 \quad -6 \quad 8 \quad 0
 \end{array}
 \quad \left. \vphantom{\begin{array}{r} x^3 \\ 1 \\ \hline 1 \end{array}} \right| x = -1$$


then:

$$(x^2 - 6x + 8)(x + 1)$$

then:

$$(x + 1)(x - 4)(x - 2)$$

1.3. cubic differences

$$u^3 + 1 = (u^2 - u + 1)(u + 1)$$

$$u^3 - 1 = (u^2 + u + 1)(u - 1)$$

1.4. general formula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

1.5. Logarithms

$$\log_a(p) = \frac{\log p}{\log a}$$

2. Boolean Algebra

2.1. Simple Formulas

$$AA' = 0, \quad A + A' = 1$$

$$AB + AC = A(B + C)$$

$$(AB...Z)' = A' + B' + ... + Z'$$

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

$$AB + AB' = A$$

$$(A + B)(A + C) = A + BC$$

$$A + A + B = A, \quad A(A + D) = A$$

$$(x + y)' = x'.y'$$

$$(x.y)' = x' + y'$$

3. Complex Algebra

3.1. Polar coordinates

$$(r, \theta)$$

3.2. Basic identities and formulas

Basic conversions:

$$y = r(\sin(\theta))$$

$$x = r(\cos(\theta))$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

Basic Formulas:

$$-i = \frac{1}{i}$$

$$Z = a + bi$$

$$\overline{Z} = a - bi$$

$$\overline{Z} + \overline{w} = \overline{Z + w}$$

$$\overline{Z} \times Z = |Z|^2$$

3.3. Euler identity

$$e^{iz} = \cos(z) + i \sin(z)$$

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

3.4. Multiplicative cycles

$$i = i$$


$$i^2 = -1$$

$$i^3 = -i$$

$$i^4 = 1$$


$$i^5 = i$$

3.5. Graphs



3.6. Triangle inequality

$$|z + w| \leq |z| + |w|$$



3.7. Golden Triangle

$$\frac{a}{b} = \frac{b}{a - b}$$

4. Linear Algebra

4.1. dot and cross product

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

$$A^{-1} = \text{frac}(\text{adj} A)^T \text{def}(A)$$

4.2. Crammer Rule

$$x = \frac{\delta_x}{\delta_s}, \quad y = \frac{\delta_y}{\delta_s}, \quad z = \frac{\delta_z}{\delta_s}$$

4.3. Gauss jordan Algorithm

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{cc|cc} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{array} \right)$$

4.4. simetry on matrices

5. Trigonometry

5.1. Basic Identities

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

5.2. Double Angle

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$$

5.3. Sin in terms of e

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{-2i}$$

$$\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

5.4. hyperbolic functions

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$$

$$\operatorname{sech}^2(x) + \tanh^2(x) = 1$$

$$\sinh(x \pm y) = \sinh(x) \cosh(y) \pm \cosh(x) \sinh(y)$$

$$\cosh(x \pm y) = \cosh(x) \cosh(y) \pm \sinh(x) \sinh(y)$$

5.5. square reduction

$$\sinh^2(x) = \frac{\cosh(x) - 1}{2}$$

$$\cosh^2(x) = \frac{\cosh(x) + 1}{2}$$

5.6. Polar Coordinates

$$r \cos(u) = x, \quad r \sin(u) = y$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

The symmetry around the x axis:

$$y - r = f(\theta) = f(-\theta)$$

The symmetry around the y axis:

$$r = f(\pi - \theta)$$

Symmetry around $\theta = \frac{\pi}{2}$

$$f(\pi - \theta) = f(\theta)$$

Symmetry around the origin

$$f(\pi + \theta) = -f(\theta)$$

Find the type of graphic the next function is gonna make:

$$r = \pm a + b \sin(u)$$

$a < b$	$a = b$	$a > b$
cola	corazon pasa origen	sin cola

Roses:

$$r = a \sin(n\theta), \quad r = \cos(n\theta)$$

1. number of petals

```
if(n %2 == 0)
{
    return 2n;
}
else
{
    return n;
}
```

2. $angle = \frac{360^\circ}{\#petals}$

3. first petal

```
if(cos(x))
{
    return "x axis";
}
else
{
    return "theta = \pi / 2n ";
}
```

6. Diferential Calculus

6.1. basic formulas

$$\begin{aligned}(\tan(x))' &= \sec^2(x), \quad (\csc(x))' = \csc(x)\cot(x) \\(\sec(x))' &= \sec(x)\tan(x), \quad (\cot(x))' = -\csc^2(x) \\(\ln(x))' &= \frac{1}{x} \\(a^x)' &= a^x \ln(a) * x' \\(\frac{f(x)}{g(x)})' &= \frac{g(x)f(x)' - f(x)g(x)'}{(g(x))^2}\end{aligned}$$

6.2. Limits

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

6.3. Derivatives of inverse trigonometric functions

$$\begin{aligned}(\sin^{-1}(x))' &= \frac{x'}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\cos^{-1}(x))' = \frac{-x'}{\sqrt{1-x^2}} \\(\tan^{-1}(x))' &= \frac{x'}{x^2+1}, \quad (\cot^{-1}(x))' = \frac{-x'}{x^2+1} \\(\sec^{-1}(x))' &= \frac{x'}{|x|\sqrt{x^2-1}}, \quad (\csc^{-1}(x))' = \frac{-x'}{|x|\sqrt{x^2-1}}\end{aligned}$$

6.4. Derivatives of Hiperbolic functions

$$\begin{aligned}(\sinh(x))' &= \cosh(x), \quad (\cosh(x))' = \sinh(x) \\(\tanh(x))' &= \operatorname{sech}^2(x), \quad (\coth(x))' = -\operatorname{csch}^2(x) \\(\operatorname{sech}(x))' &= -\operatorname{sech}(x)\tanh(x), \quad (\operatorname{csch}(x))' = -\operatorname{csch}(x)\coth(x)\end{aligned}$$

7. Integral Calculus

7.1. basic integral formulas

$$\int \frac{1}{X} dx = \ln |x|$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a}$$

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x)$$

$$\int \cos(x) dx = \sin(x)$$

$$\int \tan(x) dx = \ln |\sec(x)| \text{ or } -\ln |\cos(x)|$$

$$\int \cot(x) dx = \ln |\sin(x)|$$

$$\int \sec(x) dx = \ln |\sec(x) + \tan(x)|$$

$$\int \csc(x) dx = \ln |\csc(x) - \cot(x)|$$


7.2. Weirestrass substitution

let $t = \tan(x/2)$ where $-\pi < x < \pi$ Then:

$$\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$dx = \frac{2dt}{1+t^2}$$



if all trigonometric functions are pairs then: let $t = \tan(x)$ where $-\pi < x < \pi$
Then:

7.3. Reduction formulas

$$\int \sin^n(x) = -\frac{\sin^{n-1}(x) \cos(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2}(x) dx$$

$$\int \cos^n(x) = \frac{\cos^{n-1}(x) \sin(x)}{n} + \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2}(x) dx$$

$$\int \tan^n(x) = \frac{\tan^{n-1}(x)}{n-1} - \int \tan^{n-2}(x) dx$$

$$\int \csc^n(x) = -\frac{\csc^{n-2}(x) \cot(x)}{n-2} + \frac{n-3}{n-2} \int \csc^{n-2}(x) dx$$

$$\int \sec^n(x) = \frac{\sec^{n-2}(x) \tan(x)}{n-2} + \frac{n-3}{n-2} \int \sec^{n-2}(x) dx$$

$$\int \cot^n(x) = -\frac{\cot^{n-1}(x)}{n-1} - \int \cot^{n-2}(x) dx$$

$$\int \frac{1}{(au^2 + b)^n} du = \frac{2n-3}{2b(n-1)} \int \frac{1}{(au^2 + b)^{n-1}} du + \frac{u}{2b(n-1)(au^2 + b)^{n-1}}$$

$$\int \csc^m(x) \sec^n(x) dx = \frac{-\csc^{m-1}(x) \sec^{n-1}(x)}{m-1} + \frac{m+n-1}{m-1} \int \csc^{m-2}(x) \sec^n(x) dx$$

7.4. integrals of Hiperbolic functions

$$\begin{aligned}\int \sinh(x)dx &= \cosh(x), \quad \int \cosh(x)dx = \sinh(x) \\ \int \tanh(x)dx &= \ln |\cosh(x)|, \quad \int \coth(x)dx = \ln |\sinh(x)| \\ \int \operatorname{sech}(x)dx &= \tan^{-1}(\sinh(x)), \quad \int \operatorname{csch}(x)dx = \ln |\tanh(x)| \\ \int \coth(x)dx &= \ln |\sinh(x)|\end{aligned}$$

7.5. Particular Integrals

$$\begin{aligned}\int e^{\alpha x} \sin(\beta x)dx &= [e^{\alpha x}(\alpha \sin(\beta x) - \beta \cos(\beta x))] \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2} \\ \int e^{\alpha x} \cos(\beta x)dx &= [e^{\alpha x}(\alpha \cos(\beta x) + \beta \sin(\beta x))] \frac{1}{\alpha^2 + \beta^2}\end{aligned}$$

7.6. Taylor series

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^n(a)}{n!} (x - a)^n$$

7.7. Riemann z function

$$f(s) = 1 + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \dots$$

7.8. Gamma Function

$$\int_0^\infty e^{-t} t^{t-1} dt = \Gamma(t)$$

$$\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n) \right]$$

8. Vector Calculus

8.1. basic formulas

$$proj_u(v) = \left(\frac{u \cdot v}{u \cdot u} \right) u$$

8.2. 3d Line equation

$$\vec{r} = \vec{p} + t\vec{v}$$

9. Differential Ecuations

9.1. linearity

$$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n} + \dots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$$

9.2. homogeneous equations

given:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

the equation is homogeneous if M and N are homogeneous functions of the same exponent cambio de variable $y = ux$ o $x = uy$, $dy = xdu + udx$
Subsección 9.3

9.3. homogeneous function of grade n

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

9.4. Exact ED

para ser exacta tiene que cumplir dos condiciones

1. $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$
2. $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

si no las cumple puedes usar el factor integrante para que cumpla **Subsección 9.8**

para resolver toma en cuenta las siguientes dos cosas

$$f(x, y) = \int Mdx + g(y) = \int Ndy + h(x)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N$$

9.5. Bernouully equation

aplica cuando la ecuacion diferencial tiene la siguiente forma:

$$P_0(x)\frac{dy}{dx} + P(x)y = F(x)y^n$$

se hace el cambio de variable $u = y^{1-n}$ y se obtiene una ecuacion lineal

9.6. Ricat Ecuation

tiene la siguiente forma

$$y' = Q(x)y^2 + P(x)y + R(x)$$

se hace la sustitucion $y = y_1 + u^{-1}$

9.7. Cauchy Euler ecuation

se usa para resolver una ecuacion de segundo grado

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0$$

$$y = x^r, \quad x > 0$$

9.8. integrant factor

aplica cuando hay una $f(x, y)$ tal que $f(x, y)(ED) = exacta$

- si $\frac{M_y - N_x}{N}$ es funcion solamente de x entonces $P(x) = \frac{M_y - N_x}{N}$

$$f(x) = e^{\int P(x)dx} \text{ es un factor de integracion}$$

- si $M_y - N_x = m\frac{N}{x} - n\frac{M}{y}$ entonces

$$f(x) = x^m y^n \text{ es un factor de integracion}$$

used by [Elemento 9.4](#)

9.9. Linear differential equations

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = q(x)$$

$$u(x) = e^{\int P(x)dx}$$

$$\text{Sol} = u(x)y = \int u(x)q(x)dx$$

9.10. Order Reduction

aplica cuando conoces una solución de una ED Lineal homogénea de segundo orden

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1'} dx$$

$$y'' + P(x)y' + q(x)y = 0$$

9.11. Constant coefficients Ecuation

para poder resolver por este metodo tiene que ser una ecuacion lineal de coeficientes constantes de la forma

$$y''C_1 + y'C_2 + yC_3 = 0$$

se hace la sustitucion

$$y = e^{rx}$$

quedara una funcion cuadratica en terminos de r
se puede llegar a usar la identidad de euler
la solucion queda de la forma:

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$$

tambien puede servir:

$$r = a + bi$$

$$y_1 = C_1 * e^{\alpha x} \cos(bx)$$

$$y_2 = C_2 * e^{\alpha x} \sen(bx)$$

nota: si hay multiplicidad, ejemplo: $(r - 1)^3 = 0$

$$y_h = e^{rx} + xe^{rx} + x^2e^{rx}$$

siendo que $r = 1$ entonces:

$$y_h = e^x + xe^x + x^2e^x$$

9.12. parameter variation

tienen la forma $k_1y'' + k_2y' + k_3y = f(x)$

$$u_1 = - \int \frac{y_2 f(x)}{W} dx \quad u_2 = \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx$$

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

siendo y_h la solución de la ecuación homogénea asociada

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

y siendo y_p la solución definitiva

$$y_p = u_1 y_1 + C_2 y_2$$

9.13. Indeterminate Coefficients

$r(x)$ = polinomio, exponencial, Seno, Coseno

pasos:

1. Calcular y_n es decir calcular la ecuacion homogenea relacionada, por coeficientes constantes
2. Encontrar y_p

caso 1 No hay funciones en comun con $r(x)$

nota: tomar en cuenta el teorema de superposicion de soluciones si

$$r(x) = x^3 + x + 10 \sin 8x$$

simplemente se suman las proposiciones

$$y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D + A \sin(8x) + B \cos(8x)$$

y lo mismo aplica para la multiplicacion

- $y'' + C_1 y' + c_2 y = x^3 + x$
proponer $\rightarrow y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
- $y'' + C_1 y' + c_2 y = 10 \sin 8x$
proponer $\rightarrow y_p = A \sin(8x) + B \cos(8x)$
- $y'' + C_1 y' + c_2 y = 12e^{5x}$
proponer $\rightarrow y_p = Ae^{5x}$


caso 2 hay funciones que coinciden con $r(x)$

simplemente multiplicar la funcion por x hasta que no haya funciones en comun con x pero tiene que ser la x^n mas pequena posible

10. probability and statistics

$$P(\epsilon^c) = 1 - P(\epsilon)$$

$$P(A \cap B^c) = P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cap (B \cup A) = (A \cap B) \cup (A \cap A)$$

$$A \cup (B \cap A) = (A \cup B) \cap (A \cup A)$$

10.1. Independent Events

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$p(A|B) = P(A \cup B) = p(A) * P(B)$$


10.2. morgan laws

$$A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$$

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$$

| = *dadoque*

10.3. separated probabilities



Sean B_k Eventos mutuamente excluyentes, particion de S

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_k)P(A|B_k!)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_k)$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) * P(A|B_i)}{P(A)}$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) - P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_k)}$$

$$a^{\Phi(m)} = 1(mod\ m)$$

$$\Phi(p \times q) = (p - 1)(q - 1) \text{ para } pq \text{ primos}$$

$$\Phi(p_1^{k_1} \times \dots \times p_n^{k_n}) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \times \dots \times (p_n^{k_n} - p_n^{k_n-1})$$

11. Numerical Calculus

11.1. Taylor Polinomial

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x - x_0)^2}{2!}$$
$$= \sum_{i=0}^n \frac{f^i(x_0)(x - x_0)^i}{i!}$$

11.2. Newton Raphson

$$P_{n+1} = P_n - \frac{f(P_0)}{f'(P_0)}$$

11.3. Complement to one


11.4. complement to two

se cambian 1 por ceros y viceversa

11.5. complemento a dos

de derecha a izquierda y apartir del primer 1 encontrado sin incluirlo se hace la operacion de complemento a uno

11.6. convertir de punto flotante a decimal



Ejemplo:

$$(-1) \times (1 + mantisa) \times 2^{expo - maxExpo}$$

$$\begin{aligned}
 &(-1) \times (1 + 0,75) \times 2^{124-127} \\
 &= -0,21875
 \end{aligned}$$

11.7. convert decimal to float

Ejemplo:

$$171,25 = 10101011,01$$

Se pasa a una forma con exponente dejando solo un entero

$$1,010101101 \times 2^7$$

El primer bit es de signo

$$1 = -$$

$$0 = +$$

Los siguientes 8 numeros son el maximo exponente mas el exponente al que esta elevado el 2

$$127 + 7 = 134$$

se convierte el 134 a base 2

$$134_{10} = 10000110_2$$

y la parte decimal es la mantiza, que queda igual

$$010101101$$

11.8. Convert decimal fraction to float

para convertir de fraccionario a binario primero se convierte la parte entera y la parte fraccionaria se convierte usando el siguiente codigo

Codigo:

```
//se da un flotante de la forma 0.321312 con  
//el numero de digitos a convertir  
//ejemplo  
//in: 0.42344 3  
//out: .001  
string FraccionBinaria(float FraccionDecimal,int NumeroDeDigitos)  
{  
    string ans = ".";  
    for(int i=0;i<NumeroDeDigitos;i++)  
    {  
        FraccionDecimal*=2;  
        if(FraccionDecimal > 1.0)  
        {  
            FraccionDecimal-=1.0;  
            ans.push_back('1');  
        }  
        else  
        {  
            ans.push_back('0');  
        }  
    }  
    return ans;  
}
```

11.9. Fixed point iteration

de una ecuacion se despeja x y se substituye, tomando el resultado anterior empezando desde una x arbitraria

11.10. Divided differences

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f(x_2, x_3) - f(x_0, x_1)}{x_3 - x_0}$$

$$P_n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \times \dots \times (x - x_n)$$

j	X_j	$f(X_j)$	1	2
0	X_0	$f(X_0)$	1	1
1	X_1	$f(X_1)$	$f(X_0, X_1)$	1
2	X_2	$f(X_2)$	$f(X_1, X_2)$	$f(X_0, X_1, X_2)$

11.11. Lagrange Polinomial

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

12. Arch Linux

12.1. Maintenance

```
#check file size  
du -sh .cache/  
#remove a file  
rm -rt .cache/  
#delete what you don't need in .config file
```

specific maintenance:

```
#check the failed systems  
systemctl --failed  
#check the systemd journal  
sudo journalctl -p 3-xb  
#if the system doesn't boots then ctrl+alt+shift then timeshift  
#then update mirrors  
#clar chache  
  
#then to update the whole system use:  
sudo pacman -Syu  
#to check system updates  
sudo pacman -Syu  
#if you wan't to remove all packages in the drive use  
sudo pacman -Scc  
#remove all unwanted dependencies  
paru -Yc  
#remove orphan packages  
sudo pacman -Rns \$(pacman -Qdtq)  
#sudo pacman -Syyy Synchronise data use "mirror1"
```

12.2. Print in arch linux

install packages: usbutils, lsusb, cups
use this to make cups usable

```
sudo systemctl enable cups  
sudo systemctl start cups
```

```
localhost:631
```

```
lp -d HP_Officejey_Pro_8600]
```

12.3. configure date and time

```
hwclock --set --date = "04/32/2021 19:00:00"
```

```
hwclock -hctosys
```

12.4. Configure wireless

```
#when entering an iso
```

```
iwctl
```

```
#then in the ui
```

```
#to list all available devices
```

```
device list
```

```
#to scan networks
```

```
station <device> scan
```

```
#to get newworks
```

```
station <device> get-network
```

```
#to connect to a network
```

```
station <device> connect "<name of network>"
```

```
#to check if the connection is staable
```

```
ping -c s 8.8.8.8
```

```
#don't forget before rebooting the iso run
```

```
pacman nmtui
```

dwm basic configuration

```
#MODKEY + shift + q to restart X server
```

```
startx # to start the X server
```

12.5. mount devices

mount usb sticks:

```
#to mount a usb stick  
mount /dev/sdb1 /mnt/<destination folder>  
#to unmount a sub stick  
umount /dev/sdb1
```

mount an android device:

```
#to mount and android device  
simple-mtpfs --device 1 tablet/  
  
#to unmount an android device  
fusermount -u /tablet
```

13. Latex

13.1. commonly used special symbols

use the shortcut created to don't waste time

\= \textbackslash

|= \textbar

- = \-

13.2. Greek and Hebrew Letters

α	<code>\alpha</code>	κ	<code>\kappa</code>	ψ	<code>\psi</code>
β	<code>\beta</code>	λ	<code>\lambda</code>	ρ	<code>\rho</code>
χ	<code>\chi</code>	μ	<code>\mu</code>	τ	<code>\tau</code>
ϵ	<code>\epsilon</code>	ϕ	<code>\phi</code>	θ	<code>\theta</code>
η	<code>\eta</code>	ω	<code>\omega</code>	υ	<code>\upsilon</code>
γ	<code>\gamma</code>	ϕ	<code>\phi</code>	ξ	<code>\xi</code>
ι	<code>\iota</code>	π	<code>\pi</code>	ζ	<code>\zeta</code>
\digamma	<code>\digamma</code>	Δ	<code>\Delta</code>	Θ	<code>\Theta</code>
ε	<code>\varepsilon</code>	Γ	<code>\Gamma</code>	Υ	<code>\Upsilon</code>
\varkappa	<code>\varkappa</code>	Λ	<code>\Lambda</code>	Ξ	<code>\Xi</code>
φ	<code>\varphi</code>	Ω	<code>\Omega</code>		
ϖ	<code>\varpi</code>	Φ	<code>\Phi</code>	\aleph	<code>\aleph</code>
ϱ	<code>\varrho</code>	Π	<code>\Pi</code>	\beth	<code>\beth</code>
ς	<code>\varsigma</code>	Ψ	<code>\Psi</code>	\daleth	<code>\daleth</code>
ϑ	<code>\vartheta</code>	Σ	<code>\Sigma</code>	\gimel	<code>\gimel</code>

13.3. math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	\overline{abc}	<code>\overline{abc}</code>	\overrightarrow{abc}	<code>\overrightarrow{abc}</code>
f'	<code>\fprime</code>	\underline{abc}	<code>\underline{abc}</code>	\overleftarrow{abc}	<code>\overleftarrow{abc}</code>
\sqrt{abc}	<code>\sqrt{abc}</code>	\widehat{abc}	<code>\widehat{abc}</code>	\overbrace{abc}	<code>\overbrace{abc}</code>
$\sqrt[n]{abc}$	<code>\sqrt[n]{abc}</code>	\widetilde{abc}	<code>\widetilde{abc}</code>	\underbrace{abc}	<code>\underbrace{abc}</code>

13.4. Delimiters

$ $	<code>\vert</code>	$\{$	<code>\{</code>	\lfloor	<code>\lfloor</code>	$/$	<code>/</code>
$ $	<code>\vert</code>	$\}$	<code>\}</code>	\rfloor	<code>\rfloor</code>	\backslash	<code>\backslash</code>
$ $	<code>\ </code>	\langle	<code>\langle</code>	\lceil	<code>\lceil</code>	$[$	<code>[</code>
$ $	<code>\ </code>	\rangle	<code>\rangle</code>	\rceil	<code>\rceil</code>	$]$	<code>]</code>

use the pair `/lefts` and `/rights`

example:

`\left| expr \right|`

13.5. Variable Sized symbols

\sum	<code>\sum</code>	\int	<code>\int</code>	\biguplus	<code>\biguplus</code>
\prod	<code>\prod</code>	\oint	<code>\oint</code>	\bigcap	<code>\bigcap</code>
\coprod	<code>\coprod</code>	\iint	<code>\iint</code>	\bigcup	<code>\bigcup</code>
\bigoplus	<code>\bigoplus</code>	\bigvee	<code>\bigvee</code>	\bigotimes	<code>\bigotimes</code>
\bigwedge	<code>\bigwedge</code>	\bigodot	<code>\bigodot</code>	\bigsqcup	<code>\bigsqcup</code>

13.6. binary operation relation symbols

\cap	<code>\cap</code>	\cup	<code>\cup</code>
\uplus	<code>\uplus</code>	\sqcup	<code>\sqcup</code>
\sqcap	<code>\sqcap</code>	\wedge	<code>\wedge</code>
\vee	<code>\vee</code>	\equiv	<code>\equiv</code>
\neq	<code>\neq</code>	\simeq	<code>\simeq</code>
\approx	<code>\approx</code>	\doteq	<code>\doteq</code>
\subset	<code>\subset</code>	\because	<code>\because</code>
\sqsubset	<code>\sqsubset</code>	\sqsubseteq	<code>\sqsubseteq</code>
\geq	<code>\geq</code>	\therefore	<code>\therefore</code>

13.7. arrow symbols

\leftarrow	<code>\leftarrow</code>	\Leftarrow	<code>\Leftarrow</code>
\rightarrow	<code>\rightarrow</code>	\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>
\leftrightarrow	<code>\leftrightarrow</code>	\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>
\uparrow	<code>\uparrow</code>	\Uparrow	<code>\Uparrow</code>
\downarrow	<code>\downarrow</code>	\Downarrow	<code>\Downarrow</code>
\updownarrow	<code>\updownarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\nearrow	<code>\nearrow</code>	\searrow	<code>\searrow</code>
\swarrow	<code>\swarrow</code>	\nwarrow	<code>\nwarrow</code>

13.8. miscelanious

∞	<code>\infty</code>	∂	<code>\partial</code>
\cdots	<code>\cdots</code>	\vdots	<code>\vdots</code>
\vdots	<code>\vdots</code>	\ldots	<code>\ldots</code>
\ddots	<code>\ddots</code>	\forall	<code>\forall</code>
\exists	<code>\exists</code>	\nexists	<code>\nexists</code>
\emptyset	<code>\emptyset</code>	\angle	<code>\angle</code>
\angle	<code>\angle</code>	\measuredangle	<code>\measuredangle</code>
\cap	<code>\cap</code>	\cap	<code>\cap</code>
\cap	<code>\cap</code>	\cap	<code>\cap</code>

13.9. Matrices

matrices		
type	latex markup	Renders as
Plain	$\begin{matrix} \begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{matrix} \end{matrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

< opt >:

in this part you can specify which kind of matrix you want so you can place p: parenthesis matrix ()

b:bracket matrix []








B: for braces matrix { }

v: for pipes matrix |

V: for double pipe ||

14. Electronics

14.1. Logic Gates

	And	$A*B$
	Or	$A+B$
	Nand	$A'*B'$
	Nor	$A'+B'$
	Not	A'
	XOr	$(A'*B) + (A*B')$
	XNor	$[(A'*B) + (A*B')]'$

14.2. MinTerminos y max terminos

a	b	c	term
0	0	0	$m_0 = x'y'z'$
0	0	1	$m_1 = x'y'z$
0	1	0	$m_2 = x'yz'$
0	1	1	$m_3 = x'yz$
1	0	0	$m_4 = xy'z'$
1	0	1	$m_5 = xy'z$
1	1	0	$m_6 = xyz'$
1	1	1	$m_7 = xyz$

15. Physics

15.1. Motion with constant acceleration

$$v = v_0 + at$$

$$x = x_0 + v_0t + \frac{at^2}{2}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$$