

Formulario general

Virgilio Murillo Ochoa
4 de mayo de 2021

Índice

1. probability and statistics	4
1.1. Independent Events	4
1.2. morgan laws	4
1.3. separated probabilities	5
2. Ecuaciones Diferenciales	5
2.1. linearity	5
2.2. homogeneous ecuations	6
2.3. homogeneous function of grade n	6
2.4. Exact ED	6
2.5. Bernouully ecuation	6
2.6. Ricat Ecuation	7
2.7. Cauchy Euler ecuation	7
2.8. integrant factor	7
2.9. Linear differential equations	7
2.10. Order Reduction	8
2.11. Constant coefficients Ecuation	9
2.12. parameter variation	9
2.13. Indeterminate Coeficients	10
3. Numerical Calculus	11
3.1. Taylor Polinomial	11
3.2. Newton Raphson	11
3.3. Complement to one	11
3.4. complement to two	11
3.5. complemento a dos	11
3.6. convertir de punto flotante a decimal	11
3.7. convert decimal to float	12


3.8. Convert decimal fraction to float	13
3.9. Fixed point iteration	13
3.10. Divided differences	14
3.11. Lagrange Polinomial	14
4. Algebra	15
4.1. factorization	15
4.2. Sintetic divition	16
4.3. cubic differences	17
4.4. general formula	17
5. Arch Linux	18
5.1. Mantainance	18
5.2. Print in arch linux	18
5.3. configure date and time	19
5.4. Configure wireless	19
5.5. mount devices	20
6. Latex	20
6.1. commonly used special symbols	20
6.2. Greek and Hebrew Letters	21
6.3. math constructs	21
6.4. Delimiters	21
6.5. Variable Sized simbols	22
6.6. binary operation relation symbols	22
6.7. arrow symbols	22
6.8. miscelanious	23
6.9. Matrices	23
7. Differential Calculus	23

8. Integral Calculus	25
9. Trigonometry	26
9.1. Basic Identities	26
9.2. Double Angle	26

1. probability and statistics

$$P(\epsilon^c) = 1 - P(\epsilon)$$

$$P(A \cap B^c) = P(A \setminus B) = P(A) - P(A \cap B)$$



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \cap (B \cup A) = (A \cap B) \cup (A \cap A)$$

$$A \cup (B \cap A) = (A \cup B) \cap (A \cup A)$$

1.1. Independent Events

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$p(A|B) = P(A \cup B) = p(A) * P(B)$$


1.2. morgan laws

$$A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$$

$$A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$$

| = *dadoque*

1.3. separated probabilities



Sean B_k Eventos mutuamente excluyentes, pariticion de S

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + \dots + P(B_k)P(A|B_k!)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_k)$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) * P(A|B_i)}{P(A)}$$

$$P(B_i|A) = \frac{P(B_i) - P(A|B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)P(A|B_k)}$$

$$a^{\Phi(m)} = 1(mod\ m)$$

$$\Phi(p \times q) = (p - 1)(q - 1) \text{ para pq primos}$$

$$\Phi(p_1^{k_1} \times \dots \times p_n^{k_n}) = (p_1^{k_1} - p_1^{k_1-1}) \times \dots \times (p_n^{k_n} - p_n^{k_n-1})$$

2. Ecuaciones Diferenciales

2.1. linearity

$$a_n(x)\frac{d^ny}{dx^n} + \dots + a_1(x)\frac{dy}{dx} + a_0(x)y = f(x)$$

2.2. homogeneous ecuations

given:

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

the ecuation is homogeneous if M and N are homogeneous functions of the same exponent cambio de variable $y = ux$ o $x = uy$, $dy = xdu + udx$ [Subsección 2.3](#)

2.3. homogeneous function of grade n

$$f(tx, ty) = t^n f(x, y)$$

2.4. Exact ED

para ser exacta tiene que cumplir dos condiciones

1. $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$
2. $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$

si no las cumple puedes usar el factor integrante para que cumpla [Subsección 2.8](#)

para resolver toma en cuenta las siguientes dos cosas

$$f(x, y) = \int Mdx + g(y) = \int Ndy + h(x)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M , \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N$$

2.5. Bernouully ecuation

aplica cuando la ecuacion diferencial tiene la siguiente forma:

$$P_0(x)\frac{dy}{dx} + P(x)y = F(x)y^n$$

se hace el cambio de variable $u = y^{1-n}$ y se obtiene una ecuacion lineal

2.6. Ricat Ecuation

tiene la siguiente forma

$$y' = Q(x)y^2 + P(x)y + R(x)$$

se hace la sustitucion $y = y_1 + u^{-1}$

2.7. Cauchy Euler ecuation

se usa para resolver una ecuacion de segundo grado

$$ax^2y'' + bxy' + cy = 0$$

$$y = x^r, \quad x > 0$$

2.8. integrant factor

aplica cuando hay una $f(x, y)$ tal que $f(x, y)(ED) = exacta$

- si $\frac{M_y - N_x}{N}$ es funcion solamente de x entonces $P(x) = \frac{M_y - N_x}{N}$

$f(x) = e^{\int P(x)dx}$ es un factor de integracion

- si $M_y - N_x = m\frac{N}{x} - n\frac{M}{y}$ entonces

$f(x) = x^m y^n$ es un factor de integracion

used by [Elemento 2.4](#)

2.9. Linear differential equations

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = q(x)$$

$$u(x) = e^{\int P(x)dx}$$

$$\text{Sol} = u(x)y = \int u(x)q(x)dx$$

2.10. Order Reduction

aplica cuando conoces una solucion de una ED Lineal homogenea de segundo orden

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1'} dx$$

$$y'' + P(x)y' + q(x)y = 0$$

2.11. Constant coefficients Ecuacion

para poder resolver por este metodo tiene que ser una ecuacion lineal de coeficientes constantes de la forma

$$y''C_1 + y'C_2 + yC_3 = 0$$

se hace la sustitucion

$$y = e^{rx}$$

quedara una funcion cuadratica en terminos de r

se puede llegar a usar la identidad de euler

la solucion queda de la forma:

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$$

tambien puede servir:

$$r = a + bi$$

$$y_1 = C_1 * e^{\alpha x} \cos(bx)$$

$$y_2 = C_2 * e^{\alpha x} \sen(bx)$$

nota: si hay multiplicidad, ejemplo: $(r - 1)^3 = 0$

$$y_h = e^{rx} + xe^{rx} + x^2e^{rx}$$

siendo que $r = 1$ entonces:

$$y_h = e^x + xe^x + x^2e^x$$

2.12. parameter variation

tienen la forma $k_1 y'' + k_2 y' + k_3 y = f(x)$

$$u_1 = - \int \frac{y_2 f(x)}{W} dx \quad u_2 = \int \frac{y_1 f(x)}{W} dx$$

$$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}$$

siendo y_h la solución de la ecuación homogénea asociada

$$y_h = C_1 y_1 + C_2 y_2$$

y siendo y_p la solución definitiva

$$y_p = u_1 y_1 + C_2 y_2$$

2.13. Indeterminate Coefficients

$r(x)$ = polinomio, exponencial, Seno, Coseno

pasos:

1. Calcular y_h es decir calcular la ecuación homogénea relacionada, por coeficientes constantes
2. Encontrar y_p

caso 1 No hay funciones en común con $r(x)$

nota: tomar en cuenta el teorema de superposición de soluciones si

$$r(x) = x^3 + x + 10 \sin 8x$$

simplemente se suman las proposiciones

$$y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D + A \sin(8x) + B \cos(8x)$$

y lo mismo aplica para la multiplicación

- $y'' + C_1 y' + c_2 y = x^3 + x$
proponer $\rightarrow y_p = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$
- $y'' + C_1 y' + c_2 y = 10 \sin 8x$
proponer $\rightarrow y_p = A \sin(8x) + B \cos(8x)$
- $y'' + C_1 y' + c_2 y = 12e^{5x}$
proponer $\rightarrow y_p = Ae^{5x}$

caso 2 hay funciones que coinciden con $r(x)$

simplemente multiplicar la función por x hasta que no haya funciones en común con x pero tiene que ser la x^n más pequeña posible

3. Numerical Calculus

3.1. Taylor Polinomial

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x - x_0)^2}{2!}$$

$$= \sum_{i=0}^n \frac{f^i(x_0)(x - x_0)^i}{i!}$$

3.2. Newton Raphson

$$P_{n+1} = P_n - \frac{f(P_0)}{f'(P_0)}$$

3.3. Complement to one


3.4. complement to two

se cambian 1 por ceros y viceversa

3.5. complemento a dos

de derecha a izquierda y apartir del primer 1 encontrado sin incluirlo se hace la operacion de complemento a uno

3.6. convertir de punto flotante a decimal



Ejemplo:

$$\begin{aligned} & (-1) \times (1 + mantisa) \times 2^{expo-maxExpo} \\ & (-1) \times (1 + 0,75) \times 2^{124-127} \\ & = -0,21875 \end{aligned}$$

3.7. convert decimal to float

Ejemplo:

$$171,25 = 10101011,01$$

Se pasa a una forma con exponente dejando solo un entero

$$1,010101101 \times 2^7$$

El primer bit es de signo

1 = -

$$0 = +$$

Los siguientes 8 numeros son el maximo exponente mas el expo-
nente al que esta elevado el 2

$$127 + 7 = 134$$

se convierte el 134 a base 2

$$134_{10} = 10000110_2$$

y la parte decimal es la mantiza, que queda igual

$$010101101$$

3.8. Convert decimal fraction to float

para convertir de fraccionario a binario primero se convierte la parte entera y la parte fraccionaria se convierte usando el siguiente codigo

Codigo:

```
//se da un flotante de la forma 0.321312 con  
//el numero de digitos a convertir  
//ejemplo  
//in: 0.42344 3  
//out: .001  
string FraccionBinaria(float FraccionDecimal,int NumeroDeDigitos)  
{  
    string ans = ".";  
    for(int i=0;i<NumeroDeDigitos;i++)  
    {  
        FraccionDecimal*=2;  
        if(FraccionDecimal > 1.0)  
        {  
            FraccionDecimal-=1.0;  
            ans.push_back('1');  
        }  
        else  
        {  
            ans.push_back('0');  
        }  
    }  
    return ans;  
}
```

3.9. Fixed point iteration

de una ecuacion se despeja x y se substituye, tomando el resultado anterior empezando desde una x arbitraria

3.10. Divided differences

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f(x_1, x_2) - f(x_0, x_1)}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{f(x_2, x_3) - f(x_0, x_1)}{x_3 - x_0}$$

$$P_n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0) \times \dots \times (x - x_n)$$

j	X_j	$f(X_j)$	1	2
0	X_0	$f(X_0)$	1	1
1	X_1	$f(X_1)$	$f(X_0, X_1)$	1
2	X_2	$f(X_2)$	$f(X_1, X_2)$	$f(X_0, X_1, X_2)$

3.11. Lagrange Polinomial

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) f(x_i)$$

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{(x - x_j)}{(x_i - x_j)}$$

4. Algebra

4.1. factorization

1. common factor
2. common factor by agroupation of terms
3. cubic differences
4. perfect square trinomial
5. trinomial of the form $x^2 + bx + c$
6. trinomial of the form $ax^2 + bx + c$
7. sum and difference of cubes
8. sintetic divition
9. general formula

4.2. Sintetic divition

Example:

$$x^3 - 5x^2 + 2x + 8$$

Taking the divisors of the independent term

$$p = D_8 = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$$

and the divisors of the term with the highest exponent

$$q = D_1 = \{\pm 1\}$$

$$p/q = \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$$

now all the possibilities are in the space p/q that are integers

so:

$$\begin{array}{cccc|l} x^3 & x^2 & x & TI & \\ 1 & -5 & 2 & 8 & \\ & -1 & 6 & -8 & \\ \hline 1 & -6 & 8 & 0 & \end{array} \quad \begin{array}{l} \\ \\ \\ x = -1 \end{array}$$

then:

$$(x^2 - 6x + 8)(x + 1)$$

then:

$$(x + 1)(x - 4)(x - 2)$$

4.3. cubic differences

$$u^3 + 1 = (u^2 - u + 1)(u + 1)$$

$$u^3 - 1 = (u^2 + u + 1)(u - 1)$$

4.4. general formula

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

5. Arch Linux

5.1. Maintenance

```
#check file size  
du -sh .cache/  
#remove a file  
rm -rt .cache/  
#delete what you don't need in .config file
```

specific maintenance:

```
#check the failed systems  
systemctl --failed  
#check the systemd journal  
sudo journalctl -p 3-xb  
#if the system doesn't boots then ctrl+alt+shift the  
#then update mirrors  
#clar chache  
  
#then to update the whole system use:  
sudo pacman -Syyu  
#to check system updates  
sudo pacman -Syu  
#if you wan't to remove all packages in the drive us  
sudo pacman -Scc  
#remove all unwanted dependencies  
paru -Yc  
#remove orphan packages  
sudo pacman -Rns \$(pacman -Qdtq)  
#sudo pacman -Syyy Synchronise data use "mirror1"
```


5.2. Print in arch linux

install packages: usbutils, lsusb, cups
use this to make cups usable

```
sudo systemctl enable cups  
sudo systemctl start cups  
localhost:631
```

```
lp -d HP_Officejey_Pro_8600]
```

5.3. configure date and time

```
hwclock --set --date = "04/32/2021 19:00:00"  
hwclock -hctosys
```

5.4. Configure wireless

#when entering an iso

```
iwctl
```

#then in the ui

#to list all available devices

```
device list
```

#to scan networks

```
station <device> scan
```

#to get newworks

```
station <device> get-network
```

```
#to connect to a network  
station <device> connect "<name of network>"
```

```
#to check if the connection is stable  
ping -c 5 8.8.8.8
```

```
#don't forget before rebooting the iso run  
pacman nmtui
```

dwm basic configuration

```
#MODKEY + shift + q to restart X server  
startx # to start the X server
```

5.5. mount devices

mount usb sticks:

```
#to mount a usb stick  
mount /dev/sdb1 /mnt/<destination folder>  
#to unmount a usb stick  
umount /dev/sdb1
```

mount an android device:

```
#to mount an android device  
simple-mtpfs --device 1 tablet/  
  
#to unmount an android device  
fusermount -u /tablet
```

6. Latex

6.1. commonly used special symbols

use the shortcut created to don't waste time

$\backslash = \backslash \text{textbackslash}$

$| = \backslash \text{textbar}$

$- = \backslash -$

6.2. Greek and Hebrew Letters

α	\backslash alpha	κ	\backslash kappa	ψ	\backslash psi
β	\backslash beta	λ	\backslash lambda	ρ	\backslash rho
χ	\backslash chi	μ	\backslash mu	τ	\backslash tau
ϵ	\backslash epsilon	ϕ	\backslash o	θ	\backslash theta
η	\backslash eta	ω	\backslash omega	υ	\backslash upsilon
γ	\backslash gamma	ϕ	\backslash phi	ξ	\backslash xi
ι	\backslash iota	π	\backslash pi	ζ	\backslash zeta
F	\backslash digamma	Δ	\backslash Delta	Θ	\backslash Theta
ε	\backslash varepsilon	Γ	\backslash Gamma	Υ	\backslash Upsilon
\varkappa	\backslash varkappa	Λ	\backslash Lambda	Ξ	\backslash Xi
φ	\backslash varphi	Ω	\backslash Omega		
ϖ	\backslash varpi	Φ	\backslash Phi	\aleph	\backslash aleph
ϱ	\backslash varrho	Π	\backslash Pi	\beth	\backslash beth
ς	\backslash varsigma	Ψ	\backslash Psi	\daleth	\backslash daleth
ϑ	\backslash vartheta	Σ	\backslash Sigma	\gimel	\backslash gimel

6.3. math constructs

$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	\overline{abc}	<code>\overline{abc}</code>	\overrightarrow{abc}	<code>\overrightarrow{abc}</code>
f'	<code>\f'</code>	\underline{abc}	<code>\underline{abc}</code>	\overleftarrow{abc}	<code>\overleftarrow{abc}</code>
\sqrt{abc}	<code>\sqrt{abc}</code>	\widehat{abc}	<code>\widehat{abc}</code>	\overbrace{abc}	<code>\overbrace{abc}</code>
$\sqrt[n]{abc}$	<code>\sqrt[n]{abc}</code>	\widetilde{abc}	<code>\widetilde{abc}</code>	\underbrace{abc}	<code>\underbrace{abc}</code>

6.4. Delimiters

	—	{	\{	⌊	\lfloor	/	/
	\vert	{	\}	⌋	\rfloor	\	\backslash
	\	<	\langle	⌈	\lceil	[[
	\Vert	>	\rangle	⌋	\rceil]]

use the pair `/lefts` and `/rights`

example:

`\left| expr \right|`

6.5. Variable Sized symbols

\sum	<code>\sum</code>	\int	<code>\int</code>	\biguplus	<code>\biguplus</code>
\prod	<code>\prod</code>	\oint	<code>\oint</code>	\bigcap	<code>\bigcap</code>
\coprod	<code>\coprod</code>	\iint	<code>\iint</code>	\bigcup	<code>\bigcup</code>
\bigoplus	<code>\bigoplus</code>	\bigvee	<code>\bigvee</code>	\bigotimes	<code>\bigotimes</code>
\bigwedge	<code>\bigwedge</code>	\bigodot	<code>\bigodot</code>	\bigsqcup	<code>\bigsqcup</code>

6.6. binary operation relation symbols

\cap	<code>\cap</code>	\cup	<code>\cup</code>
\uplus	<code>\uplus</code>	\sqcup	<code>\sqcup</code>
\sqcap	<code>\sqcap</code>	\wedge	<code>\wedge</code>
\vee	<code>\vee</code>	\equiv	<code>\equiv</code>
\neq	<code>\neq</code>	\simeq	<code>\simeq</code>
\approx	<code>\approx</code>	\doteq	<code>\doteq</code>
\subset	<code>\subset</code>	\because	<code>\because</code>
\sqsubset	<code>\sqsubset</code>	\sqsubseteq	<code>\sqsubseteq</code>
\geq	<code>\geq</code>	\therefore	<code>\therefore</code>

6.7. arrow symbols

\leftarrow	<code>\leftarrow</code>	\Leftarrow	<code>\Leftarrow</code>
\rightarrow	<code>\rightarrow</code>	\Rightarrow	<code>\Rightarrow</code>
\leftrightarrow	<code>\leftrightarrow</code>	\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>
\uparrow	<code>\uparrow</code>	\Uparrow	<code>\Uparrow</code>
\downarrow	<code>\downarrow</code>	\Downarrow	<code>\Downarrow</code>
\updownarrow	<code>\updownarrow</code>	\Updownarrow	<code>\Updownarrow</code>
\nearrow	<code>\nearrow</code>	\searrow	<code>\searrow</code>
\swarrow	<code>\swarrow</code>	\nwarrow	<code>\nwarrow</code>

6.8. miscelanious

∞	<code>\infty</code>	∂	<code>\partial</code>
\cdots	<code>\cdots</code>	\vdots	<code>\vdots</code>
\vdots	<code>\vdots</code>	\ldots	<code>\ldots</code>
\ddots	<code>\ddots</code>	\forall	<code>\forall</code>
\exists	<code>\exists</code>	\nexists	<code>\nexists</code>
\emptyset	<code>\emptyset</code>	\angle	<code>\angle</code>
\angle	<code>\angle</code>	\measuredangle	<code>\measuredangle</code>
\cap	<code>\cap</code>	\cap	<code>\cap</code>
\cap	<code>\cap</code>	\cap	<code>\cap</code>

6.9. Matrices

matrices		
type	latex markup	Renders as
Plain	$\begin{matrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{matrix}$	$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$

$\langle opt \rangle$:

in this part you can specify which kind of matrix you want so you can place p: parenthesis matrix $()$

b: bracket matrix $[]$

B: for braces matrix $\{\}$

v: for pipes matrix $\begin{vmatrix} \end{vmatrix}$

V: for double pipe $\begin{Vmatrix} \end{Vmatrix}$

7. Diferential Calculus

$$(\tan(x))' = \sec^2(x), \quad (\csc(x))' = \csc(x)\cot(x)$$

$$(\sec(x))' = \sec(x)\tan(x), \quad (\cot(x))' = -\csc^2(x)$$

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x}$$

$$(a^x)' = a^x \ln(a) * x'$$

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{g(x)f(x)' - f(x)g(x)'}{(g(x))^2}$$

8. Integral Calculus

9. Trigonometry

9.1. Basic Identities

$$\cos(\alpha) = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sin(x) \cos(y) = \frac{1}{2}[\sin(x + y) + \sin(x - y)]$$

9.2. Double Angle

$$\sin(2\theta) = 2 \sin(\theta) \cos(\theta)$$

$$\cos(2\theta) = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$$

$$\cos(2\theta) = 2 \cos^2 \theta - 1$$