

Tételek: Matematika

Horváth Dávid

2018. május 24.

Tartalomjegyzék

| | |
|---|-----------|
| 1. Halmazok | 5 |
| 1.1. Halmazok, halmazműveletek | 5 |
| 1.2. Halmazműveletek | 7 |
| 1.2.1. Tulajdonságok: | 7 |
| 1.3. Nevezetes ponthalmazok a síkban és a térben | 8 |
| 1.4. Egyéb ponthalmazok | 9 |
| 1.5. Alkalmazások | 11 |
| 2. Racionális és irracionális számok | 12 |
| 2.1. Számhalmazok | 12 |
| 2.2. Műveletek a racionális számok halmazán | 13 |
| 2.3. Műveletek az irracionális számok halmazán | 14 |
| 2.4. Műveleti tulajdonságok a valós számok halmazán | 14 |
| 2.5. Közöséges és tizedes törtek | 14 |
| 2.6. Halmazok számossága | 15 |
| 2.7. Alkalmazások | 16 |
| 3. Oszthatóság | 17 |
| 3.1. Oszthatóság | 17 |
| 3.1.1. Oszthatósági szabályok | 18 |
| 3.2. Prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, osztók száma | 18 |
| 3.3. Számrendszerek | 19 |
| 3.3.1. Áttérés 10-es számrendszerből más alapúba | 20 |
| 3.3.2. Áttérés más alapúból 10-es számrendszerbe | 20 |
| 3.4. Alkalmazások | 20 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Logika | 21 |
| 4.1. A matematikai logika fogalma | 21 |
| 4.2. Logikai műveletek | 21 |
| 4.2.1. Műveleti tulajdonságok | 22 |
| 4.3. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel | 24 |
| 4.4. Alkalmazások | 25 |
| 5. Hatványozás, gyökvonás | 26 |
| 5.1. Pozitív egész kitevőjű hatványok | 26 |
| 5.2. A hatványozás kiterjesztése | 27 |
| 5.3. Az n -edik gyök fogalma | 28 |
| 5.4. A négyzetgyök azonosságai | 28 |
| 5.5. Hatványfüggvények és azok tulajdonságai | 29 |
| 5.6. Négyzetgyökfüggvény és tulajdonságai | 30 |
| 5.7. Alkalmazások | 30 |
| 6. Logaritmus | 32 |
| 6.1. Logaritmus definíciója | 32 |
| 6.2. Logaritmus azonosságai | 32 |
| 6.3. Exponenciális függvény | 33 |
| 6.4. Logaritmusfüggvény | 34 |
| 6.5. Alkalmazások | 35 |
| 7. Egyenlet-megoldási módszerek | 36 |
| 7.1. Egyenlet | 36 |
| 7.2. Egyenlet-megoldási módszerek | 37 |
| 7.3. Ekvivalencia | 38 |
| 7.4. Gyökvesztés | 39 |
| 7.5. Hamis gyök | 39 |
| 7.6. Másodfokú egyismeretlenes egyenlet | 39 |
| 7.7. Alkalmazások | 41 |
| 8. Statisztika | 42 |
| 8.1. Adatsokaságok jellemzői | 42 |

| | |
|---|-----------|
| 8.2. A leíró statisztika jellemzői | 42 |
| 8.3. Diagramok | 43 |
| 8.4. Statisztikai mutatók | 44 |
| 8.4.1. Középértékek | 44 |
| 8.4.2. Szóródás jellemzői | 45 |
| 8.5. Pozitív számok nevezetes közepei | 46 |
| 8.6. Nevezetes közepek alkalmazása szélsőérték-feladatokban | 47 |
| 8.6.1. Összeg állandósága esetén szorzat maximalizálása. | 47 |
| 8.6.2. Szorzat állandósága esetén összeg minimalizálása | 47 |
| 8.7. Alkalmazások | 48 |
| 9. Számsorozatok | 49 |
| 9.1. Számsorozat | 49 |
| 9.2. Sorozatok tulajdonságai | 49 |
| 9.3. Műveletek konvergens sorozatokkal | 51 |
| 9.4. Számtani sorozat | 51 |
| 9.5. Alkalmazások | 52 |
| 10. Mértani sorozat | 53 |
| 10.1. Mértani sorozat | 53 |
| 10.2. Végtelen mértani sor | 54 |
| 10.3. Kamatszámítás | 55 |
| 10.4. Gyűjtőjáradék | 55 |
| 10.5. Törlesztőrészlet | 55 |
| 10.6. Exponenciális folyamatok | 56 |
| 10.7. Alkalmazások | 56 |
| 11. Deriválás | 58 |
| 11.1. Függvény fogalma, értelmezési tartomány, értékkészlet | 58 |

1. fejezet

Halmazok

1.1. Halmazok, halmazműveletek

A halmaz és a halmaz eleme alapfogalom, ezért nem definiáljuk, azonban úgy kell megadjuk, hogy mindenről egyértelműen eldönthető legyen, eleme vagy sem.

A halmazokat nyomtatott nagybetűvel, a halmaz elemeit kisbetűvel jelöljük.

Halmazok megadási módjai:

- Elemek felsorolásával

$$\text{Pl.: } A = \{0; 2; 4; 6\}$$


- Elemeket egyértelműen meghatározó utasítással

$$\text{Pl.: } B = \{\text{páros számok}\}$$

- Szimbólumokkal

$$\text{Pl.: } A = \{x | x^2 > 9\}$$

- Venn-diagrammal



1.1.1. Definíció. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazokat az elemeket tartalmazzák

1.1.2. Definíció. Az elem nélküli halmazt üres halmaznak nevezzük.

Jele: $\{\}$, vagy \emptyset

1.1.3. Definíció. Az A halmaz részhalmaza a B halmaznak, ha A minden eleme a B halmaznak is eleme.

Jele: $A \subseteq B$

1.1.4. Definíció. Az A halmaz valódi részhalmaza a B halmaznak, ha A részhalmaza a B -nek, de nem egyenlő vele.

Jele: $A \subset B$

Tulajdonságok:

- $\emptyset \subseteq A$
- $A \subseteq A$
- $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \implies A = B$
- $A \subseteq B \wedge B \subseteq C \implies A \subseteq C$

1.1.5. Tétel. Az n elemű halmaz összes részhalmazainak száma 2^n .

Bizonyítás. Az n elemű halmaznak $\binom{n}{k}$ darab k elemű részhalmaza van, mert így tudunk n elemből k elemet kiválasztani. Így az összes részhalmazok száma:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \tag{1.1}$$

A binomiális tétel miatt:

$$2^n = (1 + 1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} * 1^k * 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \tag{1.2}$$

Mivel (1.1)=(1.2), ezért a részhalmazok száma 2^n . □

1.2. Halmazműveletek

1.2.1. Definíció. Azt a halmazt, amelynek a vizsgált halmazok részhalmazai, alaphalmaznak vagy univerzumnak nevezzük.

Jele: U vagy H .

1.2.2. Definíció. Egy A halmaz komplementer halmazának az alaphalmaz azon elemeinek halmazát nevezzük, amelyek az A halmaznak nem elemei.

Jele: \overline{A}

1.2.3. Definíció. Két vagy több halmaz uniója azon elemek halmaza, amelyek legalább az egyik halmaznak elemei.

Jele: \cup

1.2.4. Definíció. Két vagy több halmaz metszete azoknak az elemeknek a halmaza, amelyek mindegyik halmaznak elemei.

Jele: \cap

1.2.5. Definíció. A és B halmaz diszjunkt, ha $A \cap B = \emptyset$

1.2.6. Definíció. Az A és B halmaz különbsége az A halmaz azon elemeinek halmaza, amelyek a B halmaznak nem elemei.

Jele: $A \setminus B$

1.2.7. Definíció. Az A és B halmaz szimmetrikus differenciája azon elemek halmaza, melyek csak az egyik halmaznak elemei.

Jele: $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$

1.2.8. Definíció. Az A és B halmaz Descartes-féle szorzata az a halmaz, amelynek elemei az összes olyan rendezett $(a; b)$ pár, amelynél $a \in A$ és $b \in B$.

Jele: $A \times B$

1.2.1. Tulajdonságok:

- Komplementer

$$\overline{\overline{A}} = A$$

- Unió

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cup \overline{A} = U$$

$$A \cup U = U$$

$$A \cup B = B \cup A \quad (\text{Kommutatív})$$

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C) \quad (\text{Asszociatív})$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (\text{Metszetre nézve disztributív})$$

- Metszet

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$A \cap A = A$$

$$A \cap \overline{A} = \emptyset$$

$$A \cap U = A$$

$$A \cap B = B \cap A \quad (\text{Kommutatív})$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C) \quad (\text{Asszociatív})$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \quad (\text{Unióra nézve disztributív})$$

- De-Morgan azonosságok

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

1.3. Nevezetes pontthalmazok a síkban és a térben

1.3.1. Definíció. Azoknak a pontoknak a halmaza a síkon, amelyek a sík egy adott O pontjától adott r távolságra vannak, egy O középpontú, r sugarú kör.

1.3.2. Definíció. Azoknak a pontoknak a halmaza a térben, amelyek a tér adott O pontjától adott r távolságra vannak, egy O középpontú, r sugarú gömb.

1.3.3. Definíció. Adott egyenestől adott távolságra lévő pontok halmaza a síkon az egyenessel párhuzamos egyenespár.

1.3.4. Definíció. Adott egyenestől adott távolságra lévő pontok halmaza a térben olyan hengerfelület, amelynek tengelye az adott egyenes.

1.3.5. Definíció. Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban a két pontot összekötő szakasz felezőmerőleges egyenes.

1.3.6. Definíció. Két ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a térben a két pontot összekötő szakasz felezőmerőleges síkja.

1.3.7. Definíció. A középpárhuzamos a síkban két párhuzamos egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Olyan egyenes, amely a két adott egyenessel párhuzamos és távolságukat felezi.

1.3.8. Definíció. Két metsző egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza az általuk bezárt szögek szögfelező egyenesei. Két ilyen egyenes van, ezek merőlegesek egymásra.

1.3.9. Definíció. Egy egyenestől és egy rajta kívül lévő ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkon a parabola.

Az adott pont a parabola fókuszpontja, az adott egyenes a parabola vezéregyenes (direktrix), a pont és az egyenes távolsága a parabola paramétere.

1.4. Egyéb ponthalmazok

1.4.1. Definíció. Azoknak a pontoknak a halmaza a síkon, amelyeknek a sík két különböző adott pontjától mért távolságösszege az adott pontok távolságánál nagyobb állandó: ellipszis.

A két adott pont az ellipszis fókuszpontjai, az őket összekötő szakasz az ellipszis nagytengelye. A nagytengely felezőmerőlegesének ellipszisen belüli része az ellipszis kistengelye

1.4.2. Definíció. Azoknak a pontoknak a halmaza a síkon, amelyeknek a sík két különböző adott pontjától mért távolságkülönbségének abszolút értéke a két adott pont távolságánál kisebb állandó: hiperbola.

A két pont a hiperbola fókuszpontjai, az őket összekötő szakasz, a hiperbola főtengelye.

1.4.3. Tétel. *Három adott ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkon egy pont, ha a 3 pont nem esik egy egyenesre, vagy üres halmaz, ha a 3 pont egy egyenesre esik.*

1.4.4. Tétel. *A háromszög három oldalfelező merőlegese egy pontban metszi egymást.*

1.4.5. Tétel. *A háromszög oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja a háromszög köré írt kör középpontja. Ez a pont hegyesszögű háromszögnél a háromszögön belül, derékszögűnél az átfogó felezőpontjában, míg tompaszögűnél a háromszögön kívül található.*

1.4.6. Tétel. *Három adott ponttól egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a térben egy olyan egyenes, amely áthalad a három pont, mint háromszög köré írható kör középpontján, és merőleges a 3 pont síkjára, ha a 3 pont nem esik egy egyenesbe, vagy üres halmaz, ha a 3 pont egy egyenesbe esik.*

1.4.7. Tétel. *Három egyenstől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkon:*

- *Üres halmaz, ha a három egyenes párhuzamos.*
- *Ha 2 egyenes párhuzamos, egy pedig metszi őket, akkor a 2 párhuzamos egyenes középpárhuzamosán két olyan pont, amelyek illeszkednek két metsző egyenes szögfelezőire.*
- *Ha a 3 egyenes 3 különböző pontban metszi egymást, akkor szögfelező egyeneseik metszéspontjai. 4 ilyen pont van, az egyik a háromszög beírt körének, 3 pedig a háromszög hozzáírt köreinek középpontja.*
- *Ha a 3 egyenes egy pontban metszi egymást, akkor egyetlen pont, a 3 egyenes metszéspontja.*

1.4.8. Definíció. A látókörivek azon pontoknak a halmaza a síkon, amelyekből egy adott szakasz adott a szögben ($0^\circ < \alpha < 180^\circ$) látszik. Két, a szakasz egyenesére szimmetrikusan elhelyezkedő körív.

1.5. Alkalmazások

- A függvényekkel kapcsolatban is használjuk a halmazokat (értelmezési tartomány, értékkészlet).
- Egyenletek értelmezési tartományának vizsgálatakor számhalmazok metszetét képezzük.
- Koordináta-geometriában a kör, a parabola, az ellipszis és a hiperbola egyenletének felírásakor az adott görbe definícióját használjuk fel.

2. fejezet

Racionális és irracionális számok

2.1. Számhalmazok

2.1.1. Definíció. A természetes számok halmaza (\mathbb{N}) a pozitív egész számokból és a 0-ból áll.

Zárt az összeadásra, és a szorzásra nézve, azonban a kivonásra és az osztásra nem. Pl.:

$$3 - x = 5$$

2.1.2. Definíció. Az egész számok halmaza (\mathbb{Z}) a természetes számokból és azok elmentettjeiből áll.

Zárt a kivonásra nézve is, azonban az osztásra nem. Pl.:

$$2x + 3 = 4$$

2.1.3. Definíció. A racionális számok halmaza (\mathbb{Q}) azokból a számokból áll, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként, azaz $\frac{a}{b}$ alakban, ahol $a, b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0$.

Mind a négy alpműveletre nézve zárt, de létezik egyenlet, amelynek nincs megoldása a halmazon, pl.:

$$2x^2 - 3 = 0$$

2.1.4. Definíció. Azokat a számokat, amelyek nem írhatók fel két egész szám hányadosaként, irracionális számoknak (\mathbb{Q}^*) nevezzük.

Az irracionális számok halmaza nem zárt a négy alpműveletre, tizedes tört alakjuk végtelen nem szakaszos tizedes tört.

2.1.5. Definíció. A racionális és az irracionális számok halmaza diszjunkt halmazok, uniójuk a valós számok halmaza (\mathbb{R}).

A valós számok halmaza zárt a négy alpműveletre.

2.1.6. Tétel. $\sqrt{2}$ irracionális szám.

Bizonyítás. A bizonyítás indirekt módon történik. Tegyük fel, hogy

$$\sqrt{2} = \frac{a}{b} \quad a \wedge b \in \mathbb{Z} \wedge b \neq 0 \wedge (a; b) = 1 \quad (2.1)$$

Ebből következik, hogy:

$$2 = \frac{a^2}{b^2} \implies a^2 = 2b^2 \quad (2.2)$$

Az egyenlet jobb oldalán szereplő szám prímtényezős felbontásában a 2 páros kitevőn szerepel, míg a bal oldalon levő szám prímtényezős felbontásában a 2 kitevője páratlan.

Ez azonban lehetetlen, hiszen a számelmélet alaptétele szerint egy pozitív egész számnak nincs két lényegesen különböző felbontása.

Emiatt (2.1) hamis, vagyis $\sqrt{2}$ irracionális. \square

2.2. Műveletek a racionális számok halmazán

Egy közönséges tört értéke nem, csak az alakja változik, ha a számlálóját és a nevezőjét ugyanazzal a 0-tól különböző számmal szorozzuk (bővítés), vagy ugyanazzal a 0-tól különböző számmal osztjuk (egyszerűsítés).

Ha a racionális számok közönséges tört alakúak, akkor a következő szabályokkal lehet elvégezni az alpműveleteket:

- Csak azonos nevezőjű törtet lehet összeadni, kivonni, ezért a törtet bővítjük egy közös többszörösű nevezőre:

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{a * d}{b * d} \pm \frac{c * b}{d * b} = \frac{a * d \pm c * b}{b * d} \quad \text{Ahol } b \wedge d \neq 0$$

- Törtet törttel úgy szorzunk, hogy a számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel szorozzuk:

$$\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{a * c}{b * d} \quad \text{Ahol } b \wedge d \neq 0$$

- Törtet törttel úgy osztunk, hogy a változatlan osztandót szorozzuk az osztó reciprokával:

$$\frac{a}{b} : \frac{c}{d} = \frac{a}{b} * \frac{d}{c} = \frac{a * d}{b * c} \quad \text{Ahol } b \wedge d \neq 0$$

2.3. Műveletek az irracionális számok halmazán

Az alapl műveletek definiálhatók az irracionális számok körében úgy, hogy az eddigi azonosságok életben maradjanak. Mivel tizedestört alakjuk végtelen, nem periodikus, így azt csak közelítően tudjuk megadni. Ezért a pontos értékeket pl. hatvány, gyök, logaritmus alakban adjuk meg, ilyenkor viszont a megfelelő műveleti szabályokkal dolgozunk.

2.4. Műveleti tulajdonságok a valós számok halmazán

- Az összeadás és a szorzás kommutatív
- Az összeadás és a szorzás asszociatív
- A szorzás az összeadásra nézve disztributív

2.5. Közöséges és tizedes törtek

Az $\frac{a}{b}$ hányados a következő alakokban fordulhat elő ($a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, (a; b) = 0$):

- Egész szám, ha $b \mid a$
- Véges tizedestört, ha b prímtényezős felbontásában a 2 és az 5 számokon kívül nincs más prímszám
- Végtelen szakaszos tizedestört, ha b prímtényezős felbontásában a 2 és az 5 számokon kívül más prímszám is van.

A tizedestörtek formái lehetnek:

- véges tizedestörtek
- végtelen tizedestörtek, ezek lehetnek
 - szakaszos tizedestörtek, ezek felírhatók közöséges tört alakban. Pl. végtelen mértani sor összegeként.
 - nem szakaszos tizedestörtek, ezek nem írhatók át közöséges tört alakba

2.6. Halmazok számossága

2.6.1. Definíció. Egy A halmaz számossága az A halmaz elemeinek számát jelenti. Jele: $|A|$. Egy halmaz számossága lehet véges vagy végtelen.

2.6.2. Definíció. Egy halmaz véges halmaz, ha elemeinek számát egy természetes számmal megadhatjuk. Ellenkező esetben végtelen halmazról beszélünk. Végtelen halmazok számosságát \aleph -el jelöljük.

2.6.3. Definíció. A pozitív természetes számokkal megegyező számosságú halmazokat megszámlálhatóan végtelen halmazoknak nevezzük. Jele: \aleph_0 .

Megszámlálhatóan végtelen számosságúak: egész számok, páros számok, négyzet-számok, racionális számok.

2.6.4. Tétel. *A valós számok halmazának számossága nem egyezik meg a pozitív természetes számok halmazának számosságával.*

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a valós számok halmaza megszámlálhatóan végtelen számosságú, azaz sorba rendezhetőek. Ekkor a 0, és 1 közötti valós számok is sorba rendezhetőek. Bizonyításomban csak ezekkel a számokkal fogok foglalkozni, mivel ha nem rendezhetőek sorba, akkor a valós számok sem. Képezzünk egy számot a következő módon:

- Egészrészre 0
- Az első valós szám első tizedesjegyétől, a második második tizedesjegyétől, ... eggyel eltér

Ez a szám nem egyezik egyik sorba rendezett számmal sem, emiatt nem rendezhetőek sorba. Azaz a valós számok halmazának számossága nem egyezik meg a pozitív természetes számok halmazának számosságával. \square

2.6.5. Definíció. A valós számok számosságával megegyező számosságú halmazokat nem megszámlálhatóan végtelen vagy kontinuum számosságú halmazoknak nevezzük. $\aleph_{\mathbb{R}} = 2^{\aleph_0}$

Pl.: irracionális számok halmaza, számegegyenes pontjainak halmaza, intervallum pontjainak halmaza.

2.7. Alkalmazások

- Racionális számok: arányok, arányosság, hasonlóság
- Irracionális számok: szabályos háromszög magassága, négyzet átlója, kör kerülete, területe.
- Kifejezések legbővebb értelmezési tartományának meghatározása.
- Függvény értékkészletének megállapítása

3. fejezet

Oszthatóság

3.1. Oszthatóság

3.1.1. Definíció. Egy a egész szám osztója egy b egész számnak, ha található olyan c egész szám, amelyre $a * c = b$. Jelölése: $a|b$. Ebben az esetben az is igaz, hogy b osztható a -val és c -vel. Ekkor azt is mondhatjuk, hogy b többszöröse a -nak.

- A 0 minden nemnulla egész számnak többszöröse, azaz a 0 minden nemnulla egész számmal osztható. Ez azt is jelenti, hogy a 0 páros. A 0-nak egyetlen többszöröse van a 0.
- A 0 nem osztója egyetlen nemnulla egész számnak sem.

3.1.2. Tétel (Oszthatósági tételek). *Ha $a, b, c \in \mathbb{Z}$*

- $1|a$
- $a|a$
- $a|b \wedge b|c \implies a|c$
- $a|b \implies a|(b * c)$
- $a|b \wedge a|c \implies a|(b \pm c)$
- $a|b \wedge a|(b + c) \implies a|c$

Az oszthatóságot eddig az egész számokra értelmeztük, a továbbiakban leszűkítjük a természetes számokra.

3.1.3. Tétel. Ha $a, b \in \mathbb{Z}^+$, $a|b \wedge b|a \implies a = b$

3.1.1. Oszthatósági szabályok

Egy n egész szám osztható

- 2-vel, ha n utolsó jegye 0, 2, 4, 6, vagy 8.
- 3-mal, ha számjegyeinek összege osztható 3-mal
- 4-gyel, ha a két utolsó jegyből képzett szám osztható 4-gyel.
- 5-tel, ha utolsó jegye 0, vagy 5.
- 6-tal, ha 2-vel és 3-mal osztható.
- 7-tel, ha $10x + y$ alakú, és $x - 2y$ osztható 7-tel, ahol $x, y \in \mathbb{N}$
- 8-cal, ha a három utolsó jegyből képzett szám osztható 8-cal.
- 9-cel, ha számjegyeinek összege osztható 9-cel.
- 10-zel, ha utolsó jegye 0.

3.2. Prímszám, összetett szám, számelmélet alaptétele, osztók száma

3.2.1. Definíció. Azokat a pozitív egész számokat, amelyeknek pontosan két pozitív osztója van, prímszámoknak nevezzük.

3.2.2. Tétel. Végtelen sok prímszám van.

Bizonyítás. Indirekt módon: Tegyük fel, hogy n db prímszám van, az i -ediket jelölje: p_i . Képezzük az $A = \prod_{i=1}^n (p_i) + 1$ számot.

Ennek a felsorolt prímekek egyike sem osztója. Két lehetőség van, vagy A prím, vagy létezik olyan prím, amit nem soroltunk fel. Mindkét esetben ellentmondásra jutottunk, tehát végtelen sok prímszám van. □

3.2.3. Definíció. Azokat az 1-nél nagyobb számokat, amelyek nem prímszámok, összetett számoknak nevezzük.

3.2.4. Tétel (Számelmélet alaptétele). *Bármely összetett szám felírható prímszámok szorzataként, és ez a felbontás a tényezők sorrendjétől eltekintve egyértelmű.*

Kanonikus alak: $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$, ahol p_i prímszám, α_i nemnegatív egész szám. Ekkor az n szám prímosztói: p_1, p_2, \dots, p_k .

3.2.5. Tétel. $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ osztóinak száma: $\prod_{i=1}^k (\alpha_i + 1)$

3.2.6. Definíció. Két vagy több pozitív egész szám legnagyobb közös osztója a közös osztók közül a legnagyobb. Jele: $(a; b)$.

Előállítás: a számok prímtényezős alakjában, a közös prímtényezőket a hozzájuk tartozó legkisebb kitevővel vesszük és összeszorozzuk.

$$\left(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}; \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \right) = \prod_{i=1}^k p_i^{\min(\alpha_i, \beta_i)}$$

3.2.7. Definíció. Ha két pozitív egész szám legnagyobb közös osztója 1, akkor a két szám relatív prím.

3.2.8. Definíció. Két vagy több pozitív egész szám legkisebb közös többszöröse a közös többszörösök közül a legkisebb. Jele: $[a; b]$.

Előállítás: felírjuk a számok prímtényezős alakját, az összes prímtényezőt a hozzájuk tartozó legnagyobb kitevővel vesszük és összeszorozzuk.

$$\left(\prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}; \prod_{i=1}^k p_i^{\beta_i} \right) = \prod_{i=1}^k p_i^{\max(\alpha_i, \beta_i)}$$

$$(a; b) * [a; b] = a * b$$

3.3. Számrendszerek

3.3.1. Definíció. Az a alapú számrendszer helyi értékei: a^k , ahol $k \in \mathbb{N}$. Az a alapú számrendszerben a-féle számjegy van: $0, 1, \dots, a-1$, ha $a > 10$, betűket használunk számjegyként.

A helyi értékes ábrázolás azt jelenti, hogy a számjegyek értékén kívül a leírásuk helye is értékkel bír. Általában 10-es számrendszerben dolgozunk, a helyi értékek 10 természetes kitevőjű hatványai, a számok leírására 10 számjegyre van szükség. Az informatikában gyakran használják a 2-es, vagyis bináris, és a 16-os, azaz hexadecimális számrendszert.

3.3.1. Áttérés 10-es számrendszerből más alapúba

A számot osztjuk az új számrendszer alapszámával, majd az így kapott hányadost újra mindaddig, míg 0 hányadost nem kapunk. Az osztásoknál kapott maradékok lesznek az új szám alaki értékei az egyesektől kezdve.

3.3.2. Áttérés más alapúból 10-es számrendszerbe

A megfelelő helyi értékeknek és a hozzájuk tartozó alaki értékeknek a szorzatösszege adja a 10-es számrendszerbeli értéket.

3.4. Alkalmazások

- Legnagyobb közös osztó: törtek egyszerűsítése
- Legkisebb közös többszörös: törtek közös nevezőre hozása
- Kétismeretlenes egyenlet megoldása a természetes számok halmazán

4. fejezet

Logika

4.1. A matematikai logika fogalma

A matematikai logika a gondolkodás matematikai formában kifejezhető, matematikai eszközökkel vizsgálható összefüggéseinek, törvényeinek feltárásával foglalkozik. Fő feladata a következtetések helyességének vizsgálata.

4.2. Logikai műveletek

4.2.1. Definíció (Állítás). Olyan kijelentő mondat, amelyről egyértelműen el lehet dönteni, hogy igaz vagy hamis.

4.2.2. Definíció. Az igaz és a hamis a kijelentés logikai értéke.

Ha az A állítás igaz, a B állítás hamis, akkor $|A| = i$ és $|B| = h$. Az igaz értéket szokták 1-gyel, a hamisat 0-val jelölni.

4.2.3. Definíció. A kijelentéseket összekapcsolhatjuk. Azokat a kijelentéseket, amelyeket más kijelentésekből lehet előállítani, összetett kijelentéseknek nevezzük.

4.2.4. Definíció. Ha az összetett kijelentések logikai értéke csak az öt alkotó állítások logikai értékétől és az előállítás módjától függ, akkor logikai műveletekről beszélünk.

Logikai műveleteket igazságtábla segítségével végezhetünk el.

4.2.5. Definíció. Az állítás tagadása egyváltozós művelet. Egy A kijelentés negációja az a kijelentés, amely akkor igaz, ha A hamis és akkor hamis, ha A igaz. Jele: \overline{A} vagy $\neg A$.

4.2.6. Tétel (Kettős tagadás törvénye). *Egy állítás tagadásának tagadása az állítás:*
 $\neg\neg A = A$.

4.2.7. Tétel (Ellentmondásmentesség elve). *Egy állítás és tagadása nem lehet egyszerre igaz.*

4.2.8. Tétel (A harmadik kizárásának elve). *Egy állítás és tagadása nem lehet egyszerre hamis.*

4.2.9. Definíció. Két, A-tól és B-től függő állítás akkor egyenlő, ha A és B minden lehetséges logikai értékére a két állítás igazságértéke egyenlő.

4.2.10. Definíció (Diszjunkció (megengedő vagy)). Két kijelentés diszjunkciója pontosan akkor igaz, ha legalább az egyik kijelentés igaz, különben hamis. Jele: $A \vee B$.

4.2.11. Definíció (Antivalencia (kizáró vagy)). Két kijelentés antivalenciája pontosan akkor igaz, ha pontosan az egyik kijelentés igaz, különben hamis. Jele: $A \oplus B$.

4.2.12. Definíció (Konjunkció (és)). Két kijelentés konjunkciója pontosan akkor igaz, ha mindkét kijelentés igaz, különben hamis. Jele: $A \wedge B$.

4.2.13. Definíció (Implikáció (következtetés)). A „ha A, akkor B” kapcsolatnak megfelelő logikai művelet. Logikai értéke pontosan akkor hamis, ha A igaz és B hamis, különben igaz. Az A állítást feltételnek, B-t következménynek nevezzük. Jele: $A \rightarrow B$

4.2.14. Definíció (Ekvivalencia). Az „A akkor és csak akkor B” kapcsolatnak megfelelő logikai művelet. Logikai értéke pontosan akkor igaz, ha A és B logikai értéke azonos, különben hamis. Jele: $A \leftrightarrow B$

Ha $A \leftrightarrow B$ igaz, akkor A és B állítások ekvivalensek egymással.

4.2.1. Műveleti tulajdonságok

- Diszjunkció

$$A \vee A = A$$

$$A \vee \neg A = i$$

$$A \vee B = B \vee A \quad (\text{Kommutatív})$$

$$(A \vee B) \vee C = A \vee (B \vee C) \quad (\text{Asszociatív})$$

$$A \vee (B \wedge C) = (A \vee B) \wedge (A \vee C) \quad (\text{Konjunkcióra nézve disztributív})$$

- Konjunkció

$$A \wedge A = A$$

$$A \wedge \neg A = h$$

$$A \wedge B = B \wedge A \quad (\text{Kommutatív})$$

$$(A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C) \quad (\text{Asszociatív})$$

$$A \wedge (B \vee C) = (A \wedge B) \vee (A \wedge C) \quad (\text{Diszjunkcióra nézve disztributív})$$

4.2.15. Tétel. *Tetszőleges A és B kijelentésekre $A \rightarrow B = \neg A \vee B$.*

Bizonyítás. Igazságtáblázattal:

| A | B | $A \rightarrow B$ | $B \rightarrow A$ | $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ | $A \leftrightarrow B$ |
|---|---|-------------------|-------------------|--|-----------------------|
| i | i | i | i | i | i |
| i | h | h | i | h | h |
| h | i | i | h | h | h |
| h | h | i | i | i | i |

Az ötödik oszlop igazságértékei megegyeznek az ekvivalencia igazságértékeivel, tehát az egyenlőség A és B minden lehetséges logikai értékére fennáll, azaz azonosság. \square

4.3. Állítás és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel

- $A \rightarrow B = i$
 - A állítás B-nek elégséges feltétele
 - B állítás A-nak szükséges feltétele
 - Ha A igazságáról B igazságára következtetünk: helyes következtetés
- $A \rightarrow B = h$
 - Elég egy példa $A=h, B=i$
 - Ha A igazságáról B igazságára következtetünk: helytelen következtetés
- $A \rightarrow B = i \wedge B \rightarrow A = i$
 - A állítás B-nek szükséges és elégséges feltétele
 - $A \Leftrightarrow B$
 - A és B ekvivalensek
- Feltételek, következmények megcserélése: állítás megfordítása ($B \rightarrow A$)
 - Állítás, és megfordítása igaz: két állítás ekvivalens
 - * Pl.: Thalész-tétel, Pitagorasz tétel

4.3.1. Tétel (Thalész-tétel). *Ha egy kör átmérőjének két végpontját összekötjük a kör bármely más pontjával, akkor derékszögű háromszöget kapunk.*

4.3.2. Tétel (Thalész-tétel megfordítása). *Ha egy háromszög derékszögű, akkor köré írható körének középpontja az átfogó felezőpontja.*

4.3.3. Tétel (Pithagorasz-tétel). *Ha egy háromszög derékszögű, akkor a befogók négyzetének összege egyenlő az átfogó négyzetével.*

4.3.4. Tétel (Pithagorasz-tétel megfordítása). *ha egy háromszög két oldalhosszának négyzetének összege egyenlő a harmadik oldal négyzetével, akkor a háromszög derékszögű.*

4.4. Alkalmazások

- Matematikai definíciók, tételek pontos kimondása, tételek bizonyítása
- Bizonyítási módszerek kidolgozása (direkt, indirekt, skatulya elv, teljes indukció)
- Kombinatorika, valószínűségszámítás használja a logikai műveleteket és azok tulajdonságait.
- Egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása során sokszor végzünk logikai műveleteket (ekvivalens átalakítások).

5. fejezet

Hatványozás, gyökvonás

5.1. Pozitív egész kitevőjű hatványok

5.1.1. Definíció. Ha a tetszőleges valós szám és n 1-nél nagyobb természetes szám, akkor a^n hatvány azt az n tényezős szorzatot jelenti, amelynek minden tényezője a . Ha $n=1$, $a^1 = a$.

Az a számot a hatvány alapjának, az n számot a hatvány kitevőjének nevezzük.

5.1.2. Tétel. *Azonos alapú hatványokat úgy is szorozhatunk, hogy a közös alapot a kitevők összegére emeljük:*

$$a^m * a^n = a^{m+n}$$

5.1.3. Tétel. *Azonos alapú hatványokat úgy is oszthatunk, hogy a közös alapot a kitevők különbségére emeljük:*

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \text{ ha } a \neq 0, m > n$$

.

5.1.4. Tétel. *Szorzatot tényezőnként is hatványozhatunk:*

$$(a * b)^n = a^n * b^n$$

5.1.5. Tétel. *Azonos kitevő hatványokat úgy is szorozhatunk, hogy az alapok szorzatát a közös kitevőre emeljük.*

5.1.6. Tétel. *Törtet úgy is hatványozhatunk, hogy a számlálót és a nevezőt külön-külön hatványozzuk és a kapott hatványoknak a kívánt sorrendben a hányadosát vesszük.*

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \text{ ha } b \neq 0$$

5.1.7. Tétel. *Azonos kitevőjű hatványokat úgy is oszthatunk, hogy az alapok hányadosát a közös kitevőre emeljük.*

5.1.8. Tétel. *Hatványt úgy is hatványozhatunk, hogy az alapot a kitevők szorzatára emeljük:*

$$(a^n)^m = a^{n*m}$$

5.2. A hatványozás kiterjesztése

5.2.1. Definíció (Permanencia-elv). A hatványozás fogalmát úgy terjesztjük ki, hogy az eddigi azonosságok továbbra is teljesüljenek.

5.2.2. Definíció. Tetszőleges $a \neq 0$ valós számra $a^0 = 1$.

0^0 -t nem értelmezzük, mert:

- 0 kéne, hogy legyen, mivel 0 minden pozitív egész kitevő hatványa 0
- 1 kéne, hogy legyen, mivel minden egyéb szám nulladik hatványa 1

5.2.3. Definíció. Tetszőleges $a \neq 0$ valós szám és n pozitív egész szám esetén $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$

5.2.4. Definíció. Az a pozitív valós szám $\frac{p}{q}$ -adik hatványa az a pozitív valós szám, amelynek q -adik hatványa a^p , azaz $\left(a^{\frac{p}{q}}\right)^q = a^p$.

Ebből következik, hogy $a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p}$

5.2.5. Definíció. Az a pozitív valós szám α irracionális kitevőjű hatványa, a^α a következő határérték: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$, ahol r_n egy olyan számsorozat, mely racionális számokból áll, és $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \alpha$.

5.3. Az n -edik gyök fogalma

5.3.1. Definíció. Egy a valós szám $(2k+1)$ -edik ($k \in \mathbb{N}^+$) gyökén azt a valós számot értjük, amelynek $(2k+1)$ -edik hatványa a .

$$\left(\sqrt[2k+1]{a}\right)^{2k+1} = a, \text{ ahol } k \in \mathbb{N}^+$$

5.3.2. Definíció. Egy nemnegatív a valós szám $2k$ -adik ($k \in \mathbb{N}^+$) gyökén azt a nemnegatív valós számot értjük, amelynek $2k$ -adik hatványa a .

$$\left(\sqrt[k]{a}\right)^k = a, \text{ ahol } a \geq 0, \sqrt[k]{a} \geq 0, k \in \mathbb{Z}^+$$

5.3.3. Definíció. Egy nemnegatív valós a szám négyzetgyökén azt a nemnegatív valós számot értjük, amelynek négyzete a .

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a, \text{ ahol } a \geq 0, \sqrt{a} \geq 0$$

A definíciókból következően:

$$\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & \text{ha } n \text{ páros} \\ a, & \text{ha } n \text{ páratlan} \end{cases}$$

5.4. A négyzetgyök azonosságai

5.4.1. Tétel. $\sqrt{a * b} = \sqrt{a} * \sqrt{b}$, ha a, b nemnegatív valós számok. Szorzat négyzetgyöke egyenlő a tényezők négyzetgyökének szorzatával. Tehát szorzatból tényezőnként vonhatunk gyököt.

Bizonyítás. Vizsgáljuk mindkét oldal négyzetét:

$$\begin{aligned} \left(\sqrt{a * b}\right)^2 &= a * b \\ \left(\sqrt{a} * \sqrt{b}\right)^2 &= (\sqrt{a})^2 * (\sqrt{b})^2 = a * b \end{aligned}$$



Ha mindkét oldal értelmes, vagyis a, b nemnegatív, akkor a két oldal négyzetének egyenlőségéből következik a két oldal egyenlősége, mivel $a * b \geq 0$, ha $a \geq 0 \wedge b \geq 0$ \square

5.4.2. Tétel. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$, ha a, b nemnegatív valós számok, $b \neq 0$. Tört négyzetgyöke egyenlő a számláló és a nevező négyzetgyökének hányadosával.

5.4.3. Tétel. $\sqrt{a^k} = (\sqrt{a})^k$, ha k egész, $a > 0$ valós szám. A hatványozás és a gyökvonás sorrendje felcserélhető egymással pozitív alap esetén.

5.5. Hatványfüggvények és azok tulajdonságai

5.5.1. Definíció (Hatványfüggvény). Az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^n$ függvényt, ahol $n \in \mathbb{N}^+$, hatványfüggvénynek nevezzük. Értelmezhető az $n = 0$ esetre is, de ettől most eltekintünk.


| Kitevő | Páros | Páratlan |
|------------------------|---|---|
| Ábrázolás |  |  |
| Értelmezési tartománya | \mathbb{R} | \mathbb{R} |
| Értékkészlete | $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$ | \mathbb{R} |
| Monotonitása | ha $x < 0$, szigorúan monoton csökken, ha $x > 0$, szigorúan monoton nő | szigorúan monoton nő |
| Szélsőértéke | abszolút minimum: hely: $x = 0$, érték: $f(x) = 0$ | nincs |
| Görbülete | konvex | ha $x < 0$, akkor konkáv, ha $x > 0$, akkor konvex |
| Zérushelye | $x=0$ | $x=0$ |
| Paritása | páros | páratlan |
| Korlátosság | alulról korlátos | nem korlátos |
| Invertálhatóság | invertálható, ha $x \geq 0$, $f^{-1} : (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ | invertálható, $f^{-1} : (\mathbb{R}^+ \cup \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \sqrt[n]{x}$ |

Ha $n=1$, akkor a függvény nem konvex, és nem konkáv. Folytonosak, minden pontban differenciálhatóak, minden korlátos intervallumon integrálhatóak.

5.6. Négyzetgyökfüggvény és tulajdonságai

5.6.1. Definíció. Az $f : (\mathbb{R}^+ \cup 0) \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$ függvényt négyzetgyökfüggvénynek nevezzük.

- Jellemzés



- Értelmezési tartomány: $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
- Értékkészlet: $\mathbb{R}^+ \cup \{0\}$
- Szigorúan monoton nő
- Abszolút minimum helye: $x = 0$, értéke: $f(x) = 0$
- Konkáv
- Zérushely: $x = 0$
- Nem páros, nem páratlan
- Alulról korlátos
- Invertálható, inverze: $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$

5.7. Alkalmazások

- Hatványozás

- Normálalak: egyszerűbb kis, nagy számokkal való számolás

- Számrendszerek felépítése hatványozáson alapul
- Ismétléses variációk száma: n^k
- Négyzetes úttörvény: $s = \frac{a}{2} * t^2$
- Binomiális eloszlás
- Gyökvonás
 - Magasabb fokú egyenletek megoldása
 - l hosszú fonálinga lengésideje: $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$
 - h magasságból szabadon eső test sebessége: $v = \sqrt{2gh}$
 - Kamatos kamatnál a kamattényező kiszámítása
 - Harmonikus rezgőmozgás körfrekvenciájának kiszámítása

6. fejezet

Logaritmus

6.1. Logaritmus definíciója

6.1.1. Definíció. $\log_a b$ (a alapú logaritmus b) az az egyetlen valós kitevő, melyre a -t emelve b -t kapunk: $a^{\log_a b} = b$ ($a > 0$, $b > 0$, $a \neq 0$). Elnevezések: a = logaritmus alapja, b = hatványérték.

Ha az alap 10, akkor a jelölés: $\lg x$, ha e , akkor $\ln x$.

6.2. Logaritmus azonosságai

6.2.1. Tétel. *Szorzat logaritmusa egyenlő a tényezők logaritmusának összegével:*

$$\log_a(x * y) = \log_a x + \log_a y, \text{ ahol } x, y > 0, a > 0, a \neq 1$$

6.2.2. Tétel. *Tört logaritmusa megegyezik a számláló és a nevező logaritmusának különbségével:*

$$\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y, \text{ ahol } x, y > 0, a > 0, a \neq 1$$

6.2.3. Tétel. *Hatvány logaritmusa az alap logaritmusának és a kitevőnek a szorzata:*

$$\log_a x^k = k * \log_a x, \text{ ahol } x > 0, a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{R}$$

6.2.4. Tétel (Áttérés más alapú logaritmusra).

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}, \text{ ahol } a, b, c > 0, a, c \neq 1$$

Bizonyítás. A logaritmus definíciója miatt: $b = a^{\log_a b}$. Ezzel:

$$\log_c b = \log_c \left(a^{\log_a b} \right) = \log_a b * \log_c a$$

Ezt $\log_c a$ -val osztva, mivel az a feltételek miatt nem lehet nulla:


$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

□

6.3. Exponenciális függvény


6.3.1. Definíció. Az $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = a^x$ ($a > 0$) függvényt exponenciális függvénynek nevezzük. $a=1$ esetén az exponenciális függvény konstans: $f(x) = 1^x = 1$.

- $0 < a < 1$



- Értelmezési tartomány: \mathbb{R}
- Értékkészlet: \mathbb{R}^+
- Szigorúan monoton csökken
- Szélsőértéke nincs
- Konvex
- Zérushelye nincs
- Nem páros, nem páratlan
- Alulról korlátos
- Invertálható, inverze: $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \log_a x$

- $0 < a < 1$





- Értelmezési tartomány: \mathbb{R}
- Értékkészlet: \mathbb{R}^+
- Szigorúan monoton nő
- Szélsőértéke nincs
- Konvex
- Zérushelye nincs
- Nem páros, nem páratlan
- Alulról korlátos
- Invertálható, inverze: $f^{-1} : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f^{-1}(x) = \log_a x$

- Folytonos, differenciálható, integrálható

6.4. Logaritmusfüggvény

6.4.1. Definíció. Az $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \log_a x$, ($a > 0$, $a \neq 1$) függvényt logaritmusfüggvénynek nevezzük.

| A függvény | $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \log_a x,$ $0 < a < 1$ esetben | $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g(x) = \log_a x,$ $1 < a$ esetben |
|-------------------------|--|--|
| ábrázolása: |  |  |
| értelmezési tartománya: | pozitív valós számok halmaza: \mathbb{R}^+ | pozitív valós számok halmaza: \mathbb{R}^+ |
| értékkészlete: | valós számok halmaza: \mathbb{R} | valós számok halmaza: \mathbb{R} |
| monotonitása: | szigorúan monoton csökken | szigorúan monoton nő |
| szélsőértéke: | nincs | nincs |
| görbülete: | alulról konvex | alulról konkáv |
| zérushelye: | $x = 1$ | $x = 1$ |
| paritása: | nincs: nem páros, nem páratlan | nincs: nem páros, nem páratlan |
| korlátosság: | nem korlátos | nem korlátos |
| Invertálhatóság: | invertálható: inverze az $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f^{-1}(x) = a^x$ ($0 < a < 1$) függvény | invertálható: inverze az $g^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g^{-1}(x) = a^x$ ($1 < a$) függvény |

Folytonos, differenciálható, integrálható

6.5. Alkalmazások

- Exponenciális egyenletek megoldása
- A levegő szerűsége a magassággal exponenciálisan csökken
- A Richter-skála logaritmus alapú
- Exponenciális függvény írja le a radioaktív izotópok bomlását

7. fejezet

Egyenlet-megoldási módszerek

7.1. Egyenlet

7.1.1. Definíció. Az egyenlet bármely két egyenlőségjellel összekötött kifejezés. A kifejezésben szereplő változók az ismeretlenek.

7.1.2. Definíció. Az alaphalmaz az ismeretlenek azon értékeinek halmaza, ahol az egyenletet vizsgáljuk, ahol a megoldásokat keressük.

7.1.3. Definíció. Az egyenlet értelmezési tartománya az alaphalmaznak az a legbővebb részhalmaza, ahol az egyenletben szereplő kifejezések értelmezhetőek.

7.1.4. Definíció. Az egyenletet igazgá tevő értékek az egyenlet megoldásai vagy gyökei.

7.1.5. Definíció. Az alaphalmaz azon elemeinek halmaza, amelyekre az egyenlet igaz, az egyenlet megoldáshalmaza.

7.1.6. Definíció. Az azonosság olyan egyenlet, amelynek a megoldáshalmaza megegyezik az egyenlet értelmezési tartományával.

7.2. Egyenlet-megoldási módszerek

1. Mérlegelv

- (a) Két oldal egyforma változtatása
- (b) Megoldáshalmaz nem változik, ha
 - i. az egyenlet mindkét oldalához ugyanazt a számot hozzáadjuk, vagy mindkét oldalából kivonjuk
 - ii. az egyenlet mindkét oldalát ugyanazzal a 0-tól különböző számmal szorozzuk, osztjuk

2. Grafikus megoldás

- (a) Két oldal ábrázolása
- (b) Közös pont abszcisszája: megoldás
- (c) Hátrány: leolvasás pontatlan lehet

3. Szorzattá alakítás

- (a) Egyik oldal->szorzat
- (b) Másik oldal: 0
- (c) Szorzat=0 \Leftrightarrow Valamelyik tényező=0
- (d) Pl.: $(x-2)x^2 - (x-2) \cdot x = 0 \implies (x-2) \cdot 2x = 0$

4. Értelmezési tartomány vizsgálata

- (a) Ha $|D| = 1$
 - i. Elem ellenőrzése
- (b) Ha $D = 0$
 - i. Nincs megoldás
- (c) Pl.: $\sqrt{x-1} - \sqrt{1-x} = 0$
 - i. $D = 1$
 - ii. 1 valóban megoldás

5. Értékkészlet vizsgálata

(a) Két oldal értékkészletének metszetéből kerülhetnek ki a gyökök

(b) Pl.: $\frac{16}{3}x^4 + \frac{1}{6x^2} = \sin(\pi x)$ i. $x \neq 0$

ii. Baloldal: deriválás

A. Minimum: $\pm\frac{1}{2}$ -nél 1iii. Jobboldal: ≤ 1

iv. Bal és jobboldal = 1

v. Baloldal = $\pm\frac{1}{2}$

vi. Jobboldalba helyettesítve csak a pozitív jó

6. Új ismeretlen bevezetése

(a) Pl.: $\operatorname{tg}^4(x) - 5\operatorname{tg}^2(x) + 4 = 0 \implies a^2 - 5a + 4 = 0$

7.3. Ekvivalencia

7.3.1. Definíció. Két egyenlet ekvivalens, ha alaphalmazuk és megoldáshalmazuk is azonos**7.3.2. Definíció.** Ekvivalens átalakítás olyan átalakítás, amit egyenletek megoldása közben végzünk, és az eredetivel ekvivalens egyenletet kapunk.

- Ekvivalens: mérlegelv
- Nem ekvivalens: Négyzetre emelés
 - Szűkebb értelmezési tartomány: gyökvesztés lehet
 - Tágabb értelmezési tartomány: gyöknyerés lehet

7.4. Gyökvesztés

Ismeretlent tartalmazó kifejezéssel való osztás. Például:

$$x^3 + 2x^2 + x = 0 \quad (\text{Osztás nullával})$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

Helyesen:

$$x^3 + 2x^2 + x = 0$$

$$x * (x^2 + 2x) = 0$$

$$x = 0, \text{ vagy}$$

$$x^2 + 2x = 0 \implies x = -1$$

7.5. Hamis gyök

Négyzetre emelés, például:

$$\sqrt{7-x} = 1-x \quad (\text{Négyzetre emelés})$$

$$7-x = x^2 - 2x + 1$$

$$x = 3 \vee x = -2$$

Az $x = 3$ nem megoldása az eredeti egyenletnek. Kiküszöbölhető közbülső feltétellel:
 $1-x \geq 0$.

7.6. Másodfokú egyismeretlenes egyenlet

7.6.1. Definíció. Másodfokú egyismeretlenes egyenlet $ax^2 + bx + c = 0$ alakra hozható, ahol $a, b, c \in \mathbb{R}$

7.6.2. Tétel. $ax^2 + bx + c = 0$ gyökei: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, ahol $b^2 - 4ac \geq 0$

Bizonyítás.

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (*4a)$$

$$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0 \quad (\text{Teljes négyzetté alakítás})$$

$$(2ax + b)^2 - b^2 + 4ac = 0 \quad (+b^2 - 4ac)$$

$$(2ax + b)^2 = b^2 - 4ac$$

Mivel a baloldalon négyzetszám van, ami nem lehet negatív, $b^2 - 4ac$ sem lehet az, ha az lenne, a valós számok körében nincs megoldás. Ha $b^2 - 4ac \geq 0$:

$$|2ax + b| = \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$2ax + b = \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$2ax = -b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

□

7.6.3. Definíció. Az $ax^2 + bx + c = 0$ másodfokú egyenlet diszkriminánsa $D = b^2 - 4ac$

$$\text{Gyökök száma} = \begin{cases} \text{Két különböző valós gyök,} & \text{ha } D > 0 \\ \text{Kétszeres gyök,} & \text{ha } D = 0 \\ \text{Nincs valós gyök,} & \text{ha } D < 0 \end{cases}$$

7.6.4. Tétel. A másodfokú egyenlet $ax^2 + bx + c = 0$ gyöktényezőssé alakítható, ha a diszkrimináns nemnegatív, és a két gyök x_1, x_2 :

$$a * (x - x_1) * (x - x_2) = 0$$

7.6.5. Tétel (Viète-formulák). $ax^2 + bx + c$ alakú másodfokú egyenlet gyökei, és együtthatói közti összefüggések:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 * x_2 = \frac{c}{a}$$

7.7. Alkalmazások

- Egyenes, kör, parabola adott abszcisszájú vagy ordinátájú pontjának meghatározása
- Koszinusztételből oldalak kiszámítása
- Mély szakadék mélységének meghatározása: egy ledobott kő dobásától a szakadék alján történő koppanás hangjának meghallásáig eltelt idő mérésével.

8. fejezet

Statisztika

8.1. Adatsokaságok jellemzői

A statisztika feladatai közé tartozik, hogy bizonyos egyedek meghatározott tulajdonságairól tájékozódjék, majd a szerzett (általában számszerű) adatokat feldolgozza, elemzi.

8.1.1. Definíció. Az elemzéshez összegyűjtött adatok halmazát adatsokaságnak, mintának, a meghatározott tulajdonságot ismérvnek, változónak nevezzük.

8.1.2. Definíció. A sokaság elemeinek az ismérv szerinti tulajdonságát statisztikai adatnak, az adatsokaság elemeinek számát a sokaság méretének nevezzük.

8.2. A leíró statisztika jellemzői

- Tömegesen előforduló jelenségek(ből nyert adatok) vizsgálata
- Adatok összegyűjtése
 - Ha vizsgálandó egyedek száma nagy
 - Adatsokaság részhalmazát vizsgáljuk
 - * Mintavétel
 - * Mintából következtetés a sokaságra
 - Reprezentatív mintavétel:

- * Tulajdonság előfordulása mintában közelíti a sokaságban való előfordulást
- Véletlenszerű mintavétel:
 - * Minden elem ugyanakkora valószínűséggel->minta

8.2.1. Definíció. Az egyes adatok előfordulásának a száma a gyakoriság.

8.2.2. Definíció (Relatív gyakoriság). A gyakoriság osztva az adatok számával

- Adatok megadása: lehet táblázat
 - Nagyobb adathalmazok tömör ábrázolása
 - Gyakorisági táblázat: Lehetséges adatok, hozzá tartozó gyakoriságok
- Osztályok
 - Nagy méretű adatsokaság, vagy sok különböző érték közel azonos gyakorisággal
 - Egymáshoz közeli értékek összevonása
 - Diszjunktak, hézagmentesek

8.3. Diagramok

- Adatok grafikus megjelenítése
- Oszlopdiagram:
 - Adatok egymáshoz való viszonya
 - Nem célszerű, ha
 - * Van 1-2 kiugró érték
 - * Adatok közötti eltérés nagyon kicsi
 - Vízintes tengely: adatfajtáknak megfelelő intervallumok
 - * Ezek fölé téglalapok
 - * Területük arányos gyakorisággal

- Hisztogram
 - Gyakorisági eloszlás oszlopdiagramon
 - Oszlopok hézagmentesen
- Sávdiaagram
 - Fordított oszlopdiagram
- Kördiaagram
 - Részadatok egészhez való viszonya
 - Alkalmas %-os adatok ábrázolására
 - * 360° : 100%
 - Nem célszerű, ha sok az adat
- Vonaldiagram
 - Koordináta-rendszerben pontként
 - Töröttvonal köti össze
 - Időbeli változás
 - Gyakoriságok vonaldiagramja: gyakorisági poligon.

8.4. Statisztikai mutatók

8.4.1. Középértékek

- Adatsokaságokat csak leegyszerűsítve lehet jellemezni
 - Középértékek: egy számmal írunk le egy adathalmazt
 - Előny: valamilyen tulajdonság jó megjelenítése
 - Hátrány: nem nyújtanak képet egyes adatokról

8.4.1. Definíció (Módusz). Egy adatsokaságban a leggyakrabban előforduló adat.

- Ha 1 db van: egymóduszú adatsokaság
 - * Különben többmóduszú
- Előny: Könnyű meghatározni
- Hátrány: Csak akkor használható jellemzés, ha a többi adathoz képest sokszor fordul elő

8.4.2. Definíció (Átlag (számtani közép)). Az adatok összegének és az adatok számának hányadosa

- $\sum \text{Nagyobb adatoktól vett eltérések} = \sum \text{Kisebb adatoktól vett eltérések}$
- Hátrány: egy kiugró adat eltorzíthatja

8.4.3. Definíció (Medián). Páratlan számú adat esetén nagyság szerinti sorrendben a középső adat. Páros számú adat esetén a két középső adat átlaga

- Összes adat fele \leq Medián
- Összes adat fele \geq Medián
- Adatoktól mért távolságok összege minimális
- Előny: valóban középérték
 - * Ugyanannyi adat nagyobb, mint amennyi kisebb

8.4.2. Szóródás jellemzői

8.4.4. Definíció (Terjedelem). Legnagyobb és legkisebb adat különbsége

- Minél kisebb, annál jobban jellemzi a mintát

8.4.5. Definíció (Variancia (szórásnégyzet)). Adatok átlagtól való eltérések négyzetének átlaga

8.4.6. Definíció (Szórás). Szórásnégyzet négyzetgyöke:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

- Megmutatja, adatok mennyire térnek el az átlagtól
- Minél kisebb, átlag annál jobban jellemez

8.5. Pozitív számok nevezetes közepei

8.5.1. Definíció. a_1, a_2, \dots, a_n nemnegatív számok

- Aritmetikai (számtani) közepe:

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n a_i}{n}$$

- Geometriai (mértani) közepe:

$$G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n a_i}$$

- Kvadratis (négyzetes) közepe:

$$Q = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n a_i^2}{n}}$$

- Harmonikus közepe:

$$H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i}}, \text{ ha } a_i > 0$$

8.5.2. Tétel (Közeppek közötti összefüggés).

$$H \leq G \leq A \leq Q$$

Egyenlőség csak akkor áll fenn, ha $\forall i, j \ a_i = a_j$

8.5.3. Tétel. Két nemnegatív valós szám esetén $\sqrt{a * b} \leq \frac{a+b}{2}$

Bizonyítás. Mivel az egyenlőtlenség mindkét oldala nemnegatív, a négyzetre emelés ekvivalens átalakítás.

$$\begin{aligned}\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} &\Leftrightarrow ab \leq \frac{a^2 + 2ab + b^2}{4} \Leftrightarrow 4ab \leq a^2 + 2ab + b^2 \Leftrightarrow 0 \leq a^2 - 2ab + b^2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow 0 \leq (a-b)^2\end{aligned}$$

Az utolsó egyenlőtlenség igaz, és mivel mindig ekvivalens átalakításokat végeztünk, az eredeti is igaz. \square

8.6. Nevezetes közepek alkalmazása szélsőérték-feladatokban

8.6.1. Összeg állandósága esetén szorzat maximalizálása.

Azon téglatestek közül, amelyek élének összege 60 cm, melyiknek a térfogata maximális?

Legyenek a téglatest élei: a , b és c . Ekkor a térfogata: $V = a * b * c$, az élek összege: $4 * (a + b + c) = 60$. Ebből $a + b + c = 15$. A számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenségből:

$$\begin{aligned}\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} &\Rightarrow \left(\frac{a+b+c}{3}\right)^3 \geq abc \Rightarrow \left(\frac{15}{3}\right)^3 \geq abc \Rightarrow 5^3 \geq abc \Rightarrow \\ &\Rightarrow 125 \geq V\end{aligned}$$

Mivel egyenlőség csak $a = b = c$ esetén teljesül, így a térfogat az 5 cm élű kocka esetén maximális.

8.6.2. Szorzat állandósága esetén összeg minimalizálása

Azon téglalapok közül, amelyeknek a területe 100cm^2 , melyiknek a kerülete minimális?

Legyenek a téglalap oldalai a és b . Ekkor a területe: $T = ab = 100$, kerülete:

$K = 2(a + b)$, amiből $\frac{K}{4} = \frac{a+b}{2}$. A számtani és mértani közép közti egyenlőtlenséget kihasználva:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \Rightarrow \frac{K}{4} \geq \sqrt{100} \Rightarrow \frac{K}{4} \geq 10 \Rightarrow K \geq 40$$

Mivel egyenlőség csak $a = b$ esetén teljesül, így kerület a 10 cm oldalú négyzet esetén minimális.

8.7. Alkalmazások

- Statisztika
 - Közvélemény-kutatások
 - Gazdasági mutatók
- Nevezetes közepek
 - Négyzetes közép: statisztikai szórás kiszámítása
 - Harmonikus közép: átlagsebesség meghatározása

9. fejezet

Számsorozatok

9.1. Számsorozat

9.1.1. Definíció. A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete pedig valamilyen számhalmaz. Az a_1, \dots, a_n tagokból álló sortozatot $\{a_n\}$ -nel vagy (a_n) -nel jelöljük. A sorozat n -edik tagja: a_n .

- Megadásuk
 - Függvényszerűen: $f : \mathbb{N}^+ \longrightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$
 - Az n -edik általános tagot előállító formulával: $\{a_n\} = 3 * 2^n$
 - Az elemeit egyértelműen meghatározó utasítással: $\{a_n\} = \{2^n \text{ utolsó számjegye}\}$
 - A sorozat tagjaival: 3, 6, 9, ...
 - Rekurzívan: $a_1 = 1, a_2 = 2, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, ha $n \geq 3$

9.2. Sorozatok tulajdonságai

9.2.1. Definíció. Az $\{a_n\}$ sorozat szigorúan monoton növekvő, ha $\forall n \in \mathbb{Z}^+ a_n < a_{n+1}$.

9.2.2. Definíció. Az $\{a_n\}$ sorozat szigorúan monoton csökkenő, ha $\forall n \in \mathbb{Z}^+ a_n > a_{n+1}$.

- Ha csak monotonitás: megengedett egyenlőség is
- Keresése:

$$- a_{n+1} - a_n$$

$$- \frac{a_{n+1}}{a_n}$$

* Minden tag pozitív

9.2.3. Definíció. Egy $\{a_n\}$ sorozatnak K felső korlátja, ha $\forall n \in \mathbb{N}^+ a_n \leq K$. Ilyenkor a sorozatot felülről korlátosnak nevezzük.

9.2.4. Definíció. Egy $\{a_n\}$ sorozatnak k alsó korlátja, ha $\forall n \in \mathbb{N}^+ a_n \geq k$. Ilyenkor a sorozatot alulról korlátosnak nevezzük.

9.2.5. Definíció. Egy sorozat korlátos, ha alulról és felülről is korlátos.

9.2.6. Definíció. Felülről korlátos sorozat legkisebb felső korlátját a sorozat felső határának (szuprérum, sup), alulról korlátos sorozat legnagyobb alsó korlátját a sorozat alsó határának nevezzük (infimum, inf).

9.2.7. Tétel. *A valós számok körében felülről korlátos sorozatnak van felső határa, alulról korlátos sorozatnak van alsó határa.*

9.2.8. Tétel. *Végtelen sok egymásba skatulyázott, zárt intervallumnak a valós számok körében van közös pontja. Ha az intervallumok hossza minden pozitív számnál kisebbé válik, akkor pontosan egy közös pont van.*

9.2.9. Definíció. Az $\{a_n\}$ sorozat konvergens és határértéke az A szám, ha

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{Z}^+ n > N \implies |a_n - A| < \epsilon$$

Jelölése: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, vagy $a_n \rightarrow A$.

9.2.10. Definíció. Az olyan sorozatokat, amelyeknek nincs határértéke, divergens sorozatoknak nevezzük.

9.2.11. Tétel. *Konvergens sorozatok tulajdonságai:*

- Csak egy határértéke van
- Korlátos
- Ha monoton és korlátos, akkor konvergens. Határérték növekedés esetén felső, csökkenés esetén alsó határ
- Rendőr-elv: $\left(\left(\forall n \in \mathbb{N}^+ a_n \leq b_n \leq c_n \right) \wedge a_n \rightarrow A \right) \wedge c_n \rightarrow A \implies b_n \rightarrow A$

9.3. Műveletek konvergens sorozatokkal

- $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ konvergens, és $a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B$
 - $a_n \pm b_n \rightarrow A \pm B$
 - $a_n * b_n \rightarrow A * B$
 - $c * a_n \rightarrow c * A$, ahol $c \in \mathbb{R}$
 - $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \frac{A}{B}$, ahol $b_n \neq 0, B \neq 0$

9.4. Számtani sorozat

9.4.1. Definíció. Azt a számsorozatot, amelyben a második tagtól kezdve bármely tag és a közvetlenül előtte álló tag különbsége állandó, számtani sorozatnak nevezzük. Ez a különbség a differencia, jele d .

$$\begin{cases} \text{Szigorúan monoton nő, és alulról korlátos, ha} & d > 0 \\ \text{Konstans, ha} & d = 0 \\ \text{Szigorúan monoton csökken, és felülről korlátos, ha} & d < 0 \end{cases}$$

9.4.2. Tétel. Ha egy számtani sorozat első tagja a_1 , differenciája d , akkor n -edik tagja $a_n = a_1 + (n - 1) * d$.

9.4.3. Tétel. A számtani sorozat első n tagjának összege (S_n) az első és az n -edik tag számtani közepének n -szeresével egyenlő: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} * n$

Bizonyítás. Az összeget felírjuk az 1., majd az n -edik tagtól kiindulva:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{i=1}^n (a_1 + (i - 1) * d) \\ S_n &= \sum_{i=1}^n a_{n-i+1} = \sum_{i=1}^n (a_n - (i - 1) * d) \end{aligned}$$

A kettőt összeadva:

$$\begin{aligned} 2S_n &= \sum_{i=1}^n (a_1 + a_n) = n * (a_1 + a_n) \\ S_n &= \frac{a_1 + a_n}{2} * n \end{aligned}$$

□

9.4.4. Tétel. S_n másik alakja:

$$S_n = \frac{2a_1 + (n-1)d}{2} * n$$

9.4.5. Tétel. Tetszőleges elem a tőle szimmetrikusan elhelyezkedőknek a számtani közepe:

$$a_n = \frac{a_{n-k} + a_{n+k}}{2}$$

9.5. Alkalmazások

- Irracionális kitevőjű hatvány fogalma sorozat határértékével.
- Speciális függvények közelítése polinomokkal, pl.:

$$\begin{aligned}\sin(x) &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n * x^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ \cos(x) &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(-1)^n * x^{2n}}{(2n)!} \right)\end{aligned}$$

- Analízis: függvény határértékénél, folytonosságánál

10. fejezet

Mértani sorozat

10.1. Mértani sorozat

10.1.1. Definíció. A számsorozat olyan függvény, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza, értékkészlete pedig valamilyen számhalmaz. Az a_1, \dots, a_n tagokból álló sortozatot $\{a_n\}$ -nel vagy (a_n) -nel jelöljük. A sorozat n -edik tagja: a_n .

10.1.2. Definíció. Azt a számsorozatot, amelyben a második tagtól kezdve bármely tag és a közvetlenül előtte álló tag hányadosa állandó, mértani sorozatnak nevezzük. Ez a hányados a kvóciens, jele q . A definíció kizárja, hogy a sorozat bármely eleme 0 legyen, továbbá a kvóciens sem lehet 0.

10.1.3. Tétel. *Ha egy mértani sorozat első tagja a_1 , hányadosa q , akkor n -edik tagja $a_n = a_1 * q^{n-1}$*

10.1.4. Tétel. *A mértani sorozat első n tagjának összege:*

$$S_n = \begin{cases} n * a_1, & \text{ha } q = 1 \\ a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1}, & \text{ha } q \neq 1 \end{cases}$$

Bizonyítás. Ha $q = 1$, akkor a sorozat minden tagja a_1 , így: $S_n = \sum_{i=1}^n a_1 = n * a_1$. Ha

$q \neq 1$, akkor:

$$\begin{aligned}
 S_n &= \sum_{i=1}^n a_1 * q^{i-1} \\
 q * S_n &= \sum_{i=1}^n a_1 * q^i \\
 S_n * q - S_n &= a_1 * q^n - a_1 && \text{(Két egyenletet kivonva egymásból)} \\
 S_n(q - 1) &= a_1 * (q^n - 1) \\
 S_n &= a_1 * \frac{q^n - 1}{q - 1} && \text{(Mindkét oldal osztva } q - 1 \neq 0\text{-val)}
 \end{aligned}$$

□

10.1.5. Tétel. *Bármely elem négyzete egyenlő a tőle szimmetrikusan elhelyezkedő tagok szorzatával:*

$$a_n^2 = a_{n-k} * a_{n+k}$$

10.1.6. Tétel. *Pozitív tagú sorozatnál bármely elem a tőle szimmetrikusan elhelyezkedő elemek mértani közepe:*

$$a_n = \sqrt{a_{n-k} * a_{n+k}}, \text{ ha } \forall n \in \mathbb{N}^+ \ a_n > 0$$

10.1.7. Tétel (Mértani sorozat konvergenciája).

$$\begin{cases} a_n \longrightarrow a_1, & \text{ha } q = 1 \\ a_n \longrightarrow 0, & \text{ha } |q| < 1 \\ \{a_n\} \text{ divergens,} & \text{ha } q = -1 \vee |q| > 1 \end{cases}$$

10.2. Végtelen mértani sor

10.2.1. Definíció. Legyen $\{a_n\}$ egy számsorozat A $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ összeget végtelen sornak nevezzük.

10.2.2. Definíció. Ha a $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ végtelen sorban $\{a_i\}$ sorozat egy mértani sorozat, akkor a végtelen sort mértani sornak nevezzük.

10.2.3. Definíció. A sor összegén a $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i$ határértéket értjük, amennyiben létezik.

10.2.4. Tétel. *Ha egy mértani sorban $|q| < 1$, akkor a mértani sor konvergens, és összege $S = \frac{a_1}{1-q}$, ha $|q| \geq 1$, akkor nem konvergens.*

10.3. Kamatszámítás

- Kamat: tőke használatáért járó díj
 - Tőke: Kölcsönadott, letétbe helyezett pénz
 - Nagysága: tőke százalékában (kamatláb)
 - Kamattényező:
 - * Értéknövekedés: $q = 1 + \frac{p}{100}$
 - * Értékcsökkenés: $q = 1 - \frac{p}{100}$
- Kamatos kamat: Kamatozás után, kamat+tőke kamatozik
 - Mértani sorozat
 - * Van nulladik tag (a)
 - a összeg $p\%$ -ot kamatozik évente, akkor az n -edik év végére az összeg:

$$a_n = a * \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$
 - Éves kamatláb $p\%$, akkor
 - * Havi: $\sqrt[12]{1 + \frac{p}{100}}$
 - * Napi: $\sqrt[365]{1 + \frac{p}{100}}$

10.4. Gyűjtőjáradék

- Alapösszeget időközönként azonos összeggel növelünk, a teljes összeg kamatozik
- Minden év elején a összeget teszünk be, ez $p\%$ -al kamatozik.
 - $q = 1 + \frac{p}{100}$
 - n -edik év végén: mértani sorozat első n elemének összege, ahol $a_1 = aq$.

$$S_n = a * q \frac{q^n - 1}{q - 1}$$

10.5. Törlesztőrészlet

- Hitelt egyenlő időközönként ugyanakkora összeggel fizetünk vissza, mindig a fennálló tartozásra fizetjük a kamatos kamatot

- n évre S_n nagyságú hitelt évi $p\%$ -os kamatra veszünk fel, minden évben a összeget törlesztünk.
 - n -edik év végén befizetések kamatokkal megnövelt értéke egyenlő a kölcsön n év alatt $p\%$ -os kamatozással megnőtt értékével. Ha $q = 1 + \frac{p}{100}$, akkor $S_n * q^n = a * \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

10.6. Exponenciális folyamatok

- Időben növekedés: $N_t = N_0 * e^{\lambda t}$, csökkenés: $N_t = N_0 * e^{-\lambda t}$.
 - N_0 - kezdeti mennyiség, N_t - t időpontbeli mennyiség, λ - folyamatra jellemző paraméter
- Minél nagyobbak, annál gyorsabban növekednek. Változást exponenciális függvény írja le.
- Föld túlnépesedése
 - Matematikai modell: 1837 óta minden évben 1,1%-al nő: $N_t = 1 * 1,011^t$.
 - * Kb. 63 évente duplázódik
 - Ugyanannyi időközönként egyre nagyobb számmal nő népesség
 - Rendelkezésre álló erőforrások nem tudnak lépést tartani
 - Vagy életfeltételek romlása, vagy népesség növekedése csökken
- Diszkrét exponenciális növekedés: kamatos kamat
- Diszkrét exponenciális csökkenés: tárgyak értékcsökkenése
 - Évi $p\%$ -os: $a_n = a * \left(1 - \frac{p}{100}\right)^n$
- Térbeli: sugárzások elnyelődése homogén közegben

10.7. Alkalmazások

- Végtelen szakaszos tizedestörtek közösleges tört alakra hozása: konvergens mértani sor tulajdonságai

- Exponenciális függvény:
 - Radioaktív izotópok bomlási egyenletei
 - Oldódás folyamata
 - Kondenzátor feltöltődésének, kisülésének folyamata

11. fejezet

Deriválás

11.1. Függvény fogalma, értelmezési tartomány, érték- készlet