2.3.5 Материалы для изучения по научной специальности Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей Гусев Виталий Евгеньевич 2.3.5 2026

Содержание

1 Раздел 2. Дискретная математика и математическая логика. 2

1.1 Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм 2

1.1.1 Алгебра логики: высказывания, операции, формулы и равносильности 2

1.1.2 Булевы функции 8

1.1.3 Канонические формы задания булевых функций 13

1.1.4 Понятие полной системы. Критерий полноты Поста 19

1.1.5 Минимизация булевых функций в классах нормальных форм . . 24

1.1.6 Краткое резюме 30

1 Раздел 2. Дискретная математика и математическая логика.

1.1 Алгебра логики. Булевы функции, канонические формы задания булевых функций. Понятие полной системы. Критерий полноты Поста. Минимизация булевых функций в классах нормальных форм

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128; Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.

1.1.1 Алгебра логики: высказывания, операции, формулы и равносильности

Высказывания и их истинностные значения. Алгебра логики изучает высказывания и способы построения из них новых высказываний. Под *высказыванием* понимается повествовательное предложение, о котором можно определённо сказать, истинно оно или ложно. Высказывание не может быть одновременно истинным и ложным: это выражает *закон противоречия*. Кроме того, принимается *закон исключённого третьего*: высказывание либо истинно, либо ложно, третьего не дано. *(Источник: Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1, с. 16–17; Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1, с. 96.)*

Не всякое предложение является высказыванием. Вопросы, побуждения, команды, предложения с неопределёнными переменными («$x + 1 = 2$») сами по себе не имеют определённого истинностного значения и высказываниями не являются. Например, предложения

«Москва — столица России», «7<4», «Волга впадает в Каспийское море»

являются высказываниями, а предложения «Решите уравнение $x+1 = 2$» и «Который час?» — нет. *(Источник: Игошин, гл. I, §1, с. 16–17; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 96.)*

Истинность будем обозначать символом 1, ложность — символом 0. Если P — высказывание, то его логическое значение обозначается $\lambda(P)$:

$$\lambda(P) = \begin{cases} 1, & \text{если } P \text{ истинно,} \\ 0, & \text{если } P \text{ ложно.} \end{cases}$$

Функция λ называется *функцией истинности*. Например, для высказываний

A_1 : «Москва — столица России», A_2 : «Саратов находится на берегу Невы»

имеем $\lambda(A_1) = 1$, $\lambda(A_2) = 0$. *(Источник: Игошин, гл. I, §1, с. 17; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 96–97.)*

Логические операции над высказываниями. Из простых высказываний с помощью логических связок строятся составные высказывания. Основными операциями алгебры логики являются отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация и эквивалентность. Каждая операция определяется таблицей истинности, то есть правилом, по которому значения истинности исходных высказываний определяют значение истинности составного высказывания. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 97–101; Игошин, гл. I, §1, с. 17–22.)*

Отрицание. Отрицанием высказывания P называется новое высказывание, обозначаемое $\neg P$ (читается «не P» или «неверно, что P»), которое истинно тогда и только тогда, когда P ложно, и ложно тогда и только тогда, когда P истинно. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(\neg P)$
0	1
1	0

Иными словами, $\lambda(\neg P) = \neg\lambda(P)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.1 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 17–18.)*

Например, если A_6 — высказывание «Волга впадает в Каспийское море», то $\neg A_6$ — высказывание «Волга не впадает в Каспийское море». Так как $\lambda(A_6) = 1$, то $\lambda(\neg A_6) = 0$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.2, с. 98.)*

Конъюнкция. Конъюнкцией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \wedge Q$ (читается «P и Q»), которое истинно в том и только в том случае, когда истинны оба высказывания P и Q, и ложно во всех остальных случаях. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \wedge Q)$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \wedge Q) = \lambda(P) \wedge \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.2 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 18–19.)*

Например, высказывание «Саратов находится на берегу Невы, и все люди смертны» является конъюнкцией $A_2 \wedge A_3$. Поскольку $\lambda(A_2) = 0$, а $\lambda(A_3) = 1$, получаем

$$\lambda(A_2 \wedge A_3) = 0 \wedge 1 = 0.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.4, с. 99.)

Дизъюнкция. Дизъюнкцией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \vee Q$ (читается «P или Q»), которое истинно тогда и только тогда, когда хотя бы одно из высказываний P, Q истинно, и ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания ложны. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \vee Q)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Имеем $\lambda(P \vee Q) = \lambda(P) \vee \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.3 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 19–20.)*

Союз «или» здесь употребляется в неисключающем смысле: допускается, что истинны оба высказывания. Например, высказывание «Все люди смертны, или $7 < 4$» истинно, так как первый член дизъюнкции истинен. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.6, с. 99; Игошин, гл. I, §1, с. 19–20.)*

Импликация. Импликацией высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \to Q$ (читается «если P, то Q»), которое ложно в том и только в том случае, когда P истинно, а Q ложно, и истинно во всех остальных случаях. В импликации $P \to Q$ высказывание P называется *посылкой* (антецедентом), а Q — *следствием* (консеквентом). Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \to Q)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \to Q) = \lambda(P) \to \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.4 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 20–21.)*

Особенность импликации состоит в том, что она истинна при ложной посылке. Это соответствует логическому смыслу условного высказывания: если условие не выполнено, то обещание «если P, то Q» не нарушено. Например, высказывание «Если Саратов находится на берегу Невы, то А.С. Пушкин — великий русский математик» истинно, так как посылка и следствие ложны:

$$\lambda(A_2 \to A_7) = 0 \to 0 = 1.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, пример 1.8, с. 101; Игошин, гл. I, §1, с. 20–21.)

Эквивалентность. Эквивалентностью высказываний P и Q называется новое высказывание, обозначаемое $P \leftrightarrow Q$ (читается «P тогда и только тогда, когда Q»), которое истинно в том и только в том случае, когда оба высказывания одновременно истинны или одновременно ложны. Таблица истинности:

$\lambda(P)$	$\lambda(Q)$	$\lambda(P \leftrightarrow Q)$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Имеем $\lambda(P \leftrightarrow Q) = \lambda(P) \leftrightarrow \lambda(Q)$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, определение 2.5 и табл. 2.1, с. 97; Игошин, гл. I, §1, с. 21–22.)*

Производные операции. Кроме пяти основных операций, в алгебре логики используются производные операции:

- *сложение по модулю* 2 $P \oplus Q$, которое истинно тогда и только тогда, когда истинно ровно одно из высказываний P, Q;
- *штрих Шеффера* $P \mid Q = \neg(P \wedge Q)$;

- *стрелка Пирса* $P \downarrow Q = \neg(P \vee Q)$;
- *исключающее «или»* (альтернатива), совпадающее с $P \oplus Q$.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 98–99; Игошин, гл. I, §1, с. 21–22.)

Сводная таблица истинности основных и некоторых производных операций:

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \mid y$
0	0	1	0	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0

(Источник: таблицы операций: Макоха и др., гл. 2, §2.1, табл. 2.1–2.2, с. 97–98; Игошин, гл. I, §1, с. 17–22.)

Формулы алгебры логики. Для построения сложных высказываний используется язык формул. Алфавит алгебры логики содержит:

1) пропозициональные переменные $P, Q, R, \ldots, X, Y, Z, \ldots, X_1, X_2, \ldots$;
2) символы логических операций $\neg, \wedge, \vee, \to, \leftrightarrow$;
3) технические знаки: скобки (и).

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 24; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Формула алгебры логики определяется индуктивно:

1) каждая пропозициональная переменная есть формула;
2) если F_1 и F_2 — формулы, то $\neg F_1$, $(F_1 \wedge F_2)$, $(F_1 \vee F_2)$, $(F_1 \to F_2)$, $(F_1 \leftrightarrow F_2)$ также являются формулами;
3) никаких других формул, кроме получающихся по пунктам 1 и 2, нет.

(Источник: Игошин, гл. I, §2, определение 2.1, с. 24; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Внешние скобки обычно опускают. При записи формул принимается соглашение о старшинстве операций: сначала выполняется отрицание, затем конъюнкция, затем дизъюнкция, затем импликация, затем эквивалентность. Например, формула

$$\neg X \wedge Y \to Z \vee X$$

понимается как

$$(((\neg X) \wedge Y) \to (Z \vee X)).$$

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 26–27; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101.)

Интерпретация и таблица истинности. Если в формулу $F(X_1, \ldots, X_n)$ вместо пропозициональных переменных подставить конкретные высказывания $A_1, \ldots, A_n$, получится новое высказывание $F(A_1, \ldots, A_n)$, называемое *конкретизацией* формулы. Процесс подстановки конкретных высказываний называется *интерпретацией* формулы. Обратный переход от высказывания естественного языка к формуле называется *формализацией*. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 25–33.)*

Для вычисления логического значения формулы составляют таблицу истинности. В первых n столбцах перечисляют все 2^n наборов значений переменных, в промежуточных столбцах — значения подформул, в последнем — значение всей формулы. Справедлива теорема:

$$\lambda(F(A_1, \ldots, A_n)) = F(\lambda(A_1), \ldots, \lambda(A_n)).$$

Иными словами, логическое значение составного высказывания равно значению формулы на соответствующем наборе значений истинности исходных высказываний. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, теорема 2.2, с. 26; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102.)*

Пример. Для формулы

$$F = (\neg X \vee Y) \to (X \wedge \neg Y)$$

таблица истинности имеет вид:

X	Y	$\neg X$	$\neg X \vee Y$	$\neg Y$	$X \wedge \neg Y$	F
0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0

(Источник: пример составлен по образцу примера 2.1: Макоха и др., гл. 2, §2.1, табл. 2.3, с. 98–99.)

Классификация формул. Формула называется:

- *тождественно истинной* (или *тавтологией*), если она принимает значение 1 на всех наборах значений переменных;
- *тождественно ложной* (или *противоречием*), если она принимает значение 0 на всех наборах;
- *выполнимой*, если она принимает значение 1 хотя бы на одном наборе;
- *опровержимой*, если она принимает значение 0 хотя бы на одном наборе.

(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 31–32; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–104.)

Например, формула $X \vee \neg X$ является тавтологией, формула $X \wedge \neg X$ — тождественно ложной, а формула $X \wedge Y$ — выполнимой и опровержимой. *(Источник: Игошин, гл. I, §2, с. 31–32; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101.)*

Равносильность формул. Две формулы F и H называются *равносильными* (или эквивалентными), если при любых значениях входящих в них пропозициональных переменных логические значения получающихся высказываний совпадают. Обозначение: $F \equiv H$. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, определение 4.1, с. 40; Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101.)*

Справедлив *признак равносильности*: две формулы F и H равносильны тогда и только тогда, когда формула $F \leftrightarrow H$ является тавтологией:

$$F \equiv H \quad \Longleftrightarrow \quad \models (F \leftrightarrow H).$$

(Источник: Игошин, гл. I, §4, теорема 4.2, с. 40–41.)

Отношение равносильности рефлексивно, симметрично и транзитивно, то есть является отношением эквивалентности. Оно разбивает множество всех формул на классы равносильных формул. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, следствие 4.3, с. 41.)*

Основные равносильности. Приведём важнейшие законы алгебры логики:

1) $x \wedge x \equiv x, \qquad x \vee x \equiv x$ (идемпотентность);

2) $x \wedge y \equiv y \wedge x, \qquad x \vee y \equiv y \vee x$ (коммутативность);

3) $x \wedge (y \wedge z) \equiv (x \wedge y) \wedge z, \qquad x \vee (y \vee z) \equiv (x \vee y) \vee z$ (ассоциативность);

4) $x \wedge (y \vee z) \equiv (x \wedge y) \vee (x \wedge z), \qquad x \vee (y \wedge z) \equiv (x \vee y) \wedge (x \vee z)$ (дистрибутивность);

5) $x \vee (x \wedge y) \equiv x, \qquad x \wedge (x \vee y) \equiv x$ (поглощение);

6) $\neg(x \wedge y) \equiv \neg x \vee \neg y, \qquad \neg(x \vee y) \equiv \neg x \wedge \neg y$ (законы де Моргана);

7) $x \vee \neg x \equiv 1, \qquad x \wedge \neg x \equiv 0;$

8) $\neg\neg x \equiv x$ (двойное отрицание);

9) $x \wedge 1 \equiv x, \quad x \vee 0 \equiv x, \quad x \wedge 0 \equiv 0, \quad x \vee 1 \equiv 1;$

10) $x \to y \equiv \neg x \vee y;$

11) $x \leftrightarrow y \equiv (x \to y) \wedge (y \to x);$

12) $x \to y \equiv \neg y \to \neg x$ (контрапозиция).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 99–101; Игошин, гл. I, §4, теорема 4.4, с. 42–44.)

Лемма о замене. Если $F \equiv G$ и в формуле H заменить некоторую подформулу F на G, то полученная формула H' будет равносильна H. Это позволяет проводить *равносильные преобразования* формул: заменять подформулы на равносильные им формулы, не меняя значения всей формулы. *(Источник: Игошин, гл. I, §4, с. 43–44; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106.)*

Пример равносильного преобразования. Упростим формулу

$$F = \neg(X_1 \to \neg X_2) \wedge \neg(X_2 \to \neg X_1).$$

Используя $P \to Q \equiv \neg P \vee Q$ и закон де Моргана, получаем:

$$\neg(X_1 \to \neg X_2) \equiv \neg(\neg X_1 \vee \neg X_2) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

Аналогично

$$\neg(X_2 \to \neg X_1) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

Следовательно,

$$F \equiv (X_1 \wedge X_2) \wedge (X_1 \wedge X_2) \equiv X_1 \wedge X_2.$$

(Источник: Игошин, гл. I, §4, пример 4.6, с. 44.)

Принцип двойственности. Функция $f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n)$ называется *двойственной* к функции f. Если $f^* = f$, функция называется *самодвойственной*. Для формул principle двойственности формулируется так: двойственная формула получается из исходной заменой $\wedge$ на $\vee$, $\vee$ на $\wedge$, 0 на 1, 1 на 0 с сохранением структуры. Если $F \equiv H$, то $F^* \equiv H^*$. В частности, если формула является тавтологией, то двойственная ей формула также является тавтологией. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 106–107; Игошин, гл. I, §4, с. 44–45.)*

Связь формул с булевыми функциями. Каждая формула алгебры логики от переменных $X_1, \ldots, X_n$ задаёт некоторую булеву функцию $f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}$: значение $f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ равно значению формулы при $X_1 = \alpha_1, \ldots, X_n = \alpha_n$. Разные формулы могут задавать одну и ту же булеву функцию; это возможно тогда и только тогда, когда формулы равносильны. Таким образом, равносильность формул есть не что иное, как совпадение соответствующих им булевых функций. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.1 введены основные понятия алгебры логики: высказывание, истинностное значение, логические операции, формула, интерпретация, таблица истинности, тавтология, противоречие, выполнимость, равносильность. Установлены основные законы алгебры логики и принцип двойственности. Показано, что равносильные преобразования позволяют упрощать формулы, а каждая формула задаёт булеву функцию. Эти понятия служат основой для дальнейшего изучения булевых функций, канонических форм, полноты систем и минимизации. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.1–2.2, с. 96–107; Игошин, гл. I, §1–4, с. 16–45.)*

1.1.2 Булевы функции

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.2, с. 101–107; §2.3, теорема 2.1, с. 108. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. II, §8–10, с. 90–106.

Понятие булевой функции. Пусть n — неотрицательное целое число. Рассмотрим множество всех упорядоченных наборов длины n, составленных из нулей и единиц:

$$\{0,1\}^n = \{(x_1, \ldots, x_n) \mid x_i \in \{0,1\},\ i = 1, \ldots, n\}.$$

Это множество содержит ровно 2^n элементов: число наборов длины n из двух символов равно 2^n. *(Источник: Игошин, гл. II, §8, с. 92–94; §10, с. 100–101; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102.)*

Определение. *Булевой функцией от n переменных* называется произвольное отображение

$$f : \{0,1\}^n \to \{0,1\}.$$

Иными словами, булева функция каждому набору $(x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}^n$ ставит в соответствие единственное значение $f(x_1, \ldots, x_n) \in \{0,1\}$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102; Игошин, гл. II, §10, определение 10.1, с. 100–101.)*

Множество всех булевых функций от n переменных обозначается $P_2(n)$. Множество всех булевых функций (при всевозможных n) обозначается P_2:

$$P_2 = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_2(n).$$

При $n = 0$ получаем функции от нуля переменных — это константы 0 и 1. Формально $\{0,1\}^0$ состоит из одного пустого набора, поэтому функций от нуля переменных ровно две. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–102; Игошин, гл. II, §9, с. 94–95.)*

Табличное задание булевой функции. Булеву функцию от n переменных удобно задавать таблицей истинности. В первых n столбцах перечисляются все наборы из $\{0,1\}^n$ в лексикографическом порядке, в последнем столбце — значения функции. Например, для $n = 3$ наборы располагаются так:

$$000,\ 001,\ 010,\ 011,\ 100,\ 101,\ 110,\ 111.$$

Эти наборы можно рассматривать как двоичные записи чисел $0, 1, 2, \ldots, 7$. *(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 94–95; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102–103.)*

Часто функцию задают *вектором значений* длины 2^n:

$$(f(0,\ldots,0),\ f(0,\ldots,0,1),\ \ldots,\ f(1,\ldots,1)).$$

Например, мажоритарная функция от трёх переменных $f(x,y,z)$ равна 1, если хотя бы две переменные равны 1. Её таблица:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Вектор значений этой функции:

$$(0,0,0,1,0,1,1,1).$$

Можно также записать множество номеров наборов, на которых функция равна 1:

$$\{3,5,6,7\}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)

Число булевых функций от n переменных. Справедлива теорема: число всех различных булевых функций от n переменных равно

$$|P_2(n)| = 2^{2^n}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102; Игошин, гл. II, §10, теорема 10.3, с. 102–104.)

Доказательство. Булева функция от n переменных полностью определяется своим вектором значений длины 2^n. Каждая из 2^n координат этого вектора может независимо принимать одно из двух значений: 0 или 1. Поэтому число различных векторов, а значит и число различных функций, равно

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot 2}_{2^n \text{ раз}} = 2^{2^n}.$$

(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 102–104.)

Для малых n получаем:

$$|P_2(0)| = 2, \qquad |P_2(1)| = 4, \qquad |P_2(2)| = 16, \qquad |P_2(3)| = 256.$$

Уже при $n = 4$ число функций равно $2^{16} = 65536$, а при $n = 5$ — 2^{32}, то есть более четырёх миллиардов. Поэтому табличное задание при больших n становится необозримым. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 102–103; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97; §10, с. 102–104.)*

Равенство булевых функций. Две булевы функции f и g называются *равными*, если они принимают одинаковые значения на всех наборах значений их существенных переменных. Обозначение: $f = g$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §9, с. 96–97.)*

При этом функции могут быть формально записаны от разного числа переменных. Например, функцию $f(x, y) = x \wedge (y \vee \neg y)$ можно рассматривать как функцию от одной существенной переменной x, поскольку $y \vee \neg y \equiv 1$, и $f(x, y) \equiv x$. Переменная y здесь фактически не влияет на значение функции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §9, с. 96–97.)*

Фиктивные и существенные переменные. Переменная x_i называется *фиктивной* для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, если для любых значений остальных переменных выполняется равенство

$$f(\ldots, x_i = 0, \ldots) = f(\ldots, x_i = 1, \ldots).$$

Иными словами, значение функции не зависит от x_i. Переменная, не являющаяся фиктивной, называется *существенной*; говорят также, что функция *существенно зависит* от этой переменной. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105; Игошин, гл. II, §10, с. 101–102.)*

Пример. Функция

$$f(x, y) = x \wedge (y \vee \neg y)$$

не зависит от y, так как $y \vee \neg y = 1$ при $y = 0$ и при $y = 1$. Следовательно, y — фиктивная переменная, а x — существенная. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 104–105.)*

Пример. Мажоритарная функция

$$\mathrm{maj}(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

существенно зависит от всех трёх переменных. Действительно, при $x = 0$:

$$\mathrm{maj}(0, 0, 1) = 0, \qquad \mathrm{maj}(0, 1, 1) = 1,$$

значит, x существенна. Аналогично проверяются y и z. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)*

Булевы функции от одного аргумента. При $n = 1$ существует ровно $2^{2^1} = 4$ булевы функции. Их таблицы:

x	$f_0(x)$	$f_1(x)$	$f_2(x)$	$f_3(x)$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Это соответственно:

$$f_0(x) \equiv 0, \qquad f_1(x) \equiv x, \qquad f_2(x) \equiv \neg x, \qquad f_3(x) \equiv 1.$$

(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 94–95; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–103.)

Булевы функции от двух аргументов. При $n = 2$ существует $2^{2^2} = 16$ булевых функций. Основные из них приведены в таблице:

x	y	0	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \to y$	$x \leftrightarrow y$	$x \oplus y$	$x \mid y$	$x \downarrow y$	1
0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1

Здесь:

- $x \wedge y$ — конъюнкция;
- $x \vee y$ — дизъюнкция;
- $x \to y$ — импликация;
- $x \leftrightarrow y$ — эквивалентность;
- $x \oplus y$ — сложение по модулю 2, или исключающее «или»;
- $x \mid y = \neg(x \wedge y)$ — штрих Шеффера;
- $x \downarrow y = \neg(x \vee y)$ — стрелка Пирса.

(Источник: Игошин, гл. II, §9, с. 95–100; Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 101–103.)

Функция $x \oplus y$ может быть выражена формулой

$$x \oplus y = (x \wedge \neg y) \vee (\neg x \wedge y).$$

Штрих Шеффера и стрелка Пирса будут важны в дальнейшем при изучении полных систем булевых функций. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.1, с. 98–99; §2.4, с. 110–114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–111.)*

Формулы и суперпозиция. Пусть заданы булевы функции $g_1(y_1, \ldots, y_m), \ldots, g_n(y_1, \ldots, y_m)$ и функция $f(x_1, \ldots, x_n)$. *Суперпозицией* называется функция

$$h(y_1, \ldots, y_m) = f(g_1(y_1, \ldots, y_m), \ldots, g_n(y_1, \ldots, y_m)).$$

Иными словами, вместо переменных функции f подставляются функции g_i. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106; Игошин, гл. II, §10, определение 10.2, с. 101–102.)*

Например, если $f(x, y) = x \vee y$, $g_1(u, v) = u \wedge v$, $g_2(u, v) = \neg u$, то

$$f(g_1(u, v), g_2(u, v)) = (u \wedge v) \vee \neg u.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 105–106.)

Каждая формула алгебры логики от переменных $X_1, \ldots, X_n$ задаёт булеву функцию от n переменных: значение функции на наборе $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ равно значению формулы при $X_1 = \alpha_1, \ldots, X_n = \alpha_n$. При этом разным формулам может соответствовать одна и та же булева функция; это происходит тогда и только тогда, когда формулы равносильны. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Теорема о представлении булевых функций формулами. Справедлива следующая важная теорема.

Теорема. Всякая булева функция от n переменных может быть представлена в виде формулы через отрицание, конъюнкцию и дизъюнкцию. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, теорема 2.1, с. 108; Игошин, гл. II, §10, теорема 10.5, с. 104–105.)*

Для доказательства используется *лемма о разложении функции по переменной*:

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \big(x_1 \wedge f(1, x_2, \ldots, x_n)\big) \vee \\ \vee \big(\neg x_1 \wedge f(0, x_2, \ldots, x_n)\big).$$

Аналогичное разложение возможно по любой переменной. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, лемма 10.4, с. 103–104.)*

Идея доказательства теоремы. Применим индукцию по числу переменных n. При $n = 1$ все четыре функции от одной переменной выражаются через $\neg, \wedge, \vee$:

$$0 = x \wedge \neg x, \qquad 1 = x \vee \neg x, \qquad x = x, \qquad \neg x = \neg x.$$

Предположим, что теорема верна для функций от $n - 1$ переменной. Для функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ запишем разложение по x_1:

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \big(x_1 \wedge f(1, x_2, \ldots, x_n)\big) \vee \big(\neg x_1 \wedge f(0, x_2, \ldots, x_n)\big).$$

Функции $f(1, x_2, \ldots, x_n)$ и $f(0, x_2, \ldots, x_n)$ зависят уже от $n - 1$ переменной. По предположению индукции они выражаются через $\neg, \wedge, \vee$. Подставляя эти выражения в правую часть, получаем формулу для $f(x_1, \ldots, x_n)$. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–105; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108.)*

Следствием является возможность задания любой булевой функции формулой над базисом $\{\neg, \wedge, \vee\}$. В дальнейшем будут рассмотрены и другие базисы, а также критерий полноты произвольной системы булевых функций. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3–2.4, с. 108–114; Игошин, гл. II, §10–11, с. 104–111.)*

Пример: мажоритарная функция. Мажоритарная функция от трёх переменных

$$\mathrm{maj}(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

равна 1 тогда и только тогда, когда хотя бы две из переменных равны 1. Её таблица была приведена выше. Эта функция не имеет фиктивных переменных и существенно зависит от всех трёх аргументов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.2, с. 103–104; Игошин, гл. II, §9, с. 95–97.)*

Связь с алгеброй высказываний. Булевы функции являются математической моделью логических операций. Пропозициональной переменной X соответствует булева переменная $x \in \{0, 1\}$. Логическим связкам соответствуют булевы функции:

$$\neg \leftrightarrow \text{отрицание}, \qquad \wedge \leftrightarrow \text{конъюнкция}, \qquad \vee \leftrightarrow \text{дизъюнкция},$$

$$\to\leftrightarrow \text{импликация}, \qquad \leftrightarrow\leftrightarrow \text{эквивалентность}.$$

Формуле алгебры логики соответствует булева функция; равносильным формулам соответствует одна и та же булева функция. Обратно, каждая булева функция может быть задана формулой, и таких формул бесконечно много. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 104–106; Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.2 введено понятие булевой функции как отображения $\{0, 1\}^n \to \{0, 1\}$, рассмотрены табличный и векторный способы её задания, доказана формула для числа булевых функций 2^{2^n}, введены понятия фиктивной и существенной переменной, равенства функций, суперпозиции. Показано, что каждая формула алгебры логики задаёт булеву функцию и, обратно, всякая булева функция выражается формулой через $\neg, \wedge, \vee$. Эти результаты служат основой для изучения канонических форм, полных систем и минимизации булевых функций. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.2–2.3, с. 101–110; Игошин, гл. II, §8–10, с. 90–106.)*

1.1.3 Канонические формы задания булевых функций

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.3, с. 107–110; §2.2, с. 101–107. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §5, с. 46–53.

Элементарные конъюнкции и дизъюнкции. При построении нормальных форм булевых функций используются особые виды формул — элементарные конъюнкции и элементарные дизъюнкции.

Определение. *Элементарной конъюнкцией* от переменных $x_1, \ldots, x_n$ называется конъюнкция переменных или их отрицаний:

$$x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n},$$

где $\alpha_i \in \{0, 1\}$ и

$$x_i^{\alpha_i} = \begin{cases} x_i, & \text{если } \alpha_i = 1, \\ \neg x_i, & \text{если } \alpha_i = 0. \end{cases}$$

Аналогично, *элементарной дизъюнкцией* называется дизъюнкция переменных или их отрицаний:

$$x_1^{\beta_1} \vee x_2^{\beta_2} \vee \cdots \vee x_n^{\beta_n}.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)

Заметим, что в элементарную конъюнкцию или дизъюнкцию каждая переменная может входить не более одного раза. Если переменная входит в конъюнкцию и сама, и со своим отрицанием, то такая конъюнкция тождественно равна нулю; если в дизъюнкцию входят и x_i, и $\neg x_i$, то она тождественно равна единице. В дальнейшем такие вырожденные случаи обычно исключаются. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 46–47; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108.)*

ДНФ и КНФ. Определение. *Дизъюнктивной нормальной формой* (ДНФ) называется дизъюнкция элементарных конъюнкций:

$$\bigvee_{i=1}^{k} K_i,$$

где K_i — элементарные конъюнкции. Аналогично, *конъюнктивной нормальной формой* (КНФ) называется конъюнкция элементарных дизъюнкций:

$$\bigwedge_{i=1}^{k} D_i,$$

где D_i — элементарные дизъюнкции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)*

Примерами ДНФ служат формулы

$$(x \wedge y) \vee (\neg x \wedge z), \qquad (x \wedge y \wedge \neg z) \vee (\neg x \wedge y) \vee x.$$

Примерами КНФ — формулы

$$(x \vee y) \wedge (\neg x \vee z), \qquad (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y) \wedge z.$$

(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 47; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108.)

Любая формула алгебры логики может быть приведена к ДНФ и к КНФ с помощью равносильных преобразований, основанных на законах дистрибутивности, де Моргана, двойного отрицания и выражении импликации и эквивалентности через $\neg, \wedge, \vee$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, с. 46–47.)*

Совершенные ДНФ и КНФ. Среди всех ДНФ и КНФ, равносильных данной функции, особую роль играют *совершенные* формы, обладающие свойством единственности.

Определение. *Совершенной ДНФ* (СДНФ) называется ДНФ, удовлетворяющая следующим условиям:

1) каждая элементарная конъюнкция содержит все переменные $x_1, \ldots, x_n$ (с отрицанием или без него);

2) ни одна элементарная конъюнкция не содержит одновременно переменную и её отрицание;

3) все элементарные конъюнкции различны.

Аналогично определяется *совершенная КНФ* (СКНФ): это КНФ, в которой каждая элементарная дизъюнкция содержит все переменные (с отрицанием или без него), не содержит одновременно переменную и её отрицание, и все дизъюнкции различны. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–108; Игошин, гл. I, §5, определение 5.1, с. 47.)*

Каждая элементарная конъюнкция, входящая в СДНФ, называется *минтермом* (или *конституентой единицы*). Каждая элементарная дизъюнкция, входящая в СКНФ, называется *макстермом* (или *конституентой нуля*). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109; Игошин, гл. I, §5, с. 48–51.)*

Существование и единственность СДНФ. Справедлива следующая фундаментальная теорема.

Теорема (о СДНФ). Для всякой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, не равной тождественно нулю, существует и единственна (с точностью до порядка членов дизъюнкции) её совершенная дизъюнктивная нормальная форма. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109; Игошин, гл. I, §5, лемма 5.2 и теорема 5.3, с. 48–51.)*

Доказательство существования опирается на разложение функции по всем переменным. Именно, для любой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ справедливо представление

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \bigvee_{\substack{(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)\in\{0,1\}^n \\ f(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)=1}} x_1^{\alpha_1} \wedge x_2^{\alpha_2} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n}. \tag{2.1}$$

В этой формуле дизъюнкция берётся по всем наборам $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, на которых функция равна 1. Каждое слагаемое является минтермом, а вся дизъюнкция — СДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, формула (2.1), с. 108; Игошин, гл. I, §5, с. 48–50.)*

Доказательство единственности состоит в следующем. Предположим, что некоторая функция имеет две различные СДНФ. Пусть K — минтерм, входящий в первую СДНФ, но не входящий во вторую. Рассмотрим набор $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, на котором K обращается в 1. На этом наборе первая СДНФ равна 1. Если вторая СДНФ не содержит минтерма $x_1^{\alpha_1} \wedge \cdots \wedge x_n^{\alpha_n}$, то на данном наборе все её минтермы обращаются в 0, и вторая СДНФ равна 0. Противоречие. Следовательно, все минтермы обеих форм совпадают, и СДНФ единственна. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 49–51; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109.)*

Если функция тождественно равна нулю, то её СДНФ не существует (её нельзя представить в виде дизъюнкции минтермов, так как на всех наборах функция равна 0). Иногда условно полагают СДНФ нулевой функции равной 0, но формально это не является совершенной формой. *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 50–51; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–109.)*

Существование и единственность СКНФ. Двойственным образом формулируется теорема о СКНФ.

Теорема (о СКНФ). Для всякой булевой функции $f(x_1, \ldots, x_n)$, не равной тождественно единице, существует и единственна (с точностью до порядка членов конъюнкции) её совершенная конъюнктивная нормальная форма. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, лемма 5.4 и теорема 5.5, с. 51–53.)*

СКНФ имеет вид

$$f(x_1,\ldots,x_n)=\bigwedge_{\substack{(\beta_1,\ldots,\beta_n)\in\{0,1\}^n\\ f(\beta_1,\ldots,\beta_n)=0}}\left(x_1^{1-\beta_1}\vee x_2^{1-\beta_2}\vee\cdots\vee x_n^{1-\beta_n}\right), \tag{2.3}$$

где $x^1=x$, $x^0=\neg x$. Конъюнкция берётся по всем наборам, на которых функция равна 0. Каждый сомножитель является макстермом, а всё произведение — СКНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, формула (2.3), с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Если функция тождественно равна единице, то её СКНФ не существует (формально можно было бы считать СКНФ единичной функции равной 1, но это не совершенная форма). *(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 52–53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110.)*

Построение СДНФ и СКНФ по таблице истинности. Пусть функция $f(x_1,\ldots,x_n)$ задана таблицей истинности. Алгоритм построения СДНФ:

1) отметить в таблице все строки, в которых значение функции равно 1;
2) для каждой такой строки $(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$ выписать минтерм $x_1^{\alpha_1}\wedge\cdots\wedge x_n^{\alpha_n}$, где $x_i^1=x_i$, $x_i^0=\neg x_i$;
3) соединить все выписанные минтермы знаками дизъюнкции.

Алгоритм построения СКНФ:

1) отметить в таблице все строки, в которых значение функции равно 0;
2) для каждой такой строки $(\beta_1,\ldots,\beta_n)$ выписать макстерм $x_1^{1-\beta_1}\vee\cdots\vee x_n^{1-\beta_n}$;
3) соединить все выписанные макстермы знаками конъюнкции.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Пример построения СДНФ и СКНФ. Пусть функция $f(x,y,z)$ задана таблицей:

x	y	z	$f(x,y,z)$
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Единицы стоят на наборах с номерами $0,1,3,5,7$. Строим СДНФ:

$$f_{\text{СДНФ}}=\neg x\neg y\neg z\vee\neg x\neg yz\vee\neg xyz\vee x\neg yz\vee xyz.$$

Нули стоят на наборах $2, 4, 6$. Строим СКНФ. Для набора $2 = (0, 1, 0)$ макстерм имеет вид $x \vee \neg y \vee z$. Для набора $4 = (1, 0, 0)$ — $\neg x \vee y \vee z$. Для набора $6 = (1, 1, 0)$ — $\neg x \vee \neg y \vee z$. Следовательно,

$$f_{\text{СКНФ}} = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z).$$

В числовой форме:

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7) = \Pi(2, 4, 6).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, примеры 2.2–2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Построение СДНФ и СКНФ равносильными преобразованиями. Если функция задана не таблицей, а формулой, то СДНФ и СКНФ можно получить равносильными преобразованиями. Для этого нужно:

1) выразить все импликации и эквивалентности через $\neg, \wedge, \vee$;
2) с помощью законов де Моргана и двойного отрицания пронести отрицания до переменных;
3) с помощью дистрибутивности привести формулу к ДНФ или КНФ;
4) если полученная ДНФ (КНФ) не совершенна, то «размножить» недостающие переменные, используя равенства

$$x \vee \neg x \equiv 1, \qquad x \wedge \neg x \equiv 0;$$

5) удалить повторяющиеся минтермы (макстермы) и поглотить менее полные более полными.

(Источник: Игошин, гл. I, §5, с. 53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110.)

Пример. Приведём к СДНФ формулу

$$f = (x \to y) \wedge z.$$

Выразим импликацию:

$$f = (\neg x \vee y) \wedge z.$$

Применим дистрибутивность:

$$f = (\neg x \wedge z) \vee (y \wedge z).$$

Получена ДНФ, но не СДНФ, так как не хватает переменной y в первом члене и x во втором. «Размножим»:

$$\neg x \wedge z = \neg x \wedge (y \vee \neg y) \wedge z = \neg xyz \vee \neg x\neg yz,$$

$$y \wedge z = (x \vee \neg x) \wedge y \wedge z = xyz \vee \neg xyz.$$

Объединяя и удаляя повторения, получаем

$$f_{\text{СДНФ}} = \neg x\neg yz \vee \neg xyz \vee xyz.$$

(Источник: пример составлен по образцу задач из: Игошин, гл. I, §5, с. 53; Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 108–110.)

Связь между СДНФ и СКНФ. СДНФ и СКНФ одной и той же функции двойственны друг другу: если в СДНФ заменить $\wedge$ на $\vee$, $\vee$ на $\wedge$, x_i на $\neg x_i$, $\neg x_i$ на x_i, то получится СКНФ. Точнее, справедливо равенство

$$(f) = \neg\,(\neg f).$$

Это означает, что для построения СКНФ можно построить СДНФ отрицания функции, а затем взять отрицание и применить законы де Моргана. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Пример. Для функции из предыдущего примера

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$$

отрицание имеет единицы на наборах $2, 4, 6$, поэтому

$$\neg f = \Sigma(2, 4, 6).$$

СДНФ отрицания:

$$\neg f = \neg x y \neg z \vee x \neg y \neg z \vee x y \neg z.$$

Беря отрицание и применяя де Моргана, получаем

$$f = (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z),$$

что совпадает с ранее найденной СКНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 110; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)*

Числовая форма записи. СДНФ и СКНФ удобно записывать в числовой форме. Если функция равна 1 на наборах с номерами $i_1, \ldots, i_k$, то пишут

$$f = \Sigma(i_1, \ldots, i_k).$$

Если функция равна 0 на наборах с номерами $j_1, \ldots, j_m$, то пишут

$$f = \Pi(j_1, \ldots, j_m).$$

Например, для рассмотренной функции

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7) = \Pi(2, 4, 6).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 109–110; Игошин, гл. I, §5, с. 48–53.)

Замечание о несовершенных формах. СДНФ и СКНФ являются каноническими: они единственны для данной функции (если функция не равна тождественно 0 или 1). Однако они, как правило, не являются минимальными: содержат много литералов и конъюнкций/дизъюнкций. Например, функция

$$f(x, y, z) = xy \vee xz \vee yz$$

в СДНФ имеет вид

$$f_{\text{СДНФ}} = \neg x y z \vee x \neg y z \vee x y \neg z \vee x y z,$$

то есть содержит четыре минтерма, тогда как минимальная ДНФ $xy \vee xz \vee yz$ содержит три конъюнкции. Поэтому после приведения к совершенной форме часто возникает задача минимизации, рассматриваемая в пункте 1.1.5. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115; Игошин, гл. I, §5, с. 53.)*

Единственность и мощность. Число минтермов в СДНФ равно числу единиц функции, а число макстермов в СКНФ — числу нулей. Для функции от n переменных максимальное число минтермов равно 2^n. Всего различных СДНФ от n переменных (не считая нулевой функции) равно $2^{2^n} - 1$, поскольку каждая функция, кроме тождественного нуля, имеет единственную СДНФ. *(Источник: Игошин, гл. II, §10, с. 102–104; гл. I, §5, с. 48–53.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.3 введены элементарные конъюнкции и дизъюнкции, понятия ДНФ и КНФ, а также их совершенные формы — СДНФ и СКНФ. Доказаны теоремы о существовании и единственности совершенных форм. Описаны два способа построения СДНФ и СКНФ: по таблице истинности и равносильными преобразованиями. Показана двойственность СДНФ и СКНФ и введена числовая форма записи. Отмечено, что совершенные формы, будучи каноническими, не всегда минимальны, что мотивирует дальнейшее изучение минимизации булевых функций. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.3, с. 107–110; Игошин, гл. I, §5, с. 46–53.)*

1.1.4 Понятие полной системы. Критерий полноты Поста

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.4, с. 110–114. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. II, §11, с. 107–111.

Замыкание и полнота системы булевых функций. На множестве булевых функций P_2 определена операция *суперпозиции*: подстановка одних функций вместо переменных других и переименование переменных. Суперпозиции позволяют из исходного набора функций получать новые функции. Возникает вопрос: какие системы функций обладают свойством, что через их функции можно выразить *любую* булеву функцию?

Определение. Пусть $M \subseteq P_2$ — некоторое множество булевых функций. *Замыканием* множества M называется множество $[M]$, состоящее из всех булевых функций, которые можно получить из функций множества M с помощью конечного числа операций суперпозиции (включая переименование переменных). Иными словами, $[M]$ — это наименьшее множество, содержащее M и замкнутое относительно суперпозиции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 110–111; Игошин, гл. II, §11, определение 11.1, с. 107.)*

Определение. Множество M называется *функционально замкнутым* (или просто *замкнутым*), если $[M] = M$. Множество M называется *полным*, если $[M] = P_2$, то есть через функции из M выражается любая булева функция. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определения 2.13–2.15, с. 111–112; Игошин, гл. II, §11, определение 11.1, с. 107.)*

Определение. *Базисом* называется полная система M, никакая собственная подсистема которой не является полной. Базис — это минимальная по включению полная система. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры полных систем. Простейшие примеры полных систем булевых функций:

1) $\{\neg, \wedge, \vee\}$ — избыточная полная система (теорема о представлении булевых функций формулами);

2) $\{\neg, \wedge\}$ — базис (конъюнкция и отрицание);

3) $\{\neg, \vee\}$ — базис (дизъюнкция и отрицание);

4) $\{|\}$ — базис, состоящий из одной функции (штрих Шеффера);

5) $\{\downarrow\}$ — базис, состоящий из одной функции (стрелка Пирса);

6) $\{\neg, \to\}$ — базис;

7) $\{\oplus, \wedge, 1\}$ — базис (полином Жегалкина).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, теорема 11.2, с. 107.)

Проверим, например, полноту системы $\{|\}$. Штрих Шеффера выражается через отрицание и конъюнкцию: $x \mid y = \neg(x \wedge y)$. Следовательно, из $x \mid y$ можно получить $\neg x = x \mid x$. Далее,

$$x \wedge y = \neg(x \mid y) = (x \mid y) \mid (x \mid y).$$

Таким образом, через штрих Шеффера выражаются $\neg$ и $\wedge$, а система $\{\neg, \wedge\}$ полна; значит, полна и $\{|\}$. Аналогично проверяется полнота $\{\downarrow\}$. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 107; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114.)*

Возникает задача: как в общем случае определить, является ли данная система функций полной? Ответ даёт *критерий полноты Поста*, для формулировки которого вводятся пять специальных классов булевых функций.

Класс P_0: функции, сохраняющие нуль. Определение. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *сохраняющей нуль*, если

$$f(0, 0, \ldots, 0) = 0.$$

Множество всех таких функций обозначается P_0. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.16, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры. Функции 0, x, $x \wedge y$, $x \vee y$, $x \oplus y$ принадлежат P_0; функции 1, $\neg x$, $x \to y$ не принадлежат P_0. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс P_1: функции, сохраняющие единицу. Определение. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *сохраняющей единицу*, если

$$f(1, 1, \ldots, 1) = 1.$$

Множество всех таких функций обозначается P_1. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.16, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)*

Примеры. Функции 1, x, $x \wedge y$, $x \vee y$, $x \to y$, $x \leftrightarrow y$ принадлежат P_1; функции 0, $\neg x$, $x \oplus y$ не принадлежат P_1. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс L: линейные функции. **Определение.** Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *линейной*, если её можно представить в виде

$$f(x_1, \ldots, x_n) = a_0 \oplus a_1 x_1 \oplus a_2 x_2 \oplus \cdots \oplus a_n x_n,$$

где $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \{0, 1\}$, а операции $\oplus$ и $\cdot$ понимаются как сложение и умножение по модулю 2. Множество всех линейных функций обозначается L. Выражение в правой части называется *полиномом Жегалкина* степени не выше первой. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.17, с. 112; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции 0, 1, x, $\neg x = 1 \oplus x$, $x \oplus y$, $x \leftrightarrow y = 1 \oplus x \oplus y$ принадлежат L. Функции $x \wedge y$, $x \vee y = \neg(x \wedge y)$, $x \to y = \neg x \vee y$ не являются линейными. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс S: самодвойственные функции. **Определение.** Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *самодвойственной*, если она совпадает со своей двойственной функцией:

$$f^*(x_1, \ldots, x_n) = f(x_1, \ldots, x_n),$$

где

$$f^*(x_1, \ldots, x_n) = \neg f(\neg x_1, \ldots, \neg x_n).$$

Множество всех самодвойственных функций обозначается S. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определение 2.18, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции x, $\neg x$ являются самодвойственными. Функции 0, 1, $x \wedge y$, $x \vee y$ не являются самодвойственными. Например, для $x \wedge y$ двойственная функция есть $x \vee y$, и $x \wedge y \not\equiv x \vee y$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Класс M: монотонные функции. **Определение.** Введём на множестве $\{0, 1\}$ отношение порядка: $0 \leq 0$, $0 \leq 1$, $1 \leq 1$. Булева функция $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется *монотонной*, если для любых наборов $(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$ и $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$, таких что $\alpha_i \leq \beta_i$ для всех $i = 1, \ldots, n$, выполняется неравенство

$$f(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \leq f(\beta_1, \ldots, \beta_n).$$

Множество всех монотонных функций обозначается M. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, определения 2.19–2.20, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Примеры. Функции 0, 1, x, $x \wedge y$, $x \vee y$ монотонны. Функции $\neg x$, $x \oplus y$, $x \to y$ не монотонны. Например, для $\neg x$: $0 \leq 1$, но $\neg 0 = 1 > 0 = \neg 1$, что нарушает монотонность. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113; Игошин, гл. II, §11, с. 108.)*

Сводная таблица принадлежности основных функций классам:

Функция	P_0	P_1	L	S	M
0	да	нет	да	нет	да
1	нет	да	да	нет	да
x	да	да	да	да	да
$\neg x$	нет	нет	да	да	нет
$x \wedge y$	да	да	нет	нет	да
$x \vee y$	да	да	нет	нет	да
$x \to y$	нет	да	нет	нет	нет
$x \leftrightarrow y$	да	да	да	нет	нет
$x \oplus y$	да	нет	да	нет	нет
$x \mid y$	нет	нет	нет	нет	нет
$x \downarrow y$	нет	нет	нет	нет	нет

(Источник: таблица составлена по определениям классов: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 112–113; Игошин, гл. II, §11, с. 107–108.)

Критерий полноты Поста. Центральный результат теории булевых функций — теорема Поста (1921 г.).

Теорема (критерий полноты Поста). Система булевых функций $M \subseteq P_2$ является полной тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти замкнутых классов P_0, P_1, L, S, M. Иными словами, M полна тогда и только тогда, когда выполняются все пять условий:

1) в M существует функция, не сохраняющая нуль ($f \notin P_0$);

2) в M существует функция, не сохраняющая единицу ($f \notin P_1$);

3) в M существует нелинейная функция ($f \notin L$);

4) в M существует несамодвойственная функция ($f \notin S$);

5) в M существует немонотонная функция ($f \notin M$).

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, теорема 2.2, с. 113; Игошин, гл. II, §11, теорема 11.4, с. 109.)

Необходимость. Предположим, что M содержится целиком в одном из классов, например в P_0. Каждый из пяти классов P_0, P_1, L, S, M замкнут: суперпозиция функций из класса снова принадлежит этому классу. Следовательно, и все функции, полученные из M суперпозицией, лежат в P_0. Значит, $[M] \subseteq P_0$, и поскольку $P_0 \neq P_2$ (например, $\neg x \notin P_0$), система M не является полной. Аналогично для остальных классов. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113.)*

Достаточность. Предположим, что в M есть функции $f_0 \notin P_0$, $f_1 \notin P_1$, $f_2 \notin L$, $f_3 \notin S$, $f_4 \notin M$. Показывается, что тогда из них с помощью суперпозиций можно получить полную систему, например $\{\neg, \wedge\}$ или штрих Шеффера. Доказательство конструктивно, но довольно громоздко; оно проводится в несколько шагов и опирается на последовательное «уничтожение» принадлежности классам. Полное доказательство имеется в учебнике Игошина (гл. II, §11, с. 109–111) и в книге Макохи и др. (гл. 2, §2.4, с. 113–114). *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109–111; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113–114.)*

Свойства классов Поста. Классы P_0, P_1, L, S, M называются *предполными*: каждый из них не является полным, но добавление к нему любой функции, не принадлежащей этому классу, даёт полную систему. Например, P_0 не полон, но $P_0 \cup \{\neg x\}$ полон, так как $\neg x \notin P_0$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Пост показал, что кроме этих пяти классов других предполных классов в P_2 нет. Всего существует счётное множество замкнутых классов булевых функций; они разбиваются на семь групп, из которых шесть конечны, а одна бесконечна. Пять классов P_0, P_1, L, S, M — важнейшие из них, так как через них формулируется критерий полноты. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 111; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Пример проверки полноты. Рассмотрим систему $M = \{\neg, \wedge\}$. Проверим условия критерия Поста:

1) $\neg \notin P_0$, так как $\neg 0 = 1 \neq 0$;

2) $\neg \notin P_1$, так как $\neg 1 = 0 \neq 1$;

3) $\wedge \notin L$, так как $x \wedge y$ нелинейна (её полином Жегалкина содержит член xy);

4) $\wedge \notin S$, так как двойственная к $x \wedge y$ функция есть $x \vee y$, и $x \wedge y \not\equiv x \vee y$;

5) $\neg \notin M$, так как $0 \leq 1$, но $\neg 0 = 1 > 0 = \neg 1$.

Все пять условий выполнены, следовательно, система $\{\neg, \wedge\}$ полна. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113–114; Игошин, гл. II, §11, с. 109.)*

Рассмотрим систему $M = \{x \wedge y, x \vee y\}$. Она содержится в P_0 (обе функции сохраняют нуль), в P_1 (обе сохраняют единицу) и в M (обе монотонны). Условия критерия не выполнены, система не полна. Действительно, через монотонные функции нельзя выразить $\neg x$, так как отрицание немонотонно. *(Источник: Игошин, гл. II, §11, с. 109; Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 113.)*

Система $M = \{x \to y\}$ не полна: она содержится в P_1 ($1 \to 1 = 1$). Система $M = \{x \oplus y, 1\}$ содержится в L, поэтому не полна. Система $M = \{|\}$ проверяется так: $x \mid y \notin P_0$ ($0 \mid 0 = 1$), $x \mid y \notin P_1$ ($1 \mid 1 = 0$), $x \mid y \notin L$ (так как $\neg(x \wedge y)$ нелинейна), $x \mid y \notin S$ ($0 \mid 0 = 1 \neq 0 = 1 \mid 1$), $x \mid y \notin M$. Все условия выполнены, система $\{|\}$ полна. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–109.)*

Замечание о числе классов. Пост установил, что всякий замкнутый класс булевых функций имеет конечный базис, и дал полное описание решётки замкнутых классов. Пять классов P_0, P_1, L, S, M — предполные; любой другой замкнутый класс содержится в одном из них. Поэтому для проверки полноты достаточно убедиться, что система не лежит ни в одном из этих пяти классов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 111–114; Игошин, гл. II, §11, с. 109–111.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.4 введены понятия замыкания, замкнутой и полной системы, базиса. Описаны пять классов Поста P_0, P_1, L, S, M, приведены их определения и примеры принадлежности функций этим классам. Сформулирован критерий полноты Поста: система булевых функций полна тогда и только тогда, когда она не содержится целиком ни в одном из пяти классов Поста. Отмечено, что эти классы

являются предполными, и приведены примеры проверки полноты конкретных систем. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.4, с. 110–114; Игошин, гл. II, §11, с. 107–111.)*

1.1.5 Минимизация булевых функций в классах нормальных форм

Основные источники: Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.5, с. 114–128. Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §4, с. 40–45; §5, с. 46–53; §6, с. 54–65.

Постановка задачи минимизации. Совершенные ДНФ и КНФ, будучи каноническими формами, единственны для данной функции, но, как правило, содержат избыточное число литералов и членов. Техническая реализация такой формы приводит к громоздким логическим схемам. Поэтому возникает задача *минимизации* булевых функций: для данной функции найти равносильную ей ДНФ или КНФ, содержащую наименьшее возможное число литералов (переменных и их отрицаний), а при равенстве числа литералов — наименьшее число членов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115.)*

Определение. *Минимальной ДНФ* (МДНФ) функции f называется ДНФ, равносильная f и содержащая наименьшее возможное число литералов среди всех ДНФ, равносильных f. Аналогично определяется *минимальная КНФ* (МКНФ). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–115.)*

Точное решение задачи минимизации включает следующие этапы:

1) представление функции в СДНФ (или СКНФ);

2) получение сокращённой ДНФ (КНФ);

3) нахождение всех тупиковых ДНФ (КНФ);

4) выбор среди них минимальной формы.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118.)

Импликанты и простые импликанты. Определение. *Импликантой* функции $f(x_1, \ldots, x_n)$ называется булева функция g, принимающая значение 1 только на тех наборах, на которых f равна 1. Иными словами, $g \leq f$ поточечно: если $g(\alpha) = 1$, то и $f(\alpha) = 1$. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определение 2.23, с. 117.)*

Определение. Импликанта g называется *простой*, если никакая её собственная часть (то есть результат удаления хотя бы одного литерала) уже не является импликантой f. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 117–118.)*

Пример. Пусть

$$f(x, y, z) = xyz \vee xy\neg z \vee x\neg yz.$$

Конъюнкция xyz является импликантой, но не простой: её часть xy тоже является импликантой, так как

$$xy = xy(z \vee \neg z) = xyz \vee xy\neg z,$$

и $xy \leq f$. В то же время xy — простая импликанта, поскольку ни x, ни y не являются импликантами f. Конъюнкция $x\neg yz$ также является простой импликантой. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 117–118.)*

Определение. *Сокращённой ДНФ* называется дизъюнкция всех простых импликант функции. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определение 2.24, с. 118.)*

Определение. *Тупиковой ДНФ* называется дизъюнкция простых импликант, из которой нельзя удалить ни одну импликанту без потери равносильности исходной функции. *Минимальная ДНФ* — это тупиковая ДНФ с наименьшим числом литералов. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, определения 2.25–2.26, с. 118.)*

Логическая функция может иметь несколько тупиковых ДНФ и несколько минимальных ДНФ (если тупиковые формы имеют одинаковое число литералов). *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118.)*

Метод тождественных преобразований. Простейший метод минимизации состоит в применении законов алгебры логики:

- *склеивания*: $xy \vee x\neg y \equiv x$;
- *поглощения*: $x \vee xy \equiv x$;
- *дистрибутивности*: $x(y \vee z) \equiv xy \vee xz$;
- законов де Моргана и двойного отрицания.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 115–117; Игошин, гл. I, §4, с. 42–44.)

Пример. Минимизируем функцию, заданную в СДНФ:

$$f(x,y,z) = x\neg yz \vee xyz \vee x\neg y\neg z.$$

Вынесем x за скобки:

$$f = x(\neg yz \vee yz \vee \neg y\neg z).$$

Применим склеивание к первым двум членам:

$$\neg yz \vee yz = z.$$

Тогда

$$f = x(z \vee \neg y\neg z).$$

Применим дистрибутивность:

$$f = xz \vee x\neg y\neg z.$$

Далее можно применить поглощение: $xz \vee x\neg y\neg z = x(z \vee \neg y\neg z)$. Окончательно:

$$f_{\min} = x(z \vee \neg y\neg z).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, пример 2.10, с. 116.)

Метод тождественных преобразований удобен для простых функций, но при большом числе переменных становится трудоёмким. Кроме того, он не гарантирует получения минимальной формы, так как группировать минтермы можно по-разному. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 115–117.)*

Метод Квайна. Метод Квайна (У. Куайн, 1950-е гг.) позволяет систематически находить сокращённую ДНФ, а затем все тупиковые и минимальные формы. Он состоит из следующих шагов.

Шаг 1. Записать функцию в СДНФ.

Шаг 2. Выполнить все возможные операции *неполного склеивания*:

$$xy \vee x\neg y \equiv x.$$

Склеивать можно только минтермы, отличающиеся ровно одним литералом. Результат склеивания называется импликантой ранга $n-1$, если исходные минтермы имели ранг n (ранг — число литералов).

Шаг 3. Выполнить все возможные операции *поглощения*:

$$x \vee xy \equiv x.$$

Поглощается импликанта, которая является частью другой импликанты.

Шаг 4. Если после шагов 2–3 появились новые импликанты, к ним снова применяют склеивание и поглощение. Процесс продолжается до тех пор, пока это возможно.

Шаг 5. Полученная дизъюнкция простых импликант есть *сокращённая ДНФ*.

Шаг 6. Построить *импликантную матрицу*. Строки соответствуют простым импликантам, столбцы — минтермам СДНФ. На пересечении строки и столбца ставится метка (например, крестик), если данная простая импликанта покрывает данный минтерм.

Шаг 7. Найти все *тупиковые ДНФ*. Тупиковая ДНФ — это минимальный по включению набор простых импликант, покрывающих все минтермы. Если импликанта покрывает некоторый минтерм, который не покрывается никакой другой импликантой, то она *существенна* и обязана войти во все тупиковые ДНФ.

Шаг 8. Среди всех тупиковых ДНФ выбрать форму с наименьшим числом литералов — это и есть МДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–124.)*

Пример 1. Минимизировать функцию

$$f(x,y,z) = \neg x\neg y\neg z \vee \neg x\neg yz \vee \neg xyz \vee x\neg yz \vee xyz.$$

СДНФ содержит пять минтермов: $000, 001, 011, 101, 111$. Выполним склеивание. Удобно записать результаты в таблицу:

Склеиваемые минтермы	Импликанта
$000, 001$	$\neg x\neg y$
$001, 011$	$\neg xz$
$001, 101$	$\neg yz$
$011, 111$	yz
$101, 111$	xz
$001, 011, 101, 111$	z

Импликанта z получается двукратным склеиванием (сначала $001, 011 \to \neg xz$ и $101, 111 \to xz$, затем $\neg xz \vee xz \to z$; аналогично для $\neg yz$ и yz). Импликанты $\neg xz, \neg yz, yz, xz$ поглощаются импликантой z. Остаются простые импликанты $\neg x\neg y$ и z. Сокращённая ДНФ:

$$f_{\text{сокр}} = \neg x\neg y \vee z.$$

Импликантная матрица:

	000	001	011	101	111
$\neg x\neg y$	+	+			
z		+	+	+	+

Импликанта $\neg x\neg y$ единственная покрывает минтерм 000, значит, она существенна. Импликанта z единственная покрывает минтермы $011, 101, 111$, значит, она тоже существенна. Обе входят в единственную тупиковую ДНФ, она же минимальна:

$$f_{\min} = \neg x\neg y \vee z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–123; пример адаптирован.)

Пример 2. Минимизировать функцию

$$f(x, y, z) = xyz \vee x\neg yz \vee \neg xyz \vee \neg x\neg yz.$$

Все четыре минтерма склеиваются в пары:

$$xyz \vee x\neg yz = xz, \qquad \neg xyz \vee \neg x\neg yz = \neg xz,$$

$$xyz \vee \neg xyz = yz, \qquad x\neg yz \vee \neg x\neg yz = \neg yz.$$

Далее $xz \vee \neg xz = z$, $yz \vee \neg yz = z$. Простая импликанта — только z. Минимальная ДНФ:

$$f_{\min} = z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 119–124; пример адаптирован.)

Замечание о сложности. Метод Квайна требует перебора пар минтермов на каждом шаге. При числе переменных $n \geq 5$ и большом числе единиц функции число пар быстро растёт, и метод становится громоздким. Тем не менее он даёт точное решение задачи минимизации в классе ДНФ. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 121–124.)*

Карты Карно. Более удобным для ручной минимизации при $n \leq 5$–6 является графический метод карт Карно (диаграмм Вейча). Карта Карно — это таблица из 2^n клеток, расположенных так, что любые две соседние клетки (по горизонтали или вертикали) отличаются значением ровно одной переменной. Клетки на противоположных краях карты также считаются соседними («заворачиваются»).

В клетки записываются значения функции. Единицы объединяются в прямоугольные группы, содержащие $1, 2, 4, 8, \ldots$ клеток (степени двойки). Группа может быть прямоугольником или квадратом; она должна быть максимальной, то есть её нельзя расширить, не захватив нули. Одна и та же единица может входить в несколько групп.

Каждая группа даёт импликанту, в которой сохраняются только те переменные, которые не меняют значения внутри группы. Переменные, меняющие значение, из импликанты исключаются. Минимальная ДНФ получается как дизъюнкция импликант, соответствующих выбранному покрытию всех единиц.

Карта Карно для трёх переменных. Столбцы соответствуют наборам yz: $00, 01, 11, 10$; строки — значениям x: $0, 1$. Именно такой порядок обеспечивает соседство клеток, отличающихся на одну переменную.

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0				
1				

Карта Карно для четырёх переменных. Строки соответствуют наборам xy: $00, 01, 11, 10$; столбцы — наборам zw: $00, 01, 11, 10$:

$xy\backslash zw$	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127.)

Правила группировки.

1) Группируются только единицы.
2) Группа должна содержать $1, 2, 4, 8, \ldots$ клеток.
3) Группа должна быть прямоугольной (или квадратной).
4) Группы могут пересекаться.
5) Группы могут «заворачиваться» через края карты.
6) Каждая группа должна быть максимальной по размеру.
7) Число групп должно быть минимальным, а суммарное число литералов в соответствующих импликантах — наименьшим.

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127.)

Пример. Для функции

$$f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$$

построим карту Карно для трёх переменных:

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

Группа из четырёх единиц в столбцах 01 и 11 (при $x = 0$ и $x = 1$) даёт импликанту z (переменная x меняется, переменная y меняется, переменная z остаётся равной 1). Оставшаяся единица в клетке $x = 0, yz = 00$ объединяется с единицей $x = 0, yz = 01$ в группу из двух клеток, которая даёт $\neg x \neg y$. В результате

$$f_{\min} = z \vee \neg x \neg y.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127; пример адаптирован.)

Пример с четырьмя переменными. Пусть

$$f = \Sigma(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13, 15).$$

Карта Карно:

$xy\backslash zw$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	0	1	0

Группировка:

- четыре единицы в первой строке (00) дают $\neg x\neg y$;
- четыре единицы в столбцах $01, 11$ при $y = 1$ (клетки $01, 11$ для $xy = 00, 01, 11$) дают yz (здесь x меняется, w меняется, $y = 1$, $z = 1$);
- две единицы в клетках 1000 и 1011? Проверим: клетка $xy = 10, zw = 00$ содержит 1; клетка $xy = 10, zw = 11$ содержит 1. Они не соседние по одной переменной. Нужно объединять иначе. Клетки 1000 и 1010 соседние (отличаются w), дают $x\neg y\neg z$. Клетки 1011 и 1111 соседние (отличаются x), дают yz.

В результате

$$f_{\min} = \neg x\neg y \vee yz \vee x\neg y\neg z.$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–127; пример адаптирован.)

Минимизация в классе КНФ. Минимизация КНФ выполняется двойственным образом. Вместо единиц группируются *нули* функции. Каждая группа нулей даёт элементарную дизъюнкцию, в которой сохраняются переменные, не меняющиеся внутри группы, но с противоположными значениями: если переменная внутри группы равна 0, она входит в дизъюнкцию без отрицания; если равна 1 — с отрицанием. Минимальная КНФ получается как конъюнкция таких дизъюнкций.

Пример. Для функции $f = \Sigma(0, 1, 3, 5, 7)$ нули стоят на наборах $2, 4, 6$. Карта Карно с нулями:

$x\backslash yz$	00	01	11	10
0	1	1	1	0
1	0	1	1	0

Нуль в клетке $x = 0, yz = 10$ и нуль в клетке $x = 1, yz = 10$ объединяются в группу из двух клеток. Внутри группы x меняется, $y = 1$, $z = 0$. Дизъюнкция: $\neg y \vee z$. Нуль в клетке $x = 1, yz = 00$ объединяется с нулём $x = 1, yz = 10$? Они не соседние (отличаются y и z одновременно). Проверим: 100 и 110 — соседние (отличаются y); 100 и 000 — соседние (отличаются x). Группа из двух нулей 100 и 000 даёт дизъюнкцию $\neg x \vee z$ (внутри группы x меняется, $y = 0$, $z = 0$; значит, $\neg y$? Нет: для нулей правило другое). Аккуратно: для нулей в клетках 000 и 100 переменная x меняется, $y = 0$, $z = 0$. Дизъюнкция должна обращаться в 0 на этих наборах, то есть при $x = 0, y = 0, z = 0$ и $x = 1, y = 0, z = 0$. Этому условию удовлетворяет $y \vee z$. Значит, группа даёт $y \vee z$. Аналогично группа нулей 100 и 110 даёт $\neg x \vee z$. Объединяя, получаем

$$f_{\min\,\text{КНФ}} = (y \vee z) \wedge (\neg x \vee z) = (\neg x \vee z)(y \vee z).$$

Это равносильно найденной ранее МДНФ $z \vee \neg x\neg y$:

$$z \vee \neg x\neg y = (z \vee \neg x)(z \vee \neg y).$$

(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 124–128; Игошин, гл. I, §5, с. 51–53.)

Сравнение методов.

- *Метод тождественных преобразований* прост, но не гарантирует минимальности и плохо работает при большом числе переменных.
- *Метод Квайна* даёт точное решение, систематичен, но требует перебора и громоздок при $n \geq 5$.
- *Карты Карно* удобны для $n \leq 5$–6, дают наглядное решение, но плохо поддаются автоматизации. Для $n \geq 6$ карты становятся труднообозримыми.

Для большего числа переменных применяются машинные методы: метод Квайна–Мак-Класки, эвристические алгоритмы, основанные на импликантных матрицах, и другие. Разработаны также точные алгоритмы, гарантирующие минимальность, но они имеют экспоненциальную сложность. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 127–128.)*

Замечание о минимальности. Следует различать *сокращённую* ДНФ (дизъюнкция всех простых импликант), *тупиковые* ДНФ (минимальные по включению наборы простых импликант, покрывающие все минтермы) и *минимальную* ДНФ (тупиковая ДНФ с наименьшим числом литералов). Минимальная ДНФ всегда является тупиковой, но не наоборот. Число тупиковых ДНФ может быть большим, и выбор минимальной требует перебора. *(Источник: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 118–124.)*

Итог пункта. В пункте 1.1.5 рассмотрена задача минимизации булевых функций в классах ДНФ и КНФ. Введены понятия импликанты, простой импликанты, сокращённой, тупиковой и минимальной ДНФ. Изложены три метода минимизации: метод тождественных преобразований (склеивание и поглощение), метод Квайна (систематическое построение сокращённой ДНФ и импликантной матрицы) и метод карт Карно (графическая группировка единиц или нулей). Показано, что минимальная ДНФ не всегда совпадает с сокращённой и что задача минимизации может иметь несколько решений. Отмечены ограничения методов и необходимость машинных алгоритмов при большом числе переменных. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.5, с. 114–128; Игошин, гл. I, §4–6, с. 40–65.)*

1.1.6 Краткое резюме

Алгебра логики изучает высказывания и операции над ними. Булевы функции являются математической моделью логических операций и принимают значения в $\{0, 1\}$. Любая булева функция может быть задана таблицей истинности, формулой, СДНФ или СКНФ; СДНФ и СКНФ являются каноническими формами и единственны для данной функции (кроме тождественных констант). Полнота системы булевых функций означает возможность выразить через неё любую булеву функцию; критерий Поста сводит проверку полноты к пяти замкнутым классам P_0, P_1, L, S, M. Минимизация в классах ДНФ и КНФ позволяет получить более простые схемы и формулы; для её решения применяются тождественные преобразования, метод Квайна и карты Карно. *(Обобщение по: Макоха и др., гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128; Игошин, гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.)*
Источники к разделу:

- Макоха А.Н., Сахнюк П.А., Червяков Н.И. Дискретная математика. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. Гл. 2, §2.1–2.5, с. 96–128.
- Игошин В.И. Математическая логика и теория алгоритмов. М.: Академия, 2008. Гл. I, §1–6, с. 16–65; гл. II, §8–11, с. 90–111.