

MI602: Métodos Computacionais em Estatística, Atividade II

Guilherme Ludwig
gvludwig@ime.unicamp.br

17 de Novembro de 2022

- A atividade é individual. Referencie o trabalho citado, mas desenvolva as soluções na atividade. Explique resultados com suas próprias palavras.
 - A solução deve ser desenvolvida em detalhe. Todas as contas devem estar explicadas e desenvolvidas. Não é preciso fazer operações elementares manualmente mas as contas devem estar claramente indicadas.
 - Cada aluno deverá ser responsável por garantir que não há cópia do seu trabalho. Indícios de plágio podem levar à anulação da atividade de todos os envolvidos. Use seu bom senso para guiar as conversas com seus colegas.
 - A atividade deve ser entregue através do Moodle, em um único documento em formato PDF.
 - As páginas da sua solução devem estar numeradas, e as linhas também devem estar numeradas. Use o pacote no \LaTeX `\usepackage{lineno}` e `\linenumbers`. Isso é importante pois me ajudará a dar *feedback* à sua solução.
 - Se você usar o **Word** ou **LibreOffice**, numere linhas e páginas e imprima o documento em formato PDF antes de enviá-lo.
 - Use a linguagem que você preferir, de preferência com o pacote `listings` do \LaTeX para exibir código: **R**, **C**, **python**, **julia**, ou outra qualquer. Todos os códigos devem estar listados no final da atividade, com instruções de execução (à parte das languages listadas).
 - Se você quiser, pode usar **Rmarkdown**, **Jupyter notebooks** ou o que preferir para mesclar código e texto.
 - **Prazo de entrega:** 24/11/2022, às 23:59, via Moodle. Sem tolerância para atraso.
-

Esse exercício está adaptada da questão 2.6 do livro de Givens and Hoeting (2012), página 56. A Tabela 1 mostra as contagens de uma população do chamado besouro-da-farinha (*tribolium confusum*) em vários instantes do tempo. Os besouros em todos os estágios de desenvolvimento foram contabilizados, e a comida disponível foi controlada pelos pesquisadores. Um modelo elementar de crescimento populacional é o modelo logístico, em que

$$\frac{dN}{dt} = rN \left(1 - \frac{N}{K} \right),$$

onde N é o tamanho da população, t é o tempo, r é um parâmetro de taxa de crescimento, e K é um parâmetro que determina o potencial populacional do meio ambiente. A solução desta equação diferencial é dada por

$$N_t = f(t) = \frac{KN_0}{N_0 + (K - N_0) \exp\{-rt\}},$$

onde N_t é o tamanho da população no tempo t , e N_0 é o tamanho inicial.

Tabela 1: Contagem de besouros-da-farinha em todos os estágios de desenvolvimento, por dia

Dias	0	8	28	41	63	79	97	117	135	154
Besouros	2	47	192	256	768	896	1120	896	1184	1024

Considere $N_0 = 2$, e use como função objetivo a perda quadrática

$$Q(r, K) = \sum_{i=1}^m (N_i - f_{r,K}(t_i))^2,$$

onde $N_0 = 2, N_1 = 47, \dots, N_{10} = 1024$, e $t_0 = 0, t_1 = 8, \dots, t_{10} = 154$.

- (1) Encontre o gradiente e a matriz Hessiana para o problema de mínimos quadrados não-lineares \hat{r}, \hat{K} .
- (2) Implemente o método de Newton-Raphson manualmente (sem usar `optim` ou pacote similar). Comente sobre a convergência do método, experimentando diferentes valores iniciais.
- (3) Implemente *line search* no método anterior. Comente sobre o ganho computacional.
- (4) Uma suposição comum em modelagem populacional é a log-normalidade, isto é, $\log(N_t)$ tem distribuição normal com média $\log(f(t))$ e variância σ^2 . Neste caso, encontre os estimadores de máxima verossimilhança \hat{r}, \hat{K} utilizando o algoritmo de escore de Fisher (justifique suas contas; implemente o método sem usar `optim`).
- (5) Nota extra (20%): implemente o modelo log-normal do item (4) utilizando as restrições $r > 0, K > 0$ através do L-BFGS-B, utilizando `optim`.
- (6) Nota extra 2 (40%): faça o item (5) implementando funções objetivo e gradiente utilizando o Rcpp/Eigen.

Referências

G. H. Givens and J. A. Hoeting. *Computational Statistics*. John Wiley & Sons, 2012.