



DIVISÕES DO ZIGOTO E FORMAÇÃO DO EMBRIÃO

* REPRODUÇÃO HUMANA (VISÃO GERAL)



* DIVISÕES DO ZIGOTO



Amora




Açaí

Fruta - do - conde

* MÓRULA: SE FORMA ENTRE 3 e 4 DIAS PÓS-FECUNDAÇÃO

↳ VOLUME DA MÓRULA É PRATICAMENTE O DO ZIGOTO. (MACIÇO CELULAR)

* FORMAÇÃO DA BLÁSTULA (BLASTOCISTO)




* BLÁSTULA : SE FORMA ENTRE 4 e 7 DIAS PÓS-FECUNDAÇÃO

- NESTA ETAPA OCORRE A NIDACÃO
- TROFOBLASTO (FORMAÇÃO DOS ANEXOS EMBRIONÁRIOS)

OBS: BLÁSTULA POSSUI CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTES NO EMBRIOBLASTO

↳ CLONAGEM TERAPEÚTICA

* VISÃO DA NIDACÃO



Embrioblasto: disco bilaminar formado por epioblasto e hipoblasto



trofoblasto

- **Sinciotrofoblasto**: **implantação no útero e form. da placenta** (externo)
- **Citotrofoblasto**: **suporte p/ o sinciotrofoblasto** (interno)

Zigoto → mórula → blástula → gástrula → neurula

* GASTRULAÇÃO : PROCESSO DE FORMAÇÃO DA GÁSTRULA

↳ FOLHETOS EMBRIONÁRIOS (FORMAÇÃO)



↳ MESODERME VEM DA ENDODERME

* CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORDEM DE FORMAÇÃO DO ÂNUS E BOCA:

- ① **PROTOSTÔMIOS**: FORMAM A BOCA 1º e DEPOIS O ÂNUS. OBS: O ÂNUS SE FORMARÁ A PARTIR DE OUTRO ORIFÍCIO
- ② **DEUTEROSTÔMIOS**: FORMAM 1º O ÂNUS e DEPOIS A BOCA. OBS: A BOCA SE FORMARÁ A PARTIR DE OUTRO ORIFÍCIO



Segundo o desenvolvimento embrionário, os animais podem ser classificados em protostômios ou deuterostômios.

Em relação às diferenças entre esses dois grupos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- V** A -) Os animais protostômios têm uma boca desenvolvida a partir do blastoporo, enquanto os deuterostômios desenvolvem o ânus a partir do blastoporo.
- F** B - Os animais deuterostômios têm uma boca desenvolvida a partir do blastoporo, enquanto os protostômios desenvolvem o ânus a partir do blastoporo.
- F** C - Ambos os grupos de animais desenvolvem a boca e o ânus a partir do blastoporo, mas os protostômios desenvolvem a boca primeiro.
- F** D - Ambos os grupos de animais desenvolvem a boca e o ânus a partir do blastoporo, mas os deuterostômios desenvolvem a boca primeiro.

2024.1

* FORMAÇÃO DA NÊURULA: NEURULAÇÃO



Licenciado a: educacional@assat.com.br

CAVIDADE PR ABRIGAR OS ÓRGÃOS.

TUBO NEURAL → FORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO

NOTOCORDA → EIXO DE SUSTENTAÇÃO

SERÁ SUBSTITUÍDA PELA COLUNA VERTEBRAL,

MAS NÃO FORMA ELA!!!