



DIVISÕES DO ZIGOTO E FORMAÇÃO DO EMBRIÃO

* REPRODUÇÃO HUMANA (VISÃO GERAL)



* DIVISÕES DO ZIGOTO



Amora




Açaí

Fruta - do - conde

* MÓRULA: SE FORMA ENTRE 3 e 4 DIAS PÓS-FECUNDAÇÃO

↳ VOLUME DA MÓRULA É PRATICAMENTE O DO ZIGOTO. (MACIÇO CELULAR)

* FORMAÇÃO DA BLÁSTULA (BLASTOCISTO)




* BLÁSTULA : SE FORMA ENTRE 4 e 7 DIAS PÓS-FECUNDAÇÃO

- NESTA ETAPA OCORRE A NIDACÃO
- TROFOBLASTO (FORMAÇÃO DOS ANEXOS EMBRIONÁRIOS)

OBS: BLÁSTULA POSSUI CÉLULAS-TRONCO PLURIPOTENTES NO EMBRIOBLASTO

↳ CLONAGEM TERAPEÚTICA

* VISÃO DA NIDACÃO



Embrioblasto: DISCO BILAMINAR FORMADO POR EPIBLASTO e HIPOBLASTO



Trofoblasto

- **SINCIOTROFOBlasto**: IMPLANTAÇÃO DO EMBRIÃO e FORM. DA PLACENTA (EXTERNA)
- **CITOTROFOBlasto**: SUPORTE P/ O SINCIOTROFOBlasto. (INTERNA)

ZIGOTO → MÓRULA → BLÁSTULA → GÁSTRULA → NÊURULA

* GASTRULAÇÃO : PROCESSO DE FORMAÇÃO DA GÁSTRULA

↳ FOLHETOS EMBRIONÁRIOS (FORMAÇÃO)



↳ MESODERME VEM DA ENDODERME

* CLASSIFICAÇÃO QUANTO À ORDEM DE FORMAÇÃO DO ÂNUS E BOCA:

- ① **PROTOSTÔMIOS**: FORMAM A BOCA 1º e DEPOIS O ÂNUS. OBS: O ÂNUS SE FORMARÁ A PARTIR DE OUTRO ORIFÍCIO
- ② **DEUTEROSTÔMIOS**: FORMAM 1º O ÂNUS e DEPOIS A BOCA. OBS: A BOCA SE FORMARÁ A PARTIR DE OUTRO ORIFÍCIO



Segundo o desenvolvimento embrionário, os animais podem ser classificados em protostômios ou deuterostômios.

Em relação às diferenças entre esses dois grupos, assinale a alternativa **CORRETA**.

- V** A -) Os animais protostômios têm uma boca desenvolvida a partir do blastóporo, enquanto os deuterostômios desenvolvem o ânus a partir do blastóporo.
- F** B - Os animais deuterostômios têm uma boca desenvolvida a partir do blastóporo, enquanto os protostômios desenvolvem o ânus a partir do blastóporo.
- F** C - Ambos os grupos de animais desenvolvem a boca e o ânus a partir do blastóporo, mas os protostômios desenvolvem a boca primeiro.
- F** D - Ambos os grupos de animais desenvolvem a boca e o ânus a partir do blastóporo, mas os deuterostômios desenvolvem a boca primeiro.

2024.1

* FORMAÇÃO DA NÊURULA: NEURULAÇÃO




Licenciado a: educacional@assat.com.br

CAVIDADE PR ABRIGAR OS ÓRGÃOS.

TUBO NEURAL → FORMAÇÃO DO SISTEMA NERVOSO
NOTOCORDA → EIXO DE SUSTENTAÇÃO

SERÁ SUBSTITUÍDA PELA COLUNA VERTEBRAL,
MAS NÃO FORMA ELA!!!

* ORGANOGENESE (FOLHETOS EMBRIONÁRIOS)



REVESTIMENTO DA BEXIGA e URETRA
— REVESTIMENTO DE ÓRGÃOS.

* Questão Interessante:

03) (Campo Real/2021) Durante o desenvolvimento embrionário dos vertebrados, são formados três folhetos: ectoderme, mesoderme e endoderme. Os mecanismos de sinalização entre as células são fundamentais para que os processos de diferenciação ocorram. Uma falha nos processos de desenvolvimento da endoderme terá como consequência problemas no desenvolvimento de qual tipo celular no adulto?

- A) Células neurais. **ectoderme**
- B) Células do tecido ósseo. **MESODERME**
- C) Células do epitélio intestinal. **ENDODERME**
- D) Células do epitélio da pele. **ectoderme**
- E) Células musculares estriadas esqueléticas. **MESODERME**