

TESSAT



GEOGRAFIA

Aula:

16 ATÉ 18

Professor(a):

ALESSANDRO

1. (IA 41%) Leia o excerto a seguir:

Trata-se de planaltos de altitude média, variando entre 800 e 1.300 m, revestidos por bosques de diferentes densidades. Em sua acepção mais ampla, coincide com o Planalto Meridional Brasileiro.

Os elementos do meio físico indicados no texto são característicos do domínio morfoclimático

- a) das Pradarias
- b) das Caatingas.
- c) do Cerrado.
- d) das Araucárias.
- e) dos Mares de Morros.

2. (IA 51%) Assinale a opção em que são corretamente apresentados o tipo de clima e a classificação botânica predominante nas zonas equatoriais do Brasil, do congo africano e da Indonésia.

- a) clima equatorial e vegetação com porte arbustivo, folhas latifoliadas e ambiente tropófilo e higrófilo.
- b) clima equatorial e vegetação com porte herbáceo, folhas perenes e aciculifoliadas e ambiente halófilo.
- c) clima equatorial e vegetação com porte arbóreo, folhas perenes e latifoliadas e ambiente higrófilo.
- d) clima tropical e vegetação com porte arbustivo-herbáceo, folhas perenes e ambiente tropófilo.

e) clima tropical úmido e vegetação com porte arbóreo, folhas latifoliadas e ambiente xerófilo.

3. (IA 70%)



Conforme se observa no mapa, Ab'Sáber delimitou faixas de transição que


- a) ocorrem entre os domínios florestados, sobretudo no centro-sul do país.
- b) apresentam um padrão espacial semelhante em diferentes áreas do Brasil.
- c) assumem uma combinação de vegetação, solos e formas de relevo em cada parte do país.
- d) representam arranjos espaciais harmônicos, frequentemente denominados áreas core.
- e) são áreas que incorporam características de tropicalidade que as tornam semelhantes.

4. (IA 51%) *Na Amazônia existem florestas de inundação e florestas de terra firme. As florestas de inundação podem ser divididas em dois tipos: as matas permanentemente inundadas (igapós) e as florestas de inundação periódica (várzea).*

Sobre as matas de igapós presentes na Amazônia, é correto afirmar:

- a) ocorrem nos divisores de água e são marcados pela presença de espécies de família *Leguminosae*, como exemplo, a seringueira.
- b) ocupam quase a metade da Amazônia, formando uma grande cobertura de árvores que deixa o interior da floresta escuro e úmido.
- c) ocorrem em terrenos baixos próximos aos cursos dos rios e constituem-se de vegetação perenifólia.
- d) têm sua ocorrência próximo à foz dos rios e são marcadas pela inundação frequente das marés.
- e) ocorrem nas planícies de inundação dos rios e são formadas por vegetação rasteira de pequeno porte.

5. (IA 90%)



Aspecto de vegetação espinhenta por entre colinas revestidas de vegetação sertaneja arbustiva. Esse perfil de vegetação é característico do domínio

- a) das Caatingas.
- b) do Cerrado.
- c) das Pradarias.
- d) dos Mares de Morros.
- e) das Áreas de Transição.

6. (IA 56%) *Esse bioma tem como limitação comercial a baixa fertilidade de seus solos. A grande maioria é ácida, com baixo pH, altas concentrações de alumínio e algumas vezes de ferro e manganês, baixos teores de fósforo, cálcio e magnésio. Quase sempre apresentam solos deficientes em micronutrientes principalmente o zinco. São pobres em matéria orgânica com baixa capacidade de troca e saturação de bases. Quando corrigidos lideram produtividades da maioria dos produtos potencialmente comerciáveis. A calagem é o ponto inicial para a disponibilização dos seus solos para as atividades agrícolas.*

Assinale a opção que indica o bioma em que predomina o tipo de solo descrito.



a)




b)



c)



d)



e)

7. (IA 81%) O Bioma Amazônia corresponde a cerca de 49% do território brasileiro. É caracterizado pelo clima dominante quente e úmido, a predominância da fisionomia

florestal e pelo próprio contexto da Bacia do rio Amazonas, que possui a maior rede hidrográfica do planeta.

Sobre a importância da conservação deste bioma, analise as afirmativas a seguir.

I. O Bioma Amazônia contribui para o desenvolvimento da biotecnologia por seu estoque de material genético.

II. O Bioma Amazônia contribui para acelerar o aquecimento global por seu estoque e sua capacidade de fixação de carbono.

III. O Bioma Amazônia contribui para a manutenção das características do clima regional pela transferência de grandes quantidades de vapor d'água para a atmosfera.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I, II e III.

GABARITO

1. D
2. C
3. C
4. C
5. A
6. D



7. D

