





GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: A8 - RELEVO: DINAMICAS INTERNAS E EXTERNAS
(PARTE 1) – TQF (Treinamento de Questões Fechadas)

1. Por se situar em uma região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, a Turquia tem histórico de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Em 1939, um terremoto de magnitude 7,8 provocou a morte de cerca de 30.000 pessoas. Em fevereiro de 2023, registrou-se um terremoto de magnitude 7,8 às 4h17 (horário local) e, nove horas depois, registrou-se novo abalo sísmico, dessa vez de magnitude 7,6, o que levou 50.000 pessoas à morte.


A figura a seguir mostra a localização do sistema de falhas da placa da Anatólia e indica as áreas atingidas pelos respectivos terremotos.



Os tremores de 1939 e de 2023 foram gerados, respectivamente, pelo deslocamento entre a Placa da Anatólia e as placas

- a) Euroasiática e Arábica; o sentido de deslocamento das placas forma falhas transcorrentes.
- b) Indiana e Africana; o sentido de deslocamento forma falhas normais.
- c) Arábica e Euroasiática; o sentido de deslocamento das placas forma falhas normais.
- d) Africana e Indiana; o sentido de deslocamento forma falhas transcorrentes.

2. Um dos agentes responsáveis pela configuração da superfície dos continentes são os processos endógenos. A atuação desses agentes é representada na figura a seguir.



A partir da leitura da figura e de seus conhecimentos sobre os agentes de formação do relevo, é correto afirmar que, nos processos endógenos, ocorre a atuação de movimento

- a) divergente de placas tectônicas, originando o fenômeno do vulcanismo e a formação de cordilheiras.
- b) divergente de placas tectônicas, originando terremotos e a formação de formas de relevos aplainados.
- c) convergente de placas tectônicas, o que dá origem ao fenômeno do vulcanismo e à formação de cordilheiras.
- d) convergente de placas tectônicas, originando terremotos e a formação de relevos aplainados.

3. O Arquipélago de Fernando de Noronha formou-se há cerca de 12 milhões de anos, quando o magma na crosta oceânica extravasou e gerou uma cadeia de montanhas vulcânicas submarinas. Hoje, o arquipélago é a porção emersa dessa já extinta cadeia vulcânica. O magma que gerou o arquipélago foi formado em uma feição tectônica denominada Zona de Fratura Fernando de Noronha - um extenso sistema de falhas e fraturas geológicas profundas na crosta oceânica. (Geologia de Fernando de Noronha.

As cadeias de montanhas, assim como outras estruturas geológicas, são formadas por conta da movimentação das placas tectônicas. No caso de Fernando de Noronha, o seu surgimento tem sua origem no:

- a) Movimento divergente entre as placas Sul-Americana e de Nazca.

- b) Movimento divergente entre as placas Sul-Americana e do Caribe
- c) Movimento convergente entre as placas de Nazca e do Pacífico.
- d) Movimento divergente entre as placas Sul-Americana e Africana.
- e) Movimento convergente entre as placas Sul-Americana e Antártica.

4. Atente para o fragmento a seguir:

A litosfera é segmentada por fraturas, formando um mosaico com sete grandes placas e algumas menores, que deslizam horizontalmente, arrastando os continentes por cima da astenosfera.

Dentre os principais tipos de limites de placas tectônicas, aquela que é formada ao longo de uma falha transformante, onde o movimento relativo da placa é horizontal e paralelo ao seu limite, é conhecida como

- a) colisional.
- b) conservativa.
- c) consecutiva.
- d) convergente.

5. Observe a ilustração a seguir, referente a um dos aspectos da dinâmica da geoesfera denominada litosfera.



Pelas características geológicas apresentadas, é **CORRETO** afirmar que se trata de uma zona de

- a) divergência tectônica de placas litosféricas em movimento.

- b) espaço de limite entre placas litosféricas do tipo Falha Transformante.
- c) limite convergente entre duas placas litosféricas em movimento.
- d) ausência de fenômenos tectônicos e, portanto, sem sismicidade.
- e) vulcanismo inativo por ser um limite de falhas geológicas horizontais.

6. Atente para o seguinte excerto:

[...] é, essencialmente, o equilíbrio vertical da crosta terrestre (litosfera) sobre o substrato mantélico, controlado pela diferença de densidade das rochas que compõem a crosta e o manto. O relevo (topografia) resultante das diferenças de densidade na crosta é variável devido a mudanças de espessura dos pacotes litosféricos: o acúmulo de material gera sobrepeso e, conseqüentemente, ocorre afundamento da região (subsidência), enquanto o alívio de peso pode induzir emergência do terreno (soerguimento).

O excerto acima descreve o processo e apresenta o conceito de

- a) silicificação.
- b) isostasia.
- c) astenosfera.
- d) subducção.

7. Os terremotos são um dos mais graves problemas naturais com os quais as sociedades de vários países têm que conviver. O ser humano ainda não conseguiu desenvolver tecnologia para impedir essa forte manifestação da natureza.



Fonte: www.google.com.br

Os terremotos:

- a) são fortemente influenciados pela cinemática das águas oceânicas.
- b) independem das correntes de convecção existentes no interior da Litosfera.
- c) apresentam maior intensidade em áreas cratônicas estáveis.
- d) resultam, sobretudo, da energia liberada em áreas de colisão de placas litosféricas.
- e) surgem quando uma área cratônica colide com uma dorsal média oceânica e gera o soerguimento de um planalto.

8.

Terremoto no Nepal e na Índia

Tremor alcançou magnitude de 7,8.

Data: 25/04/2015

Horário: 3h11 (Brasília)

Nº de mortos: mais de mil



Fonte: USGS (Instituto de Geofísica dos Estados Unidos)


O evento representado na imagem está associado ao processo de

- a) choque das placas tectônicas.
- b) desgaste das rochas cristalinas.
- c) esgotamento das águas subterrâneas.
- d) exploração das bacias sedimentares.

9. *A crosta terrestre é constituída por sete grandes placas tectônicas e outras menores. Na zona de encontro entre duas placas divergentes, o magma aflora lentamente formando ao longo de milhares de anos uma cadeia montanhosa chamada _____. É o caso das placas Sul-Americana e Africana, cujo contato se dá no meio do oceano _____, formando a _____.*
Assinale a alternativa que preenche, **corretamente**, as lacunas no enunciado acima.

- a) fossa - Pacífico - Fossa das Marianas
- b) cordilheira - Índico - Cordilheira do Himalaia
- c) cordilheira - Pacífico - Cordilheira dos Andes
- d) dorsal - Atlântico - Dorsal Atlântica
- e) dorsal - Atlântico - Cordilheira do Himalaia

10.



As setas no mapa correspondem

- a) à direção do movimento das placas litosféricas.
- b) ao deslocamento das correntes marítimas.
- c) à direção do assoalho oceânico em profundidade.
- d) à direção das correntes de ressurgência.
- e) ao deslocamento do manto terrestre fluido.

GABARITO: 1-A 2-C 3-D 4-B 5-C 6-B 7-D 8-A 9-D 10-A