




GEOGRAFIA

PROF. ALESSANDRO

AULA: A9 - RELEVO: DINAMICAS INTERNAS E EXTERNAS
(PARTE 2) – TQF (Treinamento de Questões Fechadas)

1. A respeito dos processos geológicos e da geologia da Terra, assinale a alternativa correta.

- a) O metamorfismo é um importante agente no processo de formação das rochas sedimentares.
- b) A litosfera é formada pelas rochas da esfera terrestre, das crostas continental e oceânica, e por porções rígidas e móveis da litosfera denominadas placas tectônicas.
- c) O relevo é resultado da ação de agentes físicos exógenos que atuam tanto na crosta terrestre quanto no assoalho oceânico.
- d) As fossas abissais são depressões da crosta terrestre preenchidas por fragmentos minerais de rochas erodidas e sedimentos orgânicos diversificados.

2. Sobre os ambientes cársticos, é correto afirmar que

- a) o endocarste, porção subterrânea dos relevos cársticos, em função da sua condição metamórfica que é fortemente afetada pelos processos de dissolução, armazena grandes volumes de água.
- b) a evolução dos relevos cársticos é comandada pelos processos de deposição que atuam sobre a caulinita, formando, ao longo do tempo, feições como uvalas e dolinas.
- c) nos relevos cársticos recentes sob ação tectônica, a taxa de sedimentação nas vertentes tende a ser maior do que os processos de intemperismo, resultando na formação de uma rede de drenagem subterrânea.
- d) os relevos cársticos evoluem a partir dos mesmos processos presentes em ambientes não cársticos; contudo, predominam os processos de dissolução associados ao sistema hídrico e à natureza da rocha.

3. Observe a fotografia, a seguir, de uma estrada numa área tectonicamente ativa.



Um grupo de estudantes fez uma investigação geográfica sobre o que aconteceu com essa estrada numa determinada área tectonicamente instável. Pelas características apresentadas, conforme a fotografia, foram elencadas cinco hipóteses, registradas abaixo. Qual a verdadeira?

- a) Ocorreu um falhamento geológico.
- b) Houve um intenso processo erosivo que esculpiu um vale atectônico.
- c) O terreno, em face do aquecimento global, cedeu.
- d) Aconteceu uma erosão diferencial entre blocos rochosos.
- e) Notável aumento da sedimentação ocasionou uma erosão fluvial.

4.

RESGATE NA TAILÂNDIA


Como eles ficaram presos nas cavernas?

No dia 24 de junho, os rapazes adentraram a rede de cavernas para um passeio. Logo depois, começou a chover. Com isso, a entrada principal ficou bloqueada. Isso pode ter impedido o grupo de voltar e feito que buscasse uma área mais alta, protegida das águas. O complexo de cavernas, chamado de Tham Luan Nang, costuma ficar inundado durante o período de chuvas, de setembro a outubro.

As cavernas se formam por meio do trabalho erosivo dos rios, como também do intemperismo químico a partir da água já que ela infiltra e reage com calcário, formando um relevo bem particular denominado

- a) tabuliforme.
- b) cárstico.
- c) orogênico.
- d) platô.
- e) pediplanado.

5.



O drama de um grupo de crianças, membros de um time de futebol, presas em uma caverna na Tailândia, junto com seu técnico, provocou comoção internacional.

Sobre o ambiente das cavernas, pode-se afirmar:

- a) As cavernas são formadas quando a água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e as dissolvem formando espaços “ocos”.
- b) Nos países com clima temperado, como a Tailândia, as cavernas são sempre de origem vulcânica e, por isso, profundas.

- c) A elevada umidade das cavernas possibilita a abundância de animais vertebrados e de aracnídeos.
- d) Os estados brasileiros que possuem o maior número de cavernas estão localizados na Região Nordeste.
- e) A estrutura geológica e os fatores climáticos justificam porque na Região Sudeste do Brasil não existem cavernas.

6. *Tratam-se de áreas mais baixas encontradas nos escudos ou em seus arredores. São formadas por detritos ou sedimentos resultantes do desgaste das rochas ou por detritos orgânicos que se acumulam. Amadio, I. Manual Compacto de Geografia Geral – Ensino Médio. São Paulo: Rideel, 2010.*

Para essa estrutura geológica, é dado o nome de

- a) placas tectônicas.
- b) vulcões.
- c) bacias sedimentares.
- d) geleiras.
- e) dobramentos.

7. Trata-se de relevo caracterizado pela ocorrência de grutas, dolinas e drenagens subterrâneas e superficiais. O relevo descrito acima é denominado de

- a) cuesta.
- b) cárstico.
- c) pediplano.
- d) inselberg.

8.



(Fonte: <http://www.sinageo.org.br/2016/trabalhos/9/9-328-1673.html>, acessado em outubro de 2020)

Geologicamente falando, podemos denominar este resquício de relevo saliente de:

- a) Fiords
- b) Convectiva
- c) Inselberg
- d) Magma
- e) Escudos

9. No Nordeste setentrional brasileiro, existem feições de rochas graníticas que chamam atenção na paisagem por seu tamanho e forma. Por serem mais resistentes ao intemperismo e à erosão, são relevos isolados ou agrupados que se destacam em grandes superfícies planas. a assertiva CORRETA que corresponde ao tipo de feição descrita.

- a) Cânions.
- b) *Boulder*
- c) Falésias.
- d) *Inselbergs*.

10. Os fiordes referem-se a uma:

- a) Erosão fluvial
- b) Erosão eólica
- c) Erosão marinha
- d) Erosão glacial

GABARITO: 1-B 2-D 3-A 4-D 5-A 6-C 7-D 8-C 9-D 10-D