

集合的基数

School of Computer
Wuhan University



- 自然数的定义
- 等势
- 有限集和无限集
- 可数集
- 不可数集

Outline

① 可数集合和不可数集合

- 自然数的定义
- 等势
- 有限集和无限集
- 可数集
- 不可数集

- 从一到无穷大
- 一一对应——双射

自然数的定义

Definition (后继(Successor ordinal))

- 任意集合 S 的后继集合定义为: $S^+ = S \cup \{S\}$

例

- $\{a, b\}^+ = \{a, b\} \cup \{\{a, b\}\} = \{a, b, \{a, b\}\}$
- $\emptyset^+ = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$
- $(\emptyset^+)^+ = \{\emptyset\}^+ = \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
-

自然数的构造

Theorem (自然数公理)

存在集合 \mathbb{N} 满足以下条件:

- 1 $\emptyset \in \mathbb{N}$;
- 2 if $n \in \mathbb{N}$, $n \cup \{n\} \in \mathbb{N}$.

自然数集合

集合	编号
\emptyset	0
$\{\emptyset\}$	1
$\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$	2
.....	..
.....	n
$n \cup \{n\}$	$n + 1$
.....	..

自然数

Theorem (Peano 自然数公理)

- ① $0 \in \mathbb{N}$;
- ② 如果 $n \in \mathbb{N}$, 则存在唯一的 n 的后继 $n' \in \mathbb{N}$; (后继唯一性)
- ③ 0 不是任何自然数的后继;
- ④ 如果 $n' = m'$, 那么 $n = m$; (直接前驱唯一性)

Remark

常以②和④来检验一个序列有没有“自然数性质”, 如:

- 序列 $0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots$
- 序列 $0, 2, 4, 6, \dots, 1, 3, 5, 7, \dots$

自然数的大于和小于

Definition (小于)

- 若 $m, n \in \mathbb{N}$, 使得 $m \in n$, 则称 m 小于 n (或 n 大于 m), 记为 $m < n$ (or: $n > m$).

Definition (自然数的初始段)

- 集合 $\mathbb{N}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$, 称为自然数的前 n 初始段.

等势

Definition (等势(Equinumerous))

- 定义: 集合 A 和集合 B 等势, iff, 集合 A 和 B 之间存在双射, 记为 $A \sim B$; 否则, 称集合 A, B 不等势, 记为 $A \not\sim B$.
- 等势关系是一个等价关系.

例

- 例: 试证明: 集合 $(-1, 1)$ 与 $(-\infty, \infty)$ 等势.
- 证: 令 $f: (-1, 1) \rightarrow (-\infty, \infty), f(x) = \tan(\frac{\pi}{2}x)$
 $\forall y \in (-\infty, \infty), x = \arctan(y) * \frac{2}{\pi}, f(x) = y \therefore f$ 是满射;
 又 \therefore 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $f(x_1) = \tan(\frac{\pi}{2}x_1) \neq \tan(\frac{\pi}{2}x_2) = f(x_2), \therefore f$ 是单射;

有限集和无限集

Definition (有限集(Finite set)和无限集(Infinite set))

- 集合 A 为有限集, iff, $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得 $\mathbb{N}_n \sim A$, 称集合 A 的基数 (Cardinal) 为 n , 记为 $|A| = n$; 反之, 集合 A 称为无限集.

例

- 例: 试证明自然数集 \mathbb{N} 是无限集.
- 证明: (反证法)
 设 \mathbb{N} 为有限集, 则 $\exists f: \mathbb{N}_n \rightarrow \mathbb{N}, (n \in \mathbb{N})$, 是双射,
 设 $k \in \max(f(0), \dots, f(n-1)) + 1$, 则 $k \in \mathbb{N}$, 但不存在 x , 使 $f(x) = k$,
 $\therefore f$ 不是满射, 与 f 是双射矛盾.
 \therefore 自然数集 \mathbb{N} 是无限集.

有限集和无限集的性质

性质

- 任何有限集都不能与其真子集等势.
- 任何无限集都能与其真子集等势.
- 有限集的子集都是有限集.
- 无限集的父亲一定是无限集.

性质

Theorem

有限集的子集都是有限集.

Proof.

设 A 是有限集, $C \subseteq A$. 分两种情况:

- 若 C 是 \emptyset , 则 C 是有限集;
- 若 C 非空, 则 A 也非空, 可将 A 中的元素列为:

$a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$, 其中 $n \in \mathbb{N}, n \geq 1$

现构造一个双射函数 $g: \mathbb{N}_j \rightarrow C, (j \in \mathbb{N})$, 算法如下:

- ① $i = 0, j = 0$;
- ② 检查 a_i 是否在子集 C 中, 若 $a_i \in C$, 转③; 否则转④;
- ③ $g(j) = a_i, j++, i++$; 若 $i < n$, 转②; 否则结束;
- ④ $i++$; 若 $i < n$, 转②; 否则结束.

由此构造的 g 是从 $N_j = \{0, 1, \dots, j-1\}$ 到 C 的双射, 所以 C 是有限集.



可数集和不可数集

Definition (可数无限集(Countably infinite set))

- 集合 A 为 **可数无限集**, iff, 集合 A 与自然数集 \mathbb{N} 等势, 其基数用 \aleph_0 表示(读作阿列夫零), 记为 $|A| = \aleph_0$.

例

- 集合 \mathbb{N} , \mathbb{Z}^+ , \mathbb{Z} 的基数均为 \aleph_0 .

Definition (不可数集(Uncountable set))

- 集合 A 是 **不可数集**, iff, A 不是有限集且不是可数无限集.

集合分类

- | | | |
|-----|---|------|
| 可数集 | { | 有限集 |
| | | 可数无限 |
- 不可数集

可数无限集判别

Theorem

无限集合 A 为可数无限集, iff, A 的全部元素可以无重复地排列为一个序列 a_0, a_1, a_2, \dots .

Proof.



集合 A 可表示为 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, 则 a_n 与自然数 n 对应, 即可定义从 A 到 \mathbb{N} 的双射, $f: A \rightarrow \mathbb{N}, f(a_n) = n$, $\therefore A$ 为可数无限集.



若 A 为可数无限集, 则存在双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow A, f(n) = a_n$, 即 $f(n)$ 对应的元素为 a_n , $\therefore A$ 的元素可以无重复地排列为 $f(0), f(1), \dots, f(n), \dots$, 即排列为 a_0, a_1, a_2, \dots .



注

- “重复排列”等价于“无重复排列”. (构造算法)
- 此序列具有“自然数性质”.

枚举

Definition (枚举(Enumeration))

集合 A 的枚举是从自然数集 \mathbb{N} (\mathbb{N} 的初始段) 到 A 的一个满射函数;

- 若该满射也是单射, 则是一个无重复枚举;
- 若为非单射, 则是重复枚举.

性质

- 通常, 枚举 f 表示为 $\langle f(0), f(1), f(2), \dots, f(n), \dots \rangle$
- 集合 A 是可数的, iff, 集合 A 可枚举.

枚举

 $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 的枚举

$\langle 0, 0 \rangle$	$\langle 0, 1 \rangle$	$\langle 0, 2 \rangle$
$\langle 1, 0 \rangle$	$\langle 1, 1 \rangle$	$\langle 1, 2 \rangle$
$\langle 2, 0 \rangle$	$\langle 2, 1 \rangle$	$\langle 2, 2 \rangle$
...
...	$\langle m, n \rangle$...
...

例

- $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 是可数无限集.
- $f: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(m, n) = \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + m$

例子

 \mathbb{Q}^+ 的枚举(一)

1/1	→ 1/2	→ 1/3	→ ...
2/1	↙ 2/2	↙ 2/3	↙ ...
3/1	↙ 3/2	↙ 3/3	↙ ...
...	↙ ...	↙ ...	↙ ...
...	...	↘ m/n	↘ ...
...

 \mathbb{Q}^+ 的枚举(二)

1/1	→ 1/2	→ 1/3	→ ...
2/1	← 2/2	← 2/3	← ...
3/1	← 3/2	← 3/3	← ...
...
...	← ...	← m/n	← ...
...

例

- \mathbb{Q}^+ 是可数无限集.
- 是有重复的序列, 等价于无重复的序列.

字典序(Lexicographic order)

例

- 字母表 $\Sigma = \{a, b\}$, 其中 $a \prec b$, 则 Σ^* 是可数无限集.
 Σ^* 的元素可以排成序列 $\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, \dots$, 则 $|\Sigma^*| = \aleph_0$

Definition (字典序和标准序)

设有限字母表 Σ 指定了字母线序, 对于 $s, t \in \Sigma^*$

- 字典序 \prec ($s \prec t$)
 - s 是空串;
 - s 是 t 的前缀;
 - $s = zu, t = zv$, ($z \in \Sigma^*$ 是 s, t 的最长公共前缀), 且在字母线序中 u 的第一个字符前于 v 的第一个字符.
- 标准序 \preceq ($s \preceq t$)
 - $\|s\| < \|t\|$, or
 - $\|s\| = \|t\|$, 且在字典序中 s 前于 t .

可数集的性质(I)

性质

- ① 可数集的任何子集都是可数集.
- ② 可数个可数集的并集是可数集.

证明:分两种情况:见下表

有限个可数集

A_0	a_{00}	a_{01}	a_{02}	...
A_1	a_{10}	a_{11}	a_{12}	...
A_2	a_{20}	a_{21}	a_{22}	...
...
A_n	a_{n0}

可数无限个可数集

A_0	a_{00}	a_{01}	a_{02}	...
A_1	a_{10}	a_{11}	a_{12}	...
A_2	a_{20}	a_{21}	a_{22}	...
...
A_n	a_{n0}
...

可数集例子

Theorem

- 若 A, B 是可数集, 则 $A \times B$ 是可数集;
- 若 A 是可数集, 则 A^n 是可数集.

Example

- \mathbb{Q} 是可数集;
- $\mathbb{N}^2, \mathbb{Z}^n, \mathbb{Q}^n$ 是可数集;
- 有理系数的所有(n 次)多项式的集合是可数集;
- 以有理数为元素的所有 $m \times n$ 矩阵(任意有限维的矩阵)的集合是可数集.

可数集性质(II)

Theorem

任一无限集 A , 必会有可数无限子集.

Proof.

- 若 A 为无限集, 则 A 非空, 可任取出一元素 $a_1 \in A$,
- $A - \{a_1\}$ 仍为无限集, 再取出一元素 $a_2 \in A - \{a_1\}$,
- 所得集合仍为无限集;
- 如此继续, 得 A 的可数无限子集 $\{a_1, a_2, a_3, \dots\}$. \square

可数集性质(III)

Theorem

任一无限集 M , 必与自己的某真子集等势.

Proof.

- 由上可得 M 有可数无限子集 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$,
- 令 $M - A = B$,
- 定义函数 $f: M \rightarrow M - \{a_0\}$;
 - $f(a_n) = a_{n+1} \quad (a_n \in A)$;
 - $f(b) = b \quad (b \in B)$.
- 则, 易证 f 是双射. $\therefore M \sim M - \{a_0\}$.



可数集和不可数集

Definition (可数无限集(Countably infinite set))

- 集合 A 为 **可数无限集**, iff, 集合 A 与自然数集 \mathbb{N} 等势, 其基数用 \aleph_0 表示(读作阿列夫零), 记为 $|A| = \aleph_0$.

例

- 集合 \mathbb{N} , \mathbb{Z}^+ , \mathbb{Z} 的基数均为 \aleph_0 .

Definition (不可数集(Uncountable set))

- 集合 A 是 **不可数集**, iff, A 不是有限集且不是可数无限集.

集合分类

- 可数集
 - 有限集
 - 可数无限
 - 不可数集

不可数集

Definition (连续统势)

- 任一集合 A 具有连续统(Continuum)势, iff, A 与集合 $[0, 1]$ 等势, A 的基数为 \mathfrak{c} , 即 $|A| = \mathfrak{c}$.

Example-具有连续统势的集合

- 1 $[a, b]$
- 2 $(0, 1)$
- 3 \mathbb{R}

不可数集

Example

- 试证明: 集合 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 等势.
- 证明:

令 $A = \{0, 1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n, \dots\}$, 则 $A \subseteq [0, 1]$,

设 $f: [0, 1] \rightarrow (0, 1)$

$$f(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{if } x = 0 \\ 1/(n+2) & \text{if } x = 1/n, (n \geq 1, n \in \mathbb{N}) \\ x & \text{if } x \in [0, 1] - A \end{cases}$$

容易证明 f 是双射, \therefore 集合 $(0, 1)$ 与 $[0, 1]$ 等势.

Continuum hypothesis

连续统假设

- 连续统假设——在 \aleph_0 和 \mathfrak{c} 之间不存在其它的“无穷大”基数？
- 连续统假设是否成立，依赖于集合论的公理如何选择。
- https://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_hypothesis

本章内容

- 自然数的定义
- 等势
- 有限集和无限集
- 可数集
- 不可数集

Reference books



Kenneth H. Rosen.

《离散数学及其应用》(原书第8版).

机械工业出版社.



刘玉珍

《离散数学》.

武汉大学出版社.



王汉飞

《离散数学》讲义.