

PACIENTE KATHELLYN APARECIDA MARESCALCHI DA SILVA

DATA DO EXAME 14/01/2026

ULTRASSONOGRAFIA MORFOLÓGICA DO I TRIMESTRE

Data da última menstruação referida, porém não informada.

Idade Gestacional definida pelo Comprimento Cabeça-Nádegas (CCN): 14 semanas e 1 dias.

Situação variável.

ÚTERO

Apresenta-se em AVF com dimensões adequadas para a idade gestacional, apresentando contornos e textura normais.

PLACENTA

Inserção corporal posterior, grau 0 (Grannum) e espessura de 14 mm.

Líquido amniótico em quantidade normal.

ANÁLISE MORFOLÓGICA

- Polo Cefálico: Contorno craniano íntegro (ossificação presente) e plexos coróides simétricos.
- Face: Perfil facial com aspecto adequado
- Coluna: Visibilizada longitudinalmente, com alinhamento preservado.
- Tórax: Formato habitual. Parede anterior íntegra.
- Parede Abdominal: Íntegra, com inserção normal do cordão umbilical.
- Estômago: Imagem anecóica (conteúdo líquido) presente no quadrante superior esquerdo.
- Membros: Superiores e inferiores visibilizados (presença de 3 segmentos).

BIOMETRIA FETAL

Diâmetro Biparietal (DBP) 29 mm.

Diâmetro Occipitofrontal (DOF) 34 mm.

Circunferência Cefálica (CC) 101 mm.

Circunferência Abdominal (CA) 78 mm.

Comprimento do Fêmur (CF) 11 mm.

Translucência Nucal 1,6 mm.

Osso Nasal 3 mm.

Comprimento Cabeça-Nádegas 82 mm.

Batimentos cardíacos fetais rítmicos: 154 bpm. Movimentação fetal ativa: Presente.

ÍNDICES E ESTIMATIVAS:

- Índice Cefálico: 85 (Ref: 70-86).
- Relação CC/CA: 1,29.
- Relação Fêmur/CA: 14,1 (Ref: 20-24).
- Relação Fêmur/CC: 10,9.

RASTREAMENTO MORFOLÓGICO DE I TRIMESTRE

Risks from History

Trisomy 21: 1 in 870 Trisomy 13/18: 1 in 1700

The risk from history is based on a maternal age of 26 years and previous affected pregnancies.

Risks from History, NT

Trisomy 21: 1 in 3600 Trisomy 13/18: 1 in 5900

The adjusted risk is the risk at the time of screening. The calculation is based on the background risk and the following parameters: Ultrasound factors (NT).

CONCLUSÃO

Feto único com idade gestacional estimada pelo comprimento cabeça-nádegas (CCN), de 14 semanas e 1 dias, com variação de 5 dias.

- Peso fetal estimado: 86 g.

Os marcadores de cromossomopatias do 1º trimestre reduziram o risco inicial baseado na idade materna (Tabela FMF).

Não foram encontradas anomalias nas estruturas fetais observadas no presente exame.

A sensibilidade da medida da translucência nuchal e a avaliação do osso nasal na detecção de cromossomopatias (trissomia 21) é de aproximadamente 90%, quando realizada entre 11 e 14 semanas (CCN de 45 a 84 mm) e de aproximadamente 95% quando associada a marcadores bioquímicos. Para o cálculo do risco de cromossomopatias utilizou-se o programa desenvolvido pela 'Fetal Medicine Foundation' de Londres. O risco corrigido foi calculado com base nos resultados obtidos em mais de 100.000 pacientes submetidas ao exame ultrassonográfico no primeiro trimestre de gestação. Deve-se considerar que os riscos nesta fase da gestação são superiores aos riscos avaliados no segundo e terceiro trimestre de gestação. Cerca de 40% dos fetos com trissomias resultam em abortamento espontâneo.