

Paciente: Camila Cristina Facchinetti

Data: 14/01/2026

ULTRASSOM MORFOLÓGICO FETAL DE PRIMEIRO TRIMESTRE

DPP: --- (calculada pelo primeiro ultrassom), compatível com 11 semanas e 5 dias.

Gestação tópica de feto único, em situação variável.

Análise fetal:

Segmento cefálico

Crânio de contornos regulares e dimensões normais.

Estruturas da linha média presentes e plexo coróide visualizado.

Osso nasal presente.

Tórax

Forma e características ecográficas habituais.

Área cardíaca de dimensões e relação com o diâmetro torácico preservados.

Batimentos cardíacos presentes e rítmicos (F.C.F = 161 bpm).

Abdomem

Forma preservada.

Estômago repleto e visualizado em sua topografia habitual.

Bexiga repleta, de dimensões e aspectos preservados.

Membros

Membros inferiores e superiores visualizados, sem anormalidades grosseiras.

Movimentação fetal ativa e tônus adequado.

Biometria Fetal

Comprimento Cabeça-Nádega	53mm
Diâmetro Biparietal	19mm
Diâmetro Occipto Frontal	24mm
Circunferência Cefálica	69mm
Circunferência Abdominal	53mm
Comprimento do Fêmur	04mm
Comprimento do Úmero	03mm
Osso próprio do nariz	02mm
Translucência Nucal	0,7mm

Placenta de inserção corporal anterior, homogênea, grau 0, na escala de Grannum e de espessura normal, medindo 17 mm.

Líquido amniótico em quantidade normal para idade gestacional.

Ducto Venoso com Onda A positiva.

Impressão diagnóstica:

- Biometria fetal compatível com 12 semanas e 0 dias (+/- 7 dias).
- Peso 51 gramas.
- CÁLCULO DE RISCO PARA AS TRISSOMIAS

Risks from History

Trisomy 21: 1 in 177 Trisomy 13/18: 1 in 300

The risk from history is based on a maternal age of 36 years and previous affected pregnancies.

Risks from History, NT

Trisomy 21: 1 in 1400 Trisomy 13/18: 1 in 1000

The adjusted risk is the risk at the time of screening. The calculation is based on the background risk and the following parameters: Ultrasound factors (NT).

Nem todas as alterações que um feto possa vir apresentar após o nascimento, podem ser identificadas pelo exame ultrassonográfico. As estruturas examinadas, foram consideradas adequadas do ponto de vista ultrassonográfico devendo-se levar em consideração as limitações técnicas inerentes ao método e a idade gestacional.

Obs.:

- A medida da translucência nuchal consiste apenas em teste de rastreio e não um teste diagnóstico, devendo ser realizada entre a 11 e a 14 semanas de gestação
- Este exame não substitui a ecocardiografia fetal.

Favor trazer este exame quando vier realizar o próximo.

A imagem diagnóstica não é absoluta, devendo ser interpretada pelo médico assistente em conjunto com o exame físico e demais exames complementares.