Московский Физико–Технический Институт

Численные методы
Задание №5

ФИО: Лазарь Владислав Игоревич
Группа: Б01-207а
Почта: lazar.v@phystech.edu

Долгопрудный, 2026 г.

Метод Монте–Карло — это численный метод, основанный на моделировании случайных величин. Для вычисления числа π используется геометрическая интерпретация вероятности. Рассматривается четверть круга, вписанная в единичный квадрат.

Вероятность P попадания случайной точки $(x,\, y)$, где $x,\, y \in [0,\, 1]$, в область круга определяется отношением площадей:

$$p = \frac{S_{sector}}{S_{square}} = \frac{\pi \cdot r^2/4}{r^2} = \frac{\pi}{4}.$$

Следовательно, оценка числа π при большом количестве испытаний N вычисляется как

$$\pi \approx 4 \cdot \frac{N_{hits}}{N}.$$



Рис. 1: Визуализация распределения точек в методе Монте–Карло

Статистическая ошибка

Выведем стандартную ошибку исходя из того, что попадание точки в круг является испытанием Бернулли.

Итак, пусть каждая точка i — это испытание Бернулли. Точка либо попала в круг ($X_i = 1$), либо нет ($X_i = 0$). То есть вероятность успеха $p(X_i = 1) = \frac{\pi}{4}$, а вероятность неудачи $1-p = 1-\frac{\pi}{4}$. Для одного такого испытания дисперсия σ^2 вычисляется как:

$$\sigma^2 = p \cdot (1-p) = \frac{\pi}{4}\left(1 - \frac{\pi}{4}\right).$$

Оцениваем количество попаданий как среднее арифметическое:

$$\hat{p} = \frac{1}{N}\sum_i X_i.$$

По свойствам дисперсии для независимых величин, дисперсия среднего значения уменьша-

ется в N раз:

$$D[\hat{p}] = \frac{\sigma^2}{N} = \frac{p \cdot (1-p)}{N}.$$

Поскольку наша оценка $\pi_{\text{est}} = 4 \cdot \hat{p}$, то:

$$D[\pi_{\text{est}}] = 4^2 \cdot D[\hat{p}] = 16 \cdot \frac{p \cdot (1-p)}{N}.$$

Тогда:

$$\text{SE}[\pi_{\text{est}}] = \sqrt{16 \cdot \frac{p \cdot (1-p)}{N}} = 4\sqrt{\frac{p \cdot (1-p)}{N}} = \sqrt{\frac{\pi \cdot (4-\pi)}{N}}.$$

То есть для $N = 10^8$ мы должны получить $\text{SE}[\pi_{\text{est}}] \approx 0.00016$.

Ошибка убывает со скоростью $O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$, что требует значительного увеличения N для повышения точности. Например, чтобы получить еще один верный десятичный знак (уменьшить ошибку в 10 раз), нужно увеличить количество точек в 100 раз.

Реализация

Для генерации случайных чисел использовался алгоритм Вихрь Мерсенна (`std::mt19937`). Распараллеливание реализовано с помощью OpenMP. Каждый поток инициализирует собственный экземпляр генератора.

Результаты

В ходе работы было проведено моделирование метода Монте-Карло для вычисления числа π при объеме выборки от 10 до 10^8 точек. Также было получено, что

$$\text{SE}[\pi_{\text{est}}] \approx 0.00016,$$

как и ожидалось. Полученные данные демонстрируют стабильную сходимость алгоритма:

N	**Абс. ошибка**	**Станд. ошибка**
10^1	0.458407	0.519304
10^2	0.058407	0.164218
10^3	0.034407	0.051930
10^4	0.022407	0.016421
10^5	0.005432	0.005193
10^6	0.001411	0.001642
10^7	0.000580	0.000519
10^8	0.000164	0.000164


Сходимость метода Монте–Карло
SE
AE
Ошибка
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^1
10^2
10^3
10^4
10^5
10^6
10^7
10^8
Количество точек N