

Вариант 0 (для разбора)

- (1) ([10]) В области $Q = \{0 < x < \pi, 0 < y < \pi, 0 < t < +\infty\}$ решить задачу

$$u_{tt} - \Delta u = 3 \sin(2t) \sin(x) \cos(y/2),$$

с условиями
$$\begin{cases} u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 6 \sin(2x) \cos(3y/2), \end{cases} \quad \begin{cases} u|_{x=0} = 0, & u|_{x=\pi} = 0, \\ u_y|_{y=0} = 0, & u|_{y=\pi} = 0. \end{cases}$$

Указать, является ли полученное решение классическим решением этой задачи.

- (2) ([10]) Записать формальное решение в области $Q = \{0 < x < \pi, 0 < y < \pi, 0 < t < +\infty\}$ задачи

$$u_{tt} - \Delta u = 3 \sin(2t) f(x, y),$$

с условиями
$$\begin{cases} u|_{t=0} = 0, \\ u_t|_{t=0} = 0, \end{cases} \quad \begin{cases} u|_{x=0} = 0, & u|_{x=\pi} = 0, \\ u_y|_{y=0} = 0, & u|_{y=\pi} = 0. \end{cases}$$

Указать, определяет ли полученная формула обобщенное решение дифференциального уравнения, если $f \in L^2(\Omega)$.

- (3) ([10]) найти первую и вторую обобщенные производные функции

$$f(x) := \begin{cases} x^2 - 1, & x < 1, \\ 5, & x = 1, \\ x - 1, & x > 1 \end{cases}$$

Являются ли эти производные регулярными обобщенными функциями?

- (4) ([10]) В области $Q = \{0 < x < \pi, 0 < t < +\infty\}$ решить задачу

$$u_t = 4u_{xx} + te^{-t} \sin \frac{5x}{2}, \quad u(t, 0) = u_x(t, \pi) = 0, \quad u(0, x) = \sin \frac{x}{2} \cos x.$$