

Дифференциальные уравнения

2 курс

Домашняя работа

Владислав Мозговой

## Домашнее задание № 2

УРАВНЕНИЯ, НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОИЗВОДНОЙ, ПАРАМЕТР, ФАЗОВЫЕ ПОРТРЕТЫ

Дата сдачи задания: 17.11.2020

---

**Рекомендация.** В задачнике А.Ф. Филиппова “Сборник задач по дифференциальным уравнениям” имеется краткое изложение основных методов интегрирования предложенных ниже задач. Теория и полезные приемы представлены в начале каждого тематического раздела задачника.

---

Найдите семейство решений приведенных ниже уравнений, получите вид дискриминантной кривой и найдите особые решения, если они есть.

1.  $x \frac{dy}{dx} - y = \ln \frac{dy}{dx}$

2.  $x \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 - 2y \frac{dy}{dx} + x = 0$

3.  $\frac{dy}{dx} \left( x - \ln \frac{dy}{dx} \right) = 1$

Исследуйте фазовый портрет приведенных ниже линейных систем вблизи особой точки: определите тип особой точки и приведите чертеж фазовых кривых в ее окрестности.

4.  $\frac{dx}{dt} = x + 3y \quad \frac{dy}{dt} = x - y$

5.  $\frac{dx}{dt} = 6y - 9x \quad \frac{dy}{dt} = 4x - 11y$

6.  $\frac{dx}{dt} = 2y - x \quad \frac{dy}{dt} = 5y - 5x$

7.  $2 \frac{dx}{dt} = x - 2y \quad 2 \frac{dy}{dt} = 2x - 3y$

8.  $\frac{dx}{dt} = 13x - 20y \quad \frac{dy}{dt} = 10x - 15y$

9.  $\frac{dx}{dt} = 2y - x \quad \frac{dy}{dt} = y - x$

10.  $\frac{dx}{dt} = x + 4y \quad \frac{dy}{dt} = 5y - x$

## Решения

### Задача 1

$$x \frac{\partial y}{\partial x} - y = \ln \frac{\partial y}{\partial x}$$

$$p = y'$$

$$y = px - \ln(p)$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = p = p + xp' - \frac{p'}{p}$$

$$p' \left( x - \frac{1}{p} \right) = 0$$

$$x = \frac{1}{p}$$

$$x \frac{1}{x} - y = \ln \frac{1}{x}$$

$$y = \ln(x) + 1$$

или

$$p' = 0$$

$$p = c$$

$$y = xc - \ln(c)$$

Дискриминантные кривые:

$$\begin{cases} F = xp - y - \ln(p) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = x - \frac{1}{p} = 0 \end{cases}$$

$$F = 1 - y + \ln x = 0$$

$$y = \ln x + 1$$

Особые решения:  $y = \ln x + 1$

## Задача 2

$$x \left( \frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 - 2y \frac{\partial y}{\partial x} + x = 0$$

$$p = y'$$

$$xp^2 - 2yp + x = 0$$

$$D - 4(y^2 - x^2) \geq 0 \quad y^2 - x^2 \geq 0$$

$$y = \frac{xp}{2} + \frac{x}{2p}$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = p = \frac{p}{2} + \frac{xp'}{2} + \frac{1}{2p} - \frac{xp'}{2p^2}$$

$$p \left( 1 - \frac{1}{p^2} \right) = xp' \left( 1 - \frac{1}{p^2} \right)$$

$$1 - \frac{1}{p^2} = 0$$

$$p = \pm 1$$

$$x \pm 2y + x = 0$$

$$y = \pm x$$

$$xp' = p$$

$$p = xc$$

$$x^3 c^2 - 2xcy + x = 0$$

$$y = \frac{x^2 c}{2} + \frac{1}{2c}$$

$$\text{проверим } y^2 - x^2 \geq 0$$

$$\frac{x^4 c^2}{4} - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{4c^2} - x^2 \geq 0$$

$$x^4 c^2 - 6x^2 + \frac{1}{c^2} \geq 0$$

Ответ:

$$y = \pm x$$

$$y = \frac{x^2}{c} + \frac{1}{2c}$$

Дискриминантные кривые:

$$\begin{cases} F = xp^2 - 2yp + x = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = 2xp - 2y = 0 \end{cases} \quad p = \frac{y}{x}$$

$$F = \frac{y^2}{x} - \frac{2y^2}{x} + x = 0$$

$$-\frac{y^2}{x} + x = 0$$

$$x^2 = y^2$$

$$y = \pm x$$

Особые решения:  $y = \pm x$

### Задача 3

$$\frac{\partial y}{\partial x} \left( x - \ln \frac{\partial y}{\partial x} \right) = 1$$

$$\frac{\partial y}{\partial x} = p$$

$$x = \frac{1}{p} + \ln(p)$$

$$\frac{\partial x}{\partial y} = \left( -\frac{1}{p^2} + \frac{1}{p} \right) \frac{\partial p}{\partial y}$$

$$\frac{1}{p} = \frac{p-1}{p^2} p'$$

$$p' = \frac{p}{p-1}$$

$$\frac{\partial p}{\partial y} = \frac{p}{p-1}$$

$$\frac{p-1}{p} \partial p = \partial y$$

$$\int \left( 1 - \frac{1}{p} \right) \partial p = \int \partial y$$

$$p - \ln p = y + c$$

Следовательно решение имеет параметрический вид

$$\begin{cases} y = p - \ln(p) + c \\ x = \frac{1}{p} + \ln(p) \end{cases}$$

Дискриминантные кривые

$$\begin{cases} F = px - p \ln p - 1 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial p} = x - \ln p - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial (p \ln p)}{\partial p} = \ln p + p \frac{1}{p}$$

$$\ln p = x - 1$$

$$p = e^{x-1}$$

$$F = xe^{x-1} - e^{x-1}(x-1) - 1 = 0$$

$$F = e^{x-1} - 1 = 0$$

$$x - 1 = 0$$

Подставим в исходное уравнение

$$\frac{\partial y}{\partial x} \left( 1 - \ln \frac{\partial y}{\partial x} \right) = 1$$

$$1 + \ln \frac{\partial x}{\partial y} = \frac{\partial x}{\partial y}$$

Так как  $x = 1$ , то  $\frac{\partial x}{\partial y} = 0$ , следовательно  $x = 1$  не решение и особых решений нет.

# Задача 4

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 1 & -1-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 2$$

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$$

Найдем собственные вектора

$$\lambda_1 = 2 \quad A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

и

$$\lambda_2 = -2 \quad A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$X = T e^{Jt} T^{-1} = \frac{1}{4} e^{2t} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$




Рис. 1. Седло ( $\lambda_1, \lambda_2$  вещественны и разных знаков)

# Задача 5

$$\begin{vmatrix} -9 - \lambda & 6 \\ 4 & -11 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 20\lambda + 75 = (\lambda + 5)(\lambda + 15)$$

$$\lambda_1 = -5, \lambda_2 = -15$$

Найдем собственные вектора

$$\lambda_1 = -15 \quad A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 6 & 6 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

и

$$\lambda_2 = -5 \quad A - \lambda_2 I = \begin{pmatrix} -4 & 6 \\ 4 & -6 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = Te^{Jt}T^{-1} = \frac{1}{5}e^{-5t}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$




Рис. 2. Устойчивый узел  
( $\lambda_1, \lambda_2$  вещественны и отрицательны)

### Задача 6

$$\begin{vmatrix} -1-\lambda & 2 \\ -5 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 5$$

$$\lambda_1 = 2 - i, \lambda_2 = 2 + i$$

$$(A - \lambda I) f = 0$$

$$\begin{pmatrix} -3-i & 2 \\ -5 & 3-i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix} = 0$$

$$f = \begin{pmatrix} 2 \\ 3+i \end{pmatrix}$$

$$T = \|u, v\| = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X(t) = \frac{1}{2} e^t \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$v = \left( \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \right)_{|x=0} = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} y$$

$$\begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = e^{2t} \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$




Рис. 3. Неустойчивый фокус  
( $\lambda_1, \lambda_2$  – комплексны,  $\text{Re}(\lambda_{1,2}) > 0$ )

### Задача 7

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & -1 \\ 1 & -\frac{3}{2} - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda + \frac{1}{4}$$

$$\lambda = -\frac{1}{2}$$

Найдем собственные вектора

$$\lambda_1 = -\frac{1}{2}$$

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\left(A + \frac{1}{2}I\right) u_2 = u_1 \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$v = \left( \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \right)_{|y=0} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} x$$

$$e^{tJ} = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = T e^{tJ} T^{-1} = e^{-\frac{1}{2}t} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$




Рис. 4. Вырожденный устойчивый узел



### Задача 8

$$\begin{vmatrix} 13 - \lambda & -20 \\ 10 & -15 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 2\lambda + 5$$

$$\lambda_1 = -1 - 2i, \lambda_2 = -1 + 2i$$

$$(A - \lambda_1 I) f = 0$$

$$\begin{pmatrix} 14 - 2i & -20 \\ 10 & -14 - 2i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1^{(1)} \\ v_2^{(1)} \end{pmatrix} = 0$$

$$v^{(1)} = \begin{pmatrix} 7 + i \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 5 & 0 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = e^{qt} \begin{pmatrix} \cos wt & \sin wt \\ -\sin wt & \cos wt \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_0 & \eta_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = e^{-t} \begin{pmatrix} \cos 2t & \sin 2t \\ -\sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_0 & \eta_0 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{y=0} = \begin{pmatrix} 13 \\ 10 \end{pmatrix} x$$



Рис. 5. Устойчивый фокус  
( $\lambda_1, \lambda_2$  – комплексны,  $\text{Re}(\lambda_{1,2}) < 0$ )

### Задача 9

$$\begin{vmatrix} -1 - \lambda & 2 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1$$

$$\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i$$

$$(A - iI) v_1 = 0$$

$$\begin{pmatrix} -1 - i & 2 \\ -1 & 1 - i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 - i \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = T^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = e^{qt} \begin{pmatrix} \cos wt & \sin wt \\ -\sin wt & \cos wt \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi_0 \\ \eta_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \xi(t) \\ \eta(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos -t & \sin -t \\ -\sin -t & \cos -t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{y=0} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} x$$




Рис. 6. Центр ( $\lambda_1, \lambda_2$  чисто мнимые)

# Задача 10

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 4 \\ -1 & 5-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 6\lambda + 9 = (\lambda - 3)^2$$

$$\lambda = 3$$

Найдем собственные вектора

$$\lambda_1 = 3$$

$$A - \lambda_1 I = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 3I)v_2 = v_1 \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad T^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$v = \begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} \Big|_{y=0} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} x$$

$$X = T e^{tJ} T^{-1} = e^{3t} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$




Рис. 7. Вырожденный неустойчивый узел