

Логика и алгоритмы весна 2019.
Задачи для семинара N 1.

исчисление высказываний

Шпаргалка (аксиомы и правило вывода):

$$A_1 : A \rightarrow (B \rightarrow A);$$

$$A_2 : (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C));$$

$$A_3 : A \wedge B \rightarrow A;$$

$$A_4 : A \wedge B \rightarrow B;$$

$$A_5 : A \rightarrow (B \rightarrow (A \wedge B));$$

$$A_6 : A \rightarrow (A \vee B);$$

$$A_7 : B \rightarrow (A \vee B);$$

$$A_8 : (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow ((A \vee B) \rightarrow C));$$

$$A_9 : (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow \neg B) \rightarrow \neg A);$$

$$A_{10} : \neg \neg A \rightarrow A.$$

$$\text{Modus Ponens} : \frac{A, A \rightarrow B}{B}.$$

Теорема о дедукции: $\Gamma, A \vdash B \iff \Gamma \vdash A \rightarrow B$.

1. Докажите что:

- (a) если $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash B$, то $\Gamma \vdash A \wedge B$;
- (b) если $\Gamma, A \vdash C$ и $\Gamma, B \vdash C$, то $\Gamma, A \vee B \vdash C$ (правило разбора случаев).

2. Докажите что:

- (a) если $\Gamma, A \vdash B$ и $\Gamma, A \vdash \neg B$, то $\Gamma \vdash \neg A$ (рассуждение от противного),
- (b) $\vdash (A \rightarrow B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$,
- (c) $\vdash \neg \neg(A \vee \neg A)$,
- (d) $\vdash A \vee \neg A$,
- (e) если $\Gamma, A \vdash C$ и $\Gamma, \neg A \vdash C$, то $\Gamma \vdash C$.

3. Докажите выводимость следующих формул:

- (a) $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$;
- (b) $A \vee B \rightarrow B \vee A$;
- (c) $A \wedge (B \wedge C) \rightarrow (A \wedge B) \wedge C$;
- (d) $A \vee (B \vee C) \rightarrow (A \vee B) \vee C$;
- (e) $(A \vee B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C))$;

- (f) $(A \wedge C) \vee (B \wedge C) \rightarrow (A \vee B) \wedge C$;
- (g) $(A \vee B) \wedge C \rightarrow (A \wedge C) \vee (B \wedge C)$;
- (h) $(A \vee C) \wedge (B \vee C) \rightarrow (A \wedge B) \vee C$;
- (i) $(A \wedge B) \vee C \rightarrow (A \vee C) \wedge (B \vee C)$.

4. Докажите выводимость следующих формул:

- (a) $A \rightarrow \neg\neg A$;
- (b) $A \wedge \neg A \rightarrow B$;
- (c) $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow (A \rightarrow B)$.
- (d) $A \vee B \rightarrow (\neg A \rightarrow B)$;
- (e) $(\neg A \rightarrow B) \rightarrow A \vee B$.

5. Докажите выводимость формул, соответствующих законам де Моргана.

- (a) $\neg(A \vee B) \rightarrow \neg A \wedge \neg B$;
- (b) $\neg A \wedge \neg B \rightarrow \neg(A \vee B)$;
- (c) $\neg(A \wedge B) \rightarrow \neg A \vee \neg B$;
- (d) $\neg A \vee \neg B \rightarrow \neg(A \wedge B)$.

Множество формул Γ называется *непротиворечивым*, если нет такой формулы A , для которой одновременно $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash \neg A$. Максимальное по включению непротиворечивое множество формул называется *максимально непротиворечивым*.

Множество формул Γ называется *полным*, если для любой формулы A из гипотез Γ выводима ровно одна из формул $A, \neg A$.

- 6. Пусть дана функция $f : Var \rightarrow \{0, 1\}$ (оценка пропозициональных переменных). Докажите, что множество формул $\Gamma_f = \{A \mid f(A) = 1\}$ максимально непротиворечиво.
- 7. Докажите, что Γ полно тогда и только тогда, когда множество всех формул, выводимых из Γ , максимально непротиворечиво.
- 8. В этой задаче будем считать, что формулы содержат только три переменные p, q и r . Для следующих множеств формул определите, являются ли они непротиворечивыми и являются ли они полными.

- (a) $\{p \rightarrow q, q \rightarrow p\}$,
- (b) \emptyset ,
- (c) $\{p \wedge q \wedge r\}$,
- (d) $\{p \vee q \rightarrow r, \neg r, p \vee q\}$,
- (e) $\{p \wedge q \rightarrow q \vee r, r, \neg(p \vee q)\}$,
- (f) $\{\neg(p \rightarrow \neg q), \neg p\}$.

Логика предикатов.

- 9. Рассмотрим сигнатуру $\{\cdot, +, =\}$, где $\cdot, +$ — 2-местные функциональные символы, $=$ — 2-местный предикатный символ. Рассмотрим нормальную модель этой сигнатуры $(P(A), \cap, \cup)$, где A — некоторое множество, $P(A)$ — множество всех его подмножеств (т.е. \cdot интерпретируется как операция пересечения, а $+$ — как операция объединения на $P(A)$).

Рассмотрим модель $(P(A), =, \cap, \cup)$, где « $=$ » — предикат равенства, \cap и \cup — соответственно, пересечение и объединение множеств. Запишите формулу, говорящую, что в этой модели

- (a) $a \subset b$;
- (b) a — одноэлементное множество;
- (c) a — двухэлементное множество.

10. Для каждой из следующих формул определите, являются ли они выполнимыми или опровержимыми:

- (a) $\exists x \forall y (Q(x, x) \wedge \neg Q(x, y))$;
- (b) $\exists x \exists y (P(x) \wedge \neg P(y))$;
- (c) $\forall x \exists y (P(x) \leftrightarrow \neg P(y))$;
- (d) $\exists y \forall x (P(x) \leftrightarrow \neg P(y))$;
- (e) $\forall x \neg \forall y \neg P(x, y) \wedge \neg \exists z \forall y P(y, z)$;
- (f) $\forall x (\neg P(x, x) \wedge \exists z P(z, x) \wedge \forall y \exists z (P(x, z) \wedge P(z, y) \vee \neg P(x, y)))$.

11. общезначимы ли следующие формулы?

- (a) $\exists x \forall y Q(x, y) \rightarrow \forall y \exists x Q(x, y)$;
- (b) $\forall y \exists x Q(x, y) \rightarrow \exists x \forall y Q(x, y)$;
- (c) $\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)) \rightarrow \neg (\exists x P(x) \wedge \forall x Q(x))$.