
B
% significant (all groups)
40
20
0
0%
31.5%
0%
0%
0%
2.4%
any 0.1 53.9 0 0.1 0 6.2
single 0 29.7 0 0 0 1.2
multiple 0 48.1 0 0 0 6.4
high 0 38.6 0 0 0 3.2
medium 0 43.2 0 0 0 3.5
low 0.1 34.0 0 0 0 3.5
A 0 1.6 0 0 0 0.8
B 0 20.8 0 0 0 0.8
C 0 10.1 0 0 0 2.1
D 0 26.6 0 0 0 2.5
E 0 11.5 0 0 0 1.1
F 0.1 2.5 0 0 0 0.2
G 0 8.9 0 0 0 0.4
H 0 19.5 0 0 0 1.5
I 0 35.6 0 0 0 2.9
IgE group
LinDA
ANCOM-BC2
ALDEx2
ZicoSeq
Wilcoxon (CLR)
limma-voom
% significant (q < 0.05)
50
40
30
20
10
0
C
All sensitized vs matched controls (species, 5% prevalence)
LinDA BH q = 0.05
P. copri
q < 0.05 in
0 methods
1 method
2 methods
≥3 methods
−log10 p (raw)
log2 fold change (LinDA)
D
P. copri aggregate across methods and prevalence filters
LinDA
ANCOM-BC2
ALDEx2
ZicoSeq*
Wilcoxon (CLR)
limma-voom
effect (log2, method-specific scale)
10% prevalence
5% prevalence
1% prevalence
q < 0.05
q ≥ 0.05