Вариант 1

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b & при\ x < 0\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x-c} & при\ x > 0\ и\ b = 0 \\ \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 2

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} \dfrac{1}{ax} - b & при\ x + 5 < 0\ и\ c = 0 \\ \dfrac{x-a}{x} & при\ x + 5 > 0\ и\ c \neq 0 \\ \dfrac{10x}{c-4} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 3

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + bx + c & при\ a < 0\ и\ c \neq 0 \\ \dfrac{-a}{x - c} & при\ a > 0\ и\ c = 0 \\ a(x + c) & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 4

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -\ ax -\ c & при\ c < 0\ и\ x \neq 0 \\ \dfrac{x - a}{-c} & при\ c > 0\ и\ x = 0 \\ \dfrac{bx}{c -\ a} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 5

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} a - \dfrac{x}{10+b} & \text{при } x < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x-c} & \text{при } x > 0 \text{ и } b = 0 \\ 3x + \dfrac{2}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 6

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b^2 x & \text{при } c < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \dfrac{x+a}{x+c} & \text{при } c > 0 \text{ и } b = 0 \\ \dfrac{x}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 7

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -ax^2 - b & при\ x < 5\ и\ c \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x} & при\ x > 5\ и\ c = 0 \\ \dfrac{-x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 8

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -ax^2 & при\ c < 0\ и\ a \neq 0 \\ \dfrac{a-x}{cx} & при\ c > 0\ и\ a = 0 \\ \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 9

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b^2x & при\ a < 0\ и\ x \neq 0 \\ x - \dfrac{a}{x-c} & при\ a > 0\ и\ x = 0 \\ 1 + \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 10

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 - bx + c & при\ x < 3\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x-c} & при\ x > 3\ и\ b = 0 \\ \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 11

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + \dfrac{b}{c} & при\ x < 1\ и\ c \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{(x-c)^2} & при\ x > 1.5\ и\ c = 0 \\ \dfrac{x^2}{c^2} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 12

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^3 + b^2 + c & при\ x < 0.6\ и\ b + c \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x-c} & при\ x > 0.6\ и\ b + c = 0 \\ \dfrac{x}{c} + \dfrac{x}{a} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 13

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 + b & при\ x - 1 < 0\ и\ b - x \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x} & при\ x - 1 > 0\ и\ b + x = 0 \\ \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 14

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -ax^3 - b & при\ x + c < 0\ и\ a \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{x-c} & при\ x + c > 0\ и\ a = 0 \\ \dfrac{x}{c} + \dfrac{c}{x} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 15

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -ax^2 + b & при\ x < 0\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x}{x-c} + 5.5 & при\ x > 0\ и\ b = 0 \\ \dfrac{x}{-c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 16

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} a(x+c)^2 - b & при\ x = 0\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x-a}{-c} & при\ x = 0\ и\ b = 0 \\ a + \dfrac{x}{c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 17

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^2 - cx + b & при\ x + 10 < 0\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x - a}{x - c} & при\ x + 10 > 0\ и\ b = 0 \\ \dfrac{-x}{a - c} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 18

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} ax^3 + bx^2 & при\ x < 0\ и\ b \neq 0 \\ \dfrac{x - a}{x - c} & при\ x > 0\ и\ b = 0 \\ \dfrac{x + 5}{c(x - 10)} & в\ остальных\ случаях \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.

Вариант 19

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} a(x+7)^2 - b & \text{при } x < 5 \text{ и } b \neq 0 \\ \dfrac{x - cd}{ax} & \text{при } x > 5 \text{ и } b = 0 \\ \dfrac{x}{c} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c, d — действительные числа.

Вариант 20

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции F на интервале от Хнач. до Хкон. с шагом dX.

$$F = \begin{cases} -\dfrac{2x - c}{cx - a} & \text{при } x < 0 \text{ и } b \neq 0 \\ \dfrac{x - a}{x - c} & \text{при } x > 0 \text{ и } b = 0 \\ -\dfrac{x}{c} + \dfrac{-c}{2x} & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

где a, b, c — действительные числа.