



MATERIAL DE APOYO PARA EL MODULO I DE CÁLCULO II: 220041, 220181

Proyecto financiado por el Fondo de Desarrollo de la Docencia 2016-FDD2016-31, titulado Modularización, actualización y contextualización de los contenidos de Cálculo Integral en un texto guía para las carreras de Ingeniería de Ejecución en Electricidad, Ingeniería de Ejecución Electrónica, Ingeniería de Ejecución Mecánica.

Profesores participantes: Oscar Villarroel Carvallo, Fernando Flores Bazán.

Concepción, Agosto 2017.

Departamento de Matemática–Universidad del Bío-Bío

Índice general

1	Diferenciales	2
1.1	Derivación	2
1.2	Introducción a la diferencial	3
1.3	La Diferencial	3
1.3.1	Ejercicios propuestos	5
1.4	Propagación de errores	6
1.4.1	Problemas propuestos contextualizados	8
1.5	Diferenciales de Funciones Básicas	9
1.6	Propiedades de diferenciales	12
1.6.1	Ejercicios propuestos	14
2	Integral Indefinida	15
2.1	La Antiderivada	15
2.2	La Integral Indefinida	18
2.3	Integrales de funciones Básicas	22
2.4	Identidades Trigonómicas	24
2.5	Métodos de Integración	26
2.5.1	Método Cambio de variable	26
2.5.2	Integración por Partes	30
2.5.3	Funciones trigonométricas	35
2.5.4	Sustitución trigonométrica	44
2.5.5	Integración por Fracciones Parciales	50
2.6	Aplicaciones	55
2.6.1	introducción a las Ecuaciones diferenciales	55
2.6.2	Ejercicios Propuestos	56
2.6.3	Aplicaciones físicas	57
2.6.4	Aplicaciones de la integral en Mecánica Dinámica.	60
2.6.5	Crecimiento y decaimiento exponencial	64
2.6.6	Ley de enfriamiento de Newton	65

3	Integral Definida	67
3.1	Suma de Riemann	68
3.2	Integral definida como un límite de sumas	75
3.2.1	Ejercicios Propuestos	83
3.3	Ejercicios Propuestos	88
3.4	Aplicaciones de la Integral definida	89
3.4.1	Cálculo de Áreas	90
3.4.2	Problemas Propuestos	94
3.4.3	Cálculo de Volúmenes	96
3.4.4	Problemas Propuestos	102
3.4.5	Momentos y centro de masa	103

Capítulo 1

Diferenciales

1.1. Derivación

Propiedades 1.1.1.

1. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ función constante definida en I entonces $f(x) = C$ es derivable y se cumple

$$f'(x) = 0$$

2. Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ función derivable en I y $c \in \mathbb{R}$ entonces $cf(x)$ es derivable y se cumple

$$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x).$$

3. Sean $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en I entonces $(f(x) \pm g(x))$ es derivable y se cumple que

$$(f \pm g)'(x) = f'(x) \pm g'(x).$$

4. Sean $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en I entonces $f(x) \cdot g(x)$ es derivable y se cumple que

$$(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)$$

5. Sea $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones derivables en I entonces $\frac{f(x)}{g(x)}$ es derivable y se cumple que

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}, \quad g(x) \neq 0$$

1.2. Introducción a la diferencial

Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función diferenciable definida en el intervalo I y sean dados los puntos $x_0, x_0 + h \in I$ con $h \neq 0$, como f es diferenciable, existe la derivada de f , es decir

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right]$$

y eligiendo $\epsilon > 0$ pequeño, la diferencia

$$\left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \right| < \epsilon$$

se hace pequeña como queramos para los $h \neq 0$, de modo que si definimos la función $\phi(h)$ como

$$\phi(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - f'(x_0) \quad (1.1)$$

se tiene que $\lim_{h \rightarrow 0} \phi(h) = 0$, luego de (1.1) se obtiene la expresión

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = hf'(x_0) + h\phi(h)$$

Si denotamos $\Delta y = f(x_0 + h) - f(x_0)$; $\Delta x = x_0 + h - x_0 = h$ la expresión anterior quedará

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + \Delta x\phi(\Delta x)$$

1.3. La Diferencial

Definición 1.3.1. Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función diferenciable definida en el intervalo I y sean dados los puntos $x_0, x_0 + h \in I$ con $h \neq 0$,


1. Se define al término $f'(x_0)\Delta x$ como **diferencial** de f con respecto a x_0 y se denota

$$dy = df(x_0) = f'(x_0)\Delta x = f'(x_0) dx$$

2. En general la diferencial de f respecto a x es

$$dy = df(x) = f'(x)dx.$$

En conclusión la diferencial de una función es igual al producto de su derivada por la diferencial de la variable independiente, gráficamente es así



Ejemplo 1.3.1. Sea $y = f(x) = x^2 + x - 1$

(a) Hallar dy para $x = 1$ y $dx = 0,1$

(c) Comparar dy y Δy

(b) Hallar Δy para $x = 1$ y $\Delta x = 0,1$



Resolución: ►

(a) **Derivada de f .**

$$f(x) = x^2 + x - 1 \Rightarrow \boxed{f'(x) = 2x + 1}$$

Diferencial

$$dy = f'(x) \cdot dx \Rightarrow \boxed{dy = (2 + 1) \cdot (0,1) = 0,30}$$

(b) **Cálculo Δy (el verdadero cambio en la ordenada y)**

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = (x + \Delta x)^2 + (x + \Delta x) - 1 - (x^2 + x - 1)$$

$$\Delta y = \Delta x(2x + 1 + \Delta x) \Rightarrow \boxed{\Delta y = (0,1)(3 + 0,1) = 0,31}$$

(c) **La diferencia** $\boxed{\epsilon = \Delta y - dy = 0,31 - 0,30 = 0,01}$

Confeccionaremos una tabla donde los valores de Δx son 0,1, 0,01, 0,001 y vemos que dy aproxima a Δy cada vez más exactamente cuando Δx tiende hacia cero

$dx = \Delta x$	dy	Δy	$\Delta y - dy$
0.100	0.300	0.310000	0.010000
0.010	0.030	0.030100	0.000100
0.001	0.003	0.003001	0.000001

Ejemplo 1.3.2. Calcule la diferencial de las funciones siguientes

(a) $f(x) = \cos(x)$

(b) $f(x) = 3^x$

(c) $f(x) = (x+1)^x$



Resolución: ►

(a) Cálculo de la derivada de $f(x) = \cos(x)$

$$f'(x) = (\cos(x))' = -\operatorname{sen}(x)$$

Cálculo de la diferencial de f

$$\begin{aligned} df(x) &= (\cos(x))' dx \\ \Rightarrow &\boxed{df = -\operatorname{sen}(x) dx} \end{aligned}$$

(b) Cálculo de la derivada de $f(x) = 3^x$

$$f'(x) = (3^x)' = 3^x \ln(3) \cdot (x)' = 3^x \ln(3)$$

Cálculo de la diferencial de $f(x) = 3^x$

$$\begin{aligned} df(x) &= (3^x)' dx \\ \Rightarrow &\boxed{df(x) = 3^x \ln(3) dx} \end{aligned}$$

(c) Cálculo de la derivada de $f(x) = (x+1)^x$

$$\begin{aligned} f'(x) &= ((x+1)^x)' = (x+1)^{x-1} [(x+1) \cdot (x)' \ln(x+1) + x(x+1)'] \\ \Rightarrow &\boxed{f'(x) = (x+1)^{x-1} [(x+1) \ln(x+1) + x]} \end{aligned}$$

Cálculo de la diferencial de $f(x) = (x+1)^x$

$$\begin{aligned} df(x) &= ((x+1)^x)' dx \\ \Rightarrow &\boxed{df(x) = [(x+1)^{x-1} ((x+1) \ln(x+1) + x)] dx} \end{aligned}$$

1.3.1. Ejercicios propuestos

Problema 1.3.1. Para las funciones dadas y sus respectivos valores hallar $\Delta y - dy$

1. $f(x) = x^2 - 2x - 3$, $x = -1$, $\Delta x = 0,02$

6. $f(x) = \frac{1}{x}$, $\Delta x = 2$, $\Delta x = 0,05$

2. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 3$, $x = 2$, $\Delta x = 0,01$

7. $f(x) = \sqrt{x}$, $x = 1$, $\Delta x = 0,01$

3. $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 4$, $x = -1$, $\Delta x = 0,02$

8. $f(x) = 2x^2 - 5$, $x = 2$, $\Delta x = 0,01$

4. $f(x) = 80x - 16x^2$, $x = 4$, $\Delta x = -0,2$

9. $f(x) = x^2 - 3x$, $x = -1$, $\Delta x = 0,02$

5. $f(x) = x^3 + 1$, $x = 1$, $\Delta x = -0,5$

10. $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $x = 2$, $\Delta x = 0,01$

1.4. Propagación de errores

Definición 1.4.1.

1. Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función definido en el intervalo I se llama **error propagado** a la expresión

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x)$$

donde

$$f(x + \Delta x) \text{ es el } \mathbf{valor\ exacto}$$

y

$$\Delta x \text{ es el } \mathbf{error\ de\ medida}$$

2. Se llama **error relativo** a la expresión

$$\frac{\Delta f}{f(x)}$$

3. Cuando Δf es aproximado por $df(x)$ entonces se define el **error relativo aproximado** por

$$\frac{df(x)}{f(x)} = \frac{f'(x)dx}{f(x)}$$

4. Se define **error porcentual** aproximado po

$$\frac{df(x)}{f(x)} \cdot 100\% = \frac{f'(x)dx}{f(x)} \cdot 100\%$$

Observación 1.4.1.


- (a) Cuando se pide calcular el valor aproximado del incremento de f (Δf) se interpretar por la diferencial de f .
- (b) El máximo error posible cometido, se interpreta por la diferencial.

Ejemplo 1.4.2. Usando diferenciales

- (a) Obtener el valor aproximado del incremento en el volumen de un cubo, cuyos lados tienen una longitud de 2m., considerando un aumento de 0.003 por lado.
- (b) Hallar el valor aproximado del volumen de una cáscara esférica de 200mm. de diámetro exterior y 1mm. de espesor.

**Resolución:** ►

(a)




En general el volumen del cubo es
 $V = l^3$, donde l es la medida del lado.

El incremento del volumen del cubo es
 $dV = 3l^2 dl$

Si el lado del cubo se aumento en 0,003m entonces el volumen también aumento en
 $dV = 3(2)^2(0,003) = 0,036m^3$

(b)




En general el volumen de la esfera es
 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, donde r es el radio de la esfera.

El incremento del volumen de la esfera es
 $dV = \frac{4}{3}\pi(3r^2)dr$

El volumen de la cáscara esférica es el incremento del volumen de la esfera cuyo radio es $r = 99mm$ que se incremento en 1mm
 $dV = \frac{4}{3}\pi(3r^2)dr = 4\pi \cdot r^2 dr = 4 \cdot 3,14159(99)^2 \cdot (1) = 123163mm^3$

Ejemplo 1.4.3. Se mide el radio de un cilindro de 25 pulgadas de altura, encontrándose que es de 20 pulgadas con un error de 0.05 pulgadas. Encontrar el porcentaje de error aproximado del volumen, la superficie lateral y del área de la base.

**Resolución:** ▶

Cálculo del error porcentual aproximado del volumen (note que el volumen debe estar en función del radio ya que el error se produce en la medición del radio)

La expresión del volumen de un cilindro en general es $V(r) = \pi r^2 h$

Para nuestro problema $h = 25 \text{ pulg.}$, $r = 20 \text{ pulg.}$ entonces $V(20) = 25\pi(20)^2 = 10000\pi$

La diferencial del volumen es

$$dV(r) = dV(r) = 2\pi r 25 = 50\pi r dr$$

El error relativo aproximado es

$$\begin{aligned} e_{rV} &= \frac{dV}{V} = \frac{50\pi r dr}{10000\pi} \\ &= \frac{1000\pi(0,05)}{10000\pi} = 0,005 \\ \Rightarrow e_{rV} &= 0,005 \end{aligned}$$

El error porcentual aproximado es

$$\begin{aligned} e_{pV} &= e_{rV} \cdot 100\% = 0,005 \cdot 100\% \\ \Rightarrow e_{pV} &= 0,5\% \end{aligned}$$

El área lateral de un cilindro circular es $A(r) = 2\pi r h$

Rpta: error porcentual aproximado $e_{pA} = 0,25\%$

El área de la base es $A_b(r) = \pi r^2$

Rpts: error porcentual aproximado es $e_{pA_b} = 0,5\%$

1.4.1. Problemas propuestos contextualizados

Problema 1.4.1. Un tanque cilíndrico de hierro tiene 6 pies de altura y un diámetro exterior de 2 pies; si la tapa y la parte inferior del tanque tienen 0.5 pulgadas de grosor y las paredes 0.25 pulgadas; usar diferenciales para calcular aproximadamente el peso del tanque, si el hierro pesa $450 \frac{\text{lb}}{\text{pie}^3}$

Problema 1.4.2. Hallar aproximadamente la variación experimentada por el volumen de un cubo de arista x cuando esta se incrementa en 1%

Problema 1.4.3. Un disco metálico se dilata por acción del calor de manera que su radio aumenta desde 5 a 5.06 cm. Hallar el valor aproximado del incremento del área.

Problema 1.4.4. Una bola de hielo tiene 10 cm. de altura, si el radio cambia de 2 a 2.06 cm. calcular el cambio aproximado correspondiente al volumen del cilindro y hallar el error porcentual de cambio en el volumen.

Problema 1.4.5. La altura de un cono recto circular es el doble del radio de la base. Al medir se encontró que la altura es de 12 pulg. Con un posible error de 0.005pulg. Encontrar el error aproximado en el volumen calculado del cono.

1.5. Diferenciales de Funciones Básicas

DIFERENCIALES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS		
FUNCIÓN	DERIVADA	DIFERENCIAL
$f(x) = \text{sen}(x)$	$f'(x) = \cos(x)$	$df(x) = (\cos(x))dx$
$f(x) = \cos(x)$	$f'(x) = -\text{sen}(x)$	$df(x) = (-\text{sen}(x))dx$
$f(x) = \tan(x)$	$f'(x) = \sec^2(x)$	$df(x) = (\sec^2(x))dx$
$f(x) = \cot(x)$	$f'(x) = -\csc^2(x)$	$df(x) = (-\csc^2(x))dx$
$f(x) = \sec(x)$	$f'(x) = \sec(x)\tan(x)$	$df(x) = (\sec(x)\tan(x))dx$
$f(x) = \csc(x)$	$f'(x) = -\csc(x)\cot(x)$	$df(x) = (-\csc(x)\cot(x))dx$

DIFERENCIALES DE FUNCIONES TRIGONÓMICAS INVERSAS		
FUNCIÓN	DERIVADA	DIFERENCIAL
$f(x) = \arccos(x)$	$f'(x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$df(x) = \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx$
$f(x) = \arcsen(x)$	$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$df(x) = \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) dx$
$f(x) = \arctan(x)$	$f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$	$df(x) = \left(\frac{1}{1+x^2}\right) dx$
$f(x) = \operatorname{arccot}(x)$	$f'(x) = -\frac{1}{1+x^2}$	$df(x) = \left(-\frac{1}{1+x^2}\right) dx$
$f(x) = \operatorname{arcsec}(x)$	$f'(x) = \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$df(x) = \left(\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\right) dx$
$f(x) = \operatorname{arccosec}(x)$	$f'(x) = -\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$	$df(x) = \left(-\frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\right) dx$

DIFERENCIALES DE FUNCIONES TRIGONOMETRICAS HIPERBÓLICAS		
FUNCIÓN	DERIVADA	DIFERENCIAL
$f(x) = \sinh(x)$	$f'(x) = \cosh(x)$	$df(x) = (\cosh(x)) dx$
$f(x) = \cosh(x)$	$f'(x) = \sinh(x)$	$df(x) = (\sinh(x)) dx$
$f(x) = \tanh(x)$	$f'(x) = \operatorname{sech}^2(x)$	$df(x) = (\operatorname{sech}^2(x)) dx$
$f(x) = \coth(x)$	$f'(x) = -\operatorname{cosech}^2(x)$	$df(x) = (-\operatorname{cosech}^2(x)) dx$
$f(x) = \operatorname{sech}(x)$	$f'(x) = -\operatorname{sech}(x)\tanh(x)$	$df(x) = (-\operatorname{sech}(x)\tanh(x)) dx$
$f(x) = \operatorname{cosech}(x)$	$f'(x) = -\operatorname{cosech}(x)\coth(x)$	$df(x) = (-\operatorname{cosech}(x)\coth(x)) dx$

DERIVADAS DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	
FUNCIÓN	DERIVADA
$f(x) = \log_a(g(x))$	$f'(x) = \frac{g'(x)}{g(x)\ln(a)}$
$f(x) = a^{g(x)}$	$f'(x) = a^{g(x)}(\ln(a))g'(x)$
$f(x) = [g(x)]^{h(x)}$	$f'(x) = g(x)^{h(x)} \left[\frac{g(x)h'(x)\ln(g(x)) + h(x)g'(x)}{g(x)} \right]$
$f(x) = (g(x))^n$	$f'(x) = n g(x)^{n-1} g'(x)$

DIFERENCIALES DE FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS	
FUNCIÓN	DIFERENCIAL
$f(x) = \log_a(g(x))$	$df(x) = \left(\frac{g'(x)}{g(x)\ln(a)} \right) dx$
$f(x) = a^{g(x)}$	$df(x) = (a^{g(x)}(\ln(a))g'(x)) dx$
$f(x) = [g(x)]^{h(x)}$	$df(x) = g(x)^{h(x)} \left[\frac{g(x)h'(x)\ln(g(x)) + h(x)g'(x)}{g(x)} \right] dx$
$f(x) = (g(x))^n$	$df(x) = (n g(x)^{n-1} g'(x)) dx$

1.6. Propiedades de diferenciales

Propiedades 1.6.1. Suponga que $f, g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones diferenciales, y definamos $u = f(x)$, $v = g(x)$ y k constante real, entonces por definición de diferencial $du = u'dx$, $dv = v'dx$ entonces

1. La diferencial de una constante

$$d(k) = 0$$

2. La diferencial de un número por una función

$$d(ku) = kdu$$

3. La diferencial de la suma de dos funciones

$$d(u + v) = du + dv$$

4. La diferencial de la diferencia de dos funciones

$$d(u - v) = du - dv$$

5. La diferencial del producto de dos funciones

$$d(uv) = u dv + v du$$

6. La diferencial de la división de dos funciones

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2}, v \neq 0$$

7. La diferencial de la composición de dos funciones

$$d(u \circ v) = (u' \circ v) dv$$

8. Diferencial de una potencia

$$d(x^n) = nx^{n-1}dx$$

Ejemplo 1.6.2. Hallar la diferencial para cada una de las funciones dadas, donde $a \in \mathbb{R}$

1. $f(x) = x\sqrt{a^2 - x^2}$

2. $f(x) = \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{\frac{a}{x}}$



Resolución: ►

1. La función $f(x) = x\sqrt{a^2 - x^2} = \sqrt{a^2x^2 - x^4}$ entonces

$$\begin{aligned} df(x) &= \left(\sqrt{a^2x^2 - x^4} \right)' dx = \frac{1}{2} (a^2x^2 - x^4)^{-\frac{1}{2}} (a^2x^2 - x^4)' dx \\ &= \left(\frac{2a^2x - 4x^3}{2\sqrt{a^2x^2 - x^4}} \right) dx = \frac{2x(a^2 - 2x^2)}{2x\sqrt{a^2 - x^2}} dx \Rightarrow df(x) = \frac{(a^2 - 2x^2)}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx \end{aligned}$$

2. Al elevar al cuadrado la función $f(x) = \sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{\frac{a}{x}}$ quedaría $f^2(x) = \frac{x}{a} - 2 + \frac{a}{x}$ y al diferenciar esta última expresión se obtiene

$$2f(x)df(x) = \frac{dx}{a} - \frac{adx}{x^2} = \left(\frac{1}{a} - \frac{a}{x^2} \right) dx \Rightarrow df(x) = \frac{\left(\frac{1}{a} - \frac{a}{x^2} \right)}{2 \left[\sqrt{\frac{x}{a}} - \sqrt{\frac{a}{x}} \right]} dx$$

Ejemplo 1.6.3. Sea $d\left(\frac{x^2+2}{x^2-2}\right) = f(x)dx$. Calcular $f(-2)$



Resolución: ►

Defino $u(x) = \frac{x^2+2}{x^2-2}$ y diferenciando se logra la ecuación $du = u'dx$, considerando la ecuación del problema y la última construimos un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} d\left(\frac{x^2+2}{x^2-2}\right) = f(x)dx \\ du = u'dx \end{cases} \text{ de donde concluimos } f(x) = u'$$

$$\begin{aligned} f(x) &= u' = \frac{(x^2+2)'(x^2-2) - (x^2+2)(x^2-2)'}{(x^2-2)^2} dx \\ &= \frac{2x(x^2-2) - (x^2+2)2x}{(x^2-2)^2} = \frac{-8x}{(x^2-2)^2} dx \\ \Rightarrow f(-2) &= \frac{16}{4} = 4 \\ \Rightarrow f(-2) &= 4 \end{aligned}$$

1.6.1. Ejercicios propuestos

Ejercicio 1.6.1. Calcule la diferencial de la función f con respecto a x , para las siguientes funciones:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. $f(x) = e^{x^2+3x+2}$ | 6. $f(x) = (2x+3)^{\frac{3}{2}}$ | 10. $f(x) = (2x^2+3x+4)^{\frac{3}{4}}$ |
| 2. $f(x) = \ln(x^3+x+1)$ | 7. $f(x) = 7x \cos(2x)$ | 11. $f(x) = \log_3(x^2+3x+1)$ |
| 3. $f(x) = (x+7)^{\frac{5}{4}}$ | 8. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+5}}$ | 12. $f(x) = 5^{\frac{2x^2-1}{x+2}}$ |
| 4. $f(x) = 2\cos(2x)\sin(x)$ | 9. $f(x) = \frac{\sqrt{x^2+2}}{x}$ | 13. $f(x) = \log_5\left(\frac{\sin(x)}{\cos^2(x)}\right)$ |
| 5. $f(x) = \ln(x^4+x^2+1)$ | | 14. $f(x) = 34^{\tan(x)}$ |

Ejercicio 1.6.2. Si $f(x) = 4x^2 - 3x + 1$ encontrar Δf , df , $\Delta f - df$ para cualquier x y Δx

Ejercicio 1.6.3. Usando diferenciales calcular el valor de $f(3,002)$, si $f(x) = x^3 + 2x^2 - x + 1$

Ejercicio 1.6.4. Usando diferenciales calcular el valor aproximado de

- (a) $\sqrt[3]{(28)^2}$ (b) $\sqrt{0,042}$ (c) $\sqrt[5]{31}$ (d) $\sqrt{\frac{4,02}{3,98}}$

Ejercicio 1.6.5. (a) Sea $y = f\left(\frac{x}{x-3}\right)$ y $f'(x) = d(f \circ g)$

$\frac{x^2}{x^2-1}$ hallar dy

(c) Si $d(\sqrt[3]{|x-4|-x^2}) = g(x)dx$ hallar $g(3)$

(b) Si $f(u) = u^2 + 5u + 5$ y $g(x) = \frac{x+1}{x-1}$, hallar (d) Si $d\left(\frac{1+\cos(2x)}{1-\cos(2x)}\right) = h(x)dx$, hallar $h\left(\frac{\pi}{4}\right)$

Capítulo 2

Integral Indefinida

2.1. La Antiderivada

Teorema 2.1.1. [Del valor Medio]

Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ y diferenciable en $]a, b[$, entonces existe un número $c \in]a, b[$ tal que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$


Ejemplo 2.1.2.

Dada $f(x) = 4 - x^2$, $[-1; 2, 2]$ encontrar c del T.V.M. e interpretar gráficamente.

$$f(-1) = 3, f(2, 2) = -0,84, f'(c) = -2c$$

Entonces

$$\begin{aligned} -2c &= \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \\ \Rightarrow -2c &= \frac{-0,84 - 3}{2,2 - (-1)} = -1,2 \\ \Rightarrow &\boxed{c = 0,6} \end{aligned}$$



Para el gráfico, la pendiente $-2c$ de la recta tangente en $(c, 0)$ es la misma pendiente de la recta que une los extremos del gráfico de la función.

Teorema 2.1.3. [de la función constante]

Si $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua en $[a, b]$ y diferenciable en $]a, b[$, entonces existe un número $K \in \mathbb{R}$ tal que

$$F'(x) = 0, x \in]a, b[\text{ si y sólo si } F(x) = K, x \in [a, b]$$

Ejemplo 2.1.4.

Dado $f : [1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$, función definida por $f(x) = x^2 - x(x + \frac{2}{x})$, determine c del teorema

**Resolución:** ►Cálculo de la derivada de $f(x)$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 2x - \left[(x)' \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right) + x \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right)' \right] \\
 &= 2x - \left(x + \frac{2}{x} + x \left(1 - \frac{2}{x^2}\right) \right) \\
 &= 2x - \left(x + \frac{2}{x} + x - \frac{2}{x} \right) \\
 &\Rightarrow \boxed{f'(x) = 0, \forall x \in [1, 2]}
 \end{aligned}$$

Por el teorema anterior existe $c \in \mathbb{R}$ tal que $f(x) = c$, $\forall x \in [1, 2]$, podemos elegir cualquier $x \in [1, 2]$ para calcular c , por ejemplo $x = 1$, entonces $f(1) = c = 1 - 1(1 + 2) = -2 \Rightarrow c = -2$ luego $f(x) = -2$ ◀

Definición 2.1.1.

1. Una función $F : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ se llama **antiderivada o primitiva** de otra función $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que es continua si cumple

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

2. Si $F(x)$ es la antiderivada de $f(x)$ en I , se define **antiderivada general** de $f(x)$ por

$$\boxed{G(x) = F(x) + C.}$$

Teorema 2.1.5.

Sean $F, G : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ funciones continuas en $[a, b]$ y diferenciables en $]a, b[$, si $G'(x) = F'(x)$, $\forall x \in [a, b]$ entonces existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$\boxed{G(x) = F(x) + C, \forall x \in [a, b]}$$

Ejemplo 2.1.6.

Sin utilizar cálculo de derivadas prueba que las funciones $F(x) = \frac{1}{1+x^4}$ y $G(x) = \frac{-x^4}{1+x^4}$ son dos primitivas (antiderivadas) de una misma función.

**Resolución: ►**

Suponga que

- $F(x)$ es primitiva de $f(x)$, $F'(x) = f(x)$
- $G(x)$ es primitiva de $g(x)$, $G'(x) = g(x)$

Si fueran las mismas primitivas, se tendría $G'(x) = F'(x)$ y por el teorema anterior se concluye que $G(x) = F(x) + C \Rightarrow G(x) - F(x) = C$ es decir la diferencia de ambas primitivas debe ser una constante.

En efecto

$$\begin{aligned} G(x) - F(x) &= \frac{-x^4}{1+x^4} - \frac{1}{1+x^4} = \frac{-x^4 - 1}{1+x^4} = -1 \\ \Rightarrow &\boxed{G(x) - F(x) = -1} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.1.7.

Sean f y g dos funciones continuas y derivables que se diferencian en una constante. ¿Podemos asegurar que f y g tienen una misma primitiva?

**Resolución: ►**

La respuesta es negativa.

En efecto

Suponga $f(x) = 5x + 2$ y $g(x) = 5x + 3$ continuas y derivables y se diferencian en la unidad, sin embargo sus primitivas son

$F(x) = \frac{5x^2}{2} + 2x + C_1$ y $G(x) = \frac{5x^2}{2} + 3x + C_2$ respectivamente, las cuales son distintas para cualesquiera valor de C_1 y C_2

Ejemplo 2.1.8.

Encuentra la función $f(x)$ cuya primitiva es $F(x) = \sin^4(\ln(x^4 + 4)) + C$

**Resolución: ►**

$$\begin{aligned} f(x) = [\sin^4(\ln(x^4 + 4)) + C]' &= 4\sin^3(\ln(x^4 + 4)) \cdot \cos(\ln(x^4 + 4)) \cdot \frac{1}{x^4 + 4} \cdot (x^4 + 4)' \\ &= 4\sin^3(\ln(x^4 + 4)) \cos(\ln(x^4 + 4)) \cdot \frac{4x^3}{x^4 + 4} \\ \Rightarrow &\boxed{f(x) = \frac{16x^3 \sin^3(\ln(x^4 + 4)) \cdot \cos(\ln(x^4 + 4))}{x^4 + 4}} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.1.9.

Sea $G: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $G'(x) = 3x^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Hallar $G(x)$ si $G(1) = 6$

**Resolución: ►**

La antiderivada general de $3x^2$ es $G(x) = x^3 + C$. Además $G(1) = 6 = 1^3 + C \implies C = 5$. Así $G(x) = x^3 + 5$ ◀

Observación 2.1.10.

1. Del ejemplo anterior una antiderivada de $f(x) = 3x^2$ es $F(x) = x^3$, por la misma razón $F(x) = x^3 + 4$ es también una antiderivada de $f(x)$.
2. Más generalmente $F(x) = x^3 + C$ con C constante es una antiderivada de $f(x) = 3x^2$.
3. $F(x) = x^3 + C$ constituye una **familia de curvas** que satisface la condición $F'(x) = 3x^2$.
4. El valor de la constante C depende de una condición inicial $(x_0, y_0) = (x_0, F(x_0))$.

2.2. La Integral Indefinida

Definición 2.2.1.

1. Si $G : I \rightarrow \mathbb{R}$ es la antiderivada general de $f(x)$ la expresión

$$G(x) = \int f(x)dx = \int F'(x)dx = F(x) + C$$

se llama **integral indefinida** de $f(x)$ y se cumple

$$\frac{d}{dx}(G(x)) = \frac{d}{dx} \left(\int f(x)dx \right) = \frac{d}{dx} (F(x) + C) = f(x)$$

2. Sea $\int f(x)dx$, a $f(x)$ se llama **función integrando** y a x se llama **variable de integración**.
3. Sabemos que $dF(x) = F'(x)dx$ entonces

$$\int f(x)dx = \int F'(x)dx = \int dF(x) = F(x) + C$$

Observación 2.2.1.

1. Si $y = F(x)$ es una antiderivada de f , entonces decimos que $F(x)$ **es una solución de la ecuación** $\frac{dy}{dx} = f(x)$, que se escribe en notación diferencial como $dy = f(x)dx$.
2. El proceso de encontrar todas las soluciones de esta ecuación se llama integración y se denota por el símbolo \int .
3. La solución general de la ecuación $dy = f(x)dx$ se escribe

$$y = \int f(x)dx + C,$$

donde x es la **variable de integración**, $f(x)$ **integrando** y C **constante de integración**.

4. El símbolo $\int f(x)dx$ se llama **antiderivada general de f** respecto de x .
5. La diferencial dx sirve para identificar a x como variable de integración.
6. La notación

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

donde C es una constante arbitraria, significa que F es una **primitiva** de f . $F'(x) = f(x)$, para todo x en el dominio de f .

Propiedades 2.2.2.

Sean $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones integrables, y $c \in \mathbb{R}$ entonces

1. $cf(x)$ es integrable y se cumple

$$\int cf(x)dx = c \int f(x)dx, \quad c \in \mathbb{R}$$

2. $f(x) + g(x)$ es integrable y se cumple

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

3. $f(x) - g(x)$ es integrable y se cumple

$$\int [f(x) - g(x)]dx = \int f(x)dx - \int g(x)dx.$$



Ejemplo 2.2.3.

Calcule una antiderivada y su gráfica, para $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función, definida por



1. $f(x) = 1$ 2. $f(x) = x$ 3. $f(x) = x^2$ 4. $f(x) = x^3$ 5. $f(x) = x^4$

**Resolución: ►**



1. Una antiderivada de $f(x) = 1$ es $F(x) = x$ cuya grafica de f y F son





2. Una antiderivada de $f(x) = x$ es $F(x) = \frac{x^2}{2}$



3. Una antiderivada de $f(x) = x^2$ es $F(x) = \frac{x^3}{3}$





4. Una antiderivada de $f(x) = x^3$ es $F(x) = \frac{x^4}{4}$



**Resolución:** ►

5.- Una antiderivada de $f(x) = x^4$ es $F(x) = \frac{x^5}{5}$

**Observación 2.2.4.**

1. La expresión $\int F'(x)dx = F(x) + C$, muestra la naturaleza inversa de la integración y la derivación.
2. Además, si $\int f(x)dx = F(x) + C$, entonces

$$\frac{d \left[\int f(x)dx \right]}{dx} = \frac{d}{dx}[F(x) + C] = F'(x) = f(x).$$

Estas características nos permiten obtener fórmulas de integración a partir de las fórmulas de derivación, como se establece en los resultados siguientes:

2.3. Integrales de funciones Básicas

1.

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, n \neq -1$$

2.

$$\int \frac{du}{u} + C = \ln|u| + C$$

3.

$$\int e^u du = e^u + C$$

4.

$$\int \sin(u) du = -\cos(u) + C$$

5.

$$\int \cos(u) du = \sin(u) + C$$

6.

$$\int \operatorname{tg}(u) du = \ln|\sec(u)| + C$$

7.

$$\int \operatorname{cotg}(u) du = \ln|\sin(u)| + C$$

8.

$$\int \sec(u) du = \ln|\sec(u) + \operatorname{tg}(u)| + C$$

9.

$$\int \operatorname{cosec}(u) du = -\ln|\operatorname{cosec}(u) + \operatorname{cotg}(u)| + C$$

10.

$$\int \sec^2(u) du = \operatorname{tg}(u) + C$$

11.

$$\int \operatorname{cosec}^2(u) du = -\operatorname{cotg}(u) + C$$

12.

$$\int \sec(u) \operatorname{tg}(u) du = \sec(u) + C$$

Ejemplo 2.3.1.



Calcule la antiderivada general de

(a) $f(x) = x, x \in \mathbb{R}$



(b) $f(x) = \cos(x), x \in \mathbb{R}$

**Resolución: ►**

(a) La antiderivada general de $f(x) = x$ es $G(x) = F(x) + C = \frac{x^2}{2} + C, C \in \mathbb{R}$ cuya grafica de f y G son



(b) La antiderivada general de $f(x) = \cos(x)$ es $G(x) = F(x) + C = \sin(x) + C, C \in \mathbb{R}$ cuya grafica de f y G son

**Ejemplo 2.3.2.**

Calcule las integrales siguientes

(a) $\int \left[\frac{5x^3 + x}{x} - \frac{1}{x} \right] dx$

(b) $\int \frac{4x^3 - 5x^2 + 7}{\sqrt{x^3}} dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\int \left[\frac{5x^3 + x}{x} - \frac{1}{x} \right] dx = \int (5x^2 + 1 - \frac{1}{x}) dx = \int (5x^2 + 1) dx - \int \frac{1}{x} dx$$

$$\Rightarrow \boxed{\int \left[\frac{5x^3 + x}{x} - \frac{1}{x} \right] dx = \frac{5x^3}{3} + x - \ln|x| + C}$$

(b)

$$\int \frac{4x^3 - 5x^2 + 7}{\sqrt{x^3}} dx = \int (4x^3 - 5x^2 + 7) x^{-\frac{3}{2}} dx = \int (4x^{3-\frac{3}{2}} - 5x^{2-\frac{3}{2}} + 7x^{\frac{-3}{2}}) dx$$

$$= \int 4x^{\frac{3}{2}} dx - \int 5x^{\frac{1}{2}} dx + \int 7x^{-\frac{3}{2}} dx = 4 \frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{5x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + \frac{7x^{-\frac{1}{2}}}{-\frac{1}{2}} + C$$

$$\Rightarrow \boxed{\int \frac{4x^3 - 5x^2 + 7}{\sqrt{x^3}} dx = \frac{8}{5}x^{\frac{5}{2}} - \frac{10}{3}x^{\frac{3}{2}} - 14x^{-\frac{1}{2}} + C}$$

2.4. Identidades Trigonómicas

IDENTIDADES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS HIPERBÓLICAS

$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$	$\operatorname{sech}^2(x) = 1 - \tanh^2(x)$
$\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y)$	$\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y)$
$\sinh(2x) = 2\sinh(x)\cosh(x)$	$\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x)$
$\cosh(2x) = 1 + 2\sinh^2(x)$	$\cosh(2x) = 2\cosh^2(x) - 1$
$\operatorname{cosech}^2(x) = \coth^2(x) - 1$	

IDENTIDADES DE FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS	
$\operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$	$1 + \cot^2(x) = \operatorname{csc}^2(x)$
$1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$	$\tan(x) = \frac{\operatorname{sen}(x)}{\cos(x)}$
$\operatorname{sen}(x + y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) + \operatorname{sen}(y) \cos(x)$	$\operatorname{sen}(x - y) = \operatorname{sen}(x) \cos(y) - \operatorname{sen}(y) \cos(x)$
$\cos(x + y) = \cos(x) \cos(y) - \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$	$\cos(x - y) = \cos(x) \cos(y) + \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$
$\tan(x + y) = \frac{\tan(x) + \tan(y)}{1 - \tan(x) \tan(y)}$	$\tan(x - y) = \frac{\tan(x) - \tan(y)}{1 + \tan(x) \tan(y)}$
$\cos^2(x) = \frac{\cos(2x) + 1}{2}$	$\operatorname{sen}^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$
$\operatorname{sen}(2x) = 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x)$	$\cos(2x) = \cos^2(x) - \operatorname{sen}^2(x)$
$\tan(2x) = \frac{2 \tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$	$\sec(2x) = \frac{1 + \tan^2(x)}{1 - \tan^2(x)}$
$\operatorname{sen}\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{2}}$	$\cos\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos(x)}{2}}$
$\tan\left(\frac{x}{2}\right) = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos(x)}{1 + \cos(x)}}$	$\cot\left(\frac{x}{2}\right) = \operatorname{cosec}(x) + \cot(x)$
$\cos(x) - \cos(y) = -2 \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)$	$\cos(x) + \cos(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$
$\operatorname{sen}(x) + \operatorname{sen}(y) = 2 \operatorname{sen}\left(\frac{x+y}{2}\right) \cos\left(\frac{x-y}{2}\right)$	$\operatorname{sen}(x) - \operatorname{sen}(y) = 2 \cos\left(\frac{x+y}{2}\right) \operatorname{sen}\left(\frac{x-y}{2}\right)$
$\operatorname{sen}(x + y) + \operatorname{sen}(x - y) = 2 \operatorname{sen}(x) \cos(y)$	$\cos(x + y) + \cos(x - y) = 2 \cos(x) \cos(y)$
$\cos(x - y) - \cos(x + y) = 2 \operatorname{sen}(x) \operatorname{sen}(y)$	$\tan(3x) = \frac{3 \tan(x) - \tan^3(x)}{1 - 3 \tan^2(x)}$
$\operatorname{sen}(3x) = 3 \operatorname{sen}(x) - 4 \operatorname{sen}^3(x)$	$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$

2.5. Métodos de Integración

Las fórmulas de las integrales básicas anteriores son de frecuente uso y su utilidad se evidencia con el apoyo de técnicas de integración, que se desarrollan a partir de dos métodos:

1. Método de integración cambio de variable o por sustitución.
2. Método de integración por partes.

2.5.1. Método Cambio de variable

Sean $F, f : I \rightarrow \mathbb{R}$ funciones y F una antiderivada de f es decir $F'(x) = f(x)$ y g una función derivable tal que $F \circ g$ esté definida.

Usando la regla de la cadena a $F \circ g$ se tiene

$$F(g(x))' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x)) \cdot g'(x)$$

Luego $F(g(x))$ es una antiderivada de $f(g(x)) \cdot g'(x)$ entonces se logra el resultado siguiente

Teorema 2.5.1.

Sean f y g funciones tales que $y = f(g(x))$ es derivable. Si F es una **Primitiva** de f entonces

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + C \quad (2.1)$$

de manera que si $u = g(x)$ entonces $du = g'(x)dx$, así la expresión (2.1) quedaría

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + C$$

a esta expresión se llama **método de cambio de variable** con $u = g(x)$ y $du = g'(x)dx$

Ejemplo 2.5.2.



Calcule las integrales siguientes

1. $\int \sin(x - \pi) dx$
2. $\int \frac{1}{x-3} dx$
3. $\int \cos(x + \frac{\pi}{2}) dx$
4. $\int 2 \sin(x) \cos(x) dx$

**Resolución: ►**



1. Haciendo $u = x - \pi \Rightarrow du = dx$, entonces

$$\begin{aligned} \int \operatorname{sen}(x - \pi) dx &= \int \operatorname{sen}(u) du = -\cos(u) + C \\ \Rightarrow \int \operatorname{sen}(x - \pi) dx &= -\cos(x - \pi) + C \end{aligned}$$





2. Haciendo $u = x - 3 \Rightarrow du = dx$ entonces

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x-3} dx &= \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C \\ \Rightarrow \int \frac{1}{x-3} dx &= \ln|x-3| + C \end{aligned}$$



3. Haciendo $u = x + \frac{\pi}{2} \Rightarrow du = dx$ entonces


$$\begin{aligned} \int \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx &= \int \operatorname{sen}(u) du = \operatorname{sen}(u) + C \\ \Rightarrow \int \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) dx &= \operatorname{sen}\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + C \end{aligned}$$





Resolución: ►

$$(4.) \int 2 \operatorname{sen}(x) \cos(x) dx = \int \operatorname{sen}(2x) dx = -\frac{\cos(2x)}{2} + C$$



Ejemplo 2.5.3.

Calcule las integrales siguientes

(a) $\int \frac{4x+6}{(x^2+3x+7)} dx$ (b) $\int \frac{x+1}{x} dx$ (c) $\int \frac{x}{x+1} dx$ (d) $\int x^2 e^{x^3} dx$

**Resolución: ►**

(a) Haciendo el cambio $u = x^2 + 3x + 7$, se generan las ecuaciones

$$\begin{aligned}u &= x^2 + 3x + 7 \\ du &= (2x + 3)dx\end{aligned}$$

Luego reemplazamos estas ecuaciones en la integral

$$\begin{aligned}\int \frac{4x+6}{(x^2+3x+7)}dx &= 2 \int \frac{2x+3}{(x^2+3x+7)}dx = 2 \int \frac{du}{u} \\ &= 2 \ln|u| + C = 2 \ln(x^2 + 3x + 7) + C \\ \Rightarrow \boxed{\int \frac{4x+6}{(x^2+3x+7)}dx = 2 \ln|(x^2 + 3x + 7)| + C}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\int \frac{x+1}{x}dx &= \int \frac{x}{x}dx + \int \frac{dx}{x} \\ \Rightarrow \boxed{\int \frac{x+1}{x}dx = x + \ln|x| + C}\end{aligned}$$

(c) Haciendo el cambio $u = x + 1$ generamos las ecuaciones

$$\begin{aligned}u &= x + 1 \\ x &= u - 1 \\ du &= dx\end{aligned}$$

Luego reemplazamos estas ecuaciones en la integral

$$\begin{aligned}\int \frac{x}{x+1}dx &= \int \frac{u-1}{u}du = u - \ln|u| + C \\ \Rightarrow \boxed{\int \frac{x}{x+1}dx = x + 1 - \ln|x+1| + C}\end{aligned}$$

(d) Haciendo el cambio $u = x^3$ se obtiene las ecuaciones

$$\begin{aligned}u &= x^3 \\ du &= 3x^2dx \\ x^2dx &= \frac{du}{3}\end{aligned}$$

Luego reemplazamos la primera y tercera ecuación en la integral

$$\begin{aligned}\int x^2 e^{x^3} dx &= \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C \\ \Rightarrow \boxed{\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} e^{x^3} + C}\end{aligned}$$

2.5.2. Integración por Partes

Teorema 2.5.4.

Sean $u(x)$ y $v(x)$ funciones diferenciables, entonces al diferencial producto está dado por $d(uv) = u dv + v du$ de donde

$$u dv = d(uv) - v du$$

Como u y v son continuas integramos

$$\int u dv = uv - \int v du$$

se conoce con el nombre **de integración por partes**.

Observación 2.5.5.

1. Dependiendo de la elección de u y dv , $\int v du$ debe resultar más simple de resolver que la original.
2. La elección de dv debe asegurar la obtención de v de manera más sencilla que la integral original.
3. La elección de u , sujeta a las consideraciones anteriores, no deja otra opción que escribir como dv al factor restante.

Ejemplo 2.5.6.

Resolver las integrales siguientes

(a) $\int x e^x dx.$

(b) $\int \ln x dx$

(c) $\int x \ln x dx$



Resolución: ►

(a) Utilizaremos integración por partes

$$\int x e^x dx = \int \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{e^x dx}_{dv} = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.2)$$

Donde

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x \\ dv = e^x dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int e^x dx = e^x \end{array} \right\} \quad (2.3)$$

Reemplazando (2.3) en (2.2) obtenemos

$$\begin{aligned} \int x e^x dx &= x e^x - \int e^x dx \\ &\Rightarrow \boxed{\int x e^x dx = x e^x - e^x + C} \end{aligned}$$

**Resolución: ►**

(b) Utilizaremos integración por partes

$$\int \ln(x) dx = \int \ln(x) \cdot dx = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.4)$$

Donde

$$\begin{cases} u = \ln(x) \\ dv = dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{dx}{x} \\ v = \int dx = x \end{cases} \quad (2.5)$$

Reemplazando (2.5) en (2.4) obtenemos

$$\begin{aligned} \int \ln(x) dx &= x \ln(x) - \int \frac{x dx}{x} \\ &\Rightarrow \boxed{\int \ln(x) dx = x \ln|x| - x + C} \end{aligned}$$

(c) Utilizamos integración por partes:

$$\int x \ln(x) dx = \int \ln(x) \cdot x dx = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.6)$$

Donde

$$\begin{cases} u = \ln(x) \\ dv = x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = \frac{1}{x} dx \\ v = \int x dx = \frac{x^2}{2} \end{cases} \quad (2.7)$$

Reemplazando (2.7) en (2.6) obtenemos

$$\begin{aligned} \int x \ln(x) dx &= \frac{x^2}{2} \ln(x) - \int \frac{x}{2} dx \\ &= \boxed{\frac{x^2}{2} \ln(x) - \frac{x^2}{4} + C} \end{aligned}$$

Ejemplo 2.5.7.

Resolver las integrales

(a) $\int x \cos(x) dx$

(b) $\int e^x \sin(x) dx.$

(c) $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2}$

**Resolución:** ►

(a) Utilizando integración por partes

$$\int x \cos(x) dx = \int \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{\cos(x) dx}_{dv} = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.8)$$

Donde

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x \\ dv = \cos(x) dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \cos(x) dx = \text{sen}(x) \end{array} \right\} \quad (2.9)$$

Reemplazando (2.9) en (2.8) obtenemos

$$\begin{aligned} \int x \cos(x) dx &= x \text{sen}(x) - \int \text{sen}(x) dx + C \\ &\Rightarrow \boxed{\int x \cos(x) dx = x \text{sen}(x) + \cos(x) + C} \end{aligned}$$

**Resolución: ►**

(b) Utilizando integración por partes

$$\int e^x \operatorname{sen}(x) dx = \int \overset{e^x}{\text{red circle}} \cdot \overset{\operatorname{sen}(x) dx}{\text{red oval}} = \int \overset{u}{\text{red circle}} \cdot \overset{dv}{\text{red oval}} = uv - \int v du \quad (2.10)$$

Donde

$$\left\{ \begin{array}{l} u = e^x \\ dv = \operatorname{sen}(x) dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = e^x dx \\ v = \int \operatorname{sen}(x) dx = -\cos(x) \end{array} \right\} \quad (2.11)$$

Reemplazando (2.11) en (2.10) obtenemos

$$\int e^x \operatorname{sen}(x) dx = -e^x \cos(x) + \underbrace{\int e^x \cos(x) dx}_I \quad (2.12)$$

Cálculo de I

$$I = \int e^x \cos(x) dx = \int \overset{e^x}{\text{red circle}} \cdot \overset{\cos(x) dx}{\text{red oval}} = \int \overset{u}{\text{red circle}} \cdot \overset{dv}{\text{red oval}} = uv - \int v du \quad (2.13)$$

Donde

$$\left\{ \begin{array}{l} u = e^x \\ dv = \cos(x) dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = e^x dx \\ v = \int \cos(x) dx = \operatorname{sen}(x) \end{array} \right\} \quad (2.14)$$

Reemplazando (2.14) en (2.13) obtenemos

$$\int e^x \cos(x) dx = -e^x \operatorname{sen}(x) - \int e^x \operatorname{sen}(x) dx \quad (2.15)$$

reemplazando (2.15) en (2.12) obtenemos

$$\begin{aligned} \int e^x \operatorname{sen}(x) dx &= -e^x \cos(x) - e^x \operatorname{sen}(x) - \int e^x \operatorname{sen}(x) dx + C \\ \Rightarrow \int e^x \operatorname{sen}(x) dx + \int e^x \operatorname{sen}(x) dx &= -e^x [\cos(x) + \operatorname{sen}(x)] + C \\ \Rightarrow \boxed{\int e^x \operatorname{sen}(x) dx = \frac{-e^x}{2} [\cos(x) + \operatorname{sen}(x)] + C} \end{aligned}$$

**Resolución:** ►

(c) Utilizando integración por partes

$$\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = \int \underbrace{x}_{u} \cdot \underbrace{\frac{x}{(1+x^2)^2} dx}_{dv} = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.16)$$

Donde

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{x}{(1+x^2)^2} dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx \\ v = \underbrace{\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx}_I \end{array} \right\} \quad (2.17)$$

$$\text{Cálculo de } I = \int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx$$

Haciendo el cambio $u = 1+x^2$ genera las ecuaciones

$$\begin{aligned} u &= 1+x^2 \\ du &= 2x dx \\ x dx &= \frac{du}{2} \end{aligned}$$

Luego reemplazamos la primera y tercera ecuación en la integral

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx &= \int \frac{du}{2u^2} = \frac{1}{2} \int u^{-2} du = -\frac{1}{2} u^{-1} \\ &\Rightarrow \boxed{\int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2(1+x^2)}} \end{aligned}$$

Luego reemplazando en (2.17) obtenemos

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x \\ dv = \frac{x}{(1+x^2)^2} dx \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} du = dx \\ v = \int \frac{x}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{1}{2(1+x^2)} \end{array} \right\} \quad (2.18)$$

Reemplazamos (2.18) en (2.16) tenemos

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx &= -\frac{x}{2(1+x^2)} + \int \frac{dx}{2(1+x^2)} + C \\ &\Rightarrow \boxed{\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx = -\frac{x}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \arctan(x) + C} \end{aligned}$$

2.5.3. Funciones trigonométricas

Propiedades 2.5.8. Estudiaremos integrales que tienen la siguiente forma, $n, m \in \mathbb{R}$:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|--|
| 1. $\int \sin^n(x) dx$ | 4. $\int \cot^n(x) dx$ | 7. $\int \cot^m(x) \operatorname{cosec}^n(x) dx$ |
| 2. $\int \cos^n(x) dx$ | 5. $\int \sin^m(x) \cos^n(x) dx$ | |
| 3. $\int \tan^n(x) dx$ | 6. $\int \tan^m(x) \sec^n(x) dx$ | |

Integral de la forma

$$\int \sin^n(x) dx$$

Si n es par se usa $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ o $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ o ambos.

Si n es impar se usa $\sin^n(x) = \sin^{n-1}(x) \sin(x)$ y luego la identidad $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Ejemplo 2.5.9.

Calcule

(a) $\int \sin^4(3x) dx$

(b) $\int \sin^5(x) dx$

**Resolución: ►**

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \sin^4(3x) dx &= \int [\sin^2(x)]^2 dx = \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int [1 - 2\cos(2x) + \cos^2(2x)] dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left[1 - 2\cos(2x) + \frac{1 + \cos(4x)}{2} \right] dx = \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} - 2\cos(2x) + \frac{\cos(4x)}{2} \right) dx \\
 &= \frac{3x}{8} - 2 \frac{\sin(2x)}{2 \cdot 4} + \frac{\sin(4x)}{4 \cdot 2 \cdot 4} \\
 &= \boxed{\frac{3x}{8} - \frac{\sin(2x)}{4} + \frac{\sin(4x)}{32}}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \sin^5(x) dx &= \int \sin^4(x) \sin(x) dx = \int (\sin^2(x))^2 \sin(x) dx \\
 &= \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right)^2 \sin(x) dx = \frac{1}{4} \int (1 - 2\cos(2x) + \cos^2(2x)) \sin(x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - 2\cos(2x) + \left(\frac{1 + \cos(4x)}{2} \right) \right) \sin(x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left(\int \frac{3\sin(x)}{2} - 2\cos(2x)\sin(x) + \frac{\cos(4x)\sin(x)}{2} \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{3\sin(x)}{2} - (\sin(2x+x) + \sin(2x-x)) + \left(\frac{\sin(4x+x) + \sin(4x-x)}{4} \right) \right) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{5\sin(x)}{2} - \sin(3x) + \frac{\sin(5x)}{4} + \frac{\sin(3x)}{4} \right) dx \\
 &= \boxed{-\frac{5\cos(x)}{8} + \frac{3\cos(3x)}{12} - \frac{\cos(5x)}{80} + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \cos^n(x) dx$$

Si n es par se usa $\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$ o $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ o ambos

Si n es impar se usa $\cos^n(x) = \cos^{n-1}(x)\sin(x)$ y luego la identidad $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$

Ejemplo 2.5.10.

Calcule

(a) $\int \cos^4(2x)dx$

(b) $\int \cos^5(3x)dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \cos^4(2x)dx &= \int \left(\frac{1 + \cos(4x)}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{4} \int (1 + 2\cos(4x) + \cos^2(4x))dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 + 2\cos(4x) + \frac{1 + \cos(8x)}{2} \right) dx = \frac{1}{4} \int \left(\frac{3}{2} + 2\cos(4x) + \frac{\cos(8x)}{2} \right) dx \\
 &= \boxed{\frac{1}{4} \left(\frac{3x}{2} + \frac{\sin(4x)}{2} + \frac{\sin(8x)}{16} \right) + C}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \cos^5(3x)dx &= \int \cos^4(3x)\cos(3x)dx = \int (1 - \sin^2(3x))^2 \cos(3x)dx \\
 &= \int (1 - 2\sin^2(3x) + \sin^4(3x))\cos(3x)dx \\
 &= \int (\cos(3x) - \sin^2(3x)\cos(3x) + \sin^4(3x)\cos(3x))dx \\
 &= \int \cos(3x)dx - \int \underbrace{\sin^2(3x)\cos(3x)dx}_{u=\sin(3x), du=3\cos(3x)dx} + \int \underbrace{\sin^4(3x)\cos(3x)dx}_{u=\sin(3x), du=3\cos(3x)dx} \\
 &= \boxed{\frac{\sin(3x)}{3} - \frac{2\sin^3(3x)}{9} + \frac{\sin^5(3x)}{15} + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \tan^n(x)dx$$

Si n es par se usa $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$ y $\tan^n(x) = \tan^{n-2}(x)\tan^2(x)$ **Si n es impar** se usa $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$ y $\tan^n(x) = \tan^{n-1}(x)\tan(x) = (\tan^2(x))^{\frac{n-1}{2}}\tan(x)$ **Ejemplo 2.5.11.**

Calcule

(a) $\int \tan^3(5x)dx$

(b) $\int \tan^6(5x)dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \tan^3(5x) dx &= \int \tan^2(5x) \tan(5x) dx = \int (\sec^2(5x) - 1) \tan(5x) dx \\
 &= \int \underbrace{\sec^2(5x) \tan(5x) dx}_{u=\tan(5x), du=5\sec^2(5x)dx} - \int \tan(5x) dx \\
 &= \boxed{\frac{\tan^2(5x)}{10} - \frac{\ln|\sec(5x)|}{5} + C}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \tan^6(5x) dx &= \int \tan^4(5x) \tan^2(5x) dx = \int \tan^4(5x) (\sec^2(5x) - 1) dx \\
 &= \int (\tan^4(5x) \sec^2(5x) - \tan^4(5x)) dx = \int \underbrace{\tan^4(5x) \sec^2(5x) dx}_{u=\tan(5x), du=5\sec^2(5x)dx} - \int \tan^4(5x) dx \\
 &= \frac{\tan^5(5x)}{25} - \int \tan^2(5x) (\sec^2(5x) - 1) dx \\
 &= \frac{\tan^5(5x)}{25} - \int \underbrace{\tan^2(5x) \sec^2(5x) dx}_{u=\tan(5x), du=5\sec^2(5x)dx} + \int \tan^2(5x) dx \\
 &= \frac{\tan^5(5x)}{25} - \frac{\tan^3(5x)}{15} + \int (\sec^2(5x) - 1) dx \\
 &= \boxed{\frac{\tan^5(5x)}{25} - \frac{\tan^3(5x)}{15} + \frac{\tan(5x)}{5} - x + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \cot^n(x) dx$$

Si n es par se usa $1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x)$ y $\cot^n(x) = \cot^{n-2}(x) \cot^2(x)$ **Si n es impar** se usa $1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x)$ y $\cot^n(x) = \cot^{n-1}(x) \cot(x) = (\cot^2(x))^{\frac{n-1}{2}} \cot(x)$ **Ejemplo 2.5.12.**

Calcule

(a) $\int \cot^4(4x) dx$

(b) $\int \cot^5(3x) dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \cot^4(4x) dx &= \int \cot^2(4x) \cot^2(4x) dx = \int (\operatorname{cosec}^2(4x) - 1) \cot^2(4x) dx \\
 &= \int \underbrace{\operatorname{cosec}^2(4x) \cot^2(4x) dx}_{u=\cot(4x), du=-4 \operatorname{cosec}^2(4x) dx} - \int \cot^2(4x) dx \\
 &= \frac{-\cot^3(4x)}{12} - \int (\operatorname{cosec}^2(4x) - 1) dx \\
 &= \boxed{\frac{-\cot^3(4x)}{12} + \frac{\cot(4x)}{4} + x + C}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \cot^5(3x) dx &= \int \cot^4(3x) \cot(3x) dx = \int (\operatorname{cosec}^2(3x) - 1)^2 \cot(3x) dx \\
 &= \int (\operatorname{cosec}^4(3x) - 2 \operatorname{cosec}^2(3x) + 1) \cot(3x) dx \\
 &= \int \operatorname{cosec}^4(3x) \cot(3x) dx - 2 \int \underbrace{\operatorname{cosec}^2(3x) \cot(3x) dx}_{u=\cot(3x), du=-3 \operatorname{cosec}^2(3x) dx} + \int \cot(3x) dx \\
 &= \int \underbrace{\operatorname{cosec}^3(3x) \operatorname{cosec}(3x) \cot(3x) dx}_{u=\operatorname{cosec}(3x), du=-\operatorname{cosec}(3x) \cot(3x) dx} + \frac{\cot^2(3x)}{3} + \frac{\ln|\operatorname{sen}(3x)|}{3} + C \\
 &= \boxed{-\frac{\operatorname{cosec}^4(3x)}{12} + \frac{\cot^2(3x)}{3} + \frac{\ln|\operatorname{sen}(3x)|}{3} + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \operatorname{sen}^m(x) \cos^n(x) dx$$

Si m y n son pares se usa $\operatorname{sen}^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$, $\cos^2(x) = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ luego con estas sustituciones reemplazamos en la integral $\int \operatorname{sen}^m(x) \cos^n(x) dx$ la cual se transforma en integrales de la forma $\int \operatorname{sen}^n(x) dx$, que ya fueron estudiadas.

Si m es impar y n cualquier número entonces se utilizan

$$\blacksquare \operatorname{sen}^m(x) \cos^n(x) = \operatorname{sen}^{m-1}(x) \cos^n(x) \operatorname{sen}(x) \quad \blacksquare \operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Si n es impar y m cualquier número entonces se utilizan

$$\blacksquare \operatorname{sen}^m(x) \cos^n(x) = \operatorname{sen}^m(x) \cos^{n-1}(x) \cos(x) \quad \blacksquare \operatorname{sen}^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Ejemplo 2.5.13.

Calcule

(a) $\int \operatorname{sen}^2(x) \cos^2(x) dx$

(b) $\int \operatorname{sen}^4(x) \cos^3(x) dx$

(c) $\int \operatorname{sen}^5(x) \cos^2(x) dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \operatorname{sen}^2(x) \cos^2(x) dx &= \int \left(\frac{1 - \cos(2x)}{2} \right) \left(\frac{1 + \cos(2x)}{2} \right) dx = \frac{1}{4} \int (1 - \cos^2(2x)) dx \\
 &= \frac{1}{4} \int \left(1 - \left(\frac{1 + \cos(4x)}{2} \right) \right) dx = \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{2} - \frac{\cos(4x)}{2} \right) dx \\
 &= \boxed{\frac{x}{8} - \frac{\operatorname{sen}(4x)}{4} + C}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \operatorname{sen}^4(x) \cos^3(x) dx &= \int \cos^2(x) \operatorname{sen}^4(x) \cos(x) dx = \int (1 - \operatorname{sen}^2(x)) \operatorname{sen}^4(x) \cos(x) dx \\
 &= \int \underbrace{\operatorname{sen}^4(x) \cos(x) dx}_{u=\operatorname{sen}(x), du=\cos(x)dx} - \int \underbrace{\operatorname{sen}^6(x) \cos(x) dx}_{u=\operatorname{sen}(x), du=\cos(x)dx} \\
 &= \boxed{\frac{\operatorname{sen}^5(x)}{5} - \frac{\operatorname{sen}^7(x)}{7} + C}
 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 \int \operatorname{sen}^5(x) \cos^2(x) dx &= \int \operatorname{sen}^4(x) \cos^2(x) \operatorname{sen}(x) dx = \int (1 - \cos^2(x))^2 \cos^2(x) \operatorname{sen}(x) dx \\
 &= \int (1 - 2\cos^2(x) + \cos^4(x)) \cos^2(x) \operatorname{sen}(x) dx \\
 &= \int \underbrace{\cos^2(x) \operatorname{sen}(x) dx}_{u=\cos(x), du=-\operatorname{sen}(x)dx} - 2 \int \underbrace{\cos^4(x) \operatorname{sen}(x) dx}_{u=\cos(x), du=-\operatorname{sen}(x)dx} + \int \underbrace{\cos^6(x) \operatorname{sen}(x) dx}_{u=\cos(x), du=-\operatorname{sen}(x)dx} \\
 &= \boxed{-\frac{\cos^3(x)}{3} + \frac{2\cos^5(x)}{5} - \frac{\cos^7(x)}{7} + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \tan^m(x) \sec^n(x) dx$$

Si m es impar y n cualquier número o si m es par y n impar, se usa $\tan^m(x) \sec^n(x) dx = \tan^{m-1}(x) \sec^{n-1}(x) \tan(x) \sec(x)$ y la identidad $1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$

Si m es cualquier número y n es par se utilizan

$$\blacksquare \tan^m(x) \sec^n(x) = \tan^m(x) \sec^{n-2}(x) \sec^2(x) \quad \blacksquare 1 + \tan^2(x) = \sec^2(x)$$

Si m es impar y n es par se aplica cualquiera de los dos casos

Ejemplo 2.5.14.

Calcular

(a) $\int \tan^3(3x) \sec^3(3x) dx$

(b) $\int \sqrt{\tan(x)} \sec^6(x) dx$

(c) $\int \tan^2(2x) \sec^4(2x) dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}
 \int \tan^3(x) \sec^3(x) dx &= \int \tan^2(3x) \sec^2(3x) \tan(3x) \sec(3x) dx \\
 &= \int (\sec^2(3x) - 1) \sec^2(3x) \tan(3x) \sec(3x) dx \\
 &= \underbrace{\int \sec^4(3x) \tan(3x) \sec(3x) dx}_{u=\sec(3x), du=\sec(3x)\tan(3x)dx} - \underbrace{\int \sec^2(3x) \tan(3x) \sec(3x) dx}_{u=\sec(3x), du=\sec(3x)\tan(3x)dx} \\
 &= \boxed{\frac{\sec^5(3x)}{15} - \frac{\sec^3(3x)}{9} + C}
 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{\tan(x)} \sec^6(x) dx &= \int \tan^{\frac{1}{2}}(x) \sec^4(x) \sec^2(x) dx = \int \tan^{\frac{1}{2}}(x) (1 + \tan^2(x))^2 \sec^2(x) dx \\
 &= \int \tan^{\frac{1}{2}}(x) (1 + 2\tan^2(x) + \tan^4(x)) \sec^2(x) dx \\
 &= \underbrace{\int \tan^{\frac{1}{2}}(x) \sec^2(x) dx}_{u=\tan(x), du=\sec^2(x)dx} + 2 \underbrace{\int \tan^{\frac{5}{2}}(x) \sec^2(x) dx}_{u=\tan(x), du=\sec^2(x)dx} + \underbrace{\int \tan^{\frac{9}{2}}(x) \sec^2(x) dx}_{u=\tan(x), du=\sec^2(x)dx} \\
 &= \boxed{\frac{2 \tan^{\frac{3}{2}}(x)}{3} + \frac{4 \tan^{\frac{7}{2}}(x)}{7} + \frac{2 \tan^{\frac{11}{2}}(x)}{11} + C}
 \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned}
 \int \tan^2(2x) \sec^4(2x) dx &= \int \sec^2(2x) \tan^2(2x) \sec^2(2x) dx = \int (1 + \tan^2(2x)) \tan^2(2x) \sec^2(2x) dx \\
 &= \underbrace{\int \tan^2(2x) \sec^2(2x) dx}_{u=\tan(x), du=\sec^2(x)dx} + \underbrace{\int \tan^4(2x) \sec^2(2x) dx}_{u=\tan(x), du=\sec^2(x)dx} \\
 &= \boxed{\frac{\tan^3(2x)}{6} + \frac{\tan^5(2x)}{10} + C}
 \end{aligned}$$

Integral de la forma

$$\int \cot^m(x) \operatorname{cosec}^n(x) dx$$

Si m es impar y n cualquier número o si m es par y n impar, se usa

- $\cot^m(x) \operatorname{cosec}^n(x) dx = \cot^{m-1}(x) \operatorname{cosec}^{n-1}(x) \cot(x) \operatorname{cosec}(x) dx$
- $1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x)$

Si m es cualquier número y n es par se utilizan

- $\cot^m(x) \operatorname{cosec}^n(x) = \cot^m(x) \operatorname{cosec}^{n-2}(x) \operatorname{cosec}^2(x)$
- $1 + \cot^2(x) = \operatorname{cosec}^2(x) = 1$

Si m es impar y n es par se aplica cualquiera de los dos casos anteriores

Ejemplo 2.5.15.

Calcular $\int \cot^5(x) \operatorname{cosec}^4(x) dx$

**Resolución:** ►

$$\begin{aligned} \int \cot^5(x) \operatorname{cosec}^4(x) dx &= \int \cot^5(x) \operatorname{cosec}^2(x) \operatorname{cosec}^2(x) dx = \int \cot^5(x) (1 + \cot^2(x)) \operatorname{cosec}^2(x) dx \\ &= \int \underbrace{\cot^5(x) \operatorname{cosec}^2(x) dx}_{u=\cot(x), du=-\operatorname{cosec}^2(x) dx} + \int \underbrace{\cot^7(x) \operatorname{cosec}^2(x) dx}_{u=\cot(x), du=-\operatorname{cosec}^2(x) dx} \\ &= -\frac{\cot^6(x)}{6} - \frac{\cot^8(x)}{8} + C \end{aligned}$$

**Integrales de la forma** $\int \operatorname{sen}(mx) \cos(nx) dx, \int \operatorname{sen}(mx) \operatorname{sen}(nx) dx, \int \cos(mx) \cos(nx) dx$

Se utilizarán las identidades siguientes

- $\operatorname{sen}(mx) \cos(nx) = \frac{\operatorname{sen}((m+n)x) + \operatorname{sen}((m-n)x)}{2}$

- $\operatorname{sen}(mx) \operatorname{sen}(nx) = \frac{\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)}{2}$

- $\cos(mx) \cos(nx) = \frac{\cos((m-n)x) + \cos((m+n)x)}{2}$

Ejemplo 2.5.16.

Calcule

(a) $\int \operatorname{sen}(2x) \operatorname{sen}(9x) dx$

(b) $\int \cos(2x) \cos(7x) dx$

**Resolución:** ►

(a)

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}(2x) \operatorname{sen}(9x) dx &= \frac{1}{2} \int (\cos(7x) - \cos(11x)) dx = \frac{1}{2} \left(\int \cos(7x) dx - \int \cos(11x) dx \right) \\ &= \boxed{\frac{\operatorname{sen}(7x)}{14} - \frac{\operatorname{sen}(11x)}{22} + C}\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}\int \cos(2x) \cos(7x) dx &= \frac{1}{2} \int (\cos(5x) + \cos(9x)) dx = \frac{1}{2} \int \cos(5x) dx + \frac{1}{2} \int \cos(9x) dx \\ &= \boxed{\frac{\operatorname{sen}(5x)}{10} + \frac{\operatorname{sen}(9x)}{18} + C}\end{aligned}$$

Ejemplo 2.5.17. Calcule $\int \operatorname{sen}(4x) \cos(5x) dx$ **Resolución:** ►

$$\begin{aligned}\int \operatorname{sen}(4x) \cos(5x) dx &= \frac{1}{2} \int (\operatorname{sen}(9x) + \operatorname{sen}(-x)) dx = \frac{1}{2} \int \operatorname{sen}(9x) dx - \frac{1}{2} \int \operatorname{sen}(x) dx \\ &= \boxed{\frac{\cos(x)}{2} - \frac{\cos(9x)}{18} + C}\end{aligned}$$

2.5.4. Sustitución trigonométrica**Propiedades 2.5.18.** Las integrales que se estudiarán a continuación calculando su valor, son de la forma

1. $\int \sqrt{a^2 - x^2} dx$

2. $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$

3. $\int \sqrt{x^2 - a^2} dx$

**Resolución:** ►**Caso 1**


Para la integral $\int \sqrt{a^2 - x^2}$, $a \neq 0$ se hace la sustitución

$$x = a \operatorname{sen}(\theta)$$

A partir $\operatorname{sen}(\theta) = \frac{x}{a}$ construimos el
 \triangle rectángulo

Generando las ecuaciones

$$\begin{aligned} x &= a \operatorname{sen}(\theta) \\ \operatorname{sen}(\theta) &= \frac{x}{a} \\ \theta &= \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{a}\right) \end{aligned}$$



Entonces reemplazando las ecuaciones en la integral obtenemos


$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \int \sqrt{a^2 - (a \operatorname{sen}(\theta))^2} a \cos(\theta) d\theta = \int \sqrt{a^2(1 - \operatorname{sen}^2(\theta))} a \cos(\theta) d\theta \\ &= \int a \sqrt{\cos^2(\theta)} a \cos(\theta) d\theta = a^2 \int \cos^2(\theta) d\theta = a^2 \int \left(\frac{\cos(2\theta) + 1}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} \left(\int \cos(2\theta) d\theta + \int d\theta \right) = \frac{a^2}{4} \operatorname{sen}(2\theta) + \frac{a^2 \theta}{2} + C \\ &= \frac{a^2}{2} \operatorname{sen}(\theta) \cos(\theta) + \frac{a^2 \theta}{2} + C = \frac{a^2}{2} \frac{x}{a} \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} + \frac{a^2 \theta}{2} + C \\ \Rightarrow \int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \operatorname{arcsen}\left(\frac{x}{a}\right) + C \end{aligned}$$

**Resolución:** ►

Caso 2 Para la integral $\int \sqrt{a^2 + x^2} dx$, se hace la sustitución

$$x = a \tan \theta$$

De donde $\tan(\theta) = \frac{x}{a}$, considerando de esta forma el triángulo rectángulo



$$\text{De las ecuaciones } \begin{cases} \tan(\theta) = \frac{x}{a} \\ x = a \tan(\theta) \end{cases}$$

$$\text{Se obtiene } \begin{cases} \theta = \arctan\left(\frac{x}{a}\right) \\ dx = a \sec^2(\theta) d\theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= \int \sqrt{a^2 + (a \tan(\theta))^2} a \sec^2(\theta) d\theta = \int \sqrt{a^2(1 + \tan^2(\theta))} a \sec^2(\theta) d\theta \\ &= \int a \sqrt{\sec^2(\theta)} a \sec^2(\theta) d\theta = a^2 \int \sec^3(\theta) d\theta \end{aligned}$$

Cálculo de $\int \sec^3(\theta) d\theta$ por partes:

$$\int \sec^3(\theta) d\theta = \int \underbrace{\sec(\theta)}_{u} \cdot \underbrace{(\sec^2(\theta) d\theta)}_{dv} = \int u \cdot dv = uv - \int v du \quad (2.19)$$

$$u = \sec(\theta) \Rightarrow du = \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$$

$$dv = \sec^2(\theta) d\theta \Rightarrow v = \tan(\theta)$$

Reemplazando estas dos últimas ecuaciones en (2.19), tenemos

$$\begin{aligned} \int \sec^3(\theta) d\theta &= \tan(\theta) \sec(\theta) - \int \sec(\theta) \tan^2(\theta) d\theta = \tan(\theta) \sec(\theta) - \int \sec(\theta) (\sec^2(\theta) - 1) d\theta \\ &= \tan(\theta) \sec(\theta) - \int \sec^3(\theta) d\theta + \int \sec(\theta) d\theta \\ \Rightarrow 2 \int \sec^3(\theta) d\theta &= \tan(\theta) \sec(\theta) + \int \sec(\theta) d\theta \\ \Rightarrow \int \sec^3(\theta) d\theta &= \frac{\tan(\theta) \sec(\theta)}{2} + \frac{\ln |\tan(\theta) + \sec(\theta)|}{2} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \int \sqrt{a^2 + x^2} dx &= a^2 \left(\frac{\tan(\theta) \sec(\theta)}{2} + \frac{\ln |\tan(\theta) + \sec(\theta)|}{2} \right) \\ &= \boxed{\frac{x}{2} \sqrt{a^2 + x^2} + \frac{a^2}{2} \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2}) + C} \end{aligned}$$

**Resolución:** ►**Caso 3**

Para la integral $\int \sqrt{x^2 - a^2}$, $a \neq 0$ se hace la sustitución

$$x = a \sec(\theta)$$

De donde $\sec(\theta) = \frac{x}{a}$, considerando de esta forma el triángulo rectángulo



De las ecuaciones $\begin{cases} \sec(\theta) = \frac{x}{a} \\ x = a \sec(\theta) \end{cases}$

Se obtiene

$$\begin{cases} \theta = \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{a}\right) \\ dx = a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \sqrt{x^2 - a^2} dx &= \int \sqrt{(a \sec(\theta))^2 - a^2} a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta = \int \sqrt{a^2(\sec^2(\theta) - 1)} a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta \\ &= \int a \sqrt{\tan^2(\theta)} a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta = a^2 \int \tan^2(\theta) \sec(\theta) d\theta \\ &= a^2 \int (\sec^2(\theta) - 1) \sec(\theta) d\theta = a^2 \left[\int \sec^3(\theta) d\theta - \int \sec(\theta) d\theta \right] \\ &= a^2 \left[\frac{\tan(\theta) \sec(\theta)}{2} - \frac{\ln |\tan(\theta) + \sec(\theta)|}{2} \right] + C \\ &= \frac{a^2}{2} \left[\frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} \frac{x}{a} - \ln \left| \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{a} + \frac{x}{a} \right| \right] + C \\ &= \boxed{\frac{x}{2} \sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2} \ln |\sqrt{x^2 - a^2} + x| + C} \end{aligned}$$

Observación 2.5.19.

1. Los casos anteriores se pueden extender a funciones racionales que contienen funciones integrando de los casos 1, 2 y 3 respectivamente.

2. **CASO 1 GENERAL** Para la integral

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2}), \quad \text{Donde } R \text{ es función racional de variable } x \text{ que contiene } \sqrt{a^2 - x^2}$$

utilizaremos sustitución trigonométrica

$$\text{sen}(\theta) = \frac{x}{a}$$

CASO 2 GENERAL Para la integral

$$\int R(x, \sqrt{a^2 + x^2}), \quad \text{Donde } R \text{ es función racional de variable } x \text{ que contiene } \sqrt{a^2 + x^2}$$

utilizaremos sustitución trigonométrica

$$\tan(\theta) = \frac{x}{a}$$

CASO 3 GENERAL Para la integral

$$\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2}), \quad \text{Donde } R \text{ es función racional de variable } x \text{ que contiene } \sqrt{x^2 - a^2}$$

utilizaremos sustitución trigonométrica

$$\sec(\theta) = \frac{x}{a}$$

Ejemplo 2.5.20.

Calcular las integrales siguientes

(a) $\int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$

(b) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{5+x^2}} dx$

(c) $\int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2-9}} dx$


**Resolución:** ▶

$$(a) \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

función integrando

Note que el integrando es una función racional y parte de ella contiene a $\sqrt{1-x^2}$ por tanto corresponde al caso 1 general.

Se sustituye $x = \text{sen}(\theta)$ considerando de esta forma el triángulo rectángulo



$$\begin{aligned} \text{De } x = \text{sen}(\theta), \text{ se obtiene} \\ \begin{cases} \theta &= \arcsen(x) \\ dx &= \cos(\theta)d\theta \end{cases} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \int \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \int \frac{\text{sen}^2(\theta)\cos(\theta)}{\cos(\theta)} d\theta = \int \text{sen}^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int (1 - \cos(2\theta)) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\theta - \frac{\text{sen}(2\theta)}{2} \right) + C = \frac{1}{2} (\theta - \text{sen}(\theta)\cos(\theta)) + C \\ &= \frac{1}{2} (\arcsen(x) - x\sqrt{1-x^2}) + C \end{aligned}$$

$$(b) \int \frac{1}{x^2\sqrt{5+x^2}} dx$$

función integrando

Note que el integrando es una función racional y parte de ella contiene a $\sqrt{5+x^2}$ por tanto corresponde al caso 2 general.

Se sustituye $x = \sqrt{5}\tan(\theta)$ considerando de esta forma el triángulo rectángulo



$$\begin{aligned} \text{De } x = \sqrt{5}\tan(\theta), \text{ se obtiene} \\ \begin{cases} \theta &= \arctan\left(\frac{x}{\sqrt{5}}\right) \\ dx &= \sqrt{5}\sec^2(\theta)d\theta \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2\sqrt{5+x^2}} dx &= \int \frac{\sqrt{5}\sec^2(\theta)}{5\tan^2(\theta)\sqrt{5}\sec(\theta)} d\theta = \frac{1}{5} \int \frac{\cos(\theta)}{\text{sen}^2(\theta)} d\theta \\ &= \frac{1}{5} \int \cot(\theta)\text{cosec}(\theta) d\theta = -\frac{\text{cosec}(\theta)}{5} + C \\ &= \boxed{-\frac{\sqrt{5+x^2}}{5x} + C} \end{aligned}$$


**Resolución:** ▶

$$(c) \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx$$

función integrando

Note que el integrando es una función racional y parte de ella contiene a $\sqrt{x^2 - 9}$ por tanto corresponde al caso 3 general.

Se sustituye $x = 3\sec(\theta)$ considerando de esta forma el triángulo rectángulo

De $x = 3\sec(\theta)$, se obtiene

$$\begin{cases} \theta &= \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{3}\right) \\ dx &= 3\sec(\theta)\tan(\theta)d\theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}} dx &= \int \frac{3\sec(\theta)\tan(\theta)}{9\sec^2(\theta)3\tan(\theta)} d\theta = \frac{1}{9} \int \cos(\theta) d\theta \\ &= \frac{1}{9} \sin(\theta) + C = \frac{1}{9} \frac{\sqrt{x^2 - 9}}{x} + C \end{aligned}$$

2.5.5. Integración por Fracciones Parciales

Definición 2.5.1. Sean $P(x)$ y $Q(x)$ polinomios. Para calcular integrales de la forma $\int \frac{P(x)}{Q(x)} dx$, consideremos dos casos:

Grado de $P(x)$ es mayor que el grado de $Q(x)$, para este caso se divide hasta obtener una expresión de la forma $\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$ donde el grado de $R(x)$ es menor que el grado de $Q(x)$.

Grado de P menor que el grado Q para este caso expresar el denominador como producto de factores polinomiales de grado 1 o 2 a lo más donde los factores de segundo grado son irreducibles.

Observación 2.5.21. Para el caso 2, presentaremos algunos ejemplos de como descomponer una función racional en fracciones parciales:

$$\blacksquare \frac{3x+1}{x^2-25} = \frac{3x+1}{(x+5)(x-5)} = \frac{A}{x+5} + \frac{B}{x-5}.$$

$$\blacksquare \frac{4x}{(x+6)(x-1)} = \frac{A}{x+6} + \frac{B}{x-1}.$$

$$\blacksquare \frac{2x^2+3x+3}{(x+7)^3} = \frac{A}{x+7} + \frac{B}{(x+7)^2} + \frac{C}{(x+7)^3}.$$

$$\blacksquare \frac{2x^3-6x^2+4}{(x-1)\underbrace{(x^2+x+1)^2}_{\text{poli.irred., gradados}}} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} + \frac{\overbrace{Dx+E}^{\text{poli.degrado1}}}{(x^2+x+1)^2}.$$

$$\blacksquare \frac{x^3-x^2+1}{(x+2)^2(x^2+4x+5)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+4x+5}$$

$$\blacksquare \frac{x^5+x^4-2x+7}{x^6+1} = \frac{Ax+B}{x^2+1} + \frac{Cx+D}{x^2-\sqrt{3}x+1} + \frac{Ex+F}{x^2+\sqrt{3}x-1}$$

$$\blacksquare \frac{x^5-3x^3+2x^2-1}{x^6-1} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{Cx+D}{x^2+x+1} + \frac{Ex+F}{x^2-x+1}$$

$$\blacksquare \frac{x^2+1}{(x-1)^3(x+4)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{(x-1)^3} + \frac{D}{x+4} + \frac{E}{(x+4)^2}$$

Ejemplo 2.5.22.

Calcular

(a) $\int \frac{(x^3+2x^2+2)dx}{x-1}$

(b) $\int \frac{5x-7}{(x-3)(x^2-x-2)}dx$

(c) $\int \frac{4x^2+6}{x^3+3x}dx$

**Resolución:** ►

(a) Primero hay que dividir $\frac{(x^3 + 2x^2 + 2)}{x - 1}$,

$$\begin{array}{r} x^2 + 3x + 3 \\ x-1 \overline{) x^3 + 2x^2 + 2} \\ \underline{-x^3 + x^2} \\ 3x^2 \\ \underline{-3x^2 + 3x} \\ 3x + 2 \\ \underline{-3x + 3} \\ 5 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{(x^3 + 2x^2 + 2)}{x - 1} &= x^2 + 3x + 3 + \frac{5}{x - 1} \Rightarrow \\ \int \frac{(x^3 + 2x^2 + 2)dx}{x - 1} &= \int (x^2 + 3x + 3 + \frac{5}{x - 1})dx \end{aligned}$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} + 3x + 5 \ln|x - 1| + C$$

Utilizando el esquema Horner o Ruffini nos da

$$1 \begin{array}{c|cccc} & 1 & 2 & 0 & 2 \\ & 1 & 3 & 3 & \\ \hline 1 & 1 & 3 & 3 & 5 \end{array} \Rightarrow \frac{(x^3 + 2x^2 + 2)}{x - 1} = x^2 + 3x + 3 + \frac{5}{x - 1} \text{ y luego se resuelve como antes.}$$

(b) Al Factorizar $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$, la descomposición en fracciones parciales sería:

$$\begin{aligned} \frac{5x - 7}{(x - 3)(x^2 - x - 2)} &= \frac{5x - 7}{(x - 3)(x - 2)(x + 1)} = \frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 1} \\ &= \frac{A(x - 2)(x + 1) + B(x - 3)(x + 1) + C(x - 3)(x - 2)}{(x - 3)(x - 2)(x + 1)} \end{aligned}$$

Igualando los numeradores se obtiene

$$5x - 7 = A(x - 2)(x + 1) + B(x - 3)(x + 1) + C(x - 3)(x - 2), \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.20)$$

Es conveniente elegir $x = -1$, $x = 2$, $x = 3$ (conocidos como puntos críticos por que indeterminan la fracción) para calcular A , B , C

Si $x = -1$, reemplazamos este valor en la ecuación (2.20)

$$\begin{aligned} 5(-1) - 7 &= A(-1 - 2)(-1 + 1) + B(-1 - 3)(-1 + 1) + C(-1 - 3)(-1 - 2) \\ -12 &= (-3)(0)A + (-4)(0)B + (-4)(-3)C \\ -12 &= 0 + 0 + 12C \\ \Rightarrow &\boxed{C = -1} \end{aligned}$$

Si $x = 2$ reemplazamos este valor en la ecuación (2.20)

$$\begin{aligned} 5(2) - 7 &= A(2 - 2)(2 + 1) + B(2 - 3)(2 + 1) + C(2 - 3)(2 - 2) \\ 3 &= (0)(3)A + (-1)(3)B + (-1)(0)C \\ 3 &= 0 - 3B + 0 \\ \Rightarrow &\boxed{B = -1} \end{aligned}$$

**Resolución:** ►

(b) Si $x = 3$ reemplazamos este valor en la ecuación (2.20)

$$\begin{aligned} 5(3) - 7 &= A(3 - 2)(3 + 1) + B(3 - 3)(3 + 1) + C(3 - 3)(3 - 2) \\ 8 &= (1)(4)A + (0)(4)B + (0)(1)C \\ 8 &= 4A + 0 + 0 \\ \Rightarrow &\boxed{A = 2} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int \frac{5x - 7}{(x - 3)(x^2 - x - 2)} dx &= \int \frac{5x - 7}{(x + 1)(x - 2)(x - 3)} dx = \int \left(\frac{A}{x - 3} + \frac{B}{x - 2} + \frac{C}{x + 1} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x - 3} - \frac{1}{x - 2} - \frac{1}{x + 1} \right) dx = \int \frac{2}{x - 3} dx - \int \frac{1}{x - 2} dx - \int \frac{1}{x + 1} dx \\ &= \boxed{2 \ln|x - 3| - \ln|x - 2| - \ln|x + 1| + C} \end{aligned}$$

(c) Al factorizar $x^3 + 3x = (x^2 + 3)x$ la descomposición en fracciones parciales sería:

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 + 6}{x^3 + 3x} &= \frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 3} \\ &= \frac{A(x^2 + 3) + (Bx + C)x}{x(x^2 + 3)} \end{aligned}$$

Igualando los numeradores se obtiene

$$4x^2 + 6 = A(x^2 + 3) + (Bx + C)x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad (2.21)$$

El único punto crítico real es $x = 0$ este valor permite calcular, por ejemplo A , pero no es suficiente, ya que necesitamos dos valores más para x que nos permita calcular los otros dos B y C , entonces elegimos cualquier par de valores para x reales, y nos conviene elegir números que produzcan la menor cantidad de operaciones algebraicas.

Si $x = 0$, reemplazamos este valor en la ecuación (2.21)

$$\begin{aligned} 4(0)^2 + 6 &= A((0)^2 + 3) + (B(0) + C)(0) \\ 6 &= 3A + 0 \\ \Rightarrow &\boxed{A = 2} \end{aligned}$$

Si $x = 1$, reemplazamos este valor en la ecuación (2.21)

$$\begin{aligned} 4(1)^2 + 6 &= A((1)^2 + 3) + (B(1) + C)(1) \\ 10 &= 4A + B + C \Rightarrow 10 = 8 + B + C \\ \Rightarrow &\boxed{B + C = 2} \end{aligned}$$

**Resolución:** ►

(c) Si $x = -1$, reemplazamos este valor en la ecuación (2.21)

$$\begin{aligned} 4(-1)^2 + 6 &= A((-1)^2 + 3) + (B(-1) + C)(-1) \\ 10 &= 4A + B - C \Rightarrow 10 = 8 + B - C \\ &\Rightarrow \boxed{B - C = 2} \end{aligned}$$

Ahora resolvemos simultáneamente las ecuaciones

$$\begin{cases} B + C = 2 \\ B - C = 2 \end{cases} \text{ de donde } \boxed{B = 2, C = 0}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{4x^2 + 6}{x^3 + 3x} dx &= \int \frac{4x^2 + 6}{x(x^2 + 3)} dx = \int \left(\frac{A}{x} + \frac{Bx + C}{x^2 + 3} \right) dx \\ &= \int \left(\frac{2}{x} + \frac{2x}{x^2 + 3} \right) dx = \int \frac{2}{x} dx + \int \underbrace{\frac{2x}{x^2 + 3} dx}_{u=x^2+3, du=2xdx} \\ &= \boxed{2\ln|x| + \ln|x^2 + 3| + C} \end{aligned}$$

2.6. Aplicaciones

2.6.1. introducción a las Ecuaciones diferenciales

Definición 2.6.1.

(a) Sea F es una primitiva de $y = f(x)$ en $I \subset \mathbb{R}$, entonces

$$\frac{dy}{dx} = f(x) \implies dy = f'(x)dx$$

a esta expresión se llama **ecuación diferencial**.

1. Una función que satisface una ecuación diferencial, se llama **solución general** de la ecuación diferencial.
2. Una **solución particular** es aquella que se obtiene a partir de una condición inicial (x_0, y_0)
3. Al integrar la expresión $dy = f'(x)dx$

$$\int dy = \int f(x)dx + C \implies y = F(x) + C$$

se obtiene la solución de la ecuación diferencial

Ejemplo 2.6.1.

Resolver las ecuaciones diferenciales siguientes

1. $\frac{dy}{dx} = x^2 + 4$

2. $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2 + 3}{y^3 + 1}$

3. $\frac{dy}{dx} = 2x + 1, \quad y(0) = 3$

**Resolución:** ►

1.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= x^2 + 4 \Rightarrow dy = (x^2 + 4)dx \bigg/ \int \\ &\Rightarrow \int dy = \int (x^2 + 4)dx \\ &\Rightarrow \boxed{y = \frac{x^3}{3} + 4x + C}\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{x^2 + 3}{y^3 + 1} \Rightarrow dy = \frac{x^2 + 3}{y^3 + 1} dx \Rightarrow (y^3 + 1)dy = (x^2 + 3)dx \\ &\Rightarrow \int (y^3 + 1)dy = \int (x^2 + 3)dx \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{y^4}{4} + y = \frac{x^3}{3} + 3x + C}\end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 2x + 1 \Rightarrow dy = (2x + 1)dx \\ &\Rightarrow \int dy = \int (2x + 1)dx \\ &\Rightarrow \boxed{y = x^2 + x + C}\end{aligned}$$

Pero $y(0) = 3 \Rightarrow C = 3$, luego

$$y(x) = x^2 + x + 3$$

2.6.2. Ejercicios Propuestos

1. En un cultivo de bacterias, el número inicial estimado es de 200 bacterias. Al cabo de 10 minutos es de 300. Estimar el número al cabo de 20 minutos.

Resp: 450 bacterias.

2. Un cultivo de bacterias tiene una cantidad inicial N_0 . Cuando $t = 1$ hora la cantidad de bacterias es $\frac{3}{2}N_0$. Si la razón de reproducción es proporcional a la cantidad de bacterias presente, calcular el tiempo necesario para triplicar la cantidad inicial.

Resp: $t \approx 2,71$ horas

3. La población de una comunidad crece a una tasa proporcional a la población presente. Si al inicio es de 500 y aumenta 15% en 10 años. Determine la población después de 30 años.

Resp: 760.

4. Una población bacteriana crece a una tasa proporcional a la cantidad presente. Si al cabo de 3 horas hay 100 individuos y 2000 al cabo de 10 horas, obtener la cantidad inicial de bacterias.

2.6.3. Aplicaciones físicas

Observación 2.6.2.

Recordemos que si

- $s(t)$: representa la posición.
- $v(t)$: representan la velocidad.
- $a(t)$: representan la aceleración

de una partícula que se desplaza sobre una recta, entonces

$$v(t) = s'(t) = \frac{ds}{dt}$$

$$a(t) = v'(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d\left(\frac{ds}{dt}\right)}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2}$$

Ejemplo 2.6.3.

Una partícula se desplaza a lo largo de una recta con una aceleración $a = 5 - 2t[m/seg^2]$. Si $v = 2[m/seg]$ y $s = 0$ cuando $t = 0$, obtenga el desplazamiento s .

**Resolución:** ►

$$\begin{aligned}
 a = \frac{dv}{dt} &= 5 - 2t \Rightarrow dv = (5 - 2t)dt \Big/ \int \\
 \Rightarrow \int dv &= \int (5 - 2t)dt \\
 \Rightarrow v(t) &= 5t - t^2 + C_1 \quad (2.22)
 \end{aligned}$$

Como $v(0) = 2$, entonces

$$\begin{aligned}
 v(0) = 2 &= 5 \cdot 0 - 0^2 + C_1 \\
 \Rightarrow &\boxed{C_1 = 2}
 \end{aligned}$$

Así $v(t) = 5t - t^2 + 2$, luego

$$\begin{aligned}
 v(t) = \frac{ds}{dt} &= (5t - t^2 + 2) \Rightarrow ds = (5t - t^2 + 2)dt \Big/ \int \\
 \Rightarrow \int ds &= \int (5t - t^2 + 2)dt \\
 \Rightarrow s(t) &= \frac{5t^2}{2} - \frac{t^3}{3} + 2t + C_2
 \end{aligned}$$

Como $s(0) = 0$, entonces

$$\begin{aligned}
 s(0) = 0 &= \frac{5}{2}0^2 - \frac{0^3}{3} + 2 \cdot 0 + C_2 \\
 \Rightarrow &\boxed{C_2 = 0}
 \end{aligned}$$

Entonces la posición es $\boxed{s(t) = \frac{5}{2}t^2 - \frac{t^3}{3} + 2t}$ ◀**Ejemplo 2.6.4.**

Un objeto se lanza verticalmente hacia arriba desde el suelo, con una velocidad inicial de $20[\text{pie/seg}]$ cuya $a(t) = 32[\text{pie/seg}^2]$. Determinar

- (a) Tiempo que demora en alcanzar su máxima altura. (c) Tiempo que demora en llegar al suelo.
 (b) Altura máxima. (d) Velocidad con que llega al suelo.

**Resolución: ►**

(a)

$$a = \frac{dv}{dt} = -32 \Rightarrow dv = (-32)dt \Big/ \int$$

$$\Rightarrow \int dv = - \int 32dt \Rightarrow \boxed{v = -32t + C_1}$$

Como $v(0) = 20[\text{pie/seg}]$, entonces

$$v(0) = 20 = -32(0) + C_1 \Rightarrow \boxed{C_1 = 20}$$

$$\Rightarrow \boxed{v(t) = -32t + 20}$$

También

$$v(t) = \frac{ds}{dt} = -32t + 20 \Rightarrow ds = (-32t + 20)dt \Big/ \int$$

$$\Rightarrow \int ds = \int (-32t + 20)dt \Rightarrow \boxed{s = -16t^2 + 20t + C_2}$$

Además $s(0) = 0$ Entonces

$$s(0) = 0 = -16 \cdot 0 + 20 \cdot 0 + C_2$$

$$\Rightarrow \boxed{C_2 = 0}$$

entonces $\boxed{s(t) = -16t^2 + 20t}$ La máxima altura se alcanza cuando la velocidad es nula $v(t) = 0$, de aquí se estima el tiempo es decir

$$v(t) = 0 = -32t + 20 \Rightarrow \boxed{t = \frac{5}{8}[\text{seg}]}$$

(b) Por parte (a), la altura máxima será

$$s\left(\frac{5}{8}\right) = -16 \frac{25}{64} + 20 \frac{5}{8} \Rightarrow s = -\frac{25}{4} + \frac{50}{4}$$

$$\Rightarrow \boxed{s = \frac{25}{4}[\text{pie}]}$$

(c) Como la pelota llega al suelo quiere decir que el desplazamiento es cero $s = 0 = -16t^2 + 20t$, y a partir de allí calcular el tiempo entonces,

$$t(-16t + 20) = 0 \Rightarrow t_0 = 0, t_1 = \frac{5}{4}[\text{seg}]$$

(d) Para encontrar la velocidad con que llega al suelo, consideremos $t = \frac{5}{4}$, pues para $t = 0$ ya sabemos la velocidad inicial, así

$$v = -32 \cdot \frac{5}{4} + 20 \Rightarrow \boxed{v = -20[\text{pie/seg}]}$$

2.6.4. Aplicaciones de la integral en Mecánica Dinámica.

La 2ª ley de Newton $F = ma$ **expresa la relación básica para conocer y determinar el movimiento de un cuerpo**. Si se trata de una masa puntual o partícula en movimiento rectilíneo esta relación permite obtener una aceleración expresada como una función que depende del tipo de fenómeno en estudio.

CASO 1

La aceleración se conoce como función del tiempo. Es la relación más directa pero difícilmente de obtener en la realidad. Por ejemplo en movimiento bajo fuerzas centrales, vibraciones con fuerzas elásticas o con amortiguamiento.

Problema 2.6.5. La aceleración de una partícula está definida por la relación $a = kt^2$. Si se sabe que $v = -32\text{pie/s}$ cuando $t = 0$ y que $v = 32\text{pie/s}$ cuando $t = 4\text{s}$

1. determine la constante k .
2. Escriba las ecuaciones de movimiento, sabiendo también que $x = 0$ cuando $t = 4\text{s}$.



Resolución: ►

1. Como $a(t) = \frac{dv}{dt}$, entonces

$$\begin{aligned} v(t) = \int a(t)dt &= \int kt^2 dt \Rightarrow v(t) = k \frac{t^3}{3} + C \\ \Rightarrow v(0) = -32 &= C \\ \Rightarrow v(4) = 32 &= -32 + k \frac{4^3}{3} \Rightarrow k = 3 \end{aligned}$$

2. *Ecuación del movimiento ($x(t)$)*

Como $v(t) = \frac{dx}{dt}$, entonces

$$\begin{aligned} x(t) = \int v(t)dt &= \int \left(3 \frac{t^3}{3} - 32\right) dt \Rightarrow x(t) = \frac{t^4}{4} - 32t + C_1 \\ \Rightarrow x(4) = 0 &= 64 - 32 \cdot 4 + C_1 \Rightarrow C_1 = 64 \\ \Rightarrow x(t) &= \frac{t^4}{4} - 32t + 64 \end{aligned}$$

Problema 2.6.6. Sea $s(t)$ la posición de un móvil en el instante t , cuando $t = 0$ la posición es $s = 6m$ y su velocidad es $v = 6\frac{m}{s}$. De $t = 0$ a $t = 6$ segundos su aceleración es $a = 2 + t^2$. De $t = 6$ segundos hasta que alcanza el reposo su aceleración es $a = -4\frac{m}{s^2}$.

1. ¿Cuál es el tiempo total del viaje?
2. ¿Qué distancia total cubre el desplazamiento?

Rta: (1) 45,5s, (2) 3390,5m. Cuente el tiempo partiendo de cero y el mismo tiempo arrojando de 6s para el segundo tramo.

Problema 2.6.7. La velocidad de un punto P sobre una recta está dada por la ecuación $V = t \operatorname{sen}\left(\frac{t\pi}{2}\right)$. El punto comienza a moverse en $t = 0$. Encuentre la distancia total recorrida por P cuando esté partiendo del origen vuelve a pasar por él.

CASO 2

La aceleración se conoce como función de la posición s (o x , o y , etc). Para poder obtener el diferencial ds es necesario expresar $a = \frac{dv}{dt}$ como $a = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \cdot \frac{dv}{dx}$

Problema 2.6.8. Un punto P tiene una aceleración dada por la ecuación $\frac{d^2x}{dt^2} = -5x^2\frac{m}{s^2}$. Determine la velocidad P en función de su posición x si P está en 0,3 m con $v = 0,6\frac{m}{s}$, cuando $t = 0$.

Problema 2.6.9. La aceleración de gravedad $g = 9,81m/s^2$ varía a medida que aumenta la altura respecto del nivel del mar. Una expresión más exacta para la aceleración local en un punto dentro del campo de atracción gravitacional (la partícula vuelve y cae) viene dada por

$$g = \frac{9,81}{\left(1 + \frac{y}{68,67 \cdot 10^6}\right)^2} m/s^2$$

Donde y (en metros) es la altura respecto del nivel del mar. Calcule la altura alcanzada por una bala disparada verticalmente hacia arriba con las siguientes velocidades iniciales v_0 :

1. 304,8m/s
2. 3048m/s
3. 11186,2m/s (compare con la distancia tierra-luna)
4. 132140,1km/hr (compare con distancia tierra-sol)

Nota: en lanzamiento vertical $a = -g$; radio medio de la tierra 6371km.

Resp: $h = y_{\max}$ cuando $v = 0$, $h = 68,67 \cdot 10^6 \left(\frac{1,3473 \cdot 10^9}{(1,3473 \cdot 10^9 - v_0^2) - 1} \right)$

1. 20km
2. 477km
3. 7049km
4. $6,08 \cdot 10^{14}m = 6,08 \cdot 10^{11} \text{ km}$ (608 mil millones de km)

Problema 2.6.10. La aceleración debida a la gravedad de una partícula cayendo hacia la tierra es $a = -\frac{gR^2}{r^2}$ en donde R es el radio de la tierra; g es la aceleración de gravedad promedio a nivel del mar y la distancia variable r se mide desde el centro de la tierra hasta la partícula y positivo medida hacia el exterior. Encuentre una expresión para la velocidad de escape, mínima velocidad inicial hacia arriba que debe darse a una partícula sobre la superficie de la tierra para que no retorne a la tierra. (Ind.: $v = 0$ para $r = \infty$).

Resp: $\sqrt{2gR} = 11180,2 \text{ m/s}$

CASO 3:

La aceleración se conoce como función de la velocidad. En este se debe separar variables y resolver el tiempo como función de la velocidad.

Problema 2.6.11. Un cuerpo en caída libre tiene una aceleración dirigida hacia el centro de la tierra igual a $9,81 \text{ m/s}^2$, pero si se toma en cuenta la resistencia aerodinámica del aire la aceleración de un cuerpo al caer desde una altura H se puede aproximar por $a = g - cv^2$ donde c es una constante de amortiguación.

1. Si un cuerpo se libera del reposo ¿cuál es su velocidad en función del tiempo?
2. Determine su velocidad en función de la distancia s medida desde el punto en que se libera.



Resolución: ►

1. Recuerde que $a(t) = \frac{dv}{dt}$, entonces

$$\int \frac{dv}{g - cv^2} = \int \frac{dv}{g \left(1 - \left(\sqrt{\frac{c}{g}} v \right)^2 \right)} = \int dt$$

Haciendo $u = \sqrt{\frac{c}{g}} v \Rightarrow \sqrt{\frac{g}{c}} du = dv$ se tiene

$$\int \frac{\sqrt{\frac{g}{c}} du}{1 - u^2} = - \int \frac{\sqrt{\frac{g}{c}} du}{u^2 - 1} \Rightarrow -\sqrt{\frac{g}{c}} \int \frac{du}{u^2 - 1} = -\sqrt{\frac{g}{c}} \left(\int \frac{A}{u-1} du + \frac{B}{u+1} du \right) = \int g dt$$

entonces

$$-\sqrt{\frac{g}{c}} \left(\int \frac{1}{2(u-1)} du - \frac{1}{2(u+1)} du \right) = -\sqrt{\frac{g}{4c}} \ln \left| \frac{u-1}{u+1} \right| = \int g dt = gt$$

$$\Rightarrow \frac{u+1}{u-1} = e^{2t\sqrt{\frac{c}{g}}} \cdot K \Rightarrow v(t) = \sqrt{\frac{g}{c}} \left(\frac{1 + K e^{2t\sqrt{\frac{c}{g}}}}{K e^{2t\sqrt{\frac{c}{g}}} - 1} \right)$$

2.

Problema 2.6.12. En especial los movimientos que oponen los fluidos al movimiento depende de la velocidad v . Así en una cierta lancha que se va moviendo a $6m/s$ falla su motor y se apaga. Debido a la resistencia aerodinámica su aceleración es $a = -0,03V^2m/s^2$. ¿cuál es la velocidad de la lancha 2 segundos después?

Resp: $4,41m/s$

Problema 2.6.13. La velocidad de un cuerpo está dado por $v^2 = ks$ en donde k es una constante. Si $v = 4m/s$ y $s = 4m$ en $t = 0$. Determine la constante k y la velocidad a los 2s.

Resp: $20m/s$

Ejercicios propuestos

1. La segunda derivada de una función f es $f''(x) = 6(x - 1)$. Encuentre la función si su gráfica contiene el punto $(2, 1)$ y en ese punto es tangente a la recta de ecuación $3x - y - 5 = 0$ R: $f(x) = (x - 1)^3 - 7$.
2. Se lanza verticalmente desde el suelo una pelota, con una velocidad de $96[pie/seg]$. Determine
 - a) Tiempo en alcanzar la máxima altura. R: 3 seg.
 - b) Altura máxima. R: 144 pies
 - c) Tiempo para el cual la velocidad de la pelota es igual a la mitad de la velocidad inicial. R: $\frac{3}{2}$ seg.
 - d) Altura de la pelota cuando su velocidad es la mitad de la velocidad inicial. R: 108 pies

2.6.5. Crecimiento y decaimiento exponencial

Observación 2.6.14.

Supongamos que $N = f(t)$ es el tamaño de una población en el instante t . Para una población grande, $f(t)$ (que es un entero) no se ve afectada por el nacimiento o muerte de alguno de sus miembros y, aún cuando esta función $f(t)$ se incrementa o disminuye a saltos, ellos son relativamente pequeños respecto de la población total, por lo que podemos aceptar que f es una función derivable.

Parece natural entonces escribir la razón de cambio $N = f(t)$ respecto del tiempo como

$$\frac{dN}{dt} = kN$$

donde N es la población presente.

Esta ecuación diferencial la resolvemos separando variables

$$\begin{aligned}\frac{dN}{dt} &= kN \Rightarrow \frac{dN}{N} = k dt \Big/ \int \\ &\Rightarrow \int \frac{dN}{N} = \int k dt \\ &\Rightarrow \ln(N) = kt + C \Big/ e \\ &\Rightarrow N(t) = C e^{kt}\end{aligned}$$

la condición inicial $N(0) = N_0$ nos da $\ln(N_0) = C$, de donde $\ln(N) = kt + \ln(N_0)$. Así

$$\begin{aligned}\ln(N) - \ln(N_0) &= kt \Rightarrow \ln\left(\frac{N}{N_0}\right) = kt \\ \frac{N}{N_0} &= e^{kt} \Rightarrow N = \boxed{N_0 e^{kt}}\end{aligned}$$

- cuando $k > 0$, el crecimiento se llama crecimiento exponencial.
- cuando $k < 0$, se llama decrecimiento exponencial.

Ejemplo 2.6.15.

El número de bacterias en un cultivo que crece con rapidez, se estima que era de 10,000 al medio día y 40,000 después de 2 horas.

Hacer una estimación de la cantidad de bacterias que habrá después de 5 horas de iniciado el estudio.

**Resolución:** ►

Supongamos que la ecuación $\frac{dN}{dt} = kN$ es aplicable, de modo que

$$N(t) = N_0 e^{kt}$$

Entonces, si suponemos $t = 0$ a mediodía, se tiene $N(0) = 10000 = N_0$ y además $N(2) = 40000$

$$N(2) = 40,000 = 10,000 e^{k(2)} \Rightarrow 4 = e^{2k} \quad \bigg/ \ln$$

$$\Rightarrow \ln(4) = 2k \Rightarrow k = \frac{\ln(4)}{2}$$

$$\Rightarrow k = \ln \sqrt{4} \Rightarrow \boxed{k = \ln(2)}$$

así, $\boxed{y = 10,000 e^{(\ln 2)t}}$, y en $t = 5$,

$$y(5) = 10,000 e^{(\ln 2)5} \Rightarrow y \approx 320,000 \text{ bacterias.}$$

2.6.6. Ley de enfriamiento de Newton**Observación 2.6.16.**

Esta ley establece que la razón en la que un objeto se enfría (o calienta) es proporcional a la diferencia de la temperatura entre el objeto y el medio que lo rodea. Esto es, si un objeto se encuentra a una temperatura inicial T_0 se ubica en un lugar donde la temperatura es T_1 y si $T(t)$ representa la temperatura del objeto en el instante t , entonces la ley de enfriamiento de Newton señala que

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = k(T - T_1)}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{dT}{dt} &= k(T - T_1) \Rightarrow \frac{dT}{T - T_1} = k dt \quad \bigg/ \int \\ \int \frac{dT}{T - T_1} &= \int k dt \Rightarrow \ln |T - T_1| = kt + C \quad \bigg/ e \\ &\Rightarrow |T - T_1| = C e^{kt} \end{aligned}$$

que es una ecuación diferencial de variable separables.

Ejemplo 2.6.17.

Un objeto se retira de un horno que se encuentra a una temperatura de 350°F y se deja enfriar en un lugar que está a 70°F . Si la temperatura del objeto desciende a 250°F en un tiempo de 1 hora, determinar su temperatura después de 3 horas que se retiró del horno.

**Resolución: ►**

Siguiendo el esquema anterior $T_1 = 70$ entonces $|T - 70| = Ce^{kt}$. Dado que la temperatura inicial es mayor que 70, es natural asumir que la temperatura del objeto disminuirá hacia 70. Luego, $T - 70 > 0$ y el valor absoluto es innecesario. Así

$$T - 70 = e^{kt+C} \Rightarrow T = 70 + C_1 e^{kt},$$

donde $C_1 = e^C$, como $T(0) = 350$, entonces $350 = T(0) = 70 + C_1 e^{k \cdot 0} \Rightarrow \boxed{C_1 = 280}$. Luego, la solución será

$$T(t) = 70 + 280e^{kt}$$

el valor de k se obtiene con la condición inicial en $t = 1$, $T(1) = 250$. Así

$$250 = T(1) = 70 + 280e^{k \cdot 1} \Rightarrow 280e^k = 180 \Rightarrow e^k = \frac{180}{280}$$

$$\Rightarrow k = \ln \frac{180}{280} \Rightarrow \boxed{k \approx -0,44183}$$

luego, $T(t) = 70 + 280e^{-0,44183t}$, y así, después de 3 horas, la temperatura será

$$T(3) = 70 + 280e^{-0,44183 \cdot 3} \approx \boxed{144,4^\circ F}$$



Capítulo 3

Integral Definida

3.1. Suma de Riemann

Definición 3.1.1.

1. Dado el intervalo $[a, b] \subset \mathbb{R}$ se define al conjunto $P = \{x_i \in [a, b] : i = 0, 1, \dots, n\}$ **partición** de $[a, b]$ si satisface que

$$a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_i \leq x_{i+1} \leq \dots \leq x_n = b$$

La partición P determina una división del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, \dots, n$.

2. Se define la **norma** de P , a la expresión

$$|P| = \max\{x_i - x_{i-1} : i = 1, 2, \dots, n\}$$

3. Sea $P = \{x_i : i = 0, 1, \dots, n\}$ y $P' = \{x'_i : i = 0, 1, \dots, m\}$ dos particiones de $[a, b]$ tales que $P \subset P'$, entonces a la partición P' se le llama **refinamiento** de la partición P .

4. A la longitud de cada intervalo se le denota por

$$\Delta x_i = (x_i - x_{i-1}), \quad i = 1, \dots, n.$$

5. Cuando estas longitudes tienen la misma medida, es decir

$$\Delta x_i = (x_i - x_{i-1}) = \frac{b-a}{n}, \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

se dice que la partición es **regular**, y en tal caso

$$x_i = a + i \left(\frac{b-a}{n} \right), \quad i = 1, \dots, n.$$

Definición 3.1.2.

1. Sean $P = \{x_i : i = 0, 1, \dots, n\}$ y $P' = \{x'_i : i = 0, 1, \dots, m\}$ dos particiones de $[a, b]$ tales que $P \subset P'$, entonces a la partición P' se le llama **refinamiento** de la partición P .
2. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ función, se dice que es **acotada**, si existen $m, M \in \mathbb{R}$ tales que

$$m \leq f(x) \leq M, \forall x \in [a, b],$$

3. Sea $P = \{x_i : a = x_0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_i \leq x_{i+1} \leq \dots \leq x_n = b\}$ partición de $[a, b]$ se define los números siguientes.



- a) $m_i(f) = \inf\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$, es la menor cota inferior del conjunto conformado por las imágenes $f(x)$ correspondiente al intervalo $[x_{i-1}, x_i]$
- b) $M_i(f) = \sup\{f(x) : x \in [x_{i-1}, x_i]\}$ es la menor cota superior del conjunto conformado por las imágenes $f(x)$ correspondiente al intervalo $[x_{i-1}, x_i]$
- c) Sea f acotada existen $m_i(f), M_i(f)$ para todo $i = 1, \dots, n$ tales que

$$m \leq m_i(f) \leq M_i(f) \leq M$$

. Se define la **suma inferior** como $L(f, P) = \sum_{i=1}^n m_i(f)(x_i - x_{i-1})$

y la **suma superior** como $U(f, P) = \sum_{i=1}^n M_i(f)(x_i - x_{i-1})$.

- d) Ambas sumas se conoce como **sumas de Riemman**



Propiedades 3.1.1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ función acotada


1. entonces

$$m(b-a) \leq L(f, P) \leq U(f, P) \leq M(b-a)$$

2. Si P' es un refinamiento de P , es decir $P \subset P'$ entonces

$$L(f, P) \leq L(f, P') \leq U(f, P') \leq U(f, P)$$

debido a que P' tiene más puntos que P .




Ejemplo 3.1.2.

Dada la función $f(x) = x^2 + 2$, $x \in [0, 3]$ y la partición $\{0, \frac{2}{3}, 1, \frac{3}{2}, 2, \frac{7}{3}, 3\}$

1. Calcule la suma inferior Riemann.


2. Calcule la suma superior de Riemann.

**Resolución:**

1.

Suma inferior de Riemann (suma de área de los rectángulos)


$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^6 f(x_i^*)(x_i - x_{i-1}) &= \left(\frac{2}{3} - 0\right) \cdot f(0) + \left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot f\left(\frac{2}{3}\right) + \left(\frac{3}{2} - 1\right) \cdot f(1) + \\
 &\quad + \left(2 - \frac{3}{2}\right) \cdot f\left(\frac{3}{2}\right) + \left(\frac{7}{3} - 2\right) \cdot f(2) + \left(3 - \frac{7}{3}\right) \cdot f\left(\frac{7}{3}\right) \\
 &= \left(\frac{2}{3} - 0\right) \cdot [0^2 + 2] + \left(1 - \frac{2}{3}\right) \cdot \left[\left(\frac{2}{3}\right)^2 + 2\right] + \left(\frac{3}{2} - 1\right) \cdot [1^2 + 2] + \\
 &\quad + \left(2 - \frac{3}{2}\right) \cdot \left[\left(\frac{3}{2}\right)^2 + 2\right] + \left(\frac{7}{3} - 2\right) \cdot [2^2 + 2] + \left(3 - \frac{7}{3}\right) \cdot \left[\left(\frac{7}{3}\right)^2 + 2\right] \\
 &= \frac{4}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{22}{9} + \frac{1}{2} \cdot 3 + \frac{1}{2} \cdot \frac{17}{4} + \frac{1}{3} \cdot 6 + \frac{2}{3} \cdot \frac{67}{9}
 \end{aligned}$$

**Ejemplo 3.1.3.**

Calcule la suma superior e inferior de Riemann para $f(x) = x^2 + 3$ cuya partición es $\{-1, 0, 1, 5, 2, 2, 5, 3\}$



Resolución: ►




1.

Suma inferior de Riemann (suma de área de los rectángulos)

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^5 f(x_i^*)(x_i - x_{i-1}) &= (0 - (-1)) \cdot f(0) + (1,5 - 0) \cdot f(0) + (2 - 1,5) \cdot f(1,5) + (2,5 - 2) \cdot f(2) + \\
 &\quad + (3 - 2,5) \cdot f(2,5) \\
 &= 1 \cdot 3 + (1,5) \cdot 3 + (0,5) \cdot (5,25) + (0,5) \cdot 7 + (0,5) \cdot (9,25) \\
 &= 3 + 4,5 + 2,625 + 3,5 + 4,625 = 18,25
 \end{aligned}$$



Resolución: ►



2.

Suma superior de Riemann (suma de áreas de los rectángulos)

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^5 f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1}) &= (0 - (-1)) \cdot f(-1) + (1,5 - 0) \cdot f(1,5) + (2 - 1,5) \cdot f(2) + (2,5 - 2) \cdot f(2,5) + \\
 &\quad + (3 - 2,5) \cdot f(3) \\
 &= 1 \cdot 4 + (1,5) \cdot 5,25 + 0,5 \cdot 7 + (0,5) \cdot 9,25 + (0,5) \cdot 12 \\
 &= 4 + 7,875 + 0,5 \cdot 28,25 = 11,875 + 14,125 = \boxed{26u^2}
 \end{aligned}$$

3.2. Integral definida como un límite de sumas

Definición 3.2.1.

La integral definida como un límite de sumas

1. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ función y $L \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1}) = L,$$

donde \bar{x}_i es un punto arbitrario en $[x_{i-1}, x_i]$ para toda partición P de $[a, b]$ entonces a L se llama **límite de la suma de Riemann**

2. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ función. La integral definida de f desde a hasta b denotada por $\int_a^b f(x)dx$ esta dada por

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{|P| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1})$$

3. En caso que la partición sea regular se tiene como consecuencia

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1})$$

Propiedades 3.2.1.

1. $\sum_{i=1}^n c \cdot a_i = c \sum_{i=1}^n a_i, c \text{ constante}$

3. $\sum_{i=1}^n (a_i - b_i) = \sum_{i=1}^n a_i - \sum_{i=1}^n b_i$

2. $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$

4. $\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = \sum_{i=1}^n a_{i+1} - a_1$

Observación 3.2.2.

1. $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

3. $\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

2. $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

4. $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$

Ejemplo 3.2.3.

Hallar el límite dado y luego exprese ese límite como una integral definida.

(a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2}$

(b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i^3}{n^4}$

(c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{8i^2}{n^3}$



Resolución: ►

(a)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n i = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i)(x_i - x_{i-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \cdot \frac{1}{n}$$

Como la partición es regular se tiene

$$\left\{ \begin{array}{l} (x_i - x_{i-1}) = \frac{1}{n} = \frac{b-a}{n} \\ x_i = a + i \frac{b-a}{n} \\ f(\bar{x}_i) = \frac{i}{n} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} b-a = 1 \\ a = 0 \\ b = 1 \\ x_i = f(x_i) = \frac{i}{n} \end{array} \right\}$$

$$\int_a^b f(x)dx = \int_0^1 xdx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2}$$

(b)

Definición 3.2.2.

(a) Si $a > b$ entonces

$$\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$$

si existen las integrales.

(b) Si $f(a)$ existe, entonces

$$\int_a^a f(x)dx = 0$$

Teorema 3.2.4.

- (a) Si $f : [A, B] \rightarrow \mathbb{R}$ es integrable y si $[a, b] \subset [A, B]$ entonces f es integrable en $[a, b]$.
- (b) Si f es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$
- (c) Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua y si $f(x) \geq 0$, $\forall x \in [a, b]$ y si $f(x_0) \neq 0$ para algún $x_0 \in [a, b]$ entonces

$$\int_a^b f(x)dx > 0.$$

- (d) Sean f, g continuas en $[a, b]$ y $f(x) \leq g(x)$, $\forall x \in [a, b]$. Si $\exists x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) < g(x_0)$ entonces

$$\int_a^b f(x)dx < \int_a^b g(x)dx$$

- (e) Sea $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ y g es integrable y si $f(x) = g(x) \forall x$, excepto un número finito de puntos de x en $[a, b]$, entonces f es integrable y

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b g(x)dx.$$

- (f) Si f es una función continua en el intervalo $[a, b]$, tal que alcanza en él un valor máximo absoluto M y un valor mínimo absoluto m . Entonces:

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Propiedades 3.2.5.

(a) Se tiene

$$\int_a^b c dx = c(b - a)$$

(b) Si f es integrable sobre $[a, b]$ y $c \in \mathbb{R}$ constante, entonces cf es integrable sobre $[a, b]$ y

$$\int_a^b cf(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

(c) Si f, g son integrables sobre $[a, b]$, entonces $(f(x) + g(x))$ es integrable y

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

(d) Si f, g son integrables sobre $[a, b]$, entonces $(f(x) - g(x))$ es integrable y

$$\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$$

(e) Si $c \in [a, b]$ y f es integrable sobre $[a, b]$, entonces f es integrable sobre $[a, c]$ y sobre $[c, b]$; y se cumple que

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

(f) Si f y g son integrables sobre $[a, b]$ y si $f(x) \leq g(x)$ para cada $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

Propiedades 3.2.6.

(g) Si f es integrable sobre $[a, b]$, entonces $|f|$ es integrable sobre $[a, b]$ y

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

(h) Si f es integrable sobre $[a, b]$, $\forall c \in \mathbb{R}$ entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+c}^{b+c} f(x-c) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = \int_{a-c}^{b-c} f(x+c) dx$$

(i) Si f es integrable sobre $[a, b]$, $\forall c \neq 0$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f\left(\frac{x}{c}\right) dx, \quad \int_a^b f(x) dx = c \int_{a/c}^{b/c} f(cx) dx$$

Teorema 3.2.7.

(a) Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua en I y si $a \in I$, entonces $G(x) = \int_a^x f(t) dt$, es diferenciable en I y se cumple que $G'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$, es decir

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x), \quad \forall x \in I$$

conocida como el **PRIMER TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO**.

(b) Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua y F la antiderivada de f en I y si $a \in I$ entonces la diferenciación y la integración están relacionadas por

$$\int_a^x f(t) dt = \int_a^x F'(t) dt = F(x) - F(a).$$

conocida como el **SEGUNDO TEOREMA FUNDAMENTAL DEL CÁLCULO**.

Ejemplo 3.2.8.

Calcular las siguientes integrales

$$1. \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx \quad 2. \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx \quad 3. \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x) dx \quad 4. \int_0^1 x^3 dx$$

**Resolución:** ►

1. Haciendo el cambio de variable $u = x + 1$, se genera las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x + 1 \\ du = dx \end{array} \right\} \quad \text{reemplazando estas ecuaciones en la integral obtenemos}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx &= \int_a^b \frac{1}{u^2} du = \int_a^b u^{-2} du \quad \text{al hacer el cambio de variable los} \\ &= \frac{u^{-1}}{-1} \Big|_a^b = -\frac{1}{u} \Big|_a^b \quad \text{los límites de integración cambian por } a \text{ y } b \\ &= \left(-\frac{1}{x+1} \right) \Big|_0^1 = -\left(\frac{1}{1+1} \right) - \left(-\frac{1}{0+1} \right) \Rightarrow \boxed{\int_0^1 \frac{1}{(x+1)^2} dx = \frac{1}{2}} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) \Big|_1^{\sqrt{3}} = \arctan(\sqrt{3}) - \arctan(1) = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \\ &\Rightarrow \boxed{\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{12}} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}(x) dx &= -\cos(x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - (-\cos(0)) = 0 + 1 \\ &\Rightarrow \boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}(x) dx = 1} \end{aligned}$$

4. Recordar que $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$ entonces

$$\int_0^1 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{1}{4} - \frac{0}{4} \Rightarrow \boxed{\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}}$$

Observación 3.2.9.

Cuando utilizamos técnicas de integración en el cálculo de las integrales definidas, los límites de integración cambian y lo denoto por las letras a y b , que no las cálculo, si no más bien las mantengo hasta encontrar la antiderivada de la función y allí las vuelvo a cambiar por los valores de los límites iniciales.

Ejemplo 3.2.10.

Calcular las siguientes integrales

1. $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$

2. $\int_{-3}^1 x\sqrt{1-x} dx$

3. $\int_0^{\sqrt[5]{2}} \frac{x^9}{(1+x^5)^3} dx$

**Resolución:** ►

1. Haciendo el cambio $u = \sqrt{x}$ genero las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{x} \\ x = u^2 \\ dx = 2u du \end{array} \right\} \quad \text{las que utilizo en la integral, obteniendo}$$

$$\begin{aligned} \int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx &= \int_a^b \frac{2u}{u(1+u^2)} du = \int_a^b \frac{2}{1+u^2} du = 2 \arctan(u) \Big|_a^b = 2 \arctan(\sqrt{x}) \Big|_1^3 \\ &= 2 \left(\arctan(\sqrt{3}) - \arctan(1) \right) = 2 \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = 2 \frac{\pi}{12} \\ &\Rightarrow \boxed{\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \frac{\pi}{6}} \end{aligned}$$

2. Haciendo el cambio $u = \sqrt{1-x}$ genero las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} u = \sqrt{1-x} \\ x = 1-u^2 \\ dx = -2u du \end{array} \right\} \quad \text{las que utilizo en la integral, obteniendo}$$

$$\begin{aligned} \int_{-3}^1 x \sqrt{1-x} dx &= \int_a^b (1-u^2)u(-2u du) = \int_a^b 2u^2(-1+u^2) du = \int_a^b (2u^4 - 2u^2) du \\ &= \int_a^b 2u^4 du - \int_a^b 2u^2 du = \left(\frac{2u^5}{5} - \frac{2u^3}{3} \right) \Big|_a^b = \left(\frac{2(\sqrt{1-x})^5}{5} - \frac{2(\sqrt{1-x})^3}{3} \right) \Big|_{-3}^1 \\ &= \left(\frac{2(\sqrt{1-1})^5}{5} - \frac{2(\sqrt{1-1})^3}{3} \right) - \left(\frac{2(\sqrt{1-(-3)})^5}{5} - \frac{2(\sqrt{1-(-3)})^3}{3} \right) \\ &= 0 - \left(\frac{2^5 \cdot 2}{5} - \frac{2 \cdot 2^3}{3} \right) = \frac{16}{3} - \frac{64}{5} \Rightarrow \boxed{\int_{-3}^1 x \sqrt{1-x} dx = -\frac{112}{15}} \end{aligned}$$

3. Haciendo el cambio $u = x^5 + 1$ genero las ecuaciones

$$\left\{ \begin{array}{l} u = x^5 + 1 \\ x^5 = u - 1 \\ \frac{du}{5} = x^4 dx \end{array} \right\} \quad \text{las que utilizo en la integral, obteniendo}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt[5]{2}} \frac{x^9}{(1+x^5)^3} dx &= \int_0^{\sqrt[5]{2}} \frac{x^5 x^4}{(1+x^5)^3} dx = \int_a^b \frac{x^5}{5u^3} du = \int_a^b \frac{u-1}{5u^3} du = \int_a^b \frac{u^{-2}}{5} du \\ &= \int \frac{u^{-2}}{5} du = \left(-\frac{u^{-1}}{5} + \frac{u^{-2}}{10} \right) \Big|_a^b = \left(-\frac{1}{5(x^5+1)} + \frac{1}{10(x^5+1)^2} \right) \Big|_0^{\sqrt[5]{2}} \\ &= -\frac{1}{15} + \frac{1}{90} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} = -\frac{5}{90} + \frac{1}{10} = \frac{4}{90} \Rightarrow \boxed{\int_0^{\sqrt[5]{2}} \frac{x^9}{(1+x^5)^3} dx = \frac{2}{45}} \end{aligned}$$

3.2.1. Ejercicios Propuestos**Ejercicio 3.2.1.** Calcular las siguientes integrales

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. $\int_{-1}^1 (5x^4 - 4x^3)dx$ | 4. $\int_0^2 (x-1)(3x-1) dx$ | 6. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (\text{sen}(x) - \cos(x))dx$ |
| 2. $\int_2^3 (3x^2 - 4x + 2)dx$ | | 7. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \text{sen}(x) - \cos(x) dx$ |
| 3. $\int_{-2}^{-4} (x+4)^9 dx$ | 5. $\int_{-1}^1 \sqrt{ x -x}dx$ | |

Ejercicio 3.2.2. Hallar un polinomio cuadrático $P(x)$ para el cual

$$p(0) = p(1) = 0, \text{ y } \int_0^1 p(x)dx = 1$$

Ejercicio 3.2.3. Hallar un polinomio cúbico $P(x)$ para el cual

$$p(0) = p(-2) = 0, \text{ } p(1) = 15 \text{ y } 3 \int_{-2}^0 p(x)dx = 4$$

Propiedades 3.2.11.

1. Si f es continua en \mathbb{R} y g es diferenciable en \mathbb{R} , entonces

$$\frac{d}{dx} \left(\int_a^{g(x)} f(t) dt \right) = f(g(x))g'(x)$$

2. Si f es continua en \mathbb{R} y g, h son diferenciables en \mathbb{R} , se tiene

$$\frac{d}{dx} \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt \right) = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x)$$

3. Si f y g' son funciones continuas en \mathbb{R} y g diferenciable en \mathbb{R} entonces

$$\int_a^x f[g(t)]g'(t) dt = \int_{g(a)}^{g(x)} f(u) du, x \in \mathbb{R}$$

4. Si f es continua sobre un intervalo I , entonces para cada $t \in I$ se cumple

$$\int_{-t}^0 f(x) dx = \int_0^t f(-x) dx$$

$$\int_{-t}^t f(x) dx = \int_0^t [f(x) + f(-x)] dx$$

5. Si f es continua sobre un intervalo I , entonces para cada $t \in I$ y además si f es una función impar se tiene

$$\int_{-t}^t f(x) dx = 0.$$

6. Si f es continua sobre un intervalo I , entonces para cada $t \in I$ y además si f es par, se tiene

$$\int_{-t}^t f(x) dx = 2 \int_0^t f(x) dx$$

Definición 3.2.3. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrable, entonces se define **media o valor promedio** de f sobre $[a, b]$ al número

$$f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Teorema 3.2.12. Sea f continua en $[a, b]$ entonces existe $c \in]a, b[$ tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b-a)$$

Ejemplo 3.2.13.

Sea f continua en \mathbb{R} que satisface

$$\int_0^x f(t) dt = x \operatorname{sen}(2x) - 3 \cos(2x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Calcule $f\left(\frac{\pi}{4}\right)$



Resolución: ►

Aplicando el primer teorema fundamental del cálculo

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right) &= \frac{d}{dx} (x \operatorname{sen}(2x) - 3 \cos(2x)) \\ f(x) &= \operatorname{sen}(2x) + 2x \cos(2x) + 6 \operatorname{sen}(2x) = 7 \operatorname{sen}(2x) + 2x \cos(2x) \\ \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 7 \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) + 2 \frac{\pi}{4} \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) \\ \Rightarrow f\left(\frac{\pi}{4}\right) &= 7(1) + \frac{\pi}{2}(0) \\ \Rightarrow \boxed{f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 7} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.2.14.

Sea f diferenciable en \mathbb{R} tal que $f(1) = f(-1) = f'(1) = 1$. Se define las funciones

$$\blacksquare H(x) = \sqrt[3]{x^3 + 7} + \int_{-f(x)}^{f(x)} f(t) dt$$

$$\blacksquare G(x) = \int_7^x H(u) du$$

Hallar $G''(x)$ para $x = 1$

**Resolución: ►****Cálculo de $G'(x)$**

$$G'(x) = H(x) = \sqrt[3]{x^3 + 7} + \int_{-f(x)}^{f(x)} f(t) dt$$

Cálculo de $G''(x)$

$$\begin{aligned} G''(x) &= H'(x) = \frac{1}{3}(7+x^3)^{-\frac{2}{3}}(3x^2) + \left(\int_{-f(x)}^{f(x)} f(t) dt \right)' \\ &= \frac{x^2}{\sqrt[3]{(7+x^3)^2}} + f(f(x)) \cdot f'(x) - f(-f(x)) \cdot (-f'(x)) \\ \Rightarrow G''(1) &= \frac{1}{4} + f(f(1)) \cdot f'(1) + f(-f(1)) \cdot f'(1) \\ \Rightarrow G''(1) &= \frac{1}{4} + f(1) \cdot 1 + f(1) \cdot 1 = \frac{1}{4} + 2 \\ \Rightarrow G''(1) &= \frac{9}{4} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.2.15.Sea $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x) = 3 + \int_0^x \left(\frac{1 + \sin(t)}{2 + t^2} \right) dt$$

Sin calcular la integral, hallar un polinomio cuadrático $p(x) = a + bx + cx^2$ tal que $p(0) = f(0)$, $p'(0) = f'(0)$, $p''(0) = f''(0)$

**Resolución:** ►**Cálculo $f(0)$**

$$f(0) = 3 + \int_0^0 \frac{1 + \operatorname{sen}(t)}{2 + t^2} dt = 3 + 0$$

$$\Rightarrow \boxed{f(0) = 3}$$

Cálculo de $f'(0)$

$$f'(x) = \left(3 + \int_0^x \frac{1 + \operatorname{sen}(t)}{2 + t^2} dt \right)' = 0 + \left(\int_0^x \frac{1 + \operatorname{sen}(t)}{2 + t^2} dt \right)'$$

$$= \frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{2 + x^2} \Rightarrow \boxed{f'(0) = \frac{1}{2}}$$

Cálculo de $f''(0)$

$$f''(x) = \left(\frac{1 + \operatorname{sen}(x)}{2 + x^2} \right)' = \frac{(x^2 + 2)\cos(x) - 2x(1 + \operatorname{sen}(x))}{(x^2 + 2)^2}$$

$$\Rightarrow \boxed{f''(0) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}}$$

Por otro lado

$$\left\{ \begin{array}{l} p(x) = a + bx + cx^2 \\ p'(x) = b + 2cx \\ p''(x) = 2c \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} p(0) = a = f(0) = 3 \\ p'(0) = b = f'(0) = \frac{1}{2} \\ p''(0) = 2c = \frac{1}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} a = 3 \\ b = \frac{1}{2} \\ c = \frac{1}{4} \end{array} \right\}$$

Concluyendo que $\boxed{p(x) = 3 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x^2}$

Ejemplo 3.2.16.

Calcule el valor promedio para cada función luego determine el valor de c que satisface el Teorema del valor medio para integrales.

1. $f(x) = x^2, x \in [-1, 4]$

2. $f(x) = \operatorname{sen}^2(x), x \in [0, 2\pi]$

**Resolución:** ►**1. Cálculo del valor promedio**

$$VP = \frac{1}{4 - (-1)} \int_{-1}^4 x^2 dx = \frac{1}{5} \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^4 = \frac{1}{5} \left(\frac{4^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} \right) = \frac{1}{5} \left(\frac{64}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{65}{15}$$

$$\Rightarrow \boxed{VP = \frac{13}{3}}$$

Cálculo del valor(es) c

$$\frac{13}{3} = f(c) = c^2 \Rightarrow \boxed{c = \pm \sqrt{\frac{13}{3}}}$$

$$\text{Elegimos } c = \sqrt{\frac{13}{3}} \in [-1, 4], \text{ pues } c = -\sqrt{\frac{13}{3}} \notin [-1, 4]$$

$$2. \text{ Rpta: } \frac{1}{2}, c = \frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}, \frac{7\pi}{4}$$

3.3. Ejercicios Propuestos**Ejercicio 3.3.1.** Hallar las derivadas indicadas

$$1. \frac{d}{dx} \left(\int_x^5 \sqrt{1+t^4} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t^4} dt \right) \qquad 2. \frac{d}{dx} \left(\int_{1+x^2}^{\tan(x)} \frac{\sin(t)}{t} dt \right)$$

Ejercicio 3.3.2. Sea f una función derivable tal que $f(0) = f'(0) = 10$ se definen funciones

$$g(x) = \int_0^x f(u) du, \quad h(x) = \int_{-g(x)}^{g(x)} f(t) dt$$

Halle $(h(x))''$ para $x = 0$ **Ejercicio 3.3.3.** Si f es continua y $x^4 = \int_0^x (f(t))^3 dt + 17x$, hallar $f(-3)$ **Ejercicio 3.3.4.** Calcular $f(2)$ si f es continua y satisface $\forall x \geq 0$ la ecuación dada

$$1. \int_0^x f(t) dt = x^2(1+x) \qquad 3. \int_0^{f(x)} t^2 dt = x^2(1+x)$$

$$2. \int_0^{x^2} f(t) dt = x^2(1+x) \qquad 4. \int_0^{x^2(1+x)} f(t) dt = x$$

Ejercicio 3.3.5. Evaluar las siguiente integrales

1. $\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \sin^3(x) dx$

3. $\int_{-1}^1 x^3 dx$

2. $\int_{-a}^a x^3 \cos^3(x) dx$

4. $\int_{-2}^2 (1-x)(1+x) dx$

Ejercicio 3.3.6. Calcule el valor promedio para cada función luego determine el valor de c que satisface el Teorema del valor medio para integrales.

1. $f(x) = x(1+x^2)^4, x \in [-1, 1]$

3. $f(x) = \sin(x)\cos(x), x \in [0, \frac{\pi}{4}]$

2. $f(x) = x^2 + x^3, x \in [0, 1]$

4. $f(x) = \cos^2(x), x \in [0, \pi]$


3.4. Aplicaciones de la Integral definida

Para el cálculo de áreas y volúmenes, utilizaremos dos hechos básicos estudiados, suma de Riemann y el teorema fundamental del cálculo.


3.4.1. Cálculo de Áreas

Definición 3.4.1.

1. Si $f \geq 0$ y es integrable en $[a, b]$, entonces el área bajo la gráfica de f desde a hasta b se define como




2. Si la función es negativa, es decir $f \leq 0$ entonces el área de la región A acotada por la función f el eje x y las rectas verticales $x = a$, $x = b$ es igual al área de A simétrica con respecto al eje X , acotada por la gráfica de $-f$ el eje x y las rectas verticales $x = a$, $x = b$ debido a que $-f$ es una función no negativa $-f \geq 0$.



Definición 3.4.2.


3. Si la región R está limitada por la curva $x = f(y)$ y las rectas $y = c$, $y = d$, entonces el área de la región R esta dada por

$$Area(f) = \int_c^d f(y) dy$$




4. Si queremos calcular el área de una región R encerrada por las gráficas de dos funciones f y g continuas tal que $\forall x \in [a, b]: g(x) \leq f(x)$ limitadas por las rectas $x = a$ y $x = b$ es

$$Area(f) = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$




Definición 3.4.3.

5. Si queremos calcular el área de una región R encerrada por las gráficas de dos funciones $x = f(y)$ y $x = g(y)$ continuas tal que $\forall x \in [a, b]: g(y) \leq f(y)$ limitadas por las rectas $y = c$ y $y = d$ es


**Ejemplo 3.4.1.**

Dada la región R generada por la función $y = f(x) = x^2$ y la recta $x = 1$ y el eje X

1. Dibuje la región R .
2. Calcule el área de la región R .

**Ejemplo 3.4.2.**

Obtenga el área de la región R encerrada por las curvas de ecuaciones $y = x^2$, $y = x + 2$.

**Resolución:** ►**Puntos de intersección entre ambas curvas**

Se resuelve el sistema $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases}$ de donde

$$x^2 - x - 2 = 0 \Rightarrow (x + 1)(x - 2) = 0 \Rightarrow \boxed{x = 2, x = -1}$$

$$\text{Para } x = 2 \Rightarrow y = 4$$

$$\text{Para } x = -1 \Rightarrow y = 1$$

Los puntos de intersección son $\boxed{(-1, 1), (2, 4)}$.

Cálculo del área ,Note que $x + 2 \geq x^2, \forall x \in [-1, 2]$. Entonces el área es


$$\begin{aligned} \text{Area}(R) &= \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^2 \\ &= \boxed{\frac{9}{2}} \end{aligned}$$

Ejemplo 3.4.3.

Sea la función f cuya regla de correspondencia es

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = x + 2 & ; \quad x \in [-3, 0] \\ f_2(x) = -\frac{x^2}{8} + 2 & ; \quad x \in]0, 4]. \end{cases}$$

Calcule el área de la región limitada por la gráfica de $y = f(x)$ y el eje x .

**Resolución:**

Puntos de intersección de $y = f_1$ y $y = f_2$ se resuelve

$$\begin{cases} y = x + 2 \\ y = -\frac{x^2}{8} + 2 \end{cases} \Rightarrow x(x+8) = 0 \Rightarrow x = 0, x = -8 \notin [-3, 4]$$

. Para $x = 0$, $y = 2$. Luego $(0, 2)$ es el único punto de intersección.

Cálculo del área, el área según el gráfico es:

A_1 : es el área encerrada por f_1 , el eje x y $x = -3$

A_2 : es el área encerrada por f_1 , y el eje x y $x = 0$

A_3 : es el área encerrada por f_2 , el eje x y $x = 0$

$$\begin{aligned} A_1 + A_2 + A_3 &= \int_{-3}^{-2} [0 - (x + 2)] dx + \int_{-2}^0 [x + 2 - 0] dx + \int_0^4 \left[-\frac{x^2}{8} + 2 \right] dx \\ &= \left(-\frac{x^2}{2} - 2x \right) \Big|_{-3}^{-2} + \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-2}^0 + \left(-\frac{x^3}{24} + 2x \right) \Big|_0^4 \\ &= -\frac{(-2)^2}{2} - 2(-2) + \frac{(-3)^2}{2} + 2(-3) - \frac{(-2)^2}{2} - 2(-2) - \frac{(4)^3}{24} + 2(4) \\ &= -2 + 4 + \frac{9}{2} - 6 - 2 + 4 - \frac{8}{3} + 8 = 6 + \frac{11}{6} \\ &\Rightarrow \boxed{\frac{47}{6} u^2} \end{aligned}$$

3.4.2. Problemas Propuestos

Problema 3.4.1. Calcular el área de la región limitada por la gráfica de $f(x) = 3 + 2x - x^2$, la recta $x = 5$ y el eje x .

Problema 3.4.2. Calcule el área de la región limitada por la gráfica de $y = f(x)$ el eje x , las rectas $x = 1$; $x = 8$, donde

$$f(x) = \begin{cases} x^2; & x \leq 3 \\ 6x - x^2; & x > 3 \end{cases}$$

Problema 3.4.3. Calcule el área de la región limitada por f el eje x y las rectas $x = -5$; y $x = 3$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{9} - 1; & x < 0 \\ -2x^2 - 1; & x \geq 0 \end{cases}$$

Problema 3.4.4. 1. Calcular la región encerrada por las curvas

$$(y-4)^2 = 4-4x; \quad y+2x=2.$$

2. Hallar el área de la región limitada por la gráfica de las funciones

$$f(x) = 6 + 2x - \frac{x^2}{4}; \quad g(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x - 14; & x \leq 6 \\ 13 - 2x; & x > 6 \end{cases}$$

3. Hallar el área de la región encerrada por las gráficas de $y = 10x - x^2$ y $y = 3x - 8$.

4. Hallar el área de la región encerrada por la gráfica de la curva $y = x^2 - 8x + 10$, el eje x y las rectas $x = 2$ y $x = 5$

5. Calcular el área encerrada por las curvas $y = \sin x$, $y = \cos x$ entre $x = 0$ y $x = \pi$

6. Hallar el área encerrada por las curvas $8y = x^3$ y $8y = 2x^3 + x^2 - 2x$.

7. Calcular el área encerrada por las curvas $y^2 = x$ y $y = 3x - 10$.

8. Calcular el área encerrada por el eje x y las curvas $y = \arcsen x$, $y = \arccos x$.

9. Calcule el área de la región acotada por las curvas $y^2 = ax$, $ay = x^2$, $y^2 = -ax$, $y = -x^2$, $a > 0$

10. Calcule el área de la región acotada por las curvas $y = \cos x$, $y = 1 - \frac{2x}{\pi}$

11. Hallar el área encerrada por la elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

12. Hallar el área de la región situada entre la rama derecha de la hipérbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ y la recta vertical $x = 2a$.

13. Hallar el área de la región limitada por las curvas $xy = 9$ y $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 4$

14. Hallar el área dentro de la curva $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$

15. Calcular el área de la región limitada por $(y-x-2)^2 = 9x$ y por uno ó ambos de los ejes coordenados.

16. Calcular el área de la región acotada por las dos ramas de la curva $(y-x)^2 = x^5$ y por la recta $x = 4$.

17. Hallar el área de la región comprendida entre la curva $y = 2x^3 - 3x^2$ y la recta tangente a esta curva y que pasa por el origen.

Problema 3.4.5. 1. Hallar el área de la región limitada por las curvas:

- a) $y = x^2$, $y = 2x + 3$
- b) $y = \sqrt{4 - 4x}$, $y = \sqrt{4 - x}$ y el eje x .
- c) $y = \sin x$, $\cos x$ y el eje y , en el primer cuadrante.
- d) $x = y^2$, $x = -2y^2 + 3$
- e) $y^2 = 2x + 1$, $x - y - 1 = 0$
- f) $y = \sin(2x)$, $y = \sin x$, $x = 0$, $x = \pi$.

3.4.3. Cálculo de Volúmenes

Definición 3.4.4. Volumen de un sólido con secciones planas paralelas conocidas

El volumen de una rebanada de un sólido es el volumen de un cilindro $A(x_i^*)\Delta x_i$, donde $A(x_i^*)$ es el área de la sección transversal plana del sólido, y $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ es la altura de la rebanada. Luego si queremos calcular el volumen del sólido es


$$Volumen(S) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*)\Delta x_i = \int_a^b A(x)dx$$

donde $A(x)$ es el área de la sección transversal del sólido.

Definición 3.4.5. Volumen de un sólido de revolución por secciones planas paralelas: Método del disco

El volumen de un sólido (S) generado al rotar una región plana R , ubicada bajo la gráfica de una función $y = f(x) \geq 0$ y sobre el eje x desde $x = a$ hasta $x = b$ está dada por


$$V(S) = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



Definición 3.4.6. Volumen de un sólido de revolución por secciones planas paralelas alrededor de ejes paralelos al eje x : Método del disco


El volumen de un sólido (S) generado al rotar una región plana R alrededor del eje $y = c$, limitada por la grafica $y = f(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$ tal que $c \leq f(x)$ ó $f(x) \leq c$ está dada por

$$V(S) = \pi \int_a^b [f(x) - c]^2 dx$$

**Definición 3.4.7.** Volumen de un sólido de revolución por secciones planas paralelas: Método del anillo

Para calcular el volumen de un sólido (S) de revolución generado por la rotación alrededor del eje x de la región R encerrada entre dos curvas continuas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, $\forall x \in [a, b]$ desde $x = a$ hasta $x = b$ tal que $0 \leq g(x) \leq f(x)$ ó $f(x) \leq g(x) \leq 0$, está dada por


$$V(S) = \pi \int_a^b [(f(x))^2 - (g(x))^2] dx$$



Definición 3.4.8. Volumen de un sólido de revolución por secciones planas paralelas alrededor de ejes paralelos al eje x (extensión del método del anillo)

Para calcular el volumen de un sólido (S) de revolución generado por la rotación alrededor de un eje $y = c$ de la región R encerrada entre dos curvas continuas $y = f(x)$ y $y = g(x)$, $\forall x \in [a, b]$ desde $x = a$ hasta $x = b$ tal que $c \leq g(x) \leq f(x)$ ó $f(x) \leq g(x) \leq c \forall x \in [a, b]$, está dada por

$$V(S) = \pi \int_a^b [(f(x) - c)^2 - (g(x) - c)^2] dx$$

**Definición 3.4.9.** Volumen de un sólido de revolución: Método de las capas cilíndricas concéntricas

1. El volumen de un sólido (S) de revolución generado al rotar el área limitado superiormente por la gráfica de $y = f(x)$ continua en $[a, b]$, e inferiormente por el eje x desde $x = a \geq 0$ hasta $x = b$, alrededor del eje y , está dada por

$$V(S) = 2\pi \int_a^b [x(f(x))] dx$$

2. El volumen de un sólido generado al rotar el área encerrada por las gráficas de las funciones continuas $y = f(x)$, $y = g(x)$ con $f(x) \geq g(x)$ desde $x = a \geq 0$ hasta $x = b$, alrededor del eje y es

$$V(S) = 2\pi \int_a^b x(f(x) - g(x)) dx$$

Definición 3.4.10. Volumen de un sólido de revolución alrededor de ejes paralelos al eje y : Método de las capas cilíndricas concéntricas

El volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región limitada por el eje x y por la gráfica de $y = f(x) \geq 0$, $x \in [a, b]$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor de la recta $x = c \notin]a, b[$ es

$$V(S) = 2\pi \int_a^b |x - c| f(x) dx$$

Note que si

- $a \leq x \leq b \leq c \implies |x - c| = c - x$
- $c \leq a \leq x \leq b \implies |x - c| = x - c$

Definición 3.4.11. Volumen de un sólido de revolución alrededor de ejes paralelos al eje y : extensión del Método de las capas cilíndricas concéntricas

El volumen del sólido de revolución obtenido al rotar la región limitada por las gráficas de las funciones $y = f(x)$ y $y = g(x)$ desde $x = a$ hasta $x = b$, alrededor de la recta $x = c \notin]a, b[$, $f(x) \geq g(x)$, $x \in [a, b]$ es

$$V(S) = 2\pi \int_a^b |x - c| (f(x) - g(x)) dx$$

Note que si


- $a \leq x \leq b \leq c \implies |x - c| = c - x$
- $c \leq a \leq x \leq b \implies |x - c| = x - c$

Ejemplo 3.4.4.

Halle el volumen del sólido de revolución generado por el rotación de la región R , en torno a la recta L , siendo: $R : y = x^2 - 10x + 25$ y $y = 9$ $L : x = 8$



Resolución: ►



$$\begin{aligned}
 V(R) &= 2\pi \int_2^8 |x-8|(9-(x-5)^2) dx = 2\pi \int_2^8 (8-x)(9-(x-5)^2) dx \\
 &= 2\pi \int_2^8 (x^3 - 18x^2 + 96x - 128) dx = 2\pi \left(\frac{x^4}{4} - 8x^3 + 48x^2 - 128x \right) \Big|_2^8 \\
 &= 224\pi u^3
 \end{aligned}$$


Ejemplo 3.4.5.

Obtener el volumen del sólido generado por la rotación de la región R determinada por las gráficas de $y = x^3$ e $y = 4x$, en torno:

1. del eje x .
2. de la recta $x = 4$



Resolución: ►



continua^on punto de intersecc^on

Resoluci^on: ►

1.


$$V_{R_1} = \pi \int_0^2 [(4x)^2 - (x^3)^2] dx = \pi \int_0^2 (16x^2 - x^6) dx = \pi \left(\frac{16x^3}{3} - \frac{x^7}{7} \right) \Big|_0^2 u^3$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{R_1} = \frac{4\pi(128)}{21} u^3}$$

$$V_{R_2} = \pi \int_{-2}^0 [(4x)^2 - (x^3)^2] dx = \pi \int_{-2}^0 (16x^2 - x^6) dx = \pi \left(\frac{16x^3}{3} - \frac{x^7}{7} \right) \Big|_{-2}^0 u^3$$

$$= \boxed{V_{R_2} = \frac{4\pi(128)}{21} u^3}$$

$$V = V_{R_1} + V_{R_2} = \frac{8\pi 128}{21} u^3$$



$$V_{R_1} = 2\pi \int_0^2 (4-x)(4x-x^3) dx = 2\pi \int_0^2 (x^4 - 4x^3 - 4x^2 + 16x) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{x^5}{5} - \frac{4x^4}{4} - 4x^3 \cdot 3 + \frac{16x^2}{2} \right) \Big|_0^2 u^3 \Rightarrow \boxed{V_{R_1} = \frac{2\pi(176)}{15} u^3}$$

$$V_{R_2} = 2\pi \int_{-2}^0 (4-x)(x^3-4x) dx = 2\pi \int_{-2}^0 (-x^4 + 4x^3 + 4x^2 - 16x) dx$$

$$= 2\pi \left(\frac{-x^5}{5} + \frac{4x^4}{4} + 4x^3 \cdot 3 - \frac{16x^2}{2} \right) \Big|_{-2}^0 u^3 \Rightarrow \boxed{V_{R_2} = \frac{2\pi(304)}{15} u^3}$$

$$V = V_{R_1} + V_{R_2} = 64\pi u^3$$

3.4.4. Problemas Propuestos

Problema 3.4.6. 1. Hallar el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor del eje y la región acotada por $y = x^2$ y las rectas $y = 1$, $x = 0$.

2. Hallar el volumen del sólido generado por la rotación de la región comprendida entre la curva $y = x^2 - 2x$ y el eje x , alrededor del eje x .

3. Hallar el volumen del sólido generado por la rotación de la región plana definida por $x^2 + y^2 \leq 20$, $y^2 \leq 8x$, $y \geq 0$ alrededor del eje x .

4. Hallar el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región comprendida entre las curvas $y = x^2$ y $y = x + 2$

5. Hallar el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar alrededor de la recta $y = -1$ la región comprendida entre las curvas $y = x^2$ y $y = \sqrt{x}$.

6. Hallar el volumen del sólido generado al rotar la región encerrada por las gráficas de $y = x^3$ y $y = 2x - x^2$, alrededor de la recta $y = 1$.

7. Hallar el volumen del sólido generado cuando se hace girar la elipse $x^2 + 4y^2 = 4$ alrededor de la recta $y = 1$.

8. Encontrar el volumen del sólido generado al rotar la región plana encerrada por el eje x y la curva $y = \sin x$ para $x = [0, \pi]$, alrededor del eje y .

9. Halla el volumen del sólido generado por la región plana encerrada por la curva $y = 6x - x^2 - 8$ y el eje x , al girar alrededor del eje y .

10. Sea C el arco de la parábola cúbica $y = x^3$, $x \in [0, 1]$, calcular el volumen del sólido de revolución obtenido al rotar C alrededor de la recta $x = 1$.

11. Hallar el volumen del sólido formado al rotar alrededor de la recta $x = -2$ la región plana limitada por $y = x$ y $y = x^3$.

12. El área acotada por las curvas $y = \cos x$, $y = \sin x$ entre $x = 0$ y $x = \frac{\pi}{4}$ es rotada alrededor del eje $x = \frac{\pi}{2}$. ¿Cuál es el volumen del sólido generado?

Problema 3.4.7. 1. Hallar el volumen generado al rotar alrededor de $y = -2$ la región limitada por $x = 2y - y^2$, $x = y^2 - 4$.

2. La región que queda debajo de $y = 1 + \sin x$, sobre el eje x entre $x = 0$ y $x = 2\pi$ rota alrededor del eje y . Calcular el volumen del sólido generado.

3. La región encerradas por las curvas $x = -y^3(y+3)$, $x = 2y$ gira alrededor de la recta $y = 1$. Calcular el volumen del sólido generado.
4. Hallar el volumen generado por el área encerrada entre las curvas $y = \frac{x^2}{4}$, $y = 2\sqrt{x}$ al girar alrededor del eje y .
5. Calcular el volumen generado por la región comprendida entre las curvas $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$, $x^2 + y^2 = 4$ al girar alrededor de la recta $x = -3$.
6. Calcular el volumen generado al rotar la región encerrada por la curva $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$, alrededor del eje y ; al rededor de la recta $x = 1$; alrededor de la recta $x = 4$.
7. La región encerrada por las curvas $(y-4)^2 = 4-4x$, $y+2x = 2$ gira alrededor de la recta $y = -1$. Calcular el volumen generado.

3.4.5. Momentos y centro de masa

Definición 3.4.12. Centro de masa o centro de gravedad de n partículas Sean n partículas con masas m_1, \dots, m_n ubicadas en los puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) , \dots , (x_n, y_n) en el plano XY , entonces se define

1. **momento del sistema respecto al eje y** como

$$M_y = \sum_{i=1}^n m_i x_i$$

2. **momento del sistema respecto al eje x** como

$$M_x = \sum_{i=1}^n m_i y_i$$

3. Se define el centro de masa de esas n partículas por las coordenadas

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{\sum_{i=1}^n m_i}, \frac{M_x}{\sum_{i=1}^n m_i} \right)$$

Definición 3.4.14. Momento de inercia de una placa formado por dos funciones Ahora si la placa llana de densidad uniforme ρ está definida por dos funciones $f(x) \leq g(x) \geq 0$ la cual ocupa una área A , entonces el **centroide o centro de masa de esa placa** se define por las coordenadas

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{M_y}{m}, \frac{M_x}{m} \right) = \left(\frac{\rho \int_a^b [xf(x) - xg(x)]dx}{\rho A}, \frac{\rho \int_a^b [\frac{1}{2}(f(x))^2 - \frac{1}{2}(g(x))^2]dx}{\rho A} \right).$$

Teorema 3.4.6. Teorema de Pappus Consideremos una figura plana de área A y centro de gravedad (\bar{x}, \bar{y}) y un eje de rotación se define el volumen generado al rotar la figura plana alrededor del eje por

$$Volume = 2\pi \cdot dis(eje, (\bar{x}, \bar{y})) \cdot A$$