

Всеволод Заостровский, 409 группа

Отчёт по задаче "Приближение с помощью построения ряда Фурье".

1 Постановка задачи.

Для функции $u(x) \in C^\infty[0, 1]$, удовлетворяющей краевым условиям:

$$u(0) = u(1) = 0,$$

необходимо выписать тригонометрический ряд Фурье и сформулировать теорему сходимости. Затем, на сетке:

$$x_0 = \frac{-h}{2},$$

$$x_N = 1,$$

$$h = \frac{1}{N - 0.5},$$

выписать дискретный тригонометрический ряд Фурье. Найти дискретное скалярное произведение, сохраняющее ортогональность базисных функций. Нормировать базисные функции.

И, наконец, для некоторой тестовой функции из указанного класса численно найти порядок сходимости её дискретного ряда Фурье.

2 Тригонометрический ряд Фурье.

Из краевых условий видно, что функцию $u(x) \in C^\infty[0, 1]$ можно разложить в ряд Фурье, взяв синусы в качестве базисных функций:

$$u(x) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m \sin \pi m x$$

Перейдём к рассмотрению конечного числа узлов. Выпишем условия на сетку:

$$u_k := u(x_k), \quad h = \frac{1}{N-0.5}, \quad x_k := \frac{-h}{2} + kh$$

$$u(x_k) = \sum_{m=1}^{N-1} c_m^n \sin \pi m x_k,$$

$$\phi_k^m := \sin \pi m \left(\frac{-h}{2} + kh \right)$$

$$\phi^m := (\phi_0^m \dots \phi_N^m)$$

Убедимся, что указанная система функций ортогональна относительно скалярного произведения $(\phi^k, \phi^j) = \sum_{m=1}^{N-1} \phi_m^k \phi_m^j h$:

$$\begin{aligned} (\phi^k, \phi^j) &= \sum_{m=1}^{N-1} \phi_m^k \phi_m^j h = \sum_{m=1}^{N-1} \sin \pi k \left(\frac{-h}{2} + mh \right) \sin \pi j \left(\frac{-h}{2} + mh \right) h \\ &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{N-1} [\cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k - j)) - \cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k + j))] h \end{aligned}$$

Заметим, что при $\alpha \neq 0$ справедливо:

$$\begin{aligned} \sum_{m=1}^{N-1} \cos(\alpha m - \frac{\alpha}{2}) &= \operatorname{Re} \sum_{m=1}^{N-1} e^{i(\alpha m - \frac{\alpha}{2})} = \operatorname{Re} \frac{e^{\frac{i\alpha}{2}(e^{i\alpha(N-1)} - 1)}}{e^{i\alpha} - 1} = \frac{\operatorname{Im}[-1 + e^{i(N-1)\alpha}]}{2 \sin(\alpha/2)} \\ &= \frac{\sin(N-1)\alpha}{2 \sin(\alpha/2)} \end{aligned}$$

Отсюда при $k \neq j$:

$$\begin{aligned}
(\phi^k, \phi^j) &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{N-1} [\cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k - j)) - \cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k + j))]h \\
&= h \left[\frac{\sin(N-1)\pi h(k-j)}{4 \sin(\pi h(k-j)/2)} - \frac{\sin(N-1)\pi h(k+j)}{4 \sin(\pi h(k+j)/2)} \right] \\
&= h \left[\frac{\sin(\pi(k-j) - \pi h(k-j))}{4 \sin(\pi h(k-j)/2)} - \frac{\sin(\pi(k+j) - \pi h(k+j))}{4 \sin(\pi h(k+j)/2)} \right] \\
&= h \left[\frac{(-1)^{k-j} \sin(\pi h(k-j))}{4 \sin(\pi h(k-j)/2)} - \frac{(-1)^{k+j} \sin(\pi h(k+j))}{4 \sin(\pi h(k+j)/2)} \right] \\
&= \frac{h}{2} [(-1)^{k-j} \sin(\pi h(k-j)/2) - (-1)^{k+j} \sin(\pi h(k+j)/2)] = 0
\end{aligned}$$

В ином случае,

$$\begin{aligned}
(\phi^k, \phi^k) &= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{N-1} [\cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k - k)) - \cos(\pi h(m - \frac{1}{2})(k + k))]h \\
&= h \left[\frac{N-1}{2} - \frac{\sin 2(N-1)\pi h k}{4 \sin(\pi h k)} \right] = \frac{2N-1}{4} \frac{2}{2N-1} = \frac{1}{2}
\end{aligned}$$