ĐỀ LUYỆN SỐ 3 – BÀI 1 (1,5 điểm)

Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Hoành độ bằng tung độ (khác gốc tọa độ) · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 1. *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = -\dfrac{x^2}{3}$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc (P), khác gốc tọa độ, có hoành độ bằng tung độ.

Tự soát:

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 3

Hoành độ bằng tung độ (khác gốc tọa độ)

Đáp số: a) Bảng giá trị:

x	-6	-3	0	3	6
$y=-\dfrac{x^2}{3}$	-12	-3	0	-3	-12

b) $M(-3;\ -3)$



a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua Oy)	0,25
Vẽ đúng (P): hệ trục có mũi tên, ghi x, y, O, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên (P)	0,5
b) Gọi $M(x_0;\ y_0)\in(P)$: $y_0=-\dfrac{x_0^2}{3}$ và $y_0=x_0$	0,25
$\Rightarrow x_0=-\dfrac{x_0^2}{3} \iff x_0(x_0+3)=0 \iff x_0=0$ (loại vì $M\neq O$) hoặc $x_0=-3$	0,25
Vậy $M(-3;\ -3)$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Chia hai vế cho x_0 làm mất bước loại $x_0 = 0$ · Không loại gốc tọa độ

Dạng bài tham khảo: Đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bài 1b; Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (đề tham khảo: hoành độ bằng tung độ) (số liệu đã đổi).