ĐỀ LUYỆN SỐ 10 – BÀI 1 (1,5 điểm)


Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Tích hoành độ và tung độ cho trước · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 1. *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P).

a) Vẽ (P) trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm điểm M thuộc (P) có tích hoành độ và tung độ bằng -27.



Tự soát:

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 10

Tích hoành độ và tung độ cho trước

Đáp số: a) Bảng giá trị:

x	-2	-1	0	1	2
$y = x^2$	4	1	0	1	4

b) $M(-3;\ 9)$



a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua Oy)	0,25
Vẽ đúng (P): hệ trục có mũi tên, ghi x, y, O, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên (P)	0,5
b) Gọi $M(x_0;\ y_0) \in (P)$: $y_0 = x_0^2$ và $x_0 \cdot y_0 = -27$	0,25
$\Rightarrow x_0^3 = -27 \iff x_0 = -3$	0,25
$y_0 = 9$. Vậy $M(-3;\ 9)$	0,25
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Lấy $x_0 = \pm 3$ · Viết $y_0 = -9$ do nhầm dấu

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 04: tích của hoành độ và tung độ) (số liệu đã đổi).