ĐỀ LUYỆN SỐ 6 – BÀI 2 (1,0 điểm)

Phương trình bậc hai – điều kiện có nghiệm, định lí Viète · Tổng nghịch đảo hai nghiệm · Thời gian gợi ý: 10 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 2. *(1,0 điểm)* Cho phương trình $2x^2 - 7x + 2 = 0$.

a) Chứng minh phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2.

b) Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức $A = \dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} - x_1 x_2$.

Tự soát:

☐ Tính đúng Δ (hoặc Δ′, a·c) và kết luận ☐ Ghi rõ "theo định lí Viète" S, P

☐ Biến đổi biểu thức về S, P (hoặc hạ bậc bằng nghiệm) ☐ Thay số, rút gọn phân số đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 6

Tổng nghịch đảo hai nghiệm

Đáp số: a) $\Delta = (-7)^2 - 4\cdot 2\cdot 2 = 33 > 0$. b) $A = \dfrac{5}{2}$

a) $\Delta = (-7)^2 - 4\cdot 2\cdot 2 = 33 > 0$ nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2	0,25
b) Theo định lí Viète: $S = x_1 + x_2 = \dfrac{7}{2}$, $P = x_1 x_2 = 1$	0,25
$\dfrac{1}{x_1} + \dfrac{1}{x_2} = \dfrac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \dfrac{S}{P}$, nên $A = \dfrac{S}{P} - P$	0,25
$A = \dfrac{7/2}{1} - 1 = \dfrac{5}{2}$	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Viết $1/x_1 + 1/x_2 = 1/(x_1 + x_2)$ · Nhầm P = 2

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 5, đề 2: biểu thức chứa $1/x_1 + 1/x_2$) (số liệu đã đổi).