ĐỀ LUYỆN SỐ 1 – BÀI 3 (1,5 điểm)

Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Gieo hai xúc xắc – tổng số chấm bằng 8 · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Trong một trò chơi, người ta gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất.

a) Hãy mô tả không gian mẫu của phép thử và cho biết số phần tử của không gian mẫu.

b) Tính xác suất của biến cố A: "Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8".

Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 1

Gieo hai xúc xắc – tổng số chấm bằng 8

Đáp số: a) $n(\Omega) = 36$. b) $P(A) = \dfrac{5}{36}$.

a) Không gian mẫu $\Omega = \{(i;j) \mid 1 \le i, j \le 6\}$ với i, j là số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc	0,5
Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$	0,25
b) Các kết quả thuận lợi cho biến cố A (tổng bằng 8): $(2;6), (3;5), (4;4), (5;3), (6;2)$	0,5
Số kết quả thuận lợi là $n(A) = 5$. Xác suất của biến cố A: $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{5}{36}$	0,25
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Quên các cặp đảo vị trí như (2; 6) và (6; 2) là hai kết quả phân biệt · Tính nhầm tổng số kết quả của 2 xúc xắc thành 12 thay vì 36

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (gieo hai xúc xắc) (số liệu đã đổi).