# ĐỀ LUYỆN SỐ 12 – BÀI 1 (1,5 điểm)

*Hàm số $y = ax^2$ $(a \neq 0)$ và đồ thị · Tung độ nhỏ hơn hoành độ một số đơn vị · Thời gian gợi ý: 12 phút*

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

**Bài 1.** *(1,5 điểm)* Cho hàm số $y = -\dfrac{x^2}{4}$ có đồ thị $(P)$.

a) Vẽ $(P)$ trên hệ trục tọa độ.

b) Tìm các điểm thuộc $(P)$ có tung độ nhỏ hơn hoành độ $3$ đơn vị.

**Tự soát:**

☐ Bảng giá trị đủ 5 điểm, đối xứng qua Oy ☐ Trục có mũi tên, ghi x, y, O và tên (P)

☐ Parabol trơn, đi qua đúng các điểm ☐ Câu b: thay vào y = ax², đối chiếu điều kiện (khác O…)


# ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 12

*Tung độ nhỏ hơn hoành độ một số đơn vị*

**Đáp số:** a) Bảng giá trị:

| $x$ | $-4$ | $-2$ | $0$ | $2$ | $4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y=-\dfrac{x^2}{4}$ | $-4$ | $-1$ | $0$ | $-1$ | $-4$ |

b) $(2;\,-1)$ và $(-6;\,-9)$




| | |
|---|---|
| a) Lập đúng bảng giá trị (5 điểm, đối xứng qua $Oy$) | 0,25 |
| Vẽ đúng $(P)$: hệ trục có mũi tên, ghi $x, y, O$, parabol đi qua 5 điểm, ghi tên $(P)$ | 0,5 |
| b) Gọi $M(x_0;\,y_0)\in(P)$: $y_0=-\dfrac{x_0^2}{4}$ và $y_0=x_0-3$ | 0,25 |
| $\Rightarrow -\dfrac{x_0^2}{4}=x_0-3 \iff x_0^2+4x_0-12=0 \iff x_0=2$ hoặc $x_0=-6$ | 0,25 |
| Vậy có hai điểm $(2;\,-1)$ và $(-6;\,-9)$ | 0,25 |
| **Tổng** | **1,5** |

**Hay bị trừ điểm:** Lập nhầm $y_0 = x_0 + 3$ · Quên điểm có hoành độ âm

Dạng bài tham khảo: Bộ 15 đề ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán năm 2026 TP Hồ Chí Minh (Đề luyện số 15: tung độ hơn hoành độ một số đơn vị) (số liệu đã đổi).