ĐỀ LUYỆN SỐ 6 – BÀI 3 (1,5 điểm)


Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Rút lần lượt không hoàn lại 2 thẻ – số chia hết cho 3 · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Một hộp chứa 5 tấm thẻ cùng loại được ghi các chữ số: $1; 2; 3; 4; 5$. Rút ngẫu nhiên một tấm thẻ từ hộp làm chữ số hàng chục, không trả lại hộp, sau đó rút tiếp một tấm thẻ nữa làm chữ số hàng đơn vị để tạo thành một số tự nhiên có hai chữ số.

a) Hãy xác định số phần tử của không gian mẫu của phép thử trên.

b) Tính xác suất của biến cố A: "Số tự nhiên được tạo thành chia hết cho 3".



Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 6

Rút lần lượt không hoàn lại 2 thẻ – số chia hết cho 3

Đáp số: a) $n(\Omega) = 20$. b) $P(A) = \dfrac{2}{5}$.

a) Rút tấm thẻ thứ nhất làm chữ số hàng chục có 5 cách chọn. Do không hoàn lại nên rút tấm thẻ thứ hai làm chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn	0,5
Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = 5 \cdot 4 = 20$ (số)	0,25
b) Số tự nhiên chia hết cho 3 khi tổng các chữ số chia hết cho 3. Các cặp chữ số có tổng chia hết cho 3 là: $\{1;2\}, \{1;5\}, \{2;4\}, \{4;5\}$	0,25
Các số tạo thành là: $12, 21, 15, 51, 24, 42, 45, 54$ (có 8 số), suy ra $n(A) = 8$	0,25
Xác suất biến cố A: $P(A) = \dfrac{8}{20} = \dfrac{2}{5}$	0,25
Tổng	**1,5**

> **Hay bị trừ điểm:** Tính nhầm không gian mẫu có hoàn lại ($5 \cdot 5 = 25$) · Bỏ sót các cặp số như {1; 5} hoặc {4; 5} · Chưa rút gọn phân số 8/20

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (rút thẻ lần lượt không hoàn lại) (số liệu đã đổi).