ĐỀ LUYỆN SỐ 9 – BÀI 3 (1,5 điểm)

Xác suất của biến cố (dạng đơn giản) · Gieo 2 con xúc xắc – hiệu số chấm bằng 2 · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1,5

Bài 3. *(1,5 điểm)* Bạn An gieo đồng thời hai con xúc xắc cân đối và đồng chất.

a) Phép thử trên có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

b) Tính xác suất của biến cố D: "Số chấm xuất hiện trên 2 con xúc xắc chênh lệch nhau đúng 2 chấm".

Tự soát:

☐ Xác định rõ phép thử: liệt kê không gian mẫu hoặc tính đúng n(Ω)

☐ Liệt kê đầy đủ, không sót kết quả thuận lợi cho biến cố

☐ Phân biệt chọn có thứ tự (lần lượt) và không thứ tự (đồng thời)

☐ Tính xác suất P = n(A) / n(Ω) và rút gọn phân số tối giản

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 9

Gieo 2 con xúc xắc – hiệu số chấm bằng 2

Đáp số: a) $n(\Omega) = 36$. b) $P(D) = \dfrac{2}{9}$.

a) Khi gieo đồng thời 2 con xúc xắc, số phần tử của không gian mẫu là: $n(\Omega) = 6 \cdot 6 = 36$	0,5
b) Gọi kết quả gieo là cặp $(i; j)$ với $i, j \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Biến cố D xảy ra khi $\lvert i - j \rvert = 2$	0,25
Các cặp số có hiệu bằng 2: $(1; 3), (2; 4), (3; 5), (4; 6)$ và đảo vị trí: $(3; 1), (4; 2), (5; 3), (6; 4)$	0,25
Tổng cộng có 8 kết quả thuận lợi: $n(D) = 8$	0,25
Xác suất của biến cố D: $P(D) = \dfrac{8}{36} = \dfrac{2}{9}$	0,25
Tổng	**1,5**

Hay bị trừ điểm: Quên các cặp đảo vị trí như (1; 3) và (3; 1) · Chưa rút gọn phân số 8/36

Dạng bài tham khảo: Soạn theo SGK Toán 9 Kết nối tri thức – Chương VIII (gieo hai xúc xắc) (số liệu đã đổi).