

Линейная алгебра

Леонид Альжанов, Вячеслав Чепелин и другие

Оглавление

1	Аналитическая геометрия	5
1.1	Элементы векторной алгебры	5
1.1.1	Основные определения	5
1.1.2	Система координат на плоскости и в пространстве	9
1.1.3	Преобразования в ДСК	12
1.1.4	Скалярное произведение векторов	14
1.1.5	Векторное произведение векторов	17
1.1.6	Смешанное произведение векторов	19
1.2	Прямая на плоскости, плоскость и прямая в пространстве	22
1.2.1	Линейное уравнение	22
1.2.2	Способы задания	24
1.2.3	Проекция точки на плоскость и прямую	32
1.3	Кривые второго порядка (КВП)	34
1.3.1	Канонические уравнения КВП	34
1.3.2	Приведение КВП к каноническому виду	42
2	Линейная алгебра	45
2.1	Основные алгебраические структуры	45
2.1.1	Операции, группа, кольцо, поле	45
2.1.2	Линейное пространство, алгебра, свойства.	46
2.1.3	Нормированные линейные пространства и алгебры.	47
2.1.4	Отношение эквивалентности, фактор-структуры.	47
2.2	Линейное пространство комплексных чисел	48
2.2.1	Основные определения	48
2.2.2	Комплексные = алгебра с нормой.	49
2.2.3	Основные действия с комплексными числами	49
2.2.4	Экспоненциальная форма и её свойства. Формулы Эйлера и Муавра	50
2.2.5	Некоторые функции комплексной переменной	51
2.3	Линейные пространства.	54
2.3.1	Основные определения.	54
2.3.2	Порождающая (полная) система векторов. Базис и размерность линейного пространства	56
2.3.3	Координаты вектора. Изоморфизм линейного пространства	58
2.3.4	Линейное подпространство. Ранг системы векторов	62
2.3.5	$L_1 + L_2, L_1 \cap L_2$, формула Грассмана, $L_1 \oplus L_2$ (прямая сумма)	63
2.3.6	Фактор пространство лин. пространства	67

2.4	Матрицы	69
2.4.1	Основные понятия	69
2.4.2	Основные операции с матрицами	70
2.4.3	Операция транспонирования	71
2.4.4	Обратная матрица	72
2.4.5	Ранг матрицы	72
2.5	Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)	75
2.5.1	Основные определения и понятия, теорема Кронекера-Капелли.	75
2.5.2	Структура общего решения СЛОУ и СЛНУ. ФСР. Альтернатива Фред-гольма.	76
2.5.3	Метод Гаусса решения СЛНУ	78
2.5.4	Нахождение обратной матрицы методом Гаусса.	80
2.5.5	Геометрическая интерпретация СЛАУ	81
2.5.6	Матрица перехода от старого базиса к новому. Связь координат вектора в разных базисах.	82
2.6	Определители.	84
2.6.1	Антисимметричные полилинейные формы. Определитель системы векторов произвольного лин. пр-ва.	84
2.6.2	Определитель матрицы. Две формулы	86
2.6.3	Свойства определителя	87
2.6.4	Формула для обратной матрицы. Теорема Крамера.	90
2.6.5	Теорема Лапласа	91
2.6.6	Второе определение ранга матрицы.	93
2.6.7	Определитель n -ого порядка.	95
3	Информация о курсе.	97

Глава 1

Аналитическая геометрия

1.1. Элементы векторной алгебры

1.1.1. Основные определения

V — пространство геометрических векторов.

Геометрический (свободный) вектор $\vec{a}$ — направленный отрезок в пространстве.

Длина (модуль) вектора $|\vec{a}| = |\overrightarrow{AB}| = AB$ — длина отрезка, на котором строится вектор.

Нулевой вектор $\vec{0}$ — имеет длину ноль, начало совпадает с концом.

Вектор независим от точки приложения (его начала)

$\vec{a} \parallel \vec{b} \stackrel{def}{\iff}$ они лежат на одной или параллельных прямых $\stackrel{def}{\iff} \vec{a}, \vec{b}$ коллинеарны.

$$\forall \vec{a} : \vec{0} \parallel \vec{a}$$

$\Uparrow$ и $\Downarrow$ — обозначение сонаправленности и разнонаправленности векторов.

$$\vec{a} = \vec{b} \stackrel{def}{\iff} \begin{cases} \vec{a} \Uparrow \vec{b} \\ |\vec{a}| = |\vec{b}| \end{cases}$$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ - компланарны $\stackrel{def}{\iff}$ лежат или параллельны одной плоскости.

$$\vec{a}_0 \text{ — орт вектора } \vec{a} \stackrel{def}{\iff} \begin{cases} \vec{a}_0 \Uparrow \vec{a} \\ |\vec{a}_0| = 1 \end{cases}$$

Вектора можно складывать: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{c}$. Строится по правилу треугольника или параллелограмма.

Вектора можно умножать на скаляр: $\vec{c} = \vec{a} \cdot \lambda, \lambda \in \mathbb{R}$.

$$|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\lambda|$$

$$\lambda > 0 : \vec{a} \Uparrow \vec{c}$$

$$\lambda < 0 : \vec{a} \nparallel \vec{c}$$

$$\lambda = 0 : \vec{c} = \vec{0}$$

Вектора можно вычитать: $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-1) \cdot \vec{b} = \vec{c}$.

У $(V, "+", "\cdot \lambda")$ есть свойства:

1. $\forall \vec{a}, \vec{b} : \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$
2. $\forall \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} : (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$
3. $\exists \vec{0} : \forall \vec{a} : \vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$
4. $\forall \vec{a} : \exists (-\vec{a}) : \vec{a} + (-\vec{a}) = \vec{0}$
5. $\forall \lambda \in \mathbb{R} : \forall \vec{a}, \vec{b} : \lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$
6. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \vec{a} : (\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$
7. $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R} : \forall \vec{a} : (\lambda\mu)\vec{a} = \mu(\lambda\vec{a}) = \lambda(\mu\vec{a})$
8. $\forall \vec{a} : 1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$

Всё это доказывается из школьной геометрии. Эти свойства (аксиомы) линейного пространства $\Rightarrow (V, "+", "\cdot \lambda")$ — линейное пространство.

$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n \in V, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R} \Rightarrow \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = \vec{v}$ — линейная комбинация векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$, или $\vec{v}$ разложен по векторам $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$.

$\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = \vec{0}$ — нулевая линейная комбинация.

Линейная комбинация — тривиальная $\xLeftrightarrow{def} \forall i \in \{1, \dots, n\} : \lambda_i = 0$

Система векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно независимая $\xLeftrightarrow{def}$ все её нулевые линейные комбинации — тривиальные. То есть система векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно независимая $\xLeftrightarrow{def} \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = \vec{0} \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : \lambda_i = 0$. Пример: $\forall a, b : a \nparallel b \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ — линейно-независимы

Система векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно зависимая $\xLeftrightarrow{def}$ существует её нулевая нетривиальная линейная комбинация. То есть система векторов $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно зависимая $\xLeftrightarrow{def} \exists \lambda_i \neq 0 : \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = \vec{0}$. Пример: $\forall a, b : a \parallel b \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}$ — линейно-зависимы

Свойства линейной зависимости:

1. $\vec{0} \in \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n\} \Rightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно зависимая система.

Пусть $\vec{v}_k = \vec{0}$. Возьмём $\lambda_k = 1$, а $\forall i \neq k : \lambda_i = 0$. Значит $\sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = 0\vec{v}_1 + 0\vec{v}_2 + \dots + 1\vec{v}_k + \dots + 0\vec{v}_n = 1 \cdot \vec{0} = \vec{0}$ Q.E.D

2. $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ — линейно зависимая система $\Rightarrow \vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n, \vec{v}_{n+1}, \vec{v}_{n+2}, \dots, \vec{v}_{n+m}$ — линейно зависимая система.

Возьмём $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, создающие нулевую нетривиальную линейную комбинацию, а $\forall i \in \{n+1, n+2, \dots, n+m\}$ возьмём $\lambda_i = 0$. Тогда $\sum_{i=1}^{n+m} \lambda_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{v}_i = 0\vec{v}_{n+1} + 0\vec{v}_{n+2} + \dots + 0\vec{v}_{n+m} = \vec{0} + \vec{0} = \vec{0}$ Q.E.D

3. В линейно зависимой системе $\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n$ есть вектор, который можно выразить линейной комбинацией других, то есть $\exists \vec{v}_k : v_k = \sum_{i=1, i \neq k}^n \mu_i \vec{v}_i$.

Возьмём $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, создающие нулевую нетривиальную линейную комбинацию $\Rightarrow \exists \lambda_k \neq 0 \Rightarrow \lambda_k \vec{v}_k = \sum_{i=1, i \neq k}^n \lambda_i \vec{v}_i \Rightarrow$ возьмём $\mu_i = \frac{\lambda_i}{\lambda_k} \Rightarrow v_k = \sum_{i=1, i \neq k}^n \mu_i \vec{v}_i$ Q.E.D

Базис прямой — любой ненулевой вектор на этой прямой.

def: Базис плоскости — любая упорядоченная пара неколлинеарных векторов в данной плоскости. Базис пространства — любая упорядоченная тройка некомпланарных векторов в этом пространстве.

$\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — базис пространства.

def: $\vec{x} = \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i x_i, x_i \in \mathbb{R} \Rightarrow (x_1, x_2, x_3)$ — координаты $\vec{x}$ относительно базиса $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. Аналогично для плоскости и прямой.

1. $\forall \vec{x} \parallel L \exists! x_1 \in \mathbb{R} : \vec{x} = x_1 \vec{e}_1$, где $\vec{e}_1$ — базис прямой L .

Пусть $O \in L$. Приложим к O начала векторов $\vec{x}$ и $\vec{e}_1$. $\vec{x}_1 \parallel \vec{e}_1 \Leftrightarrow \exists! x \in \mathbb{R} : \vec{x} = x_1 \vec{e}_1$ Q.E.D.

$$\vec{e}_1 \uparrow \vec{x} : x_1 > 0$$

$$\vec{e}_1 \downarrow \vec{x} : x_1 < 0$$

$$\vec{x} = \vec{0} : x_1 = 0$$

2. $\forall \vec{x} \parallel \alpha \exists! x_1, x_2 \in \mathbb{R} : \vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2$, где $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — базис плоскости α .

Аналогично, пусть $O \in \alpha$. Приложим к O начала векторов $\vec{x}, \vec{e}_1$ и $\vec{e}_2$.

(a) $\vec{x} = \vec{0} : \vec{x} = 0\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2$.

(b) $\vec{x} \neq \vec{0}$: пусть B — конец $\vec{x}$. Проведём $L_2 \parallel \vec{e}_2, B \in L_2$.

Проведём $L_1 \parallel \vec{e}_1, O \in L_1. A = L_1 \cap L_2. \vec{x} = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} \parallel \vec{e}_1 \Rightarrow (\text{по пункту 1}) \Rightarrow \exists! x_1 \in \mathbb{R} : \overrightarrow{OA} = x_1 \vec{e}_1 \\ \overrightarrow{AB} \parallel \vec{e}_2 \Rightarrow (\text{по пункту 1}) \Rightarrow \exists! x_2 \in \mathbb{R} : \overrightarrow{AB} = x_2 \vec{e}_2 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 \text{ Q.E.D.}$$

3. $\forall \vec{x} \in V \exists! x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R} : \vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3$, где $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — базис V .

Пусть $O \in V$. Приложим к O начала векторов $\vec{x}, \vec{e}_1, \vec{e}_2$ и $\vec{e}_3$. $\alpha(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$.

(a) $\vec{x} = \vec{0} : \vec{x} = 0\vec{e}_1 + 0\vec{e}_2 + 0\vec{e}_3$.

(b) $\vec{x} \neq \vec{0}$: пусть B — конец $\vec{x}$. Проведём $L \parallel \vec{e}_3, B \in L. A = L \cap \alpha. \vec{x} = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$.

$$\left. \begin{array}{l} \overrightarrow{OA} \parallel \vec{a} \Rightarrow (\text{по пункту 2}) \Rightarrow \exists! x_1, x_2 \in \mathbb{R} : \overrightarrow{OA} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 \\ \overrightarrow{AB} \parallel \vec{e}_3 \Rightarrow (\text{по пункту 1}) \Rightarrow \exists! x_3 \in \mathbb{R} : \overrightarrow{AB} = x_3 \vec{e}_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{x} = x_1 \vec{e}_1 + x_2 \vec{e}_2 + x_3 \vec{e}_3$$

Q.E.D

То есть, любой вектор может быть разложен по базису, и единственным образом.

Следствия:

$$1. \vec{a} = \sum_{i=1}^3 a_i \vec{e}_i, \vec{b} = \sum_{i=1}^3 b_i \vec{e}_i : \vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : a_i = b_i$$

$$2. \vec{a} + \vec{b} = \vec{c} = \sum_{i=1}^3 c_i \vec{e}_i \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : c_i = a_i + b_i$$

$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \sum_{i=1}^3 a_i \vec{e}_i + \sum_{i=1}^3 b_i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 (a_i + b_i) \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 c_i \vec{e}_i \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : c_i = a_i + b_i \text{ Q.E.D.}$$

$$3. \lambda \vec{a} = \vec{c} = \sum_{i=1}^3 c_i \vec{e}_i \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : c_i = \lambda a_i$$

$$\vec{c} = \lambda \vec{a} = \lambda \sum_{i=1}^3 a_i \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 (\lambda a_i) \vec{e}_i = \sum_{i=1}^3 c_i \vec{e}_i \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : c_i = \lambda a_i$$

Q.E.D

$$\vec{a} \parallel \vec{b} \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} : \begin{bmatrix} \vec{a} = \lambda \vec{b} \\ \vec{b} = \lambda \vec{a} \end{bmatrix} \Leftrightarrow \forall i \in \{1, 2, 3\} : \begin{bmatrix} a_i = \lambda b_i \\ b_i = \lambda a_i \end{bmatrix} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3} = \lambda - \text{коэффициент пропорциональности.}$$


$\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3, \dots, \vec{v}_n$ — коллинеарны $\Rightarrow$ они линейно зависимы в пространстве.

1.1.2. Система координат на плоскости и в пространстве

Говорят, что в пространстве введена декартова система координат (ДСК), если зафиксирована $(\cdot)O$ (начало координат) и базис $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$

Оси координат — прямые, содержащие базисные вектора, приложенные к точке O .

Ox - абсцисс, Oy - ординат, Oz - аппликата



Координатами точки M в ДСК $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ называются координаты вектора $\vec{OM}$ в базисе $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

Если вам даны 2 точки: $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$, то $\vec{AB} = (b_1 - a_1, b_2 - a_2, b_3 - a_3)$, т.к. $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$

Задача: Даны 2 точки: $A(a_1, a_2, a_3), B(b_1, b_2, b_3)$ и точка $M = (m_1, m_2, m_3)$, делящая отрезок AB в отношении $\frac{AM}{MB} = \lambda > 0$. Найти координаты точки M через A, B, λ .

$$AM = \lambda MB \Leftrightarrow |\vec{AM}| = \lambda |\vec{MB}| \Rightarrow \vec{AM} = \lambda \vec{MB}$$

$$\forall i = 1, 2, 3 : m_i - a_i = \lambda(b_i - m_i) \Leftrightarrow m_i = \frac{\lambda b_i + a_i}{1 + \lambda}$$

Откуда координаты точки M найдены и задача решена.

В дальнейшем будем работать с ортогональной д.с.к., где $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ попарно ортогональны и нормированы ($|\vec{e}_i| = 1$).


Длина вектора в ортонормированной декартовой системе координат равна квадратному корню суммы квадратов координат:

$$|\vec{a}| = \sqrt{\sum_{i=1}^3 a_i^2}$$

$\vec{a} = \sum_{i=1}^3 a_i \vec{e}_i$ - разложение по координатам.

$\vec{a}_0 = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ - называется ортом, причем $\vec{a}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$.

Такие косинусы называются направляющими.




Причем $a_1 = |a| \cdot \cos \alpha$, $a_2 = |a| \cdot \cos \beta$, $a_3 = |a| \cdot \cos \gamma$

В трёхмерном пространстве сумма квадратов косинусов углов между радиус-вектором точки и осями координат равна единице:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$$

Полярная система координат на плоскости — это точка (начало системы координат O) и луч, исходящий из неё, на плоскости. При этом координатами точки до какой-либо точки M являются длина $r = |\overrightarrow{OM}|$ и угол, который составляет вектор $\overrightarrow{OM}$ с выбранным лучом, равный φ . У точки ноль нет полярных координат, считают, что у нее $r = 0$.



При этом выбор диапазона угла φ неоднозначен.

Связь между декартовыми и полярными координатами: Обычно ДСК связывают с ПСК так: центр общий, а полярный луч — положительное направление Ox . Тогда:

$$x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi$$


Обратно:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \varphi = \arctan \frac{y}{x} + \pi k$$

(при этом выбор k неоднозначен - зависит от диапазона и в какой четверти лежит точка)


Пример: Лемниската Бернулли

$(x^2 + y^2)^2 = x^2 - y^2$. Но приведя в п.с.к: $r^4 = r^2(\cos^2 x - \sin^2 x) \leftrightarrow r = \sqrt{\cos(2x)}$. В такой форме можно нарисовать эскиз графика:



1.1.3. Преобразования в ДСК


а) Параллельный перенос



Введем новую ДСК с центром в $O' = (x_0, y_0, z_0)$. Заметим, что $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$. Тогда:
 $M = (x, y, z)$ (в старой) $= (x', y', z')$ (в новой) $= (x_0 + x', y_0 + y', z_0 + z')$ (в старой)

б) Поворот

- На плоскости:



Введем новую ДСК, повернутую на α . (r, φ) п.с.к в $Ox'y'$


$$M = (x, y) = (r \cos(\varphi + \alpha), r \sin(\varphi + \alpha)) = (x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, x' \sin \alpha + y' \cos \alpha)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \text{ — Матрица поворота.}$$

- В пространстве:



Создадим новую ДСК, повёрнутую в пространстве. Базис $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k} \rightarrow \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$. Оси $x, y, z \rightarrow x', y', z'$. Оба базиса попарно ортогональны и нормированы.

$m = 1, 2, 3 : \vec{e}_m = (\cos \alpha_m, \cos \beta_m, \cos \gamma_m)$ - направляющие косинусы.

$$\begin{aligned} M = (x, y, z) &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = \\ &= x'(\cos \alpha_1 \vec{i} + \cos \beta_1 \vec{j} + \cos \gamma_1 \vec{k}) + \\ &+ y'(\cos \alpha_2 \vec{i} + \cos \beta_2 \vec{j} + \cos \gamma_2 \vec{k}) + \\ &+ z'(\cos \alpha_3 \vec{i} + \cos \beta_3 \vec{j} + \cos \gamma_3 \vec{k}) = \\ &= \vec{i}(x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3) + \\ &+ \vec{j}(x' \cos \beta_1 + y' \cos \beta_2 + z' \cos \beta_3) + \\ &+ \vec{k}(x' \cos \gamma_1 + y' \cos \gamma_2 + z' \cos \gamma_3) \end{aligned}$$

Т.к. координаты точки задаются единственным способом, то:

$$\begin{cases} x = x' \cos \alpha_1 + y' \cos \alpha_2 + z' \cos \alpha_3 \\ y = x' \cos \beta_1 + y' \cos \beta_2 + z' \cos \beta_3 \\ z = x' \cos \gamma_1 + y' \cos \gamma_2 + z' \cos \gamma_3 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha_1 & \cos \alpha_2 & \cos \alpha_3 \\ \cos \beta_1 & \cos \beta_2 & \cos \beta_3 \\ \cos \gamma_1 & \cos \gamma_2 & \cos \gamma_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$


Столбцы в этой матрице - координаты $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$.

1.1.4. Скалярное произведение векторов

$$“\cdot” : V_3 \times V_3 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\vec{a}, \vec{b} \in V_3 \rightarrow (\vec{a}, \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{b} \in \mathbb{R}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi; \varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b})$$



Свойства: $(\forall \vec{a}, \vec{b} \in V_3)$

1. Симметричность: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$


Очевидно

2. Аддитивность по 1-му аргументу: $\forall \vec{a}_1, \vec{a}_2 \in V_3 : (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b} = \vec{a}_1 \cdot \vec{b} + \vec{a}_2 \cdot \vec{b}$

$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}$ — Проекция $\vec{a}$ на направление $\vec{b}$.


$$\text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = |\vec{a}| \cos \varphi; \varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b}) \in [0, \pi]$$

$$\vec{a} = (a_x, a_y, a_z) \Rightarrow a_x = |\vec{a}| \cos \alpha; \alpha = \angle(\vec{a}, \vec{i})$$



$$a_x = \text{proj}_{\vec{i}} \vec{a} = \vec{i} \cdot \vec{a}, a_y = \text{proj}_{\vec{j}} \vec{a} = \vec{j} \cdot \vec{a}, a_z = \text{proj}_{\vec{k}} \vec{a} = \vec{k} \cdot \vec{a}$$

Выберем ДСК таким образом, что $\vec{i} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$ — орт вектора $\vec{b}$



$$\vec{a} = \vec{a}_1 + \vec{a}_2$$


$$(\vec{a})_x = \text{proj}_{\vec{i}} \vec{a} = \vec{a} \cdot \vec{i} = (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{|\vec{b}|} ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b})$$

$$m = 1, 2 : (\vec{a}_m)_x = \text{proj}_{\vec{i}} \vec{a}_m = \vec{a}_m \cdot \vec{i} = \vec{a}_m \cdot \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|} = \frac{1}{|\vec{b}|} (\vec{a}_m \cdot \vec{b})$$

$$\left. \begin{aligned} \vec{a} &= \frac{1}{|\vec{b}|} ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b}) \\ \vec{a} &= \vec{a}_1 + \vec{a}_2 = \frac{1}{|\vec{b}|} (\vec{a}_1 \cdot \vec{b}) + \frac{1}{|\vec{b}|} (\vec{a}_2 \cdot \vec{b}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{1}{|\vec{b}|} ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b}) = \frac{1}{|\vec{b}|} (\vec{a}_1 \cdot \vec{b}) + \frac{1}{|\vec{b}|} (\vec{a}_2 \cdot \vec{b}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \cdot \vec{b} = \vec{a}_1 \cdot \vec{b} + \vec{a}_2 \cdot \vec{b} \quad Q.E.D$$

3. Однородность по 1-му аргументу: $\forall \lambda \in \mathbb{R} : (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$



$$|\lambda \vec{a}| = |\lambda| |\vec{a}|$$

$$\lambda > 0 : (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = |\lambda \vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi_1 = \lambda (|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi_1) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\lambda < 0 : (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = |\lambda \vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi_2 = -\lambda (|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi_2) = \lambda (|\vec{a}| |\vec{b}| \cos(\pi - \varphi_2)) = \lambda (\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\lambda = 0 : (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{0} \cdot \vec{b} = 0 = 0(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

Q.E.D.

$$4. \vec{a} \cdot \vec{a} \geq 0. \vec{a} \cdot \vec{a} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$$

Очевидно

$$\left. \begin{array}{l} 2. \\ 3. \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Скалярное произведение линейно по 1-му аргументу.}$$

$$\left. \begin{array}{l} 1. \\ 2. \\ 3. \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Скалярное произведение линейно по 2-му аргументу.} \Rightarrow \text{Скалярное произведение ли-}$$

нейно по всем своим аргументам.

Координатное представление:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

$$\vec{a} = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

$$\vec{b} = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$$


$$\begin{aligned} \vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}) \cdot (b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}) = (\text{пользуясь 1. - 4.}) = \\ &= a_1 b_1 (\vec{i} \cdot \vec{i}) + a_1 b_2 (\vec{i} \cdot \vec{j}) + a_1 b_3 (\vec{i} \cdot \vec{k}) + \\ &+ a_2 b_1 (\vec{j} \cdot \vec{i}) + a_2 b_2 (\vec{j} \cdot \vec{j}) + a_2 b_3 (\vec{j} \cdot \vec{k}) + \\ &+ a_3 b_1 (\vec{k} \cdot \vec{i}) + a_3 b_2 (\vec{k} \cdot \vec{j}) + a_3 b_3 (\vec{k} \cdot \vec{k}) = \\ &= (\text{все слагаемые кроме диагональных — нули}) = \\ &= a_1 b_1 (\vec{i} \cdot \vec{i}) + a_2 b_2 (\vec{j} \cdot \vec{j}) + a_3 b_3 (\vec{k} \cdot \vec{k}) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 \end{aligned}$$

1.1.5. Векторное произведение векторов

$$“\times” : V_3 \times V_3 \rightarrow V_3$$

$$\vec{a}, \vec{b} \in V_3 \rightarrow \vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \times \vec{b} \in V_3$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c} \stackrel{def}{\iff} \begin{cases} \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{b} \text{ (плоскости, в которой лежат } \vec{a}, \vec{b}) \\ \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ — правая тройка (определяется по правилу правой руки)} \\ |\vec{c}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi; \varphi = \angle(\vec{a}, \vec{b}) \end{cases}$$



$\vec{a} \nparallel \vec{b}$. Если $\vec{a} \parallel \vec{b}$, то $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$

Свойства: $(\forall \vec{a}, \vec{b} \in V_3)$

1. Антисимметричность: $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$

Очевидно

2. Аддитивность по 1-му аргументу: $\forall \vec{a}_1, \vec{a}_2 \in V_3 : (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b} = \vec{a}_1 \times \vec{b} + \vec{a}_2 \times \vec{b}$

Доказательство см. в 1.6

3. Однородность по 1-му аргументу: $\forall \lambda \in \mathbb{R} : (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$

Очевидно

4. $|\vec{a} \times \vec{b}| = S(\text{параллелограмм, построенный на } \vec{a}, \vec{b})$

Очевидно

2. } $\Rightarrow$ Векторное произведение линейно по 1-му аргументу.
3. }

Координатное представление:

$$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) = a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j} + a_3 \vec{k}$$

$$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3) = b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j} + b_3 \vec{k}$$

$$\vec{c} = (c_1, c_2, c_3) = c_1 \vec{i} + c_2 \vec{j} + c_3 \vec{k}$$

$$\begin{aligned}
\vec{a} \times \vec{b} &= (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}) \times (b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}) = (\text{пользуясь 1. - 4.}) = \\
&= a_1b_1(\vec{i} \times \vec{i}) + a_1b_2(\vec{i} \times \vec{j}) + a_1b_3(\vec{i} \times \vec{k}) + \\
&+ a_2b_1(\vec{j} \times \vec{i}) + a_2b_2(\vec{j} \times \vec{j}) + a_2b_3(\vec{j} \times \vec{k}) + \\
&+ a_3b_1(\vec{k} \times \vec{i}) + a_3b_2(\vec{k} \times \vec{j}) + a_3b_3(\vec{k} \times \vec{k}) = \\
&= (\vec{i} \times \vec{i} = \vec{j} \times \vec{j} = \vec{k} \times \vec{k} = \vec{0}; \\
&\vec{i} \times \vec{j} = -(\vec{j} \times \vec{i}) = \vec{k}; \\
&\vec{k} \times \vec{i} = -(\vec{i} \times \vec{k}) = \vec{j}; \\
&\vec{j} \times \vec{k} = -(\vec{k} \times \vec{j}) = \vec{i}) =
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= (a_2b_3 - a_3b_2)\vec{i} + (a_3b_1 - a_1b_3)\vec{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\vec{k} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \vec{i}A_{11} + \vec{j}A_{12} + \vec{k}A_{13} = \\
&= \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right) = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)
\end{aligned}$$

1.1.6. Смешанное произведение векторов

$$V_3 \times V_3 \times V_3 \rightarrow \mathbb{R}$$


Обозначения нет, вектора ставятся друг к другу без дополнительных знаков.

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \in V_3 \rightarrow \vec{a}\vec{b}\vec{c} \in \mathbb{R}$$

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} \stackrel{\text{def}}{=} (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

Свойства:

1. $|\vec{a}\vec{b}\vec{c}| = V(\text{параллелепипед, построенный на } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, причём $\vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ — правая тройка}$, $\vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0 \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ — левая тройка}$.



$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$, пусть $\vec{a} \neq \vec{0}$, $\vec{b} \neq \vec{0}$, $\vec{c} \neq \vec{0}$ (Если какой-либо вектор — нулевой, то и произведение, и объём — тоже нулевые)

Пусть $\vec{a} \nparallel \vec{b}$ (Иначе и произведение, и объём равны нулю)

Построим $\vec{a} \times \vec{b}$

- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — правая тройка $\Leftrightarrow \varphi = \angle(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) < 90^\circ \Leftrightarrow \cos \varphi > 0 \Leftrightarrow \vec{a}\vec{b}\vec{c} > 0$
- $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — левая тройка $\Leftrightarrow \varphi = \angle(\vec{a} \times \vec{b}, \vec{c}) > 90^\circ \Leftrightarrow \cos \varphi < 0 \Leftrightarrow \vec{a}\vec{b}\vec{c} < 0$

$$V := V(\text{параллелепипед, построенный на } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) = S(\text{параллелограмм, построенный на } \vec{a}, \vec{b}) \cdot h, \text{ где } h - \text{высота параллелограмма.}$$

$$h = |\text{proj}_{\vec{a} \times \vec{b}} \vec{c}| = |\vec{c}| \cos \varphi$$

$$S(\text{параллелограмм, построенный на } \vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a} \times \vec{b}|$$

$$V = |\vec{a} \times \vec{b}| \cdot |\vec{c}| \cos \varphi = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |\vec{a}\vec{b}\vec{c}| \text{ Q.E.D.}$$

2. $\vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b} = -\vec{c}\vec{b}\vec{a} = -\vec{b}\vec{a}\vec{c} = -\vec{a}\vec{c}\vec{b}$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — правая тройка $\Leftrightarrow \vec{a}\vec{b}\vec{c} = V(\text{параллелепипед, построенный на } \vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, а объём не зависит от того, какой вектор выбрать первым, значит:

$$V = \vec{a}\vec{b}\vec{c} = \vec{b}\vec{c}\vec{a} = \vec{c}\vec{a}\vec{b}$$

То же самое, если $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — левая тройка, но со знаком минус.

3. Аддитивность по первому (с 2., по любому) аргументу: $(\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c} = \vec{a}_1\vec{b}\vec{c} + \vec{a}_2\vec{b}\vec{c}$

$$(\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c} = (\text{по 2.}) = \vec{b}\vec{c}(\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}_1 + (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}_2 = \vec{b}\vec{c}\vec{a}_1 + \vec{b}\vec{c}\vec{a}_2 = (\text{по 2.}) = \vec{a}_1\vec{b}\vec{c} + \vec{a}_2\vec{b}\vec{c} \text{ Q.E.D.}$$

4. Однородность по первому (с 2., по любому) аргументу: $(\lambda\vec{a})\vec{b}\vec{c} = \lambda(\vec{a}\vec{b}\vec{c})$

$$(\lambda\vec{a})\vec{b}\vec{c} = (\text{по 2.}) = \vec{b}\vec{c}(\lambda\vec{a}) = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot (\lambda\vec{a}) = \lambda((\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}) = \lambda(\vec{b}\vec{c}\vec{a}) = (\text{по 2.}) = \lambda(\vec{a}\vec{b}\vec{c}) \text{ Q.E.D.}$$

Координатное представление:

$$\vec{a}\vec{b}\vec{c} = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$$

по свойству определителя и скалярного произведения.

Доказательство аддитивности векторного произведения:

$$\forall \vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{b} \in V_3$$

$$(\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c} = ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a}_1\vec{b}\vec{c} + \vec{a}_2\vec{b}\vec{c}$$

$$\text{Пусть } \vec{c} = \vec{i}. \text{ Тогда: } (\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c} = ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b}) \cdot \vec{i} = ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b})_x$$

$$m = 1, 2 : (\vec{a}_m \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{a}_m \times \vec{b}) \cdot \vec{i} = (\vec{a}_m \times \vec{b})_x$$

$$(\vec{a}_1 + \vec{a}_2)\vec{b}\vec{c} = \vec{a}_1\vec{b}\vec{c} + \vec{a}_2\vec{b}\vec{c} \Leftrightarrow ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b})_x = (\vec{a}_1 \times \vec{b})_x + (\vec{a}_2 \times \vec{b})_x$$


Повторим то же самое, но с $\vec{c} = \vec{j}$ и $\vec{c} = \vec{k}$.

$$\left. \begin{aligned} ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b})_x &= (\vec{a}_1 \times \vec{b})_x + (\vec{a}_2 \times \vec{b})_x \\ ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b})_y &= (\vec{a}_1 \times \vec{b})_y + (\vec{a}_2 \times \vec{b})_y \\ ((\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b})_z &= (\vec{a}_1 \times \vec{b})_z + (\vec{a}_2 \times \vec{b})_z \end{aligned} \right\} \Leftrightarrow (\vec{a}_1 + \vec{a}_2) \times \vec{b} = (\vec{a}_1 \times \vec{b}) + (\vec{a}_2 \times \vec{b}) \text{ Q.E.D.}$$

Двойное векторное произведение («бац минус цаб»)

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\bullet \vec{b} \nparallel \vec{c}:$$



Проведём плоскость $\alpha(\vec{b}, \vec{c}) \Rightarrow \vec{b} \times \vec{c} \perp \alpha$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \perp \vec{b} \times \vec{c} \Rightarrow \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \in \alpha$$

Введём ДСК, где $\vec{i} = \frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}$, $\vec{j} \in \alpha$, $\vec{k} \perp \alpha$. Тогда:

$$\vec{b} = (b_1, 0, 0); \vec{c} = (c_1, c_2, 0); \vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$$

$$\vec{b} \times \vec{c} = (b_1, 0, 0) \times (c_1, c_2, 0) = (0, 0, b_1 c_2)$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (a_1, a_2, a_3) \times (0, 0, b_1 c_2) = (a_2 b_1 c_2, -a_1 b_1 c_2, 0)$$

$$\vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{b}a_1 c_1 + \vec{b}a_2 c_2 - \vec{c}a_1 b_1 = (b_1(a_1 c_1 + a_2 c_2) - c_1 a_1 b_1, -c_2 a_1 b_1, 0) = (a_2 b_1 c_2, -a_1 b_1 c_2, 0) = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \text{ Q.E.D.}$$

• $\vec{b} \parallel \vec{c}$:

$$\vec{b} \times \vec{c} = \vec{0}$$

$$\exists \lambda \in \mathbb{R} : \vec{b} = \lambda \vec{c}$$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) = \lambda \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{c}) \\ \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{c}(\vec{a} \cdot \lambda \vec{c}) = \lambda \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{c}) \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{b}(\vec{a} \cdot \vec{c}) - \vec{c}(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{0} = \vec{b} \times \vec{c} \text{ Q.E.D.}$$

1.2. Прямая на плоскости, плоскость и прямая в пространстве


1.2.1. Линейное уравнение

На плоскости (в пространстве) в ДСК Oxy ($Oxyz$) уравнение $Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$ ($Ax + By + Cz + D = 0$, $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$) — алгебраическое уравнение первого порядка или линейное уравнение.

Любое линейное уравнение на плоскости (в пространстве) определяет прямую (плоскость), и наоборот, любая прямая (плоскость) на плоскости (в пространстве) может быть описана линейным уравнением.

Доказывать будем для прямой в плоскости. Доказательство для прямой в пространстве полностью аналогично.

1. Уравнение $\rightarrow$ прямая:



$Ax + By + C = 0$, $A^2 + B^2 \neq 0$ Не умаляя общности, пусть $B \neq 0$. Тогда $M_0(x_0, y_0) = (0, \frac{-C}{B})$ — удовлетворяет уравнению.

Пусть $M(x, y) \neq M_0$ — тоже удовлетворяет уравнению. Тогда $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$.

$$\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0, y - y_0)$$


$$\vec{N} := (A, B) \neq 0$$

$$\begin{aligned} M_0(x_0, y_0) = (0, \frac{-C}{B}) &\Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} \cdot \vec{N} = 0 \Leftrightarrow \vec{N} \perp \overrightarrow{M_0M} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \forall M(x, y), \text{ удовлетворяющих } A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0 : M \in L \perp \vec{N}, M_0 \in L \end{aligned}$$

И наоборот, если $M \in L$, то $\overrightarrow{M_0M} \perp \vec{N} \Rightarrow M$ удовлетворяет $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$

$Ax + By + C = 0$ Определяет прямую L и никакую другую, т.к. Если $M \notin L$, то $\overrightarrow{M_0M} \not\perp \vec{N} \Rightarrow M$ не удовлетворяет $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ Q.E.D.

2. Прямая $\rightarrow$ уравнение:




Пусть L — прямая на плоскости.

Введём ДСК так, чтобы L совпала с Ox . Тогда очевидно, что линейное уравнение $y = 0$ содержит все точки L .

Если есть ДСК, в которой L задаётся линейным уравнением, то в любой другой ДСК L будет задаваться линейным уравнением. Любые две ДСК связаны поворотом и сдвигом, значит нужно доказать, что при повороте и сдвиге линейное уравнение остаётся линейным уравнением.

- Сдвиг:



$$x = x' + x_0$$


$$y = y' + y_0$$

$$A(x' + x_0) + B(y' + y_0) + C = 0 \Rightarrow Ax' + By' + (Ax_0 + By_0 + C) = 0$$

$$C' := (Ax_0 + By_0 + C)$$

$$Ax + By + C' = 0 - \text{тоже линейное уравнение.}$$

- Поворот:



$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha$$

$$y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha$$

$$A(x' \cos \alpha - y' \sin \alpha) + B(x' \sin \alpha + y' \cos \alpha) + C = 0 \Rightarrow (A \cos \alpha + B \sin \alpha)x' + (B \cos \alpha - A \sin \alpha)y' + C = 0$$

$$A' := A \cos \alpha + B \sin \alpha$$

$$B' := B \cos \alpha - A \sin \alpha$$

$$A'^2 + B'^2 = A^2 + B^2 \neq 0, \text{ значит } A'x + B'y + C = 0 - \text{ тоже линейное уравнение.}$$







Значит если прямая задаётся линейным уравнением в ДСК, то в любой другой ДСК эта прямая будет задаваться линейным уравнением *Q.E.D.*

$Ax + By + C = 0, A^2 + B^2 \neq 0$ — Общее уравнение прямой на плоскости, $\vec{N} = (A, B)$ — Вектор нормали.


$Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ — Общее уравнение плоскости в пространстве, $\vec{N} = (A, B, C)$ — Вектор нормали.

1.2.2. Способы задания

Прямая в плоскости	Плоскость в пространстве	Прямая в пространстве
--------------------	--------------------------	-----------------------

Общее уравнение:  $Ax + By + C = 0$ $A^2 + B^2 \neq 0$ $\vec{N} = (A, B)$ — нормаль. $\vec{N} \perp L$. $C = 0 \Leftrightarrow 0 \in L$	Общее уравнение:  $Ax + By + Cz + D = 0$ $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ $\vec{N} = (A, B, C)$ — нормаль. $\vec{N} \perp \alpha$. $C = 0 \Leftrightarrow 0 \in \alpha$	Пересечение плоскостей:  $L = \alpha_1 \cap \alpha_2$ $L : \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ $A_i^2 + B_i^2 + C_i^2 \neq 0$ $\vec{N}_1 \nparallel \vec{N}_2$
Уравнение в отрезках:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ $(0, 0) \notin L$ $a^2 + b^2 \neq 0$	Уравнение в отрезках:  $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$ $(0, 0, 0) \notin \alpha$ $a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$	Пересечение плоскостей $\rightarrow$ каноническое уравнение:  $\vec{s} \perp \vec{N}_1, \vec{s} \perp \vec{N}_2$ $\vec{s} = \vec{N}_1 \times \vec{N}_2$ Пусть $M_0 = (x_0, y_0, 0) = L \cap Oy$ Тогда решим систему: $L : \begin{cases} A_1x_0 + B_1y_0 + D_1 = 0 \\ A_2x_0 + B_2y_0 + D_2 = 0 \end{cases}$ Если не получилось, то $M_0 = (x_0, 0, z_0) = L \cap Oz$ Снова не получилось: $M_0 = (0, y_0, z_0) = L \cap Oz$

Уравнение через нормаль и точку:



$$M_0(x_0, y_0) \in L$$

$$\vec{N}(A, B) \perp L$$

$$M(x, y) \in L$$

$$\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0)$$


$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y)$$

$$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 \perp \vec{N} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{N} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$$

Уравнение через нормаль и точку:



$$M_0(x_0, y_0, z_0) \in \alpha$$

$$\vec{N}(A, B, C) \perp \alpha$$

$$M(x, y, z) \in \alpha$$

$$\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0, z_0)$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y, z)$$

$$\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 \perp \vec{N} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (\vec{r} - \vec{r}_0) \cdot \vec{N} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$


Каноническое уравнение $\rightarrow$ пересечение плоскостей:

$$L : \begin{cases} m(x - x_0) - l(y - y_0) = 0 \\ n(x - x_0) - l(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

Где $(l, m, n) = \vec{s}$ - направляющий вектор прямой L ,

$$(x_0, y_0, z_0) = M_0 \in L$$

Каноническое / параметрическое уравнение:




$$\begin{aligned}
 &M_0(x_0, y_0) \in L \\
 &\vec{s}(l, m) \parallel L \\
 &M(x, y) \in L \\
 &\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0) \\
 &\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y) \\
 &\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{s} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \exists t \in \mathbb{R} : \vec{r} - \vec{r}_0 = t\vec{s} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \boxed{\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = t}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}}$$

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \end{cases}}$$


Условие принадлежности четырёх точек плоскости:



$M, M_1, M_2, M_3 \in \alpha$:

$$\boxed{\overrightarrow{MM_1} \overrightarrow{MM_2} \overrightarrow{MM_3} = 0}$$

Каноническое / параметрическое уравнение:




$$\begin{aligned}
 &M_0(x_0, y_0, z_0) \in L \\
 &\vec{s}(l, m, n) \parallel L \\
 &M(x, y, z) \in L \\
 &\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0} = (x_0, y_0, z_0) \\
 &\vec{r} = \overrightarrow{OM} = (x, y, z) \\
 &\overrightarrow{M_0M} = \vec{r} - \vec{r}_0 \parallel \vec{s} \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow \boxed{\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n} = t \in \mathbb{R}}
 \end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{r} = \vec{r}_0 + t\vec{s}}$$

$$\boxed{\begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \\ z = z_0 + tn \end{cases}}$$

Нормальное уравнение:



$$O(0,0) \notin L$$

$$p = \text{dist}(O, L) > 0$$

$$\vec{n}_0 \perp L, |\vec{n}_0| = 1$$

$\vec{n}_0$ направлен в сторону L если его приложить к O

$$\vec{n}_0 = (\cos \alpha, \sin \alpha)$$

$$M(x, y) \in L$$

$$p = \text{proj}_{\vec{n}_0} \vec{r} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{r} \cdot \vec{n}_0 - p = 0}$$

$$\boxed{x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0}$$

$$L: Ax + By + C = 0, A^2 + B^2 \neq 0$$

$$\vec{N} = (A, B) \perp L \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{n}_0 = \frac{\pm \vec{N}}{|\vec{N}|} =$$

$$= \pm \left(\frac{A}{\sqrt{A^2 + B^2}}, \frac{B}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right)$$

$$C > 0: \text{"-"} "$$


$$C < 0: \text{"+"} "$$

$$\cos \alpha = \frac{\pm A}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\sin \alpha = \frac{\pm B}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$p = \frac{|C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Нормальное уравнение:



$$O(0,0,0) \notin L$$

$$p = \text{dist}(O, \alpha) > 0$$

$$\vec{n}_0 \perp \alpha, |\vec{n}_0| = 1$$

$\vec{n}_0$ направлен в сторону α если его приложить к O

$$\vec{n}_0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$M(x, y, z) \in \alpha$$

$$p = \text{proj}_{\vec{n}_0} \vec{r} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \boxed{\vec{r} \cdot \vec{n}_0 - p = 0}$$

$$\boxed{x \cos \alpha + y \cos \beta + z \cos \gamma - p = 0}$$

$$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0,$$

$$A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

$$\vec{N} = (A, B, C) \perp L \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \vec{n}_0 = \frac{\pm \vec{N}}{|\vec{N}|}$$

$$D > 0: \text{"-"} "$$

$$D < 0: \text{"+"} "$$


$$\cos \alpha = \frac{\pm A}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \beta = \frac{\pm B}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$\cos \gamma = \frac{\pm C}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$p = \frac{|D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Расстояние от точки до прямой:



$$M(x', y')$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM'} = (x', y')$$

L задана нормальным уравнением

$\text{proj}_{\vec{n}_0} \vec{r} - p = \delta$ — отклонение
 $\delta > 0$, если M' и O лежат по разные стороны от L

$\delta < 0$, если M' и O лежат по одну сторону от L

$$d = \text{dist}(M', L) = |\delta| =$$

$$= |\vec{r} \cdot \vec{n}_0 - p| =$$


$$= |x' \cos \alpha + y' \sin \alpha - p| =$$

$$L: Ax + By + C = 0$$

$$d = \frac{|Ax' + By' + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Работает даже если $O \in L$

Расстояние от точки до плоскости:



$$M(x', y', z')$$

$$\vec{r} = \overrightarrow{OM'} = (x', y', z')$$

α задана нормальным уравнением

$\text{proj}_{\vec{n}_0} \vec{r} - p = \delta$ — отклонение
 $\delta > 0$, если M' и O лежат по разные стороны от α

$\delta < 0$, если M' и O лежат по одну сторону от α

$$d = \text{dist}(M', \alpha) = |\delta| =$$

$$= |\vec{r} \cdot \vec{n}_0 - p| =$$


$$= |x' \cos \alpha + y' \cos \beta + z' \cos \gamma - p| =$$

$$\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$$

$$d = \frac{|Ax' + By' + Cz' + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

Работает даже если $O \in \alpha$

Расстояние от точки до прямой:




$$d = \text{dist}(M', L) =$$

$$= h(\text{параллелограмма, построенного на } \vec{s} \text{ и } \overrightarrow{M_0M'}) =$$

$$= \frac{|\vec{s} \times \overrightarrow{M_0M'}|}{|\vec{s}|}$$

где $M_0 \in L$ — точка на прямой

Полярное уравнение:



$O(0,0) \notin L$

(Если $O \in L$, то L распадается на 2 луча и точку O)

$M(x,y) \in L$

$(x,y) \leftrightarrow (\varphi, r)$:

$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases}$$

L задана нормальным уравнением:

$$\begin{aligned} x \cos \alpha + y \sin \alpha - p &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow r \cos \varphi \cos \alpha - r \sin \varphi \sin \alpha - p &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow r \cos(\varphi - \alpha) - p &= 0 \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$\boxed{r = \frac{p}{\cos(\varphi - \alpha)}}$$

$$r > 0$$

$$p > 0$$

$$\cos(\varphi - \alpha) > 0$$

Взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве:

$$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0, A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$$

$$L : \vec{s} = (l, m, n), M_0(x_0, y_0, z_0)$$

$$\bullet \begin{cases} L \parallel \alpha \\ L \subset \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \vec{s} \perp \vec{N} \Leftrightarrow \vec{s} \cdot \vec{N} = 0 \Leftrightarrow$$


$$\Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0$$

$$\bullet L \subset \alpha \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s} \cdot \vec{N} = 0 \\ M_0 \in \alpha \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0 \end{cases}$$

$$\bullet \begin{cases} L \parallel \alpha \\ L \not\subset \alpha \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Al + Bm + Cn = 0 \\ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0 \end{cases}$$

$$\bullet L \cap \alpha = Q:$$



$$Q(x_Q, y_Q, z_Q) \in L \Leftrightarrow \begin{cases} x_Q = x_0 + lt_Q \\ y_Q = y_0 + mt_Q \\ z_Q = z_0 + nt_Q \end{cases}$$


$$Q \in \alpha \Leftrightarrow A(x_0 + lt_Q) + B(y_0 + mt_Q) + C(z_0 + nt_Q) + D = 0$$

$$\Leftrightarrow \boxed{t_Q = -\frac{Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D}{Al + Bm + Cn}}$$

$$\sin \angle(L, \alpha) = \cos(90^\circ - \angle(L, \alpha)) = \cos \angle(\vec{N}, \vec{s}) =$$

$$= \boxed{\frac{|\vec{N} \cdot \vec{s}|}{|\vec{N}| |\vec{s}|}}$$

Взаимное расположение
прямых на плоскости:
• $L_1 \parallel L_2$:



$$\begin{aligned} L_1 \parallel L_2 &\Leftrightarrow \vec{N}_1 \parallel \vec{N}_2 \Leftrightarrow \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \Leftrightarrow \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} \end{aligned}$$

$$d = \text{dist}(L_1, L_2) (\text{парам. ур.}) = h(\text{параллелограмма, построенного на } \vec{s}_2 \text{ и } \overrightarrow{M_2M_1}) =$$


$$= \frac{|\vec{s}_2 \times \overrightarrow{M_2M_1}|}{|\vec{s}_2|} =$$

$$= \text{dist}(M_1, L_2)$$

$$\bullet L_1 = L_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$\bullet L_1 \cap L_2 = Q:$$



$$L_1 \cap L_2 \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2}$$


$$Q: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{vmatrix} =$$

$$= A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists! Q$$

Взаимное расположение
плоскостей в пространстве:
• $\alpha_1 \parallel \alpha_2$:



$$\alpha_1 \parallel \alpha_2 \Leftrightarrow \vec{N}_1 \parallel \vec{N}_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$d = \text{dist}(\alpha_1, \alpha_2)$$

$$M_1 \in \alpha_1 \Rightarrow d = \text{dist}(M_1, \alpha_2)$$


α_1, α_2 заданы нормальным уравнением:

$$d = \begin{cases} |P_1 - P_2|, \vec{n}_{01} = \vec{n}_{02} \\ P_1 + P_2, \vec{n}_{01} = -\vec{n}_{02} \end{cases}$$

$$\bullet \alpha_1 = \alpha_2:$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

$$\bullet \alpha_1 \cap \alpha_2 = L:$$



$$L:$$

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{B_1}{B_2} \\ \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{C_1}{C_2} \\ \frac{A_1}{A_2} \neq \frac{D_1}{D_2} \end{cases}$$

$$\theta = \angle(\alpha_1, \alpha_2)$$

$$|\cos \theta| = \frac{|\vec{N}_1 \cdot \vec{N}_2|}{|\vec{N}_1| |\vec{N}_2|}$$

Взаимное расположение
прямых в пространстве:

$$\bullet \begin{cases} L_1 \parallel L_2 \\ L_1 = L_2 \end{cases} \Leftrightarrow \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\bullet L_1 = L_2 \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \\ M_1 \in L_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \parallel \overrightarrow{M_1M_2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2} \\ \frac{l_1}{x_1 - x_2} = \frac{m_1}{y_1 - y_2} = \frac{n_1}{z_1 - z_2} \end{cases}$$

$$\bullet \begin{cases} L_1 \parallel L_2 \\ L_1 \neq L_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \\ M_1 \notin L_2 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s}_1 \parallel \vec{s}_2 \\ \vec{s}_1 \nparallel \overrightarrow{M_1M_2} \end{cases}$$

$$d = \text{dist}(L_1, L_2) =$$


$$\text{dist}(M_1, L_2) = \frac{|\vec{s} \times \overrightarrow{M_1M_2}|}{|\vec{s}|}$$

$$\bullet L_1 \cap L_2 = Q \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{s}_1 \nparallel \vec{s}_2 \\ \vec{s}_1 \vec{s}_2 \overrightarrow{M_1M_2} = 0 \end{cases}$$

$$\cos \angle(L_1, L_2) = \frac{\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2}{|\vec{s}_1| |\vec{s}_2|}$$

$$\bullet L_1, L_2 \text{ скрещиваются:}$$




$$\vec{s}_1 \vec{s}_2 \overrightarrow{M_1M_2} \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists \alpha_1, \alpha_2 : \begin{cases} L_1 \subset \alpha_1 \\ L_2 \subset \alpha_2 \end{cases}$$

$dist(L_1, L_2) = dist(\alpha_1, \alpha_2) = h$ (параллелепипед, построенный на $\vec{s}_1, \vec{s}_2, \overrightarrow{M_1M_2}$) =

$$= \frac{|\vec{s}_1 \vec{s}_2 \overrightarrow{M_1M_2}|}{|\vec{s}_1 \times \vec{s}_2|}$$



$$L(M, \vec{s}) : \begin{cases} L \perp L_1 \\ L \perp L_2 \end{cases}$$


$$\vec{s} = \vec{s}_1 \times \vec{s}_2$$

$$\beta_1(\vec{s}_1, \vec{s}, M_1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{M = L_2 \cap \beta_1}$$

$$\begin{aligned} \vec{N}_1 &= \vec{s}_1 \times \vec{s} = \\ &= \vec{s}_1 \times (\vec{s}_1 \times \vec{s}_2) \end{aligned}$$

1.2.3. Проекция точки на плоскость и прямую



$$PQ \perp \alpha, Q \in \alpha$$


$$\alpha : Ax + By + Cz + D = 0, \vec{N} = (A, B, C)$$

$$P(P_1, P_2, P_3)$$

$$L(P, \vec{N}) : \begin{cases} x = P_1 + tA \\ y = P_2 + tB \\ z = P_3 + tC \end{cases} \Rightarrow Q = L \cap \alpha \Rightarrow$$

$$\Rightarrow A(P_1 + t_Q A) + B(P_2 + t_Q B) + C(P_3 + t_Q C) + D = 0 \Rightarrow t_Q = -\frac{AP_1 + BP_2 + CP_3 + D}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$P' \text{ — отражение } P \text{ относительно } \alpha \Rightarrow P' = 2Q - P$$



$$PQ \perp L(M_0, \vec{s} = (l, m, n)), Q \in L$$

$$P = (P_1, P_2, P_3)$$

$$\alpha(P, \vec{s}) : l(x - P_1) + m(y - P_2) + n(z - P_3) = 0 \quad L : \begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \\ z = z_0 + tn \end{cases}$$

$$Q = \alpha \cap L \Rightarrow l((x_0 + t_Q l) - P_1) + m((y_0 + t_Q m) - P_2) + n((z_0 + t_Q n) - P_3) = 0$$

Находим из этого t_Q и подставляем в уравнение L .

$$P' \text{ — отражение } P \text{ относительно } L \Rightarrow P' = 2Q - P$$

1.3. Кривые второго порядка (КВП)

1.3.1. Канонические уравнения КВП

Кривая второго порядка — множество точек на плоскости, декартовы координаты которых удовлетворяет алгебраическому уравнению 2-го порядка:

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0, (a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0)$$




КВП делятся на 2 вида:






1. Невырожденные:




- Эллипс
- Парабола
- Гипербола

2. Вырожденные:


- Пара пересекающихся прямых
- Пара параллельных прямых
- Пара совпадающих прямых
- Точка
- Пустое множество

	Эллипс	Гипербола	Парабола
Опр. 1	ГМТ на плоскости, таких, что сумма расстояний до двух фиксированных точек плоскости — величина постоянная и равная $2a$.  $r_1 + r_2 = 2a = \text{const}$	ГМТ на плоскости, таких, что модуль разности расстояний до двух фиксированных точек плоскости — величина постоянная и равная $2a$.  $r_1 - r_2 = 2a = \text{const}$	ГМТ на плоскости, таких, что расстояние до фиксированной точки плоскости равно расстоянию до фиксированной прямой.  $r = d$

Уравнение в ДСК	 $F_{1,2}$ — фокусы $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ $\boxed{\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1}$ $a^2 = b^2 + c^2, a > c$ r_1, r_2 — фокальные радиусы a — большая полуось b — малая полуось	 $F_{1,2}$ — фокусы $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ $\boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1}$ $c^2 = a^2 + b^2, a < c$ r_1, r_2 — фокальные радиусы a — действительная полуось b — мнимая полуось Имеет асимптоты — $y = \pm \frac{b}{a}x$	 F — фокус, D — директриса $F\left(\frac{p}{2}, 0\right), D: x = -\frac{p}{2}$ $\boxed{y^2 = 2px}$ $p = \text{dist}(F, D)$ p — фокальный параметр
ε — Эксцентриситет	$\varepsilon = \frac{c}{a} < 1$	$\varepsilon = \frac{c}{a} > 1$	$\varepsilon = 1$
$r_{1,2}$ — фокальные радиусы	$r_{1,2} = a \pm \varepsilon x$ $M(x, y) \in \text{эллипсу}$	Правая ветвь: $r_{1,2} = \varepsilon x \pm a$ Левая ветвь: $r_{1,2} = -\varepsilon x \mp a$ $M(x, y) \in \text{гиперболе}$	$r = x + \frac{p}{2}$
Директрисы	 $D_{1,2}: x = \mp \frac{a}{\varepsilon}$ $\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon = \frac{r}{d}$	 $D_{1,2}: x = \mp \frac{a}{\varepsilon}$ $\frac{r_1}{d_1} = \frac{r_2}{d_2} = \varepsilon = \frac{r}{d}$	$\frac{r}{d} = 1 = \varepsilon$

Опр. 2	ГМТ на плоскости, таких, что отношение расстояния до фиксированной точки плоскости к расстоянию до прямой — величина постоянная и меньшая единицы. $\varepsilon = \text{const} = \frac{r}{d} < 1$ 	ГМТ на плоскости, таких, что отношение расстояния до фиксированной точки плоскости к расстоянию до прямой — величина постоянная и большая единицы. $\varepsilon = \text{const} = \frac{r}{d} > 1$ 	ГМТ на плоскости, таких, что отношение расстояния до фиксированной точки плоскости к расстоянию до прямой — величина постоянная и равная единице. $\varepsilon = \text{const} = \frac{r}{d} = 1$ 
--------	--	---	---

Полярное
уравнение



Начало ПСК в одном из фокусов, ось направлена в сторону соответствующей директрисы.

$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}$$

p — фокальный параметр.

$$p = \varepsilon \cdot q = \frac{b^2}{a}$$


$$q = \text{dist}(F, D) = \frac{a}{\varepsilon} - c$$

p — Длина перпендикуляра от F до эллипса

Директрисы:

$$r = \frac{\pm \frac{a}{\varepsilon} - c}{\cos \varphi}$$

Если ось направлена в противоположную сторону, то заменяем все вхождения $\cos \varepsilon$ на $-\cos \varepsilon$.



Начало ПСК в одном из фокусов, ось направлена в сторону соответствующей директрисы.

$$r = \frac{\pm p}{1 \pm \varepsilon \cos \varphi}$$

Ветвь, соответствующая фокусу: “+”

Ветвь, не соответствующая фокусу: “-”

p — фокальный параметр.

$$p = \varepsilon \cdot q = \frac{b^2}{a}$$


$$q = \text{dist}(F, D) = c - \frac{a}{\varepsilon}$$

p — Длина перпендикуляра от F до гиперболы.

Директрисы:

$$r = \frac{\pm \frac{a}{\varepsilon} + c}{\cos \varphi}$$

Если ось направлена в противоположную сторону, то заменяем все вхождения $\cos \varphi$ на $-\cos \varphi$.



Начало ПСК в фокусе, ось направлена в сторону директрисы.









$$r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi} =$$

$$= \frac{p}{1 + \cos \varphi}$$

p — Длина перпендикуляра от F до параболы

Если ось направлена в противоположную сторону, то заменяем

все вхождения $\cos \varphi$ на $-\cos \varphi$.

Касательные	 $M(x_0, y_0) \in \text{эллипсу}$ $\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$	 $M(x_0, y_0) \in \text{гиперболе}$ $\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$	 $M(x_0, y_0) \in \text{параболе}$ $yy_0 = p(x + x_0)$
Оптические свойства	 Любой луч, вышедший из одного фокуса, отразившись, пройдёт через другой фокус.	 Любой луч, вышедший из одного фокуса, отразившись, пройдёт по прямой, проходящей через другой фокус.	 Любой луч, вышедший из фокуса, отразившись, пройдёт по прямой, параллельной оси параболы.
Другие свойства	 $\frac{MN}{M'N} = \frac{b}{a}$ Любой эллипс — сжатая по какой-то оси окружность.	 $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$ — сопряжённая гипербола. Имеет те же асимптоты.	

Доказательство свойств (на примере гиперболы, эллипс доказывается полностью аналогично):

- Каноническое уравнение

По определению: $|r_1 - r_2| = 2a$

$$F_1(-c, 0), F_2(c, 0), c > a$$

$$r_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}, r_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$\text{Пусть } r_1 > r_2 \text{ (правая ветвь)} \Rightarrow r_1 = 2a + r_2 \Rightarrow r_1^2 = 4a^2 + 4ar_2 + r_2^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + 4ar_2 + (x-c)^2 + y^2 \Rightarrow xc = a^2 + ar_2 \Rightarrow r_2 = \frac{xc}{a} - a$$

$$\varepsilon = \frac{c}{a} \Rightarrow \boxed{r_2 = x\varepsilon - a} \text{ — зависимость фокального радиуса от } x$$

$$r_2^2 = (x-c)^2 + y^2 \Rightarrow (x-c)^2 + y^2 = \frac{x^2 c^2}{a^2} - 2xc + a^2 \Rightarrow x^2 \left(1 - \frac{c^2}{a^2}\right) + y^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{x^2(a^2 - c^2)}{a^2} + y^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1 \Rightarrow \boxed{\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1} \text{ Q.E.D.}$$

$$\text{Из } r_1 = 2a + r_2 \text{ аналогично получаем } r_1 = x\varepsilon + a. \text{ Значит } \boxed{r_{1,2} = x\varepsilon \pm a}$$

$$\text{Если } r_1 < r_2 \text{ (левая ветвь): } \boxed{r_{1,2} = -x\varepsilon \mp a}$$

- Директрисы:

$$D_2 : x = \pm \frac{a}{\varepsilon}, d_2 = \text{dist}(M, D_2) = \left| x - \frac{a}{\varepsilon} \right|$$

$$\text{Правая ветвь: } r_2 = x\varepsilon - a \Rightarrow \frac{r_2}{d_2} = \frac{x\varepsilon - a}{x - \frac{a}{\varepsilon}} = \varepsilon \frac{x - \frac{a}{\varepsilon}}{x - \frac{a}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

$$\text{Левая ветвь: } r_2 = -x\varepsilon + a \Rightarrow \frac{r_2}{d_2} = \frac{-x\varepsilon + a}{-x + \frac{a}{\varepsilon}} = \varepsilon \frac{-x + \frac{a}{\varepsilon}}{-x + \frac{a}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

$$\frac{r_2}{d_2} = \varepsilon \Rightarrow D_2 \text{ — директриса Q.E.D.}$$

Для r_1 и D_1 заменить x на $-x$

- Определение 2:

$$\text{Пусть известно } q = \text{dist}(F, D) \text{ и } \varepsilon = \frac{r}{d} > 1$$

Проведём ДСК, в которой $D \parallel Oy$. Давайте найдём параметры канонического уравнения, считая, что $D : x = \frac{a}{\varepsilon}$, а $F = (c, 0)$.

$$\left. \begin{aligned} c - \frac{a}{\varepsilon} &= q \\ \frac{c}{a} &= \varepsilon \end{aligned} \right\} \Rightarrow c = q + \frac{a}{\varepsilon} \Rightarrow a\varepsilon = q + \frac{a}{\varepsilon} \Rightarrow a \left(\varepsilon - \frac{1}{\varepsilon} \right) = q \Rightarrow \boxed{a = \frac{\varepsilon q}{\varepsilon^2 - 1}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{c = \frac{\varepsilon^2 q}{\varepsilon^2 - 1}}$$

Мы узнали чему равны a и c из известных нам ε и q , значит точки, удовлетворяющие 2-му определению, удовлетворяют $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, а D — очевидно директриса гиперболы. *Q.E.D.*

- Асимптоты:

Найдём $y(x)$ для I координатной четверти: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow y = b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$

Найдём угловой коэффициент асимптоты $k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y(x)}{x}$:

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{bx\sqrt{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{x^2}}}{x} = \frac{b}{a}$$

Найдём ординату пересечения асимптоты и оси ординат $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y(x) - kx)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(b\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} - \frac{b}{a}x \right) &= b \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} - \frac{x}{a} \right) = \\ &= b \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\frac{x^2}{a^2} - 1 - \frac{x^2}{a^2}}{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} + \frac{x}{a}} \right) = b \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{-1}{\sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1} + \frac{x}{a}} \right) = 0 \end{aligned}$$

Значит асимптота: $y = \frac{b}{a}x$ — в первой координатной четверти

По симметрии получаем $y = \pm \frac{b}{a}x$ *Q.E.D.*

- Полярное уравнение:

Зададим ПСК(r, φ), у которой полюс $O' = F_2 = (c, 0)$, а ось направлена в сторону, противоположную направлению координатной оси Ox .

$$x = c - r \cos \varphi$$

Правая ветвь: $r = r_2 = x\varepsilon - a$

$$r = \varepsilon(c - r \cos \varphi) - a = \varepsilon c - \varepsilon r \cos \varphi - a \Rightarrow r(1 + \varepsilon \cos \varphi) = \varepsilon c - a = \varepsilon \left(c - \frac{a}{\varepsilon} \right) = \varepsilon q = p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \varphi}$$

Левая ветвь: $r = r_2 = -x\varepsilon + a$

$$r = -\varepsilon(c - r \cos \varphi) + a = -\varepsilon c + \varepsilon r \cos \varphi + a \Rightarrow r(1 - \varepsilon \cos \varphi) = a - \varepsilon c = \varepsilon \left(\frac{a}{\varepsilon} - c \right) = \varepsilon(-q) = -p \Rightarrow$$

$$\Rightarrow r = \frac{-p}{1 - \varepsilon \cos \varphi}$$

Если ось направлена в противоположную сторону, то $\cos(\pi - \varphi) = -\cos \varphi$, и $\cos \varphi$ в формулы записывается со знаком минус.

Аналогично, если у ПСК полюс в F_1 .

- Касательные

Формула касательной к функции в точке $M_0(x_0, y_0)$: $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{f(x)^2}{b^2} = 1 \Rightarrow (\text{Возьмём производную обеих сторон}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{2x}{a^2} - \frac{2f(x)f'(x)}{b^2} = 0 \Rightarrow \frac{2f(x)f'(x)}{b^2} = \frac{2x}{a^2}$$

$$\text{Подставим } x_0: \frac{2f(x_0)f'(x_0)}{b^2} = \frac{2x_0}{a^2} \Rightarrow \frac{y_0f'(x_0)}{b^2} = \frac{x_0}{a^2} \Rightarrow f'(x_0) = \frac{x_0b^2}{y_0a^2}$$

$$\text{Подставим в формулу для касательной: } y = \frac{x_0b^2}{y_0a^2}(x - x_0) + y_0 =$$

$$= \frac{x_0b^2(x - x_0) + y_0^2a^2}{y_0a^2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow yy_0a^2 = xx_0b^2 - x_0^2b^2 + y_0^2a^2 \Rightarrow \frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = \frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1 \text{ Q.E.D.}$$

- Оптические свойства

Пусть $M_0(x_0, y_0)$ лежит на гиперболе. Тогда:

$$\vec{r}_1 = \overrightarrow{F_1M_0} = (x_0 + c, y_0), \vec{r}_2 = \overrightarrow{F_2M_0} = (x_0 - c, y_0)$$

Проверим, что вектор биссектрисы угла между $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$ параллелен касательной в точке M_0 , то есть перпендикулярен нормали касательной $\vec{N} = \left(\frac{x_0}{a^2}, -\frac{y_0}{b^2}\right)$.

$$\begin{aligned} \text{Вектор биссектрисы угла между } \vec{r}_1 \text{ и } \vec{r}_2: |\vec{r}_1|\vec{r}_2 + |\vec{r}_2|\vec{r}_1 &= (\varepsilon x_0 + a)\vec{r}_2 + (\varepsilon x_0 - a)\vec{r}_1 = \\ &= ((x_0 - c)(\varepsilon x_0 + a) + (\varepsilon x_0 - a)(x_0 + c), y_0(\varepsilon x_0 + a) + y_0(\varepsilon x_0 - a)) = \\ &= (2\varepsilon x_0^2 - 2ac, 2\varepsilon x_0 y_0) \sim \left(x_0^2 - \frac{ac}{\varepsilon}, x_0 y_0\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Скалярно перемножим с } \vec{N}: \left(x_0^2 - \frac{ac}{\varepsilon}\right) \frac{x_0}{a^2} - x_0 y_0 \frac{y_0}{b^2} &= \frac{x_0^3}{a^2} - \frac{x_0 c}{\varepsilon a} - \frac{x_0 y_0^2}{b^2} = \\ &= x_0 \left(\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2}\right) - x_0 = x_0 - x_0 = 0 \Rightarrow N \perp \text{ биссектрисе } Q.E.D. \end{aligned}$$

1.3.2. Приведение КВП к каноническому виду

$$a_{11}x^2 + 2a_{12}xy + a_{22}y^2 + 2a_1x + 2a_2y + a_0 = 0, \quad a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{22}^2 \neq 0$$

Очевидно, что уравнение КВП не меняет своего типа при повороте и сдвиге декартовой системы координат.

1. Если $a_{12} \neq 0$, подберём такой угол поворота α , чтобы в новом уравнении $a'_{12} = 0$.

Выразим старые координаты через новые:

$$x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha, \quad y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha, \quad \alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \setminus \{0\}$$

Выразим a'_{12} через старые коэффициенты, $\sin \alpha = S_\alpha$ и $\cos \alpha = C_\alpha$ и приравняем к 0:

$$a'_{12} = -2a_{11}C_\alpha S_\alpha + 2a_{12}(C_\alpha^2 - S_\alpha^2) + 2a_{22}C_\alpha S_\alpha = 0$$

$$(a_{22} - a_{11}) \tan \alpha + a_{12}(1 - \tan^2 \alpha) = 0$$

$$\tan^2 \alpha - \frac{a_{22} - a_{11}}{a_{12}} \tan \alpha - 1 = 0 \quad \text{— квадратное уравнение относительно } \tan \alpha$$

$$\text{Дискриминант } D = \left(\frac{a_{22} - a_{11}}{a_{12}}\right)^2 + 4 > 0 \quad \text{— 2 решения}$$

По теореме Виета $\tan \alpha_1 \cdot \tan \alpha_2 = -1 \Rightarrow \alpha_1 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \alpha_2 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right), \alpha_1 - \alpha_2 = 90^\circ$

$$\alpha_{1,2} = \arctan \left(\frac{\frac{a_{22} - a_{11}}{a_{12}} \pm \sqrt{\left(\frac{a_{22} - a_{11}}{a_{12}}\right)^2 + 4}}{2} \right)$$

Начало координат $O' = O$

2. $a'_{11}x'^2 + a'_{22}y'^2 + 2a'_1x' + 2a'_2y' + a_0 = 0$ Есть два случая:

$$(a) \quad \begin{cases} a'_{11} \neq 0 \\ a'_{22} \neq 0 \end{cases}$$

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_1x' = a'_{11} \left(x'^2 + 2\frac{a'_1}{a'_{11}}x' \right) = a'_{11} \left(x' + \frac{a'_1}{a'_{11}} \right)^2 - \frac{a_1'^2}{a'_{11}} = a'_{11}x''^2 - \frac{a_1'^2}{a'_{11}}$$

Сделаем сдвиг ДСК:

$$x'' = x' + \frac{a'_1}{a'_{11}}$$

$$y'' = y' + \frac{a'_2}{a'_{22}}$$

$$\text{Начало координат } O'' \left(-\frac{a'_1}{a'_{11}}, -\frac{a'_2}{a'_{22}} \right)$$

$$\text{Получим } a'_{11}x''^2 + a'_{22}y''^2 + a'_0 = 0 \Leftrightarrow a'_{11}x''^2 + a'_{22}y''^2 = -a'_0$$

Есть два случая:

i. $a'_0 \neq 0$

$$\alpha = \frac{a'_{11}}{-a'_0}, \beta = \frac{a'_{22}}{-a'_0}$$

$$\alpha x''^2 + \beta y''^2 = 1$$

Есть три случая:

A. $\alpha > 0, \beta > 0$ — Эллипс

B. $\alpha < 0, \beta < 0$ — Пустое множество

C. $\alpha\beta < 0$ — Гипербола

ii. $a'_0 = 0$

$$\alpha x''^2 = y''^2, \alpha \neq 0$$

Есть два случая:

A. $\alpha > 0 \Rightarrow y'' = \pm\sqrt{\alpha}x''$ — Пара пересекающихся прямых

B. $\alpha < 0 \Rightarrow y'' = x'' = 0$ — Точка

(b) Не умаляя общности $a'_{22} = 0$

$$a'_{11}x'^2 + 2a'_1x' + 2a'_2y' + a_0 = 0$$

Есть два случая:

i. $a'_2 \neq 0$

Сделаем сдвиг ДСК:

$$x'' = x' + \frac{a'_1}{a'_{11}}$$

$$y'' = y' + \frac{a_0 - \frac{a_1'^2}{a'_{11}}}{2a'_2}$$

$$\text{Начало координат } O'' \left(-\frac{a'_1}{a'_{11}}, -\frac{a_0 - \frac{a_1'^2}{a'_{11}}}{2a'_2} \right)$$

Получим $a'_{11}x''^2 + 2a'_2y''^2 = 0 \Leftrightarrow x''^2 = \alpha y''^2, \alpha \neq 0$ — Парабола

ii. $a'_2 = 0, x'' = x' + \frac{a'_1}{a'_{11}}$

$$a'_{11}x''^2 + a'_0 = 0 \Rightarrow x''^2 = \alpha$$

Есть три случая:

A. $\alpha > 0 \Rightarrow x'' = \pm\sqrt{\alpha}$ — Пара параллельных прямых

B. $\alpha = 0 \Rightarrow x''^2 = 0 \Leftrightarrow x'' = 0$ — Прямая

C. $\alpha < 0$ — Пустое множество

Глава 2

Линейная алгебра

2.1. Основные алгебраические структуры

2.1.1. Операции, группа, кольцо, поле

Законы композиции.

$f : A \times B \rightarrow C$ - функция, отображение.

$\forall(a, b) : a \in A, b \in B : \exists!c \in C$ — закон внешней композиции.

$f : A \times A \rightarrow A$ — закон внутренней композиции или алгебраическая операция, бинарная операция.

Ассоциативность, коммутативность алгебраических операций.

Возьмем операцию $*$: $A \times A \rightarrow A$:

$a * b = b * a$ — коммутативность.

$a * (b * c) = (a * b) * c$ — ассоциативность.

Алгебраическая структура, группа, кольцо, поле. Свойства.

Алгебраическая структура — множество с набором Ω — операция и отношений на ней, с некоторой системой аксиом. Обозначают (A, Ω)

Группа $(A, \{*\})$:

$*$ — групповая операция, чаще всего обозначается как “.” — умножение, или как “+” — сложение.

“.” — мультипликативная запись, где e — единица, а $-a$ — обратный.

“+” — аддитивная запись, где e заменяется на 0 — нулевой, а $-a$ — противоположный.

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$ — ассоциативность.

2. $\exists e : \forall a : a * e = e * a = a$ — существование нейтрального элемента e .

3. $\forall a : \exists (-a) : a * (-a) = e$ — существование обратного элемента $(-a)$.

Если группа обладает еще и коммутативностью, то такая группа — абелева:

$$4. a * b = b * a$$

Кольцо $(A, \{+, \cdot\})$:

1–4. Абелева группа по сложению.

$$5. a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ — левая дистрибутивность.}$$

$$6. (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a \text{ — правая дистрибутивность.}$$

Поле $(A, \{+, \cdot\})$:

1–5. Кольцо по сложению.

6–9. Абелева группа по умножению для ненулевых элементов.

Поле — это ассоциативное коммутативное кольцо с единицей, то есть для $\forall$ ненулевого элемента $\exists$ обратный, а вот у нуля обратного нет и это нормально.

Свойства кольца:

$$1. 0 \cdot a = 0$$

$$2. a + x = a + y \rightarrow x = y$$

$$3. a + x = b \text{ имеет единственное решение } x = -a + b$$

$$4. 0 \text{ — единственен.}$$

$$5. 1 \text{ — единственна в кольце с единицей.}$$

2.1.2. Линейное пространство, алгебра, свойства.

K — поле, V — множество. $+: V \times V \rightarrow V$, $\cdot: K \times V \rightarrow V$. Если все, что сказано ниже выполнено $\forall \phi, \lambda \in K, a, b \in V$.

1–4. Абелева группа по сложению.

$$5. \phi(\lambda(a)) = \lambda(\phi(a)).$$

$$6. \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b.$$

$$7. (\phi + \lambda)a = \phi a + \lambda a.$$

$$8. \exists 1 : a \cdot 1 = a.$$

То тогда такую систему называют линейным пространством над полем K .

Если добавить еще одну операцию $\times: V \times V \rightarrow V$.

$$9. (a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

$$c \times (a + b) = c \times a + c \times b$$

$$10. \lambda(a \times b) = (\lambda a) \times b = a \times (\lambda b)$$

То такую структуру называют алгеброй.

11. добавим коммутативность $\times$ — коммутативная алгебра.

12. добавим ассоциативность $\times$ — ассоциативная алгебра.

13. добавим единицу — унитарная алгебра.

14. добавим обратное (для ненулевых элементов) — алгебра с делением.

2.1.3. Нормированные линейные пространства и алгебры.

Нормированное пространство — линейное пространство над $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ с нормой.

Норма $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}(\mathbb{C})$, удовлетворяющее:

1. $\forall x, y \in V : \|x\| + \|y\| \geq \|x + y\|$.
2. $\forall x \in V : \|x\| \geq 0$, причем $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$.
3. $\forall x \in V : \forall \alpha \in \mathbb{R}(\mathbb{C}) : \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$.

Алгебра называется нормированной, если существует норма согласованная с умножением:

$$\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|.$$

2.1.4. Отношение эквивалентности, фактор-структуры.

Бинарное отношение $\sim$ на множестве X — отношение эквивалентности, если оно

- Рефлексивно: $\forall x \in X \ x \sim x$.
- Симметрично: $\forall x, y \in X \ x \sim y \Leftrightarrow y \sim x$.
- Транзитивно: $\forall x, y, z \in X \ x \sim y \wedge y \sim z \rightarrow x \sim z$.

Если $\sim$ — бинарное отношение на X , то множества $M_a = \{x \in X \mid x \sim a\}$ называются классами эквивалентности, а множество $X/\sim = \{M_a \mid a \in X\}$ — фактормножеством (или факторпространством) X по $\sim$.

Свойства классов эквивалентности.

1. $\forall a \in X \ M_a \neq \emptyset$.
2. $\forall a, b \in X$ выполнено либо $M_a = M_b$, либо $M_a \cap M_b = \emptyset$.
3. $\bigcup_{a \in X} M_a = X$.

Если у нас есть множество X , а M — какое-то множество, состоящее из непустых взаимно непересекающихся подмножеств X , в объединении дающих X . Тогда M называется разбиением X .

Любое разбиение X является факторпространством X по некоторому отношению эквивалентности. Доказательство этого тривиально, если вы представите отношения как ребра в графе, а классы эквивалентности — компоненты

2.2. Линейное пространство комплексных чисел

2.2.1. Основные определения

Множество комплексных чисел - линейное пространство $\mathbb{R}^2$ с евклидовой нормой. (мы его так вводим). Получаем первый вариант записи комплексных чисел - Декартову форму записи:

$$(x; y) = z \in \mathbb{C}; x, y \in \mathbb{R}$$

Евклидову норму $|z| = \|(x; y)\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}$ называют модулем комплексного числа.

Представив комплексные числа таким образом, мы видим их геометрическую интерпретацию, как радиус-векторов на плоскости (модуль числа - длина радиус-вектора). В качестве базиса будем использовать вектора $(1; 0)$ - вещественную единицу и $(0; 1)$ - мнимую единицу, обозначаемую i .

Алгебраическая форма записи - ещё один вариант записи комплексных чисел:

$$z = (x; y) = x + iy$$


При этом $x = \operatorname{Re} z$ - вещественная часть числа, а $y = \operatorname{Im} z$ - мнимая часть.

При $x = 0$ число становится чисто мнимым.

При $y = 0$ число можно отождествлять с вещественным числом x .

Теперь можем ввести полярную систему координат с центром, совпадающим с центром декартовой системы координат и осью вдоль оси $\operatorname{Re} z$. Тогда для каждого ненулевого комплексного числа получим r и φ . Для $z = x + iy \neq 0$ модуль числа $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, а φ - аргумент - такой угол, что $\tan \varphi = y/x$

Функция аргумента — $\varphi = \operatorname{Arg}(x + iy)$ — многозначная, то есть её результат — множество всех подходящих значений, а формат $\arg_k$ означает использование k -ого значения. Нулевой аргумент (результат $\arg_0$ или просто $\arg$) называется главным аргументом и лежит в $[-\pi; \pi)$ или в $[0; 2\pi)$, в зависимости от выбранного диапазона.



Заметим, что тогда $x = r \cos \varphi$, а $y = r \sin \varphi$. Тогда получим третий вариант записи комплексного числа - Тригонометрическую форму записи:

$$z = x + iy = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$$

2.2.2. Комплексные = алгебра с нормой.

То, что это линейное пространство и так понятно (очевидно, что все 8 аксиом выполнены, тк мы до этого доказывали, что $\mathbb{R}^2$ — линейное пространство). Давайте докажем, что комплексные числа — это нормированная алгебра.

Значит, мы хотим создать такую операцию умножения, что она будет согласованна с нормой. Посмотрим, тогда чему должно быть равно $i \cdot i = i^2$.

Тогда давайте предположим, что сейчас $i \cdot i = \lambda + \phi i$.

Посмотрим, чему у нас будет равна вот такая норма:

$$\forall x \in \mathbb{R} : \|i^2 + ix\| = \|i(i + x)\| \leq \|i\| \|i + x\| = \sqrt{1 + x^2}$$

Должно выполняться последнее, если мы хотим, чтобы норма была согласованна с умножением. Но мы знаем что $i \cdot i = \lambda + \phi i$! Подставим:

$$\|i^2 + ix\| = \|\lambda + \phi i + ix\| = \sqrt{\lambda^2 + (\phi + x)^2} \leq \sqrt{1 + x^2}$$

$$\lambda^2 + \phi^2 + 2\phi x + x^2 \leq 1 + x^2$$

$$\lambda^2 + \phi^2 + 2\phi x \leq 1$$

Заметим, что, если $\phi \neq 0$, тогда слева многочлен от x — прямая, с углом наклона не 0. Откуда в какой-то момент она пересечет 1 и будет принимать значения больше 1.

Откуда получаем, что $\phi = 0$. Откуда $i^2 = \lambda \in \mathbb{R}$.

Посмотрим на $2 \leq \sqrt{(\lambda + 1)^2 + 4} = \|\lambda + 2i + 1\| = \|(i + 1)^2\| \leq \sqrt{2}^2 = 2$.

$\lambda^2 + 2\lambda + 1 + 4 = 4$, откуда $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, откуда $\lambda = -1$.

Мы только что доказали, что $i^2 = -1!!!$

Теперь тогда покажем, как будет происходить умножение ниже:

2.2.3. Основные действия с комплексными числами

Немного действий, определённых для $\mathbb{C}$:

1. Сложение/вычитание — аналогично сложению/вычитанию векторов

$$(x_1 + iy_1) + (x_2 + iy_2) = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$$

$$(x_1 + iy_1) - (x_2 + iy_2) = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

2. Умножение — например, как умножение алгебраических форм записи

$$(x_1 + iy_1) * (x_2 + iy_2) = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + x_2y_1)$$

Оно так задается из-за того, что мы хотим дистрибутивность для того, чтобы комплексные числа были алгеброй с нормой. Распишем в тригонометрической форме перемножение двух комплексных чисел:

$$r_1(\cos \varphi_1 + i \sin \varphi_1) * r_2(\cos \varphi_2 + i \sin \varphi_2) =$$

$$\begin{aligned}
&= r_1 r_2 ((\cos \varphi_1 \cos \varphi_2 - \sin \varphi_1 \sin \varphi_2) + i(\cos \varphi_1 \sin \varphi_2 + \sin \varphi_1 \cos \varphi_2)) = \\
&= r_1 r_2 (\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \sin(\varphi_1 + \varphi_2))
\end{aligned}$$

Видим, что при умножении комплексных чисел их аргументы складываются, а модули перемножаются.

3. Сопряжение – для всех комплексных чисел $z = x + iy$ существует комплексно сопряжённое ему $\bar{z} = x - iy$. Несколько весьма простых, но полезных фактов с сопряжёнными числами:

- $\overline{\bar{z}} = z$
- $z = \bar{z} \Leftrightarrow (x + iy) = (x - iy) \Leftrightarrow y = 0 \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}$
- $z\bar{z} = (x + iy)(x - iy) = (x^2 + y^2) = |z|^2$
- $z + \bar{z} = (x + iy) + (x - iy) = 2x = 2 \cdot \operatorname{Re} z$
- $z - \bar{z} = (x + iy) - (x - iy) = 2iy = 2i \cdot \operatorname{Im} z$

4. Обратное – зная свойства сопряжения можно получить формулу для числа обратного комплексному z это будет $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$. Несложно убедиться, что $z * z^{-1} = 1$, что и требовалось от обратного элемента.

5. *Деление – имея обратное число деление построить несложно:

$$\frac{z_1}{z_2} = z_1 \cdot z_2^{-1}$$

Такое деление будет весьма неудобным, хоть и рабочим, упростит его экспоненциальная форма записи комплексных чисел.

2.2.4. Экспоненциальная форма и её свойства. Формулы Эйлера и Муавра

Сделаем заявление, в которое поверим и в дальнейшем будем активно использовать:

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi; \varphi \in \mathbb{R}$$

Свойства:

1. $e^{i*2\pi k} = 1; k \in \mathbb{Z}$
2. $e^{i(\varphi+2\pi k)} = e^{i\varphi}; k \in \mathbb{Z}$
3. $e^{i(\varphi_1+\varphi_2)} = e^{i\varphi_1} \cdot e^{i\varphi_2}$
4. $e^{-i\varphi} = \frac{1}{e^{i\varphi}} = \overline{e^{i\varphi}}$
5. $|e^{i\varphi}| = 1$
6. $e^{i\varphi \cdot n} = (e^{i\varphi})^n; n \in \mathbb{Z}$
7. Формулы Эйлера:

$$\frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2} = \cos \varphi$$

$$\frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i} = \sin \varphi$$

Введём ещё одну новую форму записи комплексного числа - Экспоненциальную:

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi) = r e^{i\varphi}$$

Формула Муавра:

$$z^n = r^n (\cos n\varphi + i \sin n\varphi) = r^n e^{i\varphi \cdot n}; n \in \mathbb{N}$$

$$|z^n| = |z|^n = r^n$$

$$\arg z^n = n \cdot \arg z$$

Раз мы научились возводить комплексное число в целую степень, то хочется научиться находить и корень целой степени. Пусть $w = \sqrt[n]{z} \Leftrightarrow w^n = z = r e^{i\varphi}$

$$w \in \mathbb{C} \Leftrightarrow w = |w| e^{i \arg w}$$

$$w^n = |w|^n e^{in \cdot \arg w} = r e^{i\varphi} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} |w| = \sqrt[n]{r} \\ \arg w = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} \quad k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

Получили, что $\arg w = \frac{\varphi + 2\pi k}{n} = \frac{\varphi}{n} + \frac{2\pi}{n} k$ а значит, что корень целой степени n даёт n различных решений, которые лежат на плоскости на одной окружности, через равные углы $\frac{2\pi}{n}$, и никаких других, так как алгебраическое уравнение $w^n = r$ имеет ровно n корней.

2.2.5. Некоторые функции комплексной переменной

Комплексная экспонента

$$\exp z = e^z = e^x \cdot e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y); z = x + iy; x, y \in \mathbb{R}$$

Свойства:

1. $e^{z+2\pi ki} = e^z - 2\pi i$ периодичность
2. $|e^z| = e^x = e^{\operatorname{Re} z}$
3. $e^{z_1+z_2} = e^{z_1} \cdot e^{z_2}$
4. $e^{-z} = \frac{1}{e^z}$
5. Аналогично формулам Эйлера введём $\sin$ и $\cos$ комплексной переменной:

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

Аналогично вещественным тригонометрическим можем ввести $tg z, ctg z$, обратные тригонометрические и гиперболические функции комплексного переменного. Например:

$$ch z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Пусть $\operatorname{Re} z \in [a_1; a_2]$, а $\operatorname{Im} z \in [b_1; b_2]$, то есть z лежит внутри некоего прямоугольника на комплексной плоскости. В какой области будет лежать $\exp z$? Заметим, что модули итоговых чисел ограничены $[e_1; e_2]$, а аргументы $[b_1; b_2]$. Получается, что $\exp z$ лежит в некоем угловом секторе.

Логарифм комплексного числа

Пусть $\ln z = w = x + iy$, тогда

$$z = |z|e^{i(\arg z + 2\pi k)} = re^{i\varphi}$$

$$z = e^w = e^x e^{iy}$$

Получим, что $|z| = e^x \in \mathbb{R}$, то есть $x = \ln |z|$. А $y = \arg z + 2\pi k$.

Видим, что в формуле присутствует $2\pi k$, что говорит нам о многозначности логарифма комплексного числа. Приведём общую формулу:

$$\ln_k z = w = \ln |z| + i(\arg_0 z + 2\pi k) = \ln |z| + i \cdot \arg_k z; k \in \mathbb{Z}$$

Из этой формулы можем получить несколько небольших формул:

$$\ln_0 z = \ln |z| + i \cdot \arg_0 z$$

$$\ln_k z = \ln_0 z + 2\pi ki$$

$\ln_0 z$ — главное значение логарифма

Из-за многозначности логарифма есть большая опасность неправильно воспользоваться им, например может быть, что $\ln z_1 z_2 \neq \ln z_1 + \ln z_2$ или $\ln z^k \neq k \ln z$. Приведём пример подобной ошибки: Пусть $\arg z \in [0; 2\pi)$, $z_1 = -1$, $z_2 = -i$, $k = 0$

$$\ln_0 z_1 = \ln |-1| + i \arg_0(-1) = \ln 1 + \pi i \text{ (тут функция } \ln 1 \text{ — вещественная } \Rightarrow \text{ равна нулю)}$$

$$\ln_0 z_2 = \ln |-i| + i \arg_0(-i) = \ln 1 + \frac{3\pi}{2}i$$

В сумме получилось $\frac{5\pi}{2}i$

$$\ln_0 z_1 z_2 = \ln_0 i = \ln |i| + i \arg_0 i = \ln 1 + \frac{\pi}{2}i$$

Комплексное число в натуральной степени

Пусть $w = z^n = r^n e^{in\varphi}$, где $n \in \mathbb{N}$ Рассмотрим, во что перейдёт z , лежащий в угловом секторе при возведении в степень. Модуль числа будет возведён в степень n , а аргумент умножится на n . Если изначальный сектор был ограничен окружностями с радиусами a_1 и a_2 , а так же лучами с полярными углами b_1 и b_2 , то он перейдёт в другой угловой сектор, ограниченный окружностями с радиусами a_1^n и a_2^n , а так же лучами с полярными углами nb_1 и nb_2 .

Комплексное число в комплексной степени

Пусть $k \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{C}$ – константа

$w = z^b = e^{b \ln_k z}$ – обобщённая степенная функция

$w = b^z = e^{z \ln_k b}$ – обобщённая показательная функция

Заметим, что стандартные свойства натурального логарифма не выполняются. Например $b^{z_1+z_2} \neq b^{z_1} b^{z_2}$.

2.3. Линейные пространства.

2.3.1. Основные определения.

В этом разделе мы будем рассматривать линейные пространства над $\mathbb{C}$ и иногда $\mathbb{R}$. Обозначать над чем мы будем K .

Линейная оболочка, линейная независимость векторов.

Говорят, что вектор u является линейной комбинацией векторов $(v_1; v_2; \dots; v_n)$, если $\exists \lambda_1; \lambda_2; \dots; \lambda_n \in K$:

$$u = \sum_{i=1}^n \lambda_i \cdot v_i$$

Если все $\lambda_k = 0$, то линейная комбинация называется тривиальной

Система векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ называется линейной независимой, если любая нулевая линейная комбинация тривиальна $\xLeftrightarrow{def} \sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0 \Leftrightarrow \forall k \in \{1, \dots, m\} : \lambda_k = 0$

В противном случае, система векторов называется линейно зависимой, т.е. $\exists$ набор $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ не все нули таких, что $\sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0$.

$\text{span}(v_1, v_2, \dots, v_n)$ это линейная оболочка векторов — множество всевозможных векторов, представимых через $v_1, v_2, \dots, v_n$.

Теорема о линейно независимых системах векторов

Теорема

1. $v_1, \dots, v_m$ -линейно зависима $\Leftrightarrow$ по крайней мере один из векторов — это линейная комбинация остальных
2. Если некоторая подсистема системы векторов $v_1, \dots, v_m$ - линейно зависима, то система векторов $v_1, \dots, v_m$ — линейно зависима
3. $\left. \begin{array}{l} v_1, \dots, v_m - \text{линейно независима} \\ v_1, \dots, v_{m+1} - \text{линейно зависима} \end{array} \right\} \Rightarrow v_{m+1} - \text{линейная комбинация } v_1, \dots, v_m$

Доказательство

1. $\Rightarrow$ $v_1, \dots, v_m$ — линейно зависима, т.е. $\exists$ нетривиальный набор $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ такой, что $\sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0$

н.у.о. пусть $\lambda_m \neq 0$, тогда $\lambda_m v_m = - \sum_{k=1}^{m-1} \lambda_k v_k$

$$v_m = \sum_{k=1}^{m-1} \left(-\frac{\lambda_k}{\lambda_m} \right) v_k = \sum_{k=1}^{m-1} \lambda'_k v_k \xLeftrightarrow{def} v_m - \text{линейная комбинация } v_1, \dots, v_{m-1}$$

$$\Leftarrow \text{ н.у.о. пусть } v_m = \sum_{k=1}^{m-1} \lambda_k v_k, \text{ тогда } \sum_{k=1}^{m-1} \lambda_k v_k - v_m = 0$$

$\exists \lambda_1, \dots, \lambda_{m-1}, \lambda_m \neq 0$ такой, что $\sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0 \xLeftrightarrow{def} v_1, \dots, v_m$ — линейно зависима Q.E.D.

2. н.у.о. пусть $v_1, \dots, v_{m'}$ — линейно зависима $m' < m$, тогда

$\exists$ нетривиальный набор $\lambda_1, \dots, \lambda_{m'} : \sum_{k=1}^{m'} \lambda_k v_k = 0$

При $\lambda_{m'+1} = 0, \dots, \lambda_m = 0$: набор $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — нетривиален

$\Rightarrow \sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0 \xLeftrightarrow{def} v_1, \dots, v_m$ — линейно зависима Q.E.D.

3. $v_1, \dots, v_m, v_{m+1}$ — линейно зависима $\Rightarrow \exists$ нетривиальный набор $\lambda_1, \dots, \lambda_{m+1} : \sum_{k=1}^m \lambda_k v_k + \lambda_{m+1} v_{m+1} = 0$

Если $\lambda_{m+1} = 0$, тогда набор $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — нетривиален и $\sum_{k=1}^m \lambda_k v_k = 0 \xLeftrightarrow{def} v_1, \dots, v_m$ — линейно зависима. Противоречие.

Иначе $v_{m+1} = \sum_{k=1}^m \left(-\frac{\lambda_k}{\lambda_{m+1}} \right) v_k = \sum_{k=1}^m \lambda'_k v_k \xLeftrightarrow{def} v_{m+1}$ — линейная комбинация $v_1, \dots, v_m$
Q.E.D.

Следствия:

1. Если система линейно независима, то любая подсистема линейно независима.
2. Если система содержит 0 вектор, либо пару пропорциональных векторов, то система линейно зависима.

Теорема о «прополке».

Любую систему векторов $v_1, \dots, v_m$, в которой хотя бы один из векторов ненулевой, можно заменить на линейно независимую систему векторов $v_{j_1}, \dots, v_{j_k}$ с сохранением линейной оболочки. $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_{j_1}, \dots, v_{j_k})$

Доказательство:

Пусть $s_0 = 0, s_1 = \text{span}(v_1), \dots, s_m = \text{span}(v_1, \dots, v_m)$

Тогда $s_0 \subset s_1 \subset \dots \subset s_m \subset V$.

Идём от $j = m$ до $j = 2$.

Если $s_{j-1} = s_j$, то v_j удаляем. При этом $\text{span}(v_1, \dots, v_j) = \text{span}(v_1, \dots, v_{j-1})$ сохраняется.

Если $s_{j-1} \subset s_j$, то $v_j \notin s_{j-1}$, т.е. v_j — не является линейной комбинацией $v_1, \dots, v_{j-1}$.

Продолжая так делать, получим, что никакой вектор из полученных не является линейной комбинацией других, то есть итоговое подмножество линейно независимо. В результате получается цепочка строго вложенных подмножеств $s_0 \subset s_{j_1} \subset \dots \subset s_{j_k} \subset s_m \subset V$

$\Rightarrow s_m = \text{span}(v_{j_1}, \dots, v_{j_k})$ Q.E.D.

2.3.2. Порождающая (полная) система векторов. Базис и размерность линейного пространства

Система векторов $v_1, \dots, v_m \in V$ называется порождающей (полной), если любой вектор линейного пространства V раскладывается по этим векторам, т.е. является линейной комбинацией $v_1, \dots, v_m$. $V = \text{span}(v_1, \dots, v_m)$

Если число $v_1, \dots, v_m$ конечно, то линейное пространство называется конечномерным.

Теорема

Следующие утверждения равносильны:

1. $v_1, \dots, v_n \in V$ — линейно независимая и порождающая система
2. $v_1, \dots, v_n \in V$ — линейно независимая система и максимальная по числу элементов
3. $v_1, \dots, v_n \in V$ — порождающая система и минимальная по числу элементов

Доказательство

$\boxed{1 \Rightarrow 2}$ $v_1, \dots, v_n$ — линейно независимая и порождающая система

Пусть $u_1, \dots, u_m$ — линейно независима

Тогда $\forall u \in V : v_1, \dots, v_n, u$ — линейно зависима, т.к. $v_1, \dots, v_n$ — порождающая система, то u — линейная комбинация $v_1, \dots, v_n$, или $\text{span}(v_1, \dots, v_n, u) = V$

$$\begin{array}{ccc}
 \underbrace{u_m, v_1, \dots, v_n}_{\substack{\text{линейно зависима} \\ n+1}} & \xrightarrow{\text{прополка}} & \underbrace{u_m, v_1, \dots}_{\substack{\text{линейно независима} \\ \text{span}(u_m, v_1, \dots) = V \\ \leq n}} \\
 \\
 \underbrace{u_{m-1}, u_m, v_1, \dots}_{\substack{\text{линейно зависима} \\ \leq n}} & \xrightarrow{\text{прополка}} & \underbrace{u_{m-1}, u_m, v_1, \dots}_{\substack{\text{линейно независима} \\ \text{span}(u_{m-1}, u_m, v_1, \dots) = V \\ \leq n}}
 \end{array}$$

и т.д.

$$\underbrace{u_1, \dots, u_m, v_1, \dots}_{\leq n} \text{ — линейно независима} \Rightarrow m \leq n$$

$\boxed{2 \Rightarrow 1}$ $v_1, \dots, v_m$ — линейно независимая система и максимальная по числу элементов

$$\forall v \in V : \left. \begin{array}{l} v_1, \dots, v_n \text{ — линейно независима} \\ v_1, \dots, v_n, v \text{ — линейно зависима} \end{array} \right\} \Rightarrow v = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k \Rightarrow v_1, \dots, v_n \text{ — порождающая}$$

$\boxed{1 \Rightarrow 3}$ $v_1, \dots, v_n \in V$ — линейно независимая и порождающая система

Пусть $u_1, \dots, u_m$ — порождающая система

$$\text{span}(u_1, \dots, u_m) = V$$

$\forall v \in V : u_1, \dots, u_m, v$ — линейно зависима

$$\begin{array}{ccc}
\underbrace{v_n, u_1, \dots, u_m}_{\substack{\text{линейно зависима} \\ m+1}} & \xrightarrow{\text{прополка}} & \underbrace{v_n, u_1, \dots}_{\substack{\text{линейно независима} \\ \text{span}(v_n, u_1, \dots) = V \\ \leq m}} \\
\underbrace{v_{n-1}, v_n, u_1, \dots}_{\substack{\text{линейно зависима} \\ \leq m+1}} & \xrightarrow{\text{прополка}} & \underbrace{v_{n-1}, v_n, u_1, \dots}_{\substack{\text{линейно независима} \\ \text{span}(v_{n-1}, v_n, u_1, \dots) = V \\ \leq m}} \\
& & \text{и т.д.} \\
\underbrace{v_1, \dots, v_n, u, \dots}_{n \leq m} & \text{— линейно независима} & \Rightarrow n \leq m
\end{array}$$

3 $\Rightarrow$ 1

$v_1, \dots, v_n$ — порождающая система и минимальная по числу элементов

Пусть $v_1, \dots, v_n$ — линейно зависима

Тогда $\exists v$ — линейная комбинация остальных $\Rightarrow$ можно сделать прополку

$v_1, \dots, v_n \xrightarrow{\text{прополка}} v_{j_1}, \dots, v_{j_k}$ — порождающую систему с меньшим числом элементов (при прополке хотя бы один вектор уйдёт)

Но это противоречит тому, что $v_1, \dots, v_n$ — минимальная по числу элементов $\Rightarrow v_1, \dots, v_n$ — линейно независимая

Q.E.D.

Если система $v_1, \dots, v_n \in V$ удовлетворяет условиям теоремы, то она называется базисом пространства V .

Количество векторов $n = \dim V =$ размерность линейного пространства = $\max$ возможное число линейно независимых векторов = $\min$ число в порождающей системе векторов

Теорема

1. $\forall$ линейно независимую систему векторов в V можно дополнить до базиса пространства V
2. из любой порождающей системы пространства V можно выделить базис пространства V

Доказательство

1. Пусть $v_1, \dots, v_m$ — линейно независимая система

Если $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = V$, то $v_1, \dots, v_m$ — базис

Если $\text{span}(v_1, \dots, v_m) \subset V$, то $\exists v_{m+1} \neq 0 \in V$ и $v_{m+1} \notin \text{span}(v_1, \dots, v_m)$

$\Rightarrow v_{m+1}$ — не линейная комбинация остальных векторов

$\Rightarrow v_1, \dots, v_{m+1}$ — линейно независимая система

Повторяем рассуждения для $v_1, \dots, v_{m+1}$

В итоге получаем $v_1, \dots, v_n$ — линейно независимая система максимальная по числу элементов $\Rightarrow v_1, \dots, v_n$ — базис

2. $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = V$, где $v_1, \dots, v_m$ — порождающая система

Если $v_1, \dots, v_m$ — линейно независимая система $\Rightarrow v_1, \dots, v_m$ — базис

Если $v_1, \dots, v_m$ — линейно зависимая система, то

$$v_1, \dots, v_m \xrightarrow{\text{прополка}} \underbrace{v_{j_1}, \dots, v_{j_n}}_{\substack{\text{линейно независимая система} \\ \text{порождающая система} \\ n \leq m \\ \text{span}(v_{j_1}, \dots, v_{j_n}) = V}}$$

$\Rightarrow v_{j_1}, \dots, v_{j_n}$ — базис

Q.E.D.

2.3.3. Координаты вектора. Изоморфизм линейного пространства

V — линейное пространство над полем $K(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. $\dim V = n$

$\forall x \in V : x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, где $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V (порождающая система)

$x_i \in K$ — координаты вектора x относительно базиса e

$$x \in V \longrightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n, \text{ где } \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \text{ — координатный столбец}$$

Утверждение

$\forall x \in V$ координаты относительно базиса e определяются единственным образом

Доказательство

e базис $\Leftrightarrow$ порождающая линейно независимая система.

$e_1, \dots, e_n \Rightarrow$ порождающая система, т.е. x раскладывается на координаты

$$\text{Пусть } x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum x'_i e_i$$

$$\sum_{i=1}^n (x_i - x'_i) e_i = 0 \text{ — нулевая линейная комбинация линейно независимых векторов} \Leftrightarrow \forall i = 1 \dots n : x_i - x'_i = 0$$

Q.E.D.

$$x \in V \xleftrightarrow{e} x \in K^n$$

взаимно однозначное соответствие (биекция)

V_1, V_2 — линейные пространства над одним и тем же полем K называются изоморфными ($V_1 \cong V_2$), если между V_1 и V_2 существует биекция и сохраняется линейность, т.е.

$$\begin{aligned} x \in V_1 &\longleftrightarrow x' \in V_2 \\ y \in V_1 &\longleftrightarrow y' \in V_2 \\ \forall \lambda \in K : x + \lambda y \in V_1 &\longleftrightarrow x' + \lambda y' \in V_2 \end{aligned}$$

Свойства изоморфизма

$$1. 0 \in V \longrightarrow 0' \in V'$$

Доказательство:

$$\forall \lambda \in K : \lambda x \longleftrightarrow \lambda x'$$

$$\text{Пусть } \lambda = 0, \text{ тогда } 0 = 0 \cdot x \longleftrightarrow 0 \cdot x' = 0'$$

Q.E.D.

$$2. \forall x \in V \longleftrightarrow x' \in V'$$

$-x \in V$ — противоположный элемент к x

$-x' \in V'$ — противоположный элемент к x'

$$\Rightarrow -x \longleftrightarrow -x'$$

Доказательство:

$$\forall \lambda \in K : \lambda x \longleftrightarrow \lambda x'$$

$$\text{Пусть } \lambda = -1, \text{ тогда } -x = -1 \cdot x \longleftrightarrow -1 \cdot x' = -x'$$

Q.E.D.

$$3. x_1, \dots, x_m \in V; x'_1 \dots x'_m \in V'$$

$$\forall k = 1 \dots m : x_k \longleftrightarrow x'_k$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k \in V \longleftrightarrow \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k \in V'$$

Доказательство:

По методу математической индукции

Q.E.D.

$$4. \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{линейно независимы}} \in V \longleftrightarrow \underbrace{x'_1, \dots, x'_m}_{\text{линейно независимы}} \in V'$$

Доказательство:

$$\alpha_k \in K$$

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k x_k = 0 \longleftrightarrow \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k = 0'$$

$$\text{т.к. } \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k \longleftrightarrow \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k \text{ (3 свойство) и } 0 \in V \longleftrightarrow 0' \in V' \text{ (1 свойство)}$$

$$\underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{линейно независимы}} \in V \Leftrightarrow \forall k = 1 \dots m : \alpha_k = 0 \Leftrightarrow \underbrace{x'_1, \dots, x'_m}_{\text{линейно независимы}} \in V'$$

Q.E.D.

$$5. \underbrace{x_1, \dots, x_m}_{\text{порождающая система}} \in V \longleftrightarrow \underbrace{x'_1, \dots, x'_m}_{\text{порождающая система}} \in V'$$

$x_1, \dots, x_m \in V$ — порождающая система $\Leftrightarrow \forall x \in V : x = \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k$

$$\forall x \in V : x = \sum_{k=1}^m \alpha_k x_k \longleftrightarrow \forall x' \in V' : x' = \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k$$

т.к. $\sum_{k=1}^m \alpha_k x_k \longleftrightarrow \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k$ (3 свойство) и $x \longleftrightarrow x'$

$\forall x' \in V' : x' = \sum_{k=1}^m \alpha_k x'_k \Leftrightarrow x'_1, \dots, x'_m$ — порождающая система

Q.E.D.

$$6. \underbrace{e_1, \dots, e_n}_{\text{базис } V} \longleftrightarrow \underbrace{e'_1, \dots, e'_n}_{\text{базис } V'}$$

Доказательство:

Из свойств 4 и 5 мы знаем, что если система векторов линейно независима и порождающая, то есть это базис. Q.E.D.

Теорема

V_1, V_2 — линейные пространства над полем K

$$V_1 \cong V_2 \Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2$$

Доказательство

$$\boxed{\Leftarrow} \dim V_1 = \dim V_2 \Rightarrow e_1, \dots, e_n \text{ — базис в } V_1 \text{ и } e'_1, \dots, e'_n \text{ — базис в } V_2$$

Построим изоморфизм из V_1 в V_2

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in V_1 \longleftrightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \longleftrightarrow x' = \sum_{i=1}^n x_i e'_i \in V_2$$

$$x \in V_1 \xleftrightarrow{\text{координатный изоморфизм}} x \in K^n \xleftrightarrow{\text{координатный изоморфизм}} x' \in V_2$$

Проверим линейность $\forall \lambda \in K$

$$x + \lambda y \longleftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i e_i + \lambda \sum_{i=1}^n y_i e_i = \sum_{i=1}^n (x_i + \lambda y_i) e_i \longleftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 + \lambda y_1 \\ \vdots \\ x_n + \lambda y_n \end{pmatrix} \longleftrightarrow \sum_{i=1}^n (x_i + \lambda y_i) e'_i =$$

$$= \sum_{i=1}^n x_i e'_i + \lambda \sum_{i=1}^n y_i e'_i = e'_i \longleftrightarrow x' + \lambda y'$$

$$x + \lambda y \longleftrightarrow x' + \lambda y'$$

Биекция сохраняет свойство линейности $\Leftrightarrow$ изоморфизм

$\Rightarrow$ Если $V_1 \cong V_2$, то из 6 свойства изоморфизма мы знаем, что существует биекция между базисами этих систем $\Rightarrow \dim V_1 = \dim V_2$

Q.E.D.

Следствие

Изоморфизм конечномерных пространств — отношение эквивалентности на множестве линейных конечномерных пространств

$$V_1 \sim V_2 \Leftrightarrow V_1 \cong V_2$$

Доказательство

1. рефлексивность

$$V_1 \sim V_1, \text{ т.к. } id_{V_1} \text{ — изоморфизм}$$

2. симметричность

$$V_1 \sim V_2 \Rightarrow V_2 \sim V_1, \text{ т.к. } \dim V_1 = \dim V_2 \text{ по теореме выше}$$

3. транзитивность

$$\left. \begin{array}{l} V_1 \sim V_2 \\ V_2 \sim V_3 \end{array} \right\} \Rightarrow V_1 \sim V_3$$

по теореме выше

$$\left. \begin{array}{l} \dim V_1 = \dim V_2 \\ \dim V_2 = \dim V_3 \end{array} \right\} \Rightarrow \dim V_1 = \dim V_3$$

Q.E.D.

2.3.4. Линейное подпространство. Ранг системы векторов

$L \subset V$ (подмножество), если L удовлетворяет 1–8 аксиомам линейного пространства над полем K относительно $+$, $\cdot \lambda$, то L называется линейным подпространством пространства V .

Теорема (критерий линейного подпространства)

L — линейное подпространство $V \Leftrightarrow \forall x, y \in L \subset V \forall \lambda \in K : x + \lambda y \in L$

(L замкнуто относительно $+$, $\cdot \lambda$)

Доказательство

$\Rightarrow$ т.к. $L \subset V$ и выполняются 1-8 аксиомы

$\Leftarrow$ т.к. $L \subset V$ выполнены все аксиомы кроме 3 и 4

Пусть $x \in L \subset V$, тогда $x + (-1) \cdot x \in L \Rightarrow 0 \in L \Rightarrow \exists$ нейтральный элемент в L

Пусть $x = 0 \in L, y \in L \Rightarrow 0 + (-1) \cdot y = -y \in L \Rightarrow \exists$ противоположный элемент

$\Rightarrow$ для L выполнены 1-8 аксиомы линейного пространства

Q.E.D.

Замечания

1. $L \subset V \Rightarrow 0 \in L$

2. $\dim L \leq \dim V$

Ранг системы векторов $\stackrel{def}{\Longleftrightarrow} \dim(\text{span}(v_1, \dots, v_m)) = r = \text{rg}(v_1, \dots, v_m)$

r — число max линейно независимых векторов в $L = \text{span}(v_1, \dots, v_m)$

по теореме о «прополке»: $\text{span}(v_1, \dots, v_m) = \text{span}(v_{j_1}, \dots, v_{j_r})$ — линейно независимы

$v_{j_1}, \dots, v_{j_r}$ базис $\text{span}(v_1, \dots, v_m)$ — база системы векторов $v_1, \dots, v_m$

Элементарные преобразования системы векторов:

1. удаление/добавление нулевого вектора
2. изменение порядка векторов
3. замена любого векторов на него же, умноженный на скаляр ($\lambda \in K, \lambda \neq 0 : v_j \rightarrow \lambda v_j$)
4. замена любого из векторов на его сумму с любым другим вектором системы ($v_j \rightarrow v_j + v_k$)

Теорема

$\text{rg}(v_1, \dots, v_m)$ не меняется при элементарных преобразованиях

Доказательство:

1. Заметим, что добавление/удаление нулевого вектора никак не влияет на span , то есть на ранг.
2. Заметим, что при перестановке у нас просто меняется порядок в разложении через эти вектора.

3. Возьмем и умножим соответствующее α_i в разложении вектора на $\frac{1}{\lambda}$. Заметим, что «новых» векторов в спан не добавится, и старые вектора все останутся
4. $\dots + a_j v_j + \dots + a_k v_k + \dots = \dots + a_j (v_j + v_k) + \dots + (a_k - a_j) v_k + \dots$. Аналогично рассуждениям из прошлого пункта получим требуемое

Q.E.D.

2.3.5. $L_1 + L_2, L_1 \cap L_2$, формула Грассмана, $L_1 \oplus L_2$ (прямая сумма) $L_1, L_2 \in V$ — линейные подпространства пространства V

$$L_1 + L_2 = \{x_1 + x_2 \in V : x_1 \in L_1, x_2 \in L_2\}$$

$$L_1 \cap L_2 = \{x \in V : x \in L_1, x \in L_2\}$$

Лемма:

Сумма и пересечение тоже линейные подпространства.

Доказательство:

См. критерий линейного подпространства.

Q.E.D.

Теорема (формула Грассмана)

 $L_1, L_2 \in V$ — линейные подпространства пространства V

$$\dim(L_1 + L_2) = \dim(L_1) + \dim(L_2) - \dim(L_1 \cap L_2)$$

Доказательство:

$$1. \dim(L_1 \cap L_2) = 0$$

$L_1 \cap L_2 = \{0\}$. А что это значит? Что мы должны доказать немного другую формулу:
 $\dim(L_1 + L_2) = \dim(L_1) + \dim(L_2)$

Возьмём $v_1, \dots, v_n$ — базис L_1 .Возьмём $f_1, \dots, f_m$ — базис L_2 .Докажем, что $v_1, \dots, v_n, f_1, \dots, f_m$ — базис для $L_1 + L_2$.

- Докажем линейную независимость. От противного. Пусть лин. зависимо, тогда напишем нетривиальную линейную комбинацию:

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^m \alpha_{i+m} f_i = 0 \Rightarrow \underbrace{\sum_{i=1}^n \alpha_i v_i}_{\in L_1} = \underbrace{\sum_{i=1}^m -\alpha_{i+m} f_i}_{\in L_2}, \quad L_1 \cap L_2 = \{0\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i \underbrace{v_i}_{\text{базис}} = 0 = \sum_{i=1}^m -\alpha_{i+m} \underbrace{f_i}_{\text{базис}} \Leftrightarrow \forall i : \alpha_i = 0$$

- Докажем порождаемость. Любой элемент суммы раскладывается (по определению) на элемент из L_1 и элемент из L_2 . Откуда получили то, что нам надо.

Формула доказана!

2. $\dim(L_1 \cap L_2) \neq 0$ Откуда возьмём базис пересечения: $e_1, \dots, e_k$.

По теореме о дополнении до базиса, т.к. $e_1, \dots, e_k$ лежит в L_1 и линейно независимо, то можно дополнить до базиса L_1 , получим: $e_1, \dots, e_k, v_1, \dots, v_{n-k}$ — базис L_1 .

Аналогично сделаем со вторым пространством и получим: $e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_{m-k}$ — базис L_2 .

Теперь докажем, что $e_1, \dots, e_k, v_1, \dots, v_{n-k}, f_1, \dots, f_{m-k}$ — базис суммы.

- Докажем линейную независимость. От противного. Пусть лин. зависимо, тогда напишем нетривиальную линейную комбинацию:

$$\sum_{i=1}^{n-k} \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^k \alpha_{n-k+i} e_i + \sum_{i=1}^{m-k} \alpha_{n+i} f_i = 0$$

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n-k} \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^k \alpha_{n-k+i} e_i}_{\in L_1} = - \underbrace{\sum_{i=1}^{m-k} \alpha_{n+i} f_i}_{\in L_2} \Rightarrow \in L_1 \cap L_2$$

Перенесем в другую сторону и получим, что с одной стороны у нас есть v из L_1 , с другой стороны он у нас из L_2 . Откуда левая сумма раскладывается по векторам из e_1 (так как он лежит в пересечении).

$$\sum_{i=1}^{n-k} \alpha_i v_i + \sum_{i=1}^k \alpha_{n-k+i} e_i = \sum_{i=1}^k \beta_i e_i$$

Перенесу налево, должна получиться линейная комбинация равная нулю, а такая из-за линейной независимости может быть только тривиальной, откуда α_j при v_j равны 0, следовательно α_j при всех f_j и e_k , т.к. это базис L_2 :

$$\sum_{i=1}^{m-k} \alpha_{n+i} f_i + \sum_{i=1}^k \alpha_{n-k+i} e_i = 0$$

Откуда линейно независима.

- Докажем порождаемость. Любой элемент суммы раскладывается (по определению) на элемент из L_1 и элемент из L_2 . Откуда разложим на базисы L_1, L_2 (которые указаны выше). Сложим их и получили, что данный элемент это линейная комбинация. Откуда порождается.

Тогда $\dim(L_1 + L_2) = n + m - k$.

Q.E.D.

$L_1, \dots, L_m \subset V$ называются дизъюнктными, если $x_1 + \dots + x_n = 0$, где $x_i \in L_i, i = 1 \dots m \Leftrightarrow \forall i = 1 \dots m : x_i = 0$

$L_1 + \dots + L_m$ называется прямой суммой, если $L_1, \dots, L_m$ — дизъюнктны.

$L_1 \oplus L_2 \oplus \dots \oplus L_m$ — прямая сумма линейных подпространств.

Теорема

$$L = L_1 + \dots + L_m = \sum_{k=1}^m L_k, L_k \subset V$$

$$L = \bigoplus_{k=1}^m L_k \Leftrightarrow \text{выполнению любого из 3-х утверждений}$$

1. $\forall j = 1 \dots m : L_j \cap \sum_{k \neq j} L_k = \{0\}$
2. базис L = объединение базисов L_k
3. $\forall x \in L : \exists! x_k \in L_k : x = \sum x_k$ (единственность представления элемента суммы)

Доказательство:

1. Давайте сначала докажем из определения дизъюнктивности первый пункт.

$\Rightarrow$ Мы знаем, что $v_1 + v_2 + \dots + v_m = 0$ возможно только если каждый из векторов — 0. Рассмотрим $v \in L_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m L_j$. Он, как несложно заметить, лежит в L_i , поэтому может быть записан как v_i . С другой стороны, $v \in \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m L_j$, что значит, что его можно записать как сумму $\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m v_j$. А это значит, что $-v_i + \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m v_j = 0$. По причине дизъюнктивности, все слагаемые тут — 0. А значит $-v_i = 0 \Rightarrow v = 0$. То есть любой $v \in L_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m L_j$ является 0, что и требовалось доказать.

$\Leftarrow$ Мы знаем, что $\forall i \in [1 : m] L_i \cap \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m L_j = \{0\}$. Хотелось доказать, что $v_1 + v_2 + \dots + v_m = 0 \Leftrightarrow \forall i \in [1 : m] v_i = 0$. Заметим, что $v_1 + v_2 + \dots + v_m = 0 \Leftrightarrow \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m v_j = -v_i$. Правая часть лежит в $\sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^m L_j$, а левая — в L_i . Это значит, что обе части лежат в их пересечении, а там лежит только 0. Значит $v_i = 0$. То же самое можно провести для любого i , получив, что все v_i — нули. Что и требовалось доказать.

2. Теперь давайте докажем из определения дизъюнктивности второй пункт.

Мы знаем, что $v_1, \dots, v_m = 0$ возможно только если каждый из векторов — 0. Рассмотрим базисы L_i . Возьмем все эти базисы. Очевидно они будут порождать нашу сумму. Теперь докажем линейную независимость.

Рассмотрим нулевую линейную комбинацию объединения базисов L_j :

$$\sum \beta_j e_i^j + \dots + \sum \beta_{f_k} e_{j_k}^k$$

где $v_j = \sum \beta_j e_i^j \in L_j$.

Дизъюнкты $\Leftrightarrow \forall j : v_j = 0 \Leftrightarrow \forall j : \beta_{i_j} = 0$ т.к. $e_{i_j}^j$ базис $L_j \Leftrightarrow$ объединение базисов линейно независимо.

3. $\exists x_k$, очевидно. Докажем единственность. Пусть $x = \sum x_k = \sum x'_k \Rightarrow \sum (x_k - x'_k) = 0$
 $\Leftrightarrow \bigwedge_k x_k - x'_k = 0$
 дизъюнктность

Q.E.D.

Следствие

$$L = L_1 \oplus \dots \oplus L_m \Leftrightarrow \dim L = \sum_{i=1}^m \dim L_i$$

Доказательство

Из п. 2.

Q.E.D.

$$V = \bigoplus_{i=1}^m L_i \Rightarrow \forall x \in V : \exists! x_i \in L_i : x = \sum_{i=1}^m x_i$$

x_i — проекция элемента x на подпространство L_i параллельно $\sum_{j \neq i} L_j$.

Если $V = L_1 \oplus L_2$, L_1 — прямое дополнение L_2 и наоборот.

Если $L \subset V$, то всегда $\exists L' \subset V : V = L \oplus L'$ (L' выбирается неоднозначно).

Линейным (аффинным) многообразием называется множество точек пространства $V : P = \{x \in V : x = x_0 + l, l \in L\}$, где $L \subset V, x_0 \in V$ (сдвинутое линейное подпространство). Обозначается как $P = x_0 + L$.

Размерность линейного многообразия $\xLeftrightarrow{def} \dim P = \dim L$

Теорема

$P_1 = x_1 + L_1; P_2 = x_2 + L_2$, где $L_1, L_2 \subset V$ — линейные подпространства, $x_1, x_2 \in V$

$$P_1 = P_2 \Leftrightarrow \begin{cases} L_1 = L_2 = L \\ x_1 - x_2 \in L \end{cases}$$

Доказательство:

$$\boxed{\Leftarrow} \forall p_1 \in P_1 = x_1 + L_1 = x_1 - x_2 + l_1 + x_2 \in P_2$$

Так как $x_1 - x_2 \in L = L_2, l_1 \in L = L_2$. Откуда $P_1 \subset P_2$. Аналогично $P_2 \subset P_1$, откуда получили искомое $\boxed{\Rightarrow}$ Посмотрим на $x_1 + 0$. Он лежит в P_1 , откуда есть ему эквивалентный $x_2 + l_2$ из P_2 , исходя из того, что $P_1 = P_2$. Тогда $x_1 - x_2$ лежит в L_2 .

Посмотрим на $x_2 + 0$. Он лежит в P_2 , откуда есть ему эквивалентный $x_1 + l_1$ из P_1 , исходя из того, что $P_1 = P_2$. Тогда $x_1 - x_2$ лежит в L_1 . Откуда он лежит в пересечении.

Теперь рассмотрим любое $l_2 \in L_2$. Ему соответствует элемент, как $x_2 + l_2$, с другой стороны это $x_1 + l_1$. Тогда $x_1 - x_2 + l_1 = l_2$. Откуда любой l_2 содержится в l_1 . То есть $L_2 \subset L_1$. Аналогично, $L_1 \subset L_2$, откуда получили то, что нам надо.

Q.E.D.

Следствие

$$P = x_0 + L$$

$$\forall x \in P \Rightarrow P_x = x + L = P$$

Доказательство

1. $L = L$
2. $x - x_0 \in L$

Q.E.D.

2.3.6. Фактор пространство лин. пространства

Пусть у нас есть линейное подпространство L . Тогда отношение $x \sim y \Leftrightarrow x - y \in L$ является отношением эквивалентности, для любых векторов из V .

Факторпространство пространства V по модулю линейного подпространства L $V|_L$ — это фактормножество $\bar{V}$ по отношению эквивалентности $\sim$ из предыдущего утверждения.

Теорема $V|_L$ состоит из линейных многообразий на L .

Доказательство:

Если $x - y \in L$, то линейные многообразия $x + L$ и $y + L$ по одной из теорем ранее совпадают. То есть эквивалентные элементы порождают одинаковые многообразия.

Q.E.D.

Теорема

$$\dim V|_L = \dim V - \dim L.$$

Доказательство:

Пусть $\{e_1; e_2; \dots; e_m\}$ — базис L . Дополним его до базиса V векторами $\{f_1; f_2; \dots; f_{n-m}\}$. Хочется доказать, что $\{f_1 + L; f_2 + L; \dots; f_{n-m} + L\}$ — базис $V|_L$.

Докажем, что эта система порождающая. Нужно породить $v + L$. v раскладывается по базису $\{e_1; e_2; \dots; e_m; f_1; f_2; \dots; f_{n-m}\}$ как $v = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i + \sum_{i=1}^{n-m} \beta_i f_i$. Первая сумма лежит в L , то есть её можно выкинуть, многообразие останется таким же. А значит $v + L$ можно представить как $\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i (f_i + L)$, ведь по определению суммы многообразий это $\left(\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i f_i \right) + L$.

Теперь докажем линейную независимость. Рассмотрим нулевую линейную комбинацию $\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i (f_i + L)$. Она, как мы уже знаем, равна $\left(\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i f_i \right) + L$. Это должно быть равно нейтральному элементу (то есть L). Когда эти линейные многообразия равны? Когда

$\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i f_i \in L$. То есть $\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i f_i - \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i = 0$. Но это же линейная комбинация векторов подсистемы $\{e_1; e_2; \dots; e_m; f_1; f_2; \dots; f_{n-m}\}$, а значит она линейно независима. А значит $\forall i \in [1 : n - m] \beta_i = 0$, что значит, что линейная комбинация $\sum_{i=1}^{n-m} \beta_i (f_i + L)$ тривиальна.

Q.E.D.

2.4. Матрицы

2.4.1. Основные понятия

def: Матрица — множество некоторых объектов (элементов), записанных в виде таблицы (не обязательно числа).

$$A = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m — число строк n — число столбцов "Матрица размерности m на n ".

Матрица, где $\forall i, j \ a_{ij} \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$ — числовая (вещественная/комплексная).

$$A = (A_1 \ \dots \ A_m) \text{ — столбцовый вид записи. } A_j \text{ — столбец матрицы. } A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m(\mathbb{C}^m)$$

$$A = \begin{pmatrix} S_1 \\ \vdots \\ S_m \end{pmatrix} \text{ — строчный вид записи. } S_i \text{ — строка матрицы. } S_i = (a_{i1} \ \dots \ a_{in}) \in \mathbb{R}_n(\mathbb{C}_n)$$

$$\text{span}(A_1, \dots, A_n) \subset \mathbb{R}^m(\mathbb{C}^m)$$

Если $m = n$, матрица называется квадратной.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & * & * \\ * & \ddots & * \\ * & * & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ — главная диагональ.}$$

$$A = \begin{pmatrix} * & * & a_{1n} \\ * & \ddots & * \\ a_{n1} & * & * \end{pmatrix} \text{ — побочная диагональ.}$$

$$\forall i \neq j \ a_{ij} = 0 \quad \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_n \end{pmatrix} = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \text{ — } \underline{\text{диагональная}} \text{ матрица.}$$

$$E = \text{diag}(\alpha_1, \dots, \alpha_n), \forall i \ \alpha_i = 1 \text{ — } \underline{\text{единичная}} \text{ матрица.}$$

$$0 = \text{diag}(0, \dots, 0) \text{ — } \underline{\text{нулевая}} \text{ матрица.}$$

$$\forall A_{n \times n} \quad \text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} \text{ — след матрицы (от англ. trace)}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ 0 & 0 & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ — верхнетреугольная матрица.}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ * & \ddots & 0 \\ * & * & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ — нижнетреугольная матрица.}$$

2.4.2. Основные операции с матрицами

$$a_{ij} \in \mathbb{K}$$

$$A_{m \times n}, B_{m \times n}$$

$$\text{def: } C = A + B = (c_{ij}) \quad \forall i, j \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$$

'+' — сложение матриц (одной размерности)

$\mathbb{0}$ — нейтральный элемент относительно сложения

$$\lambda \in \mathbb{K}$$

$$C = \lambda A = (\lambda a_{ij})$$

$\lambda \times$ — умножение на скаляр.

$-1A$ — противоположная A матрица (не путать с обратной)

Свойства:

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $\exists \mathbb{0}$
4. $\exists -A$
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A) = \beta(\alpha A)$
8. $1A = A$

$\Rightarrow$ Линейное пространство (8 аксиом выполнены) $M_{m \times n}$

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & a_{ij} = 1 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ — канонический базис пространства } M_{m \times n} \quad A = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} E_{ij} =$$

$$(\alpha_{ij})_{m \times n} = \mathbb{0}_{m \times n} \Leftrightarrow a_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

$$A \leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{1n} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{2n} \\ a_{m1} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}(\mathbb{C})^{mn} \Leftrightarrow A \cong \mathbb{K}^{mn} \Leftrightarrow \dim(M_{m \times n}) = mn$$

def: Матрицы A и B согласованы, если число столбцов A совпадает с числом строк B .

Если A и B согласованы, то $A_{m \times k}, B_{k \times n}$

$$C = A \times B = AB = (C_{ij})_{m \times n} \quad C_{ij} = \sum_{r=1}^k a_{ir} b_{rj} \text{ — ”}\times\text{” умножение матриц.}$$

def: Матрицы A и B перестановочны, если $AB = BA$ (очевидно, должны быть квадратными).

A, B, C — квадратные матрицы $n \times n$

$\forall \lambda \in \mathbb{K}$

$$\begin{aligned} 9. \quad & A(B + C) = AB + AC \\ & (A + B)C = AC + BC \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ кольцо

$$10. \quad \lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$$

$\Rightarrow$ алгебра $(M_{n \times n})$

$$12. \quad A(BC) = (AB)C$$

$\Rightarrow$ ассоциативная алгебра

$$13. \quad \exists E \quad EA = AE = A$$

$\Rightarrow$ унитарная алгебра

Обратный элемент может не существовать, так что не выполняется 14. И ещё нет коммутативности, так что не выполняется 11.

Доказательства: упражнение на дом :) Но, вообще, там несложно, просто глина.

2.4.3. Операция транспонирования

def: Операция транспонирования заменяет матрицу $A_{m \times n}$ на $A_{n \times m}^T$, где строки новой матрицы — столбцы исходной (для квадратной матрицы это попросту отражение относительно главной диагонали).

$$B = A^T = (b_{ij}) = (a_{ji})$$

Свойства:

$$1. \quad (A^T)^T = A$$

$$2. (A + \lambda B)^T = A^T + \lambda B^T$$

$$3. A \text{ и } B \text{ согласованы } (AB)^T = B^T A^T$$

def: $A_{m \times n}$ называется симметричной, если $A = A^T$

def: $A_{m \times n}$ называется кососимметричной, если $A = -A^T$ (у кососимметричной все диагональные элементы — нули).

2.4.4. Обратная матрица

def: $A_{n \times n}$

Матрица A^{-1} называется обратной к A , а A называется обратимой, если $A^{-1}A = AA^{-1} = E$

Пока мы не знаем условий существования (в лекциях позже)

Свойства:

1. A^{-1} — единственная (док-во очевидное через ассоциативность)
2. $(A^{-1})^{-1} = A$ (из определения)
3. $\forall \lambda, \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \neq 0 \quad (\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
4. $E^{-1} = E$
5. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
6. $\exists B^{-1} \Rightarrow \exists (AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$

2.4.5. Ранг матрицы

def: $rg_{line}(A) = rg(S_1, \dots, S_m)$ — строчный ранг матрицы A (берем строки как вектора, находим ранг системы векторов) $1 \leq rg_{line}(A) \leq n$ ($A \neq 0$)

def: $rg_{col}(A) = rg(A_1, \dots, A_n)$ — столбцовый ранг матрицы A (берем строки как вектора, находим ранг системы векторов) $1 \leq rg_{col}(A) \leq m$ ($A \neq 0$)

$$A_j \quad 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$$

$$\tilde{A}_j = \begin{pmatrix} a_{i_1 j} \\ a_{i_2 j} \\ \vdots \\ a_{i_k j} \end{pmatrix} \text{ — отрезок длины } k \text{ столбца } A_j$$

$$S_i \quad 1 \leq j_1 < \dots < j_k \leq m$$

$$\tilde{S}_i = (a_{ij_1} \quad a_{ij_2} \quad \dots \quad a_{ij_k}) \text{ — отрезок длины } k \text{ строки } S_i$$

Утверждение 1: $A_1, A_2, \dots, A_n$ линейно зависимы $\Rightarrow$ любые отрезки длины k $\tilde{A}_1 \dots \tilde{A}_n$ линейно зависимы.

Доказательство:

Есть нетривиальная линейная комбинация столбцов $A_1, A_2, \dots, A_n$, равная нулю, и если мы удалим часть строк, линейная комбинация всё так же будет давать 0, при этом получим нетривиальную линейную комбинацию отрезков $A_1, \dots, A_n \Rightarrow$ линейно зависимы.

Следствие: Отрезки длины k $\tilde{A}_1 \dots \tilde{A}_n$ линейно независимы $\Rightarrow A_1, A_2, \dots, A_n$ линейно независимы.

Утверждение 2: $rg_{line}(A) = k$ $S_{i_1} \dots S_{i_k}$ — база строк. Тогда, если $\tilde{A}_1 \dots \tilde{A}_n$ отрезки, отвечающие $S_{i_1} \dots S_{i_k}$, линейно зависимы, то и $A_1, A_2, \dots, A_n$ линейно зависимы.

Доказательство:

н.у.о. $i_1, \dots, i_k = 1, 2, \dots, k$. Значит все оставшиеся — линейно комбинация. Значит любую строку можно записать, как линейную комбинацию наших строк:

$$s_{k+l} = \sum_{r=1}^k \alpha_{rl} s_r. \quad a_{k+l_j} = \sum_{r=1}^k \alpha_{rl} a_{r_j}, \quad l = 1, \dots, m-k:$$

$\tilde{A}_1 \dots \tilde{A}_n$ отрезки, отвечающие $S_1 \dots S_k$, линейно зависимы $\Leftrightarrow \exists \beta_j \in K$ не все нули.

$$\sum_{j=1}^n b_j \tilde{A}_j = 0 \Leftrightarrow \sum_{j=1}^n \beta_j a_{rj} = 0, \forall r = 1, \dots, k. \text{ Докажем, что с этими же } \beta_j$$

$$\sum_{j=1}^n b_j A_j = 0. \text{ Первые } k - \text{ нули. Докажем, что и оставшиеся нули.}$$

$$\text{Посмотрим на } k+1 \text{ координату: } \sum_{j=1}^n \beta_j a_{k+1j} = \sum_{j=1}^n \beta_j \sum_{r=1}^k \alpha_{r1} a_{rj} = \sum_{r=1}^k \alpha_{r1} \sum_{j=1}^n \beta_j a_{rj} = 0$$

Далее будем смотреть на следующую $k+l$ координату, и дальнейшее доказательство будет аналогично.

Q.E.D.

Замечание: Утверждение 2 справедливо для любой подсистемы отрезков столбцов $A_{j_1}, \dots, A_{j_r}$.

Теорема (о ранге матрицы)

$$rg_{line}(A) = rg_{col}(A) = rg(A)$$

Доказательство:

$$rg A = k : 1 \leq k \leq n, m$$

н.у.о. Пусть первые k строк — база строк матрицы.

Рассмотрим отрезки столбцов, соответствующие этим элементам.

$$r = rg(\tilde{A}_1 \dots \tilde{A}_n) \leq k$$

Пусть $\tilde{A}_{j_1} \dots \tilde{A}_{j_r}$ — база отрезков.

Тогда по следствию к утверждению 1: $\tilde{A}_{j_1} \dots \tilde{A}_{j_r}$ — линейно независимые столбцы. При этом, по утверждению 2 (и замечанию) любая система из $r+1$ столбца будет зависима, т.к. будут зависимы их отрезки $\Rightarrow rg_{col} = r$

Откуда получаем, что ранг столбцов меньше ранга строк. Заметим, что то же самое будет верно и для строк.

Q.E.D.

Свойства ранга:

$$1. \quad rg(A^T) = rg(A)$$

2. $rg(\lambda A) = rg(A), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda \neq 0$
3. $rg(A + B) \leq rg(A) + rg(B)$ (лайт версия т. Грассмана)
4. A и B согласованы, $rg(AB) \leq \min(rg(A), rg(B))$

Доказательство:

1. Заметим, что у транспонированной столбцы и строки просто местами поменяются.
2. тут даже говорить нечего...
3. $rg(A + B) \leq \dim(L_1 + L_2) \leq \dim(L_1) + \dim(L_2)$
4. Зафиксируйте A . Тогда столбцы, полученные умножением матрицы A поочерёдно на столбцы матрицы B будут лин. комбинацией столбцов матрицы A , откуда $rg(AB) \leq rg A$. Транспонируйте произведение и повторите, получите $rg(AB) \leq rg(B)^T = rg(B)$

def: Элементарными преобразованиями над строками (столбцами) матрицы A называются элементарные преобразования 1-4, которые производятся с ними, как с векторами пространства K^n и K^m соответственно.

5. $rg(A)$ не меняется при элементарных преобразованиях над её строками/столбцами

Теорема: $A_{m \times n}$

$$rg(A) = k$$

$$1 \leq k \leq \min(n, m)$$

$\forall A$ может быть элементарными преобразованиями строк и перестановкой столбцов приведена к трапециевидной форме. Причем, число строк в трапециевидной форме равно k (соответственно, если число столбцов равно k , можно привести к треугольной форме)

Матрица трапециевидной формы (н.у.о. $n \leq m$):

$$\begin{pmatrix} a_{11} & * & * & * & * \\ 0 & \ddots & * & * & * \\ 0 & 0 & a_{nn} & * & * \end{pmatrix}$$

2.5. Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

2.5.1. Основные определения и понятия, теорема Кронекера-Капелли.

Обычно система записывается так:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12} + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22} + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2} + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

Это общий вид СЛАУ, причём $a_{ij}, x_k, b_r \in K$

Матричная форма записи $Ax = b$, где

$$\underbrace{A}_{\text{матрица системы}} = (a_{ij})_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, x = \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{\text{столбец неизвестных}}, b = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}}_{\text{столбец свободных членов}}$$

$A = (A_1, \dots, A_n)$, где A_j — столбцы. $\sum_{i=1}^n x_i A_i = b$ — векторная форма записи

$Ax = b$ — система однородных линейных уравнений (СЛОУ) (однородная система), если $b = 0$.

$Ax = b$ — система неоднородных линейных уравнений (СЛНУ) (неоднородная система), если $b \neq 0$.

Система $Ax = b$ — совместная (разрешимая), если $\exists x$, то есть существует решение.

Система $Ax = b$ — несовместная (неразрешимая), если $\nexists x$, то есть решения не существует.

Замечание: СЛОУ всегда совместна, т.к. $x = 0$ всегда является решением.

Система $Ax = b$ — определенная, если есть единственное решение.

Система $Ax = b$ — неопределенная, если есть более одного решения.

Система $Ax = 0$ — тривиальная, если она определённая, то есть единственное решение $x = 0$.

Общее решение системы $Ax = b$ — $\{\forall x | Ax = b\}$, то есть множество всех его решений.

Частное решением системы $Ax = b$ — какое-то конкретное решение x , рассматриваемое в данном контексте.

Расширенная матрица системы — $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$

Теорема Кронекера-Капелли: $Ax = b$ совместна $\Leftrightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(A|b)$

Доказательство:

$$Ax = b \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i A_i = b \text{ — линейная комбинация столбцов } \Leftrightarrow b \in \text{span}(A_1, \dots, A_n) \Leftrightarrow \text{span}(A_1, \dots, A_n) = \text{span}(A_1, \dots, A_n, b)$$

$$\text{rg}(A) = \dim(\text{span}(A_1, \dots, A_n)) = \dim(\text{span}(A_1, \dots, A_n, b)) = \text{rg}(A|b) \text{ Q.E.D.}$$

2.5.2. Структура общего решения СЛОУ и СЛНУ. ФСР. Альтернатива Фредгольма.

Теорема: $Ax = 0$, $u, v \in K^n$ — решения СЛОУ $\Rightarrow \forall \lambda \in K : \lambda u + v$ — тоже решение СЛОУ.

Доказательство:

$$u, v \text{ — решения } \Rightarrow Au = 0, Av = 0$$

$$A(\lambda u + v) = \lambda Au + Av = \lambda 0 + 0 = 0 \Rightarrow \lambda u + v \text{ — тоже решение СЛОУ Q.E.D.}$$

Следствие: общее решение СЛОУ — линейное подпространство $L \subseteq K^n$

Смотри критерии линейного подпространства.

Теорема (размерность общего решения СЛОУ): $Ax = 0$, $\text{rg}(A) = k$, L — общее решение СЛОУ $\Rightarrow \dim(L) = n - k = n - \text{rg}(A)$, где n — число неизвестных.

Доказательство:

- $k = 0$:

$$A = 0 \forall x \in K^n : Ax = 0 \Rightarrow \dim(L) = \dim(K^n) = n - 0 = n - k$$

- $1 \leq k < n$:

Тогда $\text{rg}(A) = k = \text{rg}_{\text{col}}(A) = \text{rg}(A_1, \dots, A_n)$ — база столбцов из k элементов. Переставим неизвестные x_i , чтобы базисом были столбцы $A_1, \dots, A_k$, а все остальные столбцы будут их линейными комбинациями.

$$\forall j = 1, \dots, n - k :$$

$$A_{k+j} = \sum_{i=1}^k \alpha_i^j A_i, \text{ где } \alpha_i^j \in K. (j \text{ — тоже индекс, просто для удобства записанный сверху})$$

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i^j A_i - A_{k+j} = 0 \Leftrightarrow u_1 = \begin{pmatrix} \alpha_1^1 \\ \alpha_2^1 \\ \vdots \\ \alpha_k^1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} \alpha_1^2 \\ \alpha_2^2 \\ \vdots \\ \alpha_k^2 \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, u_{n-k} = \begin{pmatrix} \alpha_1^{n-k} \\ \alpha_2^{n-k} \\ \vdots \\ \alpha_k^{n-k} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ -1 \end{pmatrix}$$

$u_1, \dots, u_{n-k}$ — решения $Ax = 0$, причём линейно независимые, т.к. ни один не является линейной комбинацией остальных.

Покажем, что $u_1, \dots, u_{n-k}$ — порождающая система. Пусть u — решение $Ax = 0$.

$$\begin{aligned}
 u = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \beta_{k+1} \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} &\Rightarrow v = u + \sum_{i=1}^{n-k} \beta_{k+i} u_i = \\
 &= \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \beta_{k+1} \\ \beta_{k+2} \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_{k+1} \alpha_1^1 \\ \beta_{k+1} \alpha_2^1 \\ \vdots \\ \beta_{k+1} \alpha_k^1 \\ -\beta_{k+1} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \beta_{k+2} \alpha_1^2 \\ \beta_{k+2} \alpha_2^2 \\ \vdots \\ \beta_{k+2} \alpha_k^2 \\ 0 \\ -\beta_{k+2} \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + \begin{pmatrix} \beta_n \alpha_1^{n-k} \\ \beta_n \alpha_2^{n-k} \\ \vdots \\ \beta_n \alpha_k^{n-k} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ -\beta_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma_1 \\ \gamma_2 \\ \vdots \\ \gamma_k \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

v — тоже решение $Ax = 0$, так как является суммой других решений $Ax = 0$, домноженных на некоторые коэффициенты.

$Av = \gamma_1 A_1 + \dots + \gamma_k A_k = 0$ — нулевая линейная комбинация линейно независимых векторов $\Rightarrow \forall \gamma_j = 0 \Rightarrow u + \sum_{i=1}^{n-k} \beta_{k+i} u_i = 0 \Rightarrow u = \sum_{i=1}^{n-k} (-\beta_{k+i}) u_i \Rightarrow$

$\Rightarrow u_1, \dots, u_{n-k}$ — порождающая система $\Rightarrow u_1, \dots, u_{n-k}$ — базис $L \Rightarrow$

$\Rightarrow \dim L = n - k$

- $k = n$:

$A_1, \dots, A_n$ — линейно независимы

$Ax = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i A_i = 0 \Leftrightarrow \forall i = 1, \dots, n : x_i = 0 \Leftrightarrow x = 0$ — единственное решение
 $\Leftrightarrow \dim L = 0$

Следствие: $Ax = 0$, n — число переменных.

- $0 \leq \text{rg}(A) < n \Rightarrow$ система неопределенная, имеет бесконечно много решений, образующие линейное подпространство.
- $\text{rg}(A) = n \Rightarrow$ система определенная, имеет единственное решение равное нулю, то есть система тривиальная.

Фундаментальная система решения — базис линейного подпространства решений СЛОУ.

Теорема (о структуре решения СЛНУ): Пусть $Ax = b$ совместна, x_0 — частное решение СЛНУ: x — решение СЛНУ $\Leftrightarrow x = x_0 + u$, где u — некоторое решение $Ax = 0$

Доказательство:

• $\Rightarrow$:

$$Ax = b, Ax_0 = b \Rightarrow A(x - x_0) = 0 \Rightarrow u = x - x_0 \text{ — решение } Ax = 0$$

• $\Leftarrow$:

$$x = x_0 + u, Au = 0, Ax_0 = b \Rightarrow Ax = A(x_0 + u) = b + 0 = b \Rightarrow x \text{ — решение } Ax = b$$

Следствия (если система $Ax = 0$ совместна, то):

1. Общее решение $Ax = b$ — линейное многообразие $P = L + x_0$, где x_0 — частное решение СЛНУ, $L = \text{span}(u_1, \dots, u_{n-k})$ — общее решение $Ax = 0$

$$\dim(P) = \dim(L) \text{ — размерность общего решения СЛНУ.}$$

2. • $0 \leq \text{rg}(A) < n \Rightarrow Ax = b$ имеет бесконечно много решений, $\dim(P) = n - \text{rg}(A)$
 • $\text{rg}(A) = n \Rightarrow Ax = b$ имеет единственное решение, $\dim(P) = 0$

Теорема (Альтернатива Фредгольма): Пусть $A_{m \times n} \neq 0$, $x \in K^n$, $y \in K^m$: Либо $\forall b \in K^m : Ax = b$ имеет решение, либо $A^T y = 0$ нетривиальна.

То есть, $\forall b \in K^m$, существует решение $Ax = b \Leftrightarrow A^T y = 0$ тривиальна.

Доказательство:

$$\forall b \in K^m Ax = b \text{ совместна} \Leftrightarrow b = \sum_{i=1}^n x_i A_i \Leftrightarrow b \in \text{span}(A_1, \dots, A_n)$$

$$\text{Пусть } b = E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a_j \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ где } a_j = 1 \text{ — элемент } j\text{-ой строки}$$

$$E_j \in \text{span}(A_1, \dots, A_n)$$

Заметим, что $K^m \subset \text{span}(A_1, \dots, A_n) \subset K^m$, потому что любой базисный вектор содержится в нашей оболочке. Откуда:

$$\text{span}(A_1, \dots, A_n) = K^m \Rightarrow \text{rg} A = m = \text{rg} A^T \Leftrightarrow A^T y = 0 \text{ будем иметь одно решение, по ранее сказанной теореме.}$$

2.5.3. Метод Гаусса решения СЛНУ

$$Ax = b.$$

Элементарным преобразованием системы будем называть:

1. добавление / удаление уравнения с нулевыми коэффициентами и нулевым свободным членом.
2. изменение нумераций уравнений.
3. умножение $\forall$ уравнения на $\forall \lambda \in K, \lambda \neq 0$.

4. замена $\forall$ уравнения на его сумму с другим уравнением.
5. изменение нумерации переменных.

Замечание:

1. все элементарные преобразования приводят к эквивалентной системе.
2. все элементарные преобразования эквиваленты элементарным преобразованиям со строками матрицы $A|b$ и перестановкой в ней столбцов (пункт 5).

Теорема (прямой ход метода Гаусса)

$$\forall Ax = b$$

Элементарными преобразованиями системы исходная система может быть заменена на эквивалентную систему, матрица которой будет иметь трапецевидную (в частном случае, треугольную) форму.

Доказательство:

- Находим в необработанной части матрицы самую левую верхнюю ненулевую ячейку. Переставляем её в самый левый верхний угол необработанной части матрицы.
- Отнимаем от всех строчек, ниже первой необработанной, первую необработанную, домноженную на нужный коэффициент, чтобы первый столбец необработанной части оказался заполненным нулями, кроме первой ячейки.
- Отмечаем верхнюю необработанную строчку и левый необработанный столбец, как обработанные.

Метод Гаусса решения СЛАУ:

1. Прямой ход $(A|b) \sim (\tilde{A}|\tilde{b})$

См. теорему о приведении матрицы к трапецевидной форме. Проводить её мы будем с расширенной матрицей системы. Один лишь нюанс в том, что переставлять столбец B ни с чем нельзя, то есть на нём мы заканчиваем алгоритм. Нужно также учесть, что если в матрице $(\tilde{A}|\tilde{b})$ будет строка вида $(0 \dots 0 | \underset{\neq 0}{\tilde{b}_j})$, то система несовместна.

2. Обратный ход

(а) Вид матрицы треугольный ($\text{rg } A = n$ — числу неизвестных)

Обнулим последний столбец при помощи последней строки:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & 0 & b_1 - b_n \frac{a_{2n}}{a_{nn}} \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 & b_2 - b_n \frac{a_{2n}}{a_{nn}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right)$$

Повторим для предпоследней строки и столбца и так далее. В конце концов придём к виду:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & b'_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b'_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b'_n \end{array} \right)$$

Значит $\begin{pmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ \vdots \\ b'_n \end{pmatrix}$ — решение СЛАУ, причём единственное в силу теоремы о структуре общего решения СЛНУ.

(b) Вид матрицы трапецевидный ($\text{rg } A < n$)

Возьму из матрицы треугольник, а остальные переменные возьмём за параметры. Их перенесём в правую часть относительно “=”, затем повторим алгоритм пункта (a). В результате, получим общее решение, зависящее от $n - k$ параметров.

2.5.4. Нахождение обратной матрицы методом Гаусса.

$A_{n \times n}$. Найти $A_{n \times n}^{-1}$, такую, что $A \cdot A^{-1} = E = A^{-1} \cdot A$

A^{-1} - n неизвестных столбцов. $A^{-1} = (X_1, \dots, X_n) = X =$

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

$$\text{Заметим, что } A^{-1} \text{ - решение уравнения } AX = E \Leftrightarrow \begin{cases} AX_1 = E_1 \\ AX_2 = E_2 \\ \vdots \\ AX_n = E_n \end{cases} \quad E = (E_1, \dots, E_n)$$

Пусть все системы совместны. Тогда, в процессе нахождения неизвестных столбцов мы делаем с левой частью матрицы одни и те же преобразования. Давайте решать n систем одновременно:

$$\left(\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & \cdots & 0 & x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{array} \right)$$

Теорема. (о существовании обратной матрицы)

Дано: матрица $A_{n \times n}$

$\exists A^{-1}$ (A обратима) $\Leftrightarrow \text{rg } A = n$

Причем A^{-1} может быть найдена методом Гаусса.

Доказательство:

$\exists A^{-1}$, если $\exists$ решения $AX_i = E_i$ ($\forall i = 1 \dots n$), это значит, что $\text{rg}(A|E_i) = \text{rg } A$ ($\forall i = 1 \dots n$),

откуда каждый $E_i \in \text{span}(A_1, \dots, A_n) \subset K^n \Rightarrow \text{rg} A = n$.

Следствие. Дано $A_{n \times n}$, $Ax = b$. A обратима $\Leftrightarrow \exists!$ решение СЛНУ. Причем, $x = A^{-1}b$

$\exists A^{-1} \Leftrightarrow A$ обратима $\Leftrightarrow \text{rg} A = n \Leftrightarrow \Leftrightarrow \exists!$ решение СЛНУ $Ax = b$.

Пусть $x = A^{-1}b$

$Ax = b \Leftrightarrow A(A^{-1}b) = b \Leftrightarrow b = b$ Q.E.D

Теорема (о ранге произведения матриц)

$A_{n \times n}$, A - обратима, $B \Rightarrow \begin{cases} \text{rg}(AB) = \text{rg} B, \text{ если определено } A \cdot B \\ \text{rg}(BA) = \text{rg} B, \text{ если определено } B \cdot A \end{cases}$

Доказательство:

$$1. \text{rg}(AB) \leq (\text{rg} A, \text{rg} B) \leq \text{rg} B.$$

$$\text{rg} B = \text{rg} EB = \text{rg}(A^{-1}AB) \leq \text{rg}(AB) \leq \text{rg} B$$

$$2. \text{rg}(BA) = \text{rg}(BA)^T = \text{rg}(A^T B^T) = \text{rg}(B^T) = \text{rg} B \text{ (т.к. } \text{rg}(A^T) = \text{rg}(A) = n)$$

2.5.5. Геометрическая интерпретация СЛАУ

$V, \dim V = n$

$e_1, e_2, \dots, e_n$ - базис

Множество точек пр-ва V , координаты которых удовлетворяют алгебраическому уравнению 1-ой степени (линейному) наз-ся гиперплоскостью в пр-ве V .

$\forall x \in V \leftrightarrow x \in \mathbb{R}^n(\mathbb{C}^n)$ — координатный изоморфизм

$\alpha_1, \dots, \alpha_m$ - гиперплоскости

Что будет в пересечении $\alpha_1 \cap \alpha_2 \cap \dots \cap \alpha_m$?

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a'_{11} & a'_{12} & a'_{13} & b'_1 \\ a'_{21} & a'_{22} & a'_{23} & b'_2 \\ 0 & 0 & 0 & b'_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & b'_k \end{array} \right)$$

1.

2.

3. $\text{rg} A = 3 = \text{rg} A|B$, это значит, что есть 3 линейно независимые строки, а остальные - их лин. комбинация.

То есть существуют 3 некомпланарные нормали $\vec{N}_1, \vec{N}_2, \vec{N}_3$.

Прямые лежащие в попарном пересечении плоскостей с этими нормальными будут не параллельными, то есть т.к. система совместна, то существует точка, принадлежащая каждой из прямых, т.е. все 3 прямые пересекаются в 1-ой точке.

2.5.6. Матрица перехода от старого базиса к новому. Связь координат вектора в разных базисах.

$V, e_1, e_2, \dots, e_n$ — “старый” базис — $e = (e_1, \dots, e_n)$.

$e'_1, e'_2, \dots, e'_n$ — новый базис — $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$.

$$x \in V \leftrightarrow x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in K^n \text{ - координаты в базисе } e.$$

$$x \in V \leftrightarrow x = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \in K^n \text{ - координаты в базисе } e'.$$

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i.$$

Давайте представим e'_j через старый базис: $T_j = \begin{pmatrix} t_{1j} \\ \vdots \\ t_{nj} \end{pmatrix}$ - координаты в базисе e .

$$e'_j = \sum_{k=1}^n t_{kj} e_k$$

$T = T_{e \rightarrow e'} = (T_1, T_2, \dots, T_n)$ — матрица перехода от базиса e к e'

$$(e'_1, \dots, e'_n) = (e_1, \dots, e_n) T_{e \rightarrow e'}$$

Свойства T :

1. $\text{rg } T = n$ (T обратима) (очевидно, т.к. координатный изоморфизм)
2. T^{-1} - матрица перехода из e' в e .

Пусть B - матрица перехода от e' к e .

$$(e_1, \dots, e_n) = (e'_1, \dots, e'_n) B = ((e_1, \dots, e_n) T) B = (e_1, \dots, e_n) (BT), \text{ откуда } BT = E, \text{ откуда } B = T^{-1}$$

3. связь координат вектора в разных базисах:

$x \leftrightarrow x$ в старом базисе

$x \leftrightarrow x'$ в новом базисе

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n t_{ij} e_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n t_{ij} x'_j \right) e_i$$

т.к координаты определяются единственным образом

$$\forall i = 1 \dots n : x_i = \sum_{j=1}^n t_{ij} x'_j = (TX')_i \Leftrightarrow X = TX', \text{ а}$$

$$X' = T^{-1}X$$

2.6. Определители.

2.6.1. Антисимметричные полилинейные формы. Определитель системы векторов произвольного лин. пр-ва.

$\dim V = n$ - лин. пространство над полем K

$f : \underbrace{V \times V \times \dots \times V}_p \rightarrow K$ — называется полилинейной формой (функцией), если выполнено:

$$f(\xi_1, \dots, \xi_p) = \text{число в } K.$$

$$\forall \lambda \in K, \forall \psi, \mu \in V : f(\dots, \psi + \lambda\mu, \dots) = f(\dots, \psi, \dots) + \lambda f(\dots, \mu, \dots)$$

(линейна по каждому аргументу)

Правило/Соглашение Эйнштейна: $x^i e_i = \sum_{i=1}^n x e_i$ - меняем обозначение

~~решил выделить это в лемму~~

Лемма:

$$\xi_1, \dots, \xi_p \in V.$$

$$\xi_j = \xi_j^i e_i \leftrightarrow \begin{pmatrix} \xi_j^1 \\ \vdots \\ \xi_j^n \end{pmatrix} \in K^n$$

$$\text{Тогда: } f(\xi_1, \dots, \xi_p) = f(\xi_1^{i_1} e_{i_1}, \xi_2^{i_2} e_{i_2}, \dots, \xi_p^{i_p} e_{i_p}) = \xi_1^{i_1} \xi_2^{i_2} \dots \xi_p^{i_p} f(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}),$$

где $f(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}) := \alpha_{i_1 \dots i_p} \in K$ — коэффициенты (координаты) формы f

Доказательство:

Разложите каждую скобочку по линейности. Ой, получили, что надо :0

$f : V^p \rightarrow K$ - полилинейная форма. если $f=0$ при любых двух равных аргументах, то f наз-ся антисимметричной.

Утверждение. f антисимметрична $\Leftrightarrow \forall (i, j) : f(\dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) = -f(\dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots)$.

Доказательство:

$\Rightarrow$

$$f(\dots, \xi_i + \xi_j, \dots, \xi_i + \xi_j, \dots) = 0$$

Разложим через линейность и учтём антисимметричность:

$$f(\dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) + f(\dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) = 0. \text{ Откуда уже следует искомое.}$$

$\Leftarrow$

$$f(\dots, \xi_i, \dots, \xi_j, \dots) = -f(\dots, \xi_j, \dots, \xi_i, \dots), \text{ откуда уже следует искомое. Q.E.D}$$

Антисимметричные полилинейные формы будем называть p - формами.

Следствие: f - p -форма $\Leftrightarrow \forall (k, m) : \alpha_{i_1 \dots i_k \dots i_m, \dots, i_p} = -\alpha_{i_1 \dots i_m \dots i_k, \dots, i_p} \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \forall (k, m) \alpha_{i_1 \dots i_k \dots i_m, \dots, i_p} = 0, \text{ если } i_k = i_m.$$

Если $p > n$, то, очевидно, $f = 0$. Пусть $p = n$, f — n -форма, тогда все координаты $\alpha_{i_1 \dots i_n} = 0$, если совпадают хотя бы 2 индекса.

$$f(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n} \underbrace{f(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})}_{\alpha_{i_1 \dots i_n}}, \text{ где } i_1, \dots, i_n \text{ это перестановка индексов}$$

Здесь S_n — множество всех перестановок чисел $1 \dots n$.

Подстановки и перестановки

$\varphi : (1, \dots, n) \rightarrow (1, \dots, n)$ — подстановка. Удобнее всего показывать стрелочками. Перестановка — отображение (биекция) ка — образ.

φ, ψ — 2 подстановки. Произведением перестановок назовем образ композиции отображений.

Произведение ассоциативно, но не коммутативно.

Если φ — подстановка, то φ^{-1} — взаимно однозначная и взаимнообратная.

Транспозиция элементов перестановки σ называется подстановка меняющая местами 2 элемента перестановки:

$$(i_1, \dots, i_a, \dots, i_b, \dots, i_n) \text{ перейдет в } (i_1, \dots, i_b, \dots, i_a, \dots, i_n)$$

Любую перестановку можно привести к тривиальной конечным числом транспозиций, так как можно найти единицу, поменять местами с первым элементом, затем найти двойку, поменять местами со вторым, и так далее.

Перестановка называется четной или нечетной, если она приводится к тривиальной за четное или соответственно нечетное количество транспозиций (именно тем алгоритмом который сверху)

$$\varepsilon(\sigma) = \begin{cases} 0, \sigma - \text{четная} \\ 1, \sigma - \text{нечетная} \end{cases} \quad \text{— чётность (функция чётности) перестановки.}$$

Тогда $(-1)^{\varepsilon(\sigma)}$ — знак перестановки.

Приведём каждую из перестановок $(i_1, \dots, i_n)$ к тривиальной, описанным выше способом и учтём, что f антисимметричная форма.

$$\begin{aligned} f(\xi_1, \dots, \xi_n) &= \sum_{\sigma \in S_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n} f(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = \sum_{\sigma \in S_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n} f(e_1, \dots, e_n) \cdot (-1)^{\varepsilon(\sigma)} = \\ &= \text{const} \cdot \sum_{\sigma \in S_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)}, \text{ где } \text{const} = f(e_1, \dots, e_n). \end{aligned}$$

n -форму, у которой значение на упорядоченном наборе базиса векторов $e_1, \dots, e_n$ равно 1 назовем D .

Пусть D — n -форма, т.ч. $D(e_1, \dots, e_n) = 1$

$$\Rightarrow \forall \xi_1 \dots \xi_n : D(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum_{\sigma \in S_n} \xi_1^{i_1} \dots \xi_n^{i_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} \stackrel{\text{def}}{=} \det(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

— определитель системы векторов $\xi_1, \dots, \xi_n \in V$.

Замечания:

1. $\forall f$ - n -форма $f = \alpha D$, где $\alpha = f(e_1, \dots, e_n)$.
2. Форма D существует и единственная.
3. Определение D -формы зависит от базиса, т.к. чтобы её определить, должен быть зафиксирован базис.

2.6.2. Определитель матрицы. Две формулы

Есть матрица $A_{n \times n}$, $a_{ij} \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$

$$A = (A_1, \dots, A_n), A_j \in K^n$$

$$E_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ E_{jj} = 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \text{ — канонический базис пространства } K^n$$

$$A_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} E_i$$

$$A_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix} \text{ — координаты в базисе } E_1, \dots, E_n$$

$$D \text{ - } n\text{-форма } D(E_1, \dots, E_n) = 1$$

$$\forall A_1, \dots, A_n \in K^n$$

$$D(A_1, \dots, A_n) = \boxed{\sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} a_{i_1 1} \dots a_{i_n n} = \det A} \text{ — 1-ая формула } \det \text{ числовой матрицы.}$$

Замечания:

1. $D(E_1, \dots, E_n) = 1 = \det E$
2. f — n -форма на K^n
 $f(A_1, \dots, A_n) = \alpha D(A_1, \dots, A_n)$
 $\alpha = f(E_1, \dots, E_n)$

Инверсией называется пара элементов (i_α, i_β) перестановки σ такие, что $i_\alpha > i_\beta$ и $\alpha < \beta$.

$\text{inv}(\sigma)$ = число инверсий в перестановке

Теорема:

1. $\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma^{-1})$
2. Любая транспозиция элементов может быть получена за нечётное число транспозиций соседних элементов
3. транспозиция любых двух соседних элементов меняет число инверсий на 1

$$4. (-1)^{\varepsilon(\sigma)} = (-1)^{\text{inv}(\sigma)}$$

Доказательство:

1. Применим алгоритм из определения ε одновременно для σ и σ^{-1} . На каждом шаге алгоритма перестановками, полученные из σ и σ^{-1} остаются обратными друг-другу, значит добираются до тривиальной за одинаковое количество транспозиций. Значит, их чётности равны.
2. Поменяем местами i_α и i_β ; приблизим i_β к i_α k транспозициями соседних элементов. Поменяем i_α и i_β местами. Отодвинем i_α от i_β k транспозициями. Всего $2k+1$ транспозиций.
3. Пусть перестановка имеет вид $(A, i_\alpha, i_\beta, B)$, где A и B — части перестановки. i_α образует m инверсий с A , i_β образует k инверсий с B . Транспозиция i_α и i_β или создаст или уничтожит их инверсию и не изменит m или k .
4. Пусть σ четная $\Rightarrow$ четное число транспозиций приводят к тривиальной $\Rightarrow$ четное число соседних транспозиций приводят к тривиальной перестановке, т.е. число инверсий изменилось на четное число. Число инверсий в конце — 0, чётное число, а значит изначально $\text{inv } \sigma$ — четное число. Пусть σ нечетная $\Rightarrow$ нечетное число транспозиций приводят к тривиальной $\Rightarrow$ нечетное число соседних транспозиций приводят к тривиальной перестановке, т.е. число инверсий изменилось на нечетное число. Число инверсий в конце — 0, чётное число, а значит изначально $\text{inv } \sigma$ — нечетное число.

Вторая формула для определителя:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{inv}(\sigma)} a_{i_1 1}, \dots, a_{i_n n}, \text{ где } \sigma = (i_1, \dots, i_n)$$

2.6.3. Свойства определителя

$$1. \det A^T = \det A$$

$$A^T = \begin{pmatrix} A_1^T \\ \vdots \\ A_n^T \end{pmatrix}$$

$$\det A^T = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma)} a_{i_1 1}, \dots, a_{i_n n}, \sigma = (i_1, \dots, i_n) = (\varphi(1), \dots, \varphi(n)) = \varphi(1, \dots, n) \Leftrightarrow$$

$$\sigma^{-1} \text{ обратная} = (j_1 \dots j_n)$$

$$(-1)^{\varepsilon(\sigma^{-1})} = (-1)^{\varepsilon(\sigma)}$$

$$\det A^T = \sum_{\sigma^{-1} \in S_n} (-1)^{\varepsilon(\sigma^{-1})} a_{j_1 i} \dots a_{j_n n} = \det A$$

$$\text{Следствие: } \det A = \sum_{\sigma \in S_n} (-1)^{\text{inv}(\sigma)} a_{1 i_1} \dots a_{n i_n}, \text{ для } \sigma = (i_1 \dots i_n)$$

Замечание: все свойства, сформулированные для столбцов, верны и для строк.

$$2. \det(\dots, \lambda A_i, \dots) = \lambda \det(\dots, A_i, \dots), \lambda \in K$$

$$\det(\dots, A_i + A_j, \dots, A_k, \dots) = \det(\dots, A_i, \dots, A_k, \dots) + \det(\dots, A_j, \dots, A_k, \dots)$$

Доказательство:

$$\det A = D(A_1, \dots, A_n) - \text{полилинейная } n - \text{ форма, откуда все и следует}$$

3. $\det(\dots 0 \dots) = 0$ - частный случай $\lambda = 0$.
4. $\det(\dots, A_i, \dots, A_j, \dots) = -\det(\dots, A_j, \dots, A_i, \dots)$
 $\det(\dots, A_i, \dots, A_i, \dots) = 0$

Доказательство: $\det$ — антисимметричная

5. $\det(\dots A_i \dots A_j \dots) = \det(\dots A_i + \lambda A_j \dots A_j \dots)$

Доказательство:

$$\det(\dots A_i + \lambda A_j \dots A_j \dots) = \det(\dots A_i + \dots A_j \dots) + \det(\dots \lambda A_j \dots A_j \dots) = \det(\dots A_i + \dots A_j \dots) + \lambda \cdot 0 \text{ Q.E.D}$$

6. Определитель ступенчатой матрицы:

$$\det \begin{pmatrix} A^1 & 0 & \dots & 0 \\ * & A^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \dots & A^m \end{pmatrix} = \prod_{k=1}^m \det A^k$$

$A^k = (a_{ij}^k)$ — квадратная матрица.

Доказательство:

- База $m = 2$: $\det \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ * & A_2 \end{pmatrix}$

Решим простой случай $A_1 = E_1, A_2 = E_2$:

$$\det \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ * & E_2 \end{pmatrix} \stackrel{\text{св-во det}}{=} \det \begin{pmatrix} E_1 & 0 \\ 0 & E_2 \end{pmatrix} = \det E = 1$$

Усложним. Пусть у нас теперь только одна из двух матриц единичная (E_{k_2} - единичная матрица размера $k \times k$):

$$\det \begin{pmatrix} B & 0 \\ * & E_{k_2} \end{pmatrix} \stackrel{\text{св-во det}}{=} \det \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & E_{k_2} \end{pmatrix} = f(B_1, \dots, B_{k_1}) = f(E_1, \dots, E_{k_1}) \det B = \det B$$

f — k_1 -форма, т.к. полилинейная относительно B_j и антисимметричная из свойства $\det$. (f - функция, которая для заданной B находит определитель матрицы)

$$f = \alpha D, \alpha = f(e_1, \dots, e_{k_1}), D(B_1, \dots, B_{k_2}) = \det B$$

$$f(E_1, \dots, E_{k_1}) = \det \begin{pmatrix} E_{k_1} & 0 \\ * & E_{k_2} \end{pmatrix} = 1$$

Усложним ещё раз:

$$\det \begin{pmatrix} B & 0 \\ * & C \end{pmatrix} = g(C_1, \dots, C_{k_2}) = g(E_1, \dots, E_{k_2}) \cdot \det C = \det B \det C, \text{ что следует из того, что } g - k_2 \text{ форма относительно } C_j, \text{ при фиксированном } B$$

- Индукционный переход Пусть верно для $m - 1$, тогда докажем, что верно для m :

$$\det \begin{pmatrix} A^1 & 0 & \dots & 0 \\ * & A^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \dots & A^m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & 0 \\ * & A^m \end{pmatrix} = \det A^m \cdot \det A = \prod_{k=1}^m \det A^k,$$

$$\text{где } A = \begin{pmatrix} A^1 & 0 & \dots & 0 \\ * & A^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ * & * & \dots & A^{m-1} \end{pmatrix}$$

Следствия:

$$(a) \det \begin{pmatrix} a_{11} & 0 \\ * & a_{nn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot \dots \cdot a_{nn}$$

$$(b) \operatorname{rg} A = n \Rightarrow \det A \neq 0$$

Просто преобразуем A методом Гаусса и получим трапецевидную. $\operatorname{rg} A = n \Rightarrow$ после преобразований она будет треугольной, значит на диагонали нет нулей, значит их произведение не 0.

Замечание: в силу свойства 1, всё сказанное верно и для верхнетреугольных матриц.

7. $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$, для любого столбца $j = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij}$ для любой строки i , где A_{ij} – алгебраическое дополнение элемента a_{ij}

$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$, где M_{ij} – минор.

$$A = \begin{pmatrix} I \dots & a_{1j} & II \\ a_{1n} \dots & a_{ij} & \dots a_{in} \\ III & a_{mj} & IV \end{pmatrix}, \text{ тогда } M_{ij} = \det \left(\begin{array}{c|c} I & II \\ \hline III & IV \end{array} \right)$$

Докажем сначала для 1 столбца:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} A_{i1}$$

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ a_{12} & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & * & \dots & * \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & * & \dots & * \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & * & \dots & * \end{vmatrix} + \dots + \\ &+ \begin{vmatrix} 0 & * & \dots & * \\ 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + a_{31} M_{31} - \dots + (-1)^{n-1} a_{n1} M_{n1} = \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} M_{i1} a_{i1} \text{ (свойства 2, 4, 6)} \end{aligned}$$

Докажем для произвольного j -ого столбца

$$\det A = \det(\dots A_j \dots) \underset{\text{св-во 4}}{=} (-1)^{j-1} \det(A_j A_1 \dots A_n) = \sum_{i=1}^n (-1)^{j-1} (-1)^{i+1} a_{ij} M_{ij}$$

8. $\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik}$ (j — фиксированный номер столбца, k — фиксированный номер другого столбца.) $= 0 = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{kj}$ (i — фиксированный номер строки, k — фиксированный номер другой строки)

Доказательство:

A_{ik} — алгебраические дополнения элементов k -ого столбца

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ik} = \det(A_1 \dots A_j \dots A_j \dots A_n) \stackrel{\text{св-ва 4, 7}}{=} 0$$

9. $\det(A \cdot B) = \det A \cdot \det B$

$$AB = (AB_1, \dots, AB_n), B = (B_1, \dots, B_n)$$

$$\det(A \cdot B) = f(B_1, \dots, B_n) \text{ (} n \text{- форма, } f = \alpha D \text{)} = f(E_1, \dots, E_n) \cdot \det B = \det(A \cdot E) \cdot \det B = \det a \cdot \det B$$

2.6.4. Формула для обратной матрицы. Теорема Крамера.

Матрица $A_{n \times n}$ — невырожденная, если $\det A \neq 0$

Теорема: (об обратной матрице)

Дано $A_{n \times n}$. A обратима $\Leftrightarrow A$ невырожденна.

Причем, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}^T$, A_{ij} — алгебраическое дополнение элемента a_{ij}

Матрица в формуле называется союзной, взаимной, или присоединяемой.

Доказательство:

• $\Rightarrow$

$$A \text{ обратима} \Rightarrow \exists A^{-1}. A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = E$$

$$\Rightarrow \det(A^{-1}A) = \det E = \det A^{-1} \cdot \det A, \text{ откуда уже следует искомое.}$$

• $\Leftarrow$

A - невырожденная. $\det A \neq 0$. Покажем, что матрица $B = \frac{1}{\det A} (A_{ij})^T$

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\det A} \cdot \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{nj} \\ \sum_{j=1}^n a_{2j} A_{1j} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{2j} A_{nj} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{nj} A_{nj} & \dots & \sum_{j=1}^n a_{nj} A_{nj} \end{pmatrix} =$$

(Все не диагональные ячейки по 8 свойству — нули, а все диагональные по 7 свойству — $\det A$) $\Rightarrow B = A^{-1}$

Следствия:

1. A обратима $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$
2. $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
3. Теорема Крамера

$$Ax = b, A_{n \times n}$$

$\exists!$ решение $\Leftrightarrow A$ невырожденная.

Причём, $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$, где $\Delta = \det A$, $\Delta_i = \det(A_1, \dots, b, \dots, A_n)$ (b занимает i -й столбец)

Доказательство:

$\exists!$ решение $\Leftrightarrow \operatorname{rg} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$, то есть A - невырожденная ($x = A^{-1}b$)

$$x = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} A_{11} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n A_{i1} b_i \\ \sum_{i=1}^n A_{i2} b_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n A_{in} b_i \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} \det(b, A_2 \dots A_n) \\ \det(A_1, b \dots A_n) \\ \vdots \\ \det(A_1, A_2 \dots b) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\Delta_1}{\Delta} \\ \frac{\Delta_2}{\Delta} \\ \vdots \\ \frac{\Delta_n}{\Delta} \end{pmatrix}$$

2.6.5. Теорема Лапласа

$$A = (a_{ij})_{n \times n}$$

$$1 \leq k \leq n: i_1 < i_2 < \dots < i_k, j_1 < j_2 < \dots < j_k$$

$$i_s \in (1, \dots, n), j_t \in (1, \dots, n)$$

Составим из элементов матрицы A новую матрицу, состоящую из элементов, находящихся на пересечении k выбранных строк и k выбранных столбцов

$$\text{Минор } k\text{-того порядка } M_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_k j_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{i_1 j_k} & \dots & a_{i_k j_k} \end{vmatrix}$$

$\overline{M}_{i_1, \dots, i_k}^{j_1, \dots, j_k} = M_{s_1, \dots, s_m}^{t_1, \dots, t_m}$ — называется дополнительным минором, где $t_i \neq j_j$, $s_i \neq i_j$.

Алгебраическим дополнением называется дополнительный минор, домноженный на единицу в степени суммы номеров строк и столбцов.

$$A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} = (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \overline{M}_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}$$

Теорема Лапласа

$A_{n \times n}$, зафиксируем какие-то k строчек $i_1, \dots, i_k$

$$\det A = \sum_{j_1 < \dots < j_k} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} A_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} \text{ (аналогично для столбцов)}$$

Доказательство:

Пусть k выбрано от 1 до n и фиксирован набор строк. Тогда хотим доказать:

$$\sum_{j_1 < \dots < j_k} (-1)^{i_1 + i_2 + \dots + i_k + j_1 + j_2 + \dots + j_k} \overline{M}_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k} = \det A$$

- База индукции:

$$\text{Свойство 7: } \sum_j (-1)^{i+j} \overline{M}_j^i M_j^i = \det A, \text{ где } M_i^j = a_{ij}$$

- Индукционное предположение:

Пусть формула верна для $k-1$ строчки $(i_1, \dots, i_{k-1})$:

$$\det A = \sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_{k-1}} (-1)^{i_1 + \dots + i_{k-1} + j_1 + \dots + j_{k-1}} \overline{M}_{j_1, \dots, j_{k-1}}^{i_1, \dots, i_{k-1}} M_{j_1, \dots, j_{k-1}}^{i_1, \dots, i_{k-1}}$$

- Индукционный переход:

Пусть i_k строка такая, что $i_k > i_{k-1}$

Заметим, что в дополнительный минор входит i_k строка:

$$\overline{M}_{j_1, \dots, j_{k-1}}^{i_1, \dots, i_{k-1}} = M_{\dots}^{\dots, i_k, \dots}$$

Давайте разложим данный минор, по данной строке. Получим:

$$\sum_{j \in (1, \dots, n) \setminus (j_1, \dots, j_{k-1})} a_{i_k j} (-1)^{\#i_k + \#j} \overline{M}_{j_1, \dots, j_{k-1}, j}^{i_1, \dots, i_{k-1}, i_k}$$

где $\#i_k$ и $\#j$ - номер строки в матрице без $k-1$ столбцов $(j_1, \dots, j_{k-1})$ и без этих $k-1$ строк $(i_1, \dots, i_{k-1})$.

Не трудно заметить, что $\#i_k = i_k - (k - 1)$. Теперь давайте подставим в формулу наш получившийся минор.

$$\sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_{k-1}} (-1)^{i_1 + \dots + i_{k-1} + j_1 + \dots + j_{k-1}} M_{j_1, \dots, j_{k-1}}^{i_1, \dots, i_{k-1}} \sum_{j \in (1, \dots, n) \setminus (j_1, \dots, j_{k-1})} a_{i_k j} (-1)^{\#i_k + \#j} \overline{M}_{j_1, \dots, j_{k-1}, j}^{i_1, \dots, i_{k-1}, i_k}$$

Получится вот такая крайне прелестная формула. Перепишем:

$$\sum_{j_1 < j_2 < \dots < j_{k-1}} \sum_{j \in (1, \dots, n) \setminus (j_1, \dots, j_{k-1})} a_{i_k j} (-1)^{\#i_k + \#j} \overline{M}_{j_1, \dots, j_{k-1}, j}^{i_1, \dots, i_{k-1}, i_k} (-1)^{i_1 + \dots + i_{k-1} + j_1 + \dots + j_{k-1}} M_{j_1, \dots, j_{k-1}}^{i_1, \dots, i_{k-1}}$$

И что мы делаем в этой формуле, выбираем сначала $k - 1$ столбец, а потом еще один. Давайте делать это по-другому. Выберем k столбцов и 1, который выкидываем. Получится вот такая формула:

$$\sum_{j_1 < \dots < j_k} \sum_{s \in \{1, \dots, k\}} (-1)^{i_k - (k-1) + \#j_s} a_{i_k j_s} \overline{M}_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} M_{\{j_1, \dots, j_{k-1}, j_k\} \setminus \{j_s\}}^{i_1, \dots, i_{k-1}} \cdot (-1)^{i_1 + \dots + i_{k-1} + j_1 + \dots + \widehat{j_s} + j_k}$$

Найдем $\#j_s = j_s - (s - 1)$:

$$\sum_{j_1 < \dots < j_k} \sum_{s \in \{1, \dots, k\}} (-1)^{i_k - (k-1) + j_s - (s-1)} a_{i_k j_s} \overline{M}_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} M_{\{j_1, \dots, j_{k-1}, j_k\} \setminus \{j_s\}}^{i_1, \dots, i_{k-1}} \cdot (-1)^{i_1 + \dots + i_{k-1} + j_1 + \dots + \widehat{j_s} + j_k}$$

В итоге:

$$\sum_{j_1 < \dots < j_k} (-1)^{i_1 + \dots + i_k + j_1 + \dots + j_k} \overline{M}_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \sum_{s \in \{1, \dots, k\}} (-1)^{-(k-1) - (s-1)} a_{i_k j_s} M_{\{j_1, \dots, j_{k-1}, j_k\} \setminus \{j_s\}}^{i_1, \dots, i_{k-1}}$$

А это будет разложением по k -ой строчке $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}$, откуда получаем искомое. Q.E.D.

~~Кажется, вам тяжело! Единый общероссийский телефон доверия:~~

~~Позвонить 8-800-2000-122~~

2.6.6. Второе определение ранга матрицы.

$\text{rg } A$ называется наибольший порядок минора отличного от нуля, то есть $\text{rg } A = k$, если существует минор k -ого порядка не равный нулю, а любой минор большего порядка равен 0. Такой минор называется базисным, а строки и столбцы, входящие в этот минор — базисными.

Базисный минор не определён единственным образом.

Замечание. Если все миноры $k + 1$ порядка 0, то все миноры порядка больше $k + 1$ тоже 0. (очевидно из разложения по строчке или столбцу)

Теорема (об эквивалентности двух определений ранга)

$$\text{rg } A_{\text{def } 1} = \text{rg } A_{\text{def } 2}$$

Доказательство:

Давайте докажем, что $\text{rg } A_{\text{def } 1} \geq \text{rg } A_{\text{def } 2}$.

Пусть $\text{rg } A_{\text{def } 1} = k \Rightarrow$ любые $(k+1)$ столбцов линейно зависимы $\Rightarrow$ любые отрезки длины $(k+1)$ будут линейно зависимы $\Rightarrow$ любой минор $(k+1)$ -ого порядка $= 0 \Rightarrow \text{rg } A_{\text{def } 2} \leq k = \text{rg } A_{\text{def } 1}$

Давайте докажем, что $\text{rg } A_{\text{def } 1} \leq \text{rg } A_{\text{def } 2}$

Пусть $\text{rg } A_{\text{def } 1} = k$, возьмём отрезки длины k , соответствующие базисным столбцам и строкам. Тогда отрезки столбцов будут линейно независимы, т.к. в противном случае, по утверждению 2 были бы линейно зависимы исходные столбцы $\Rightarrow$ получим минор k -ого порядка $\neq 0 \Rightarrow \text{rg } A_{\text{def } 2} \geq k = \text{rg } A_{\text{def } 1}$

Метод окаймляющих миноров.

$A \neq 0$

Алгоритм:

Берем смотрим на минор k -ого порядка $\neq 0$:

1. Если все его окаймляющие миноры 0, то $\text{rg } A = k$.
2. Если существует минор $(k+1)$ -ого порядка не равный 0, тогда $k++$ и повторить алгоритм

Окаймляющий минор - минор, строки и столбцы которого содержат строки и столбцы данного минора.

Пусть $M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k} \neq 0$, а все его окаймляющие его равны 0 $\Rightarrow \text{rg } A = k$

$$\forall i \forall j \notin (j_1, \dots, j_k) : \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \dots & a_{i_1 j_k} & a_{i_1 j} \\ a_{i_2 j_1} & \dots & a_{i_2 j_k} & a_{i_2 j} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{i_k j_1} & \dots & a_{i_k j_k} & a_{i_k j} \\ a_{i j_1} & \dots & a_{i j_k} & a_{i j} \end{vmatrix} = 0$$

Если i совпадает с каким-либо индексом из $i_1, \dots, i_k$, то это определитель с равными строками, значит нулевой. Если i не совпадает ни с одним индексом из $i_1, \dots, i_k$, то тогда это окаймляющий минор $(k+1)$ -го порядка, который нулевой по условию.

Разложим определитель по последней строке.

$$0 = \sum_{s=1}^k a_{i j_s} A_{i j_s} + a_{i j} (-1)^{k+1+k+1} \underbrace{M_{j_1 \dots j_k}^{i_1 \dots i_k}}_{\neq 0} - \text{не зависит от } i$$

$$\lambda_s = -\frac{A_{i j_s}}{M_{j_1, \dots, j_k}^{i_1, \dots, i_k}}$$

$$\forall i : a_{i j} = \sum_{s=1}^k a_{i j_s} \lambda_s \Leftrightarrow A_j = \sum_{s=1}^k A_{j_s} \lambda_s$$

мы показали, что для $\forall j \notin \{j_1, \dots, j_k\}$ столбец A_j — линейная комбинация k линейно независимых столбцов $A_{j_1}, \dots, A_{j_k} \Rightarrow \text{rg } A = k$.

2.6.7. Определитель n -ого порядка.

Приведение к треугольному виду.

$$\Delta_n \begin{pmatrix} a_1 & x & x & \dots & x \\ x & a_2 & x & \dots & x \\ x & x & a_3 & \dots & x \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x & x & x & \dots & a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & x & x & \dots & x \\ x - a_1 & a_2 - x & 0 & \dots & 0 \\ x - a_1 & 0 & a_3 - x & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x - a_1 & 0 & 0 & \dots & a_n - x \end{pmatrix} =$$

$$= \prod_{k=1}^n (a_k - x) \begin{vmatrix} \frac{a_1}{a_1 - x} & \frac{x}{a_2 - x} & \frac{x}{a_3 - x} & \dots & \frac{x}{a_n - x} \\ -1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= \prod_{k=1}^n (a_k - x) \begin{vmatrix} \sum & \frac{x}{a_2 - x} & \frac{x}{a_3 - x} & \dots & \frac{x}{a_n - x} \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

Откуда уже можно легко посчитать определитель.

Метод выделения линейных множителей

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = p(x_i)$$

Заметим, что когда $x_i = x_j$ определитель равен 0. Тогда

получаем, что определитель должен делиться на каждый из корней (раскладывается в произведение корней)

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \dots & x_1^n \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \dots & x_2^n \\ 1 & x_3 & x_3^2 & \dots & x_3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \dots & x_n^n \end{vmatrix} = p(x_i) = (x_1 - x_2) \cdot (x_1 - x_3) \cdot \dots \cdot (x_1 - x_n) \cdot (x_2 - x_3) \cdot \dots \cdot (x_{n-1} - x_n) C$$

Посмотрим на Δ_n как на многочлен от x_n

$$\Delta_n = (x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1}) c' = \Delta_{n-1} x_n^{n-1} + \dots, \text{ при этом } \Delta_{n-1} = \text{const}, \text{ т.к. не содержит } x_n.$$

$$c' = \Delta_{n-1}$$

$$\Delta_n = (x_n - x_1)(x_n - x_2) \dots (x_n - x_{n-1})(x_{n-1} - x_n) \dots (x_{n-1} - x_{n-2}) \Delta_{n-2} =$$

$$= \prod_{i>j} (x_i - x_j)$$

Метод рекуррентных соотношений

Возвратная последовательность. Пример. $x_2 = 2, x_1 = 4$. Рекуррентная последовательность задается выражением $x_n = x_{n-1} + 2x_{n-2}$. Можно получить явное выражение.

Пример решения. $x_1 = 3, x_2 = 9, x_n = 3x_{n-1} - \frac{9}{4}x_{n-2}, n > 2$.

Подставим вместо $x_n = \lambda^n$ (не спрашивайте почему, там огромный кусок теорий и объяснений)

$\lambda^n = 3\lambda^{n-1} + \frac{9}{4}\lambda^{n-2}$. Переведем в квадратное, решим, найдем корни. Получим $\lambda_{1,2} = \frac{3}{2}$

Тк лямбды совпали, то второй корень умножаем на n :

$$x_n = c_1 \left(\frac{3}{2}\right)^n + c_2 n \left(\frac{3}{2}\right)^n$$

$$3 = x_1 = c_1 \left(\frac{3}{2}\right) + c_2 \left(\frac{3}{2}\right)$$

$$x_2 = c_1 \left(\frac{3}{2}\right)^2 + c_2 2 \left(\frac{3}{2}\right)^2 = 9$$

Найдём c_1 и c_2 , получим явно выражение.

Глава 3

Информация о курсе.

Преподаватель – Кучерук Екатерина Аркадьевна

Конспект писался Чепелиным Вячеславом и Альжановым Леонидом.

По редакцией Е.А. Кучерук.

Огромное спасибо за большое количество правок:

1. Бородулину Фёдору
2. Солянику Егору
3. Свешникову Борису