


Na téma Volské oko

Toto vejce má časovač a špatnou náladu. Raději ho nenechávejte bez dozoru.

Vypočítejte správnou teplotu a čas pro smažení vejce.



- Identifikujte typ vejce, které máte. Použijte tabulky jedna a dvě k získání latinského názvu vejce.
- Než vejce položíte na pánev, ujistěte se, že je pánev předeřtá na správnou teplotu. Použijte níže uvedené podmínky jako referenci.
 - Pokud se vejce po předeřtí začne třást, nastavte teplotu na nejvyšší hodnotu.
- Poté vypočítejte časový posun pomocí vzorce níže. Toto číslo udává, o kolik dále od nuly na časovači je ideální čas na smažení.
- Jakmile je pánev předeřtá na správnou teplotu, položte vejce na pánev. Časovač se automaticky spustí. *Pokud je nastavena nesprávná teplota, dostanete chybu. (Časovač poběží rychleji, pokud je toto poslední nevyřešený modul)*
- Když je dosaženo ideálního času na smažení, vejce je hotové a musíte vypnout teplotu. *(Musí být provedeno do 5 sekund)*

Vejce s pruhy

Základ \ Nádech	Zelená	Šedá	Modrá	Růžová
Béžová	<u>Ovolumen viristria</u>	<u>Ovolumen grisestria</u>	<u>Ovolumen caerulestria</u>	<u>Ovolumen purpurestria</u>
Oranžová	<u>Fulvovum viristria</u>	<u>Fulvovum grisestria</u>	<u>Fulvovum caerulestria</u>	<u>Fulvovum purpurestria</u>
Zelená	<u>Herbovum viristria</u>	<u>Herbovum grisestria</u>	<u>Herbovum caerulestria</u>	<u>Herbovum purpurestria</u>
Šedá	<u>Cinereovum viristria</u>	<u>Cinereovum grisestria</u>	<u>Cinereovum caerulestria</u>	<u>Cinereovum purpurestria</u>

Vejce s tečkami

Základ \ Nádech	Zelená	Šedá	Modrá	Růžová
Béžová	<u>Ovolumen viripuncta</u>	<u>Ovolumen griseipuncta</u>	<u>Ovolumen caeruleipuncta</u>	<u>Ovolumen purpureipuncta</u>
Oranžová	<u>Fulvovum viripuncta</u>	<u>Fulvovum griseipuncta</u>	<u>Fulvovum caeruleipuncta</u>	<u>Fulvovum purpureipuncta</u>
Zelená	<u>Herbovum viripuncta</u>	<u>Herbovum griseipuncta</u>	<u>Herbovum caeruleipuncta</u>	<u>Herbovum purpureipuncta</u>
Šedá	<u>Cinereovum viripuncta</u>	<u>Cinereovum griseipuncta</u>	<u>Cinereovum caeruleipuncta</u>	<u>Cinereovum purpureipuncta</u>

Teplota ohřevu:

Najděte první podmínku, která platí. Pokud je vypočítané číslo mimo rozsah 1-3, přičtěte nebo odečtěte 3, dokud nedosáhnete rozsahu.

- Pokud je vaše vejce Cinereovum a máte alespoň 2 baterie, nastavte teplotu na 2.
- Pokud je vaše vejce grisestria, nastavte teplotu na poslední číslici sériového čísla.
- Pokud je vaše vejce Ovolumen a je přítomen indikátor SIG, nastavte teplotu na celkový počet portů.
- Pokud je vaše vejce Fulvovum a máte přesně 3 držáky na baterie, nastavte teplotu na 3.
- Pokud je vaše vejce viripuncta, předehejte na počet nerozsvícených indikátorů.
- Pokud je vaše vejce Herbovum a bomba má více modulů než portů, předehejte na 1.
- Pokud je vaše vejce caerulepuncta, nastavte teplotu na počet modulů.
- Pokud je vaše vejce Fulvovum a nejsou žádné rozsvícené indikátory, nastavte teplotu na 1.
- Pokud je vaše vejce purpurestria, nastavte teplotu na 3.
- Pokud je vaše vejce viristria, nastavte teplotu na počet držáků na baterie.
- Jinak nastavte teplotu na 2.

Časový posun:

První číslice v sériovém čísle je lichá	První číslice v sériovém čísle je sudá
Držáky na baterie - (Teplota ohřevu * 4)	(Teplota ohřevu * 3) + Porty - Nezapálené indikátory