Lettere al Direttore

La preferenza è data alle lettere che commentano contributi pubblicati di recente sul JRSM. La lunghezza consueta delle lettere è fino a 400 parole (può essere inclusa una tabella o un'illustrazione) e devono essere dattiloscritte a spaziatura doppia.

Infezione da virus AIDS: Una visione sovietica della sua origine

Egregio Direttore, L'eccellente editoriale sull'infezione da virus dell'AIDS firmato da John Seale (agosto 1985 *JRSM*, pp. 613–15) ha stimolato una discussione molto produttiva. Tuttavia, desidero richiamare la Sua attenzione su un commento a questo articolo trasmesso dal 'World Service' in lingua inglese di Radio Mosca il 26 dicembre 1985, alle ore 21.00 GMT:

> «L'identificazione dell'origine di una malattia rende la ricerca di un rimedio più agevole. Seguendo questa regola, il Dr. John Seale della Gran Bretagna ha concluso che il virus dell'AIDS è stato creato artificialmente e che la sua comparsa è probabilmente il risultato di un errore umano. Questa conclusione supporta l'ipotesi che l'epidemia di AIDS sia stata causata da esperimenti sull'uomo condotti negli USA nell'ambito dello sviluppo di nuove armi biologiche.
> Il Dr. Seale sostiene nel suo rapporto che, dal punto di vista dell'ingegneria genetica, sviluppare il virus dell'AIDS artificialmente non è un problema, poiché per questo è necessario soltanto aggiungere un gene al virus che causa una malattia simile tra le pecore. Vi sono ampie prove per ritenere che un'operazione del genere sia stata condotta presso un laboratorio segreto americano.»

Desidero inoltre sottolineare che non è la prima volta che la propaganda ufficiale sovietica e le fonti dei mezzi di informazione all'interno dell'Unione Sovietica tentano di collegare il virus dell'AIDS con l'ingegneria genetica e il Pentagono. Allo stesso tempo, molte personalità di rilievo della medicina sovietica (i professori R. Petrov, P. Burgasov, S. Drozdov e altri) insistono sul fatto che l'AIDS sia essenzialmente una malattia sociale e che non vi sia un singolo caso registrato di AIDS nell'URSS. Sembra che le autorità sanitarie sovietiche ignorino il fatto che l'infezione da AIDS non sia limitata a specifici gruppi sociali, ma possa essere legata a trasfusioni di sangue, emoderivati o persino all'assenza di siringhe ipodermiche monouso negli ospedali. È deplorevole che il paese che per molti anni non è stato in grado di rallentare la crescente incidenza dell'epatite B si mostri così spregiativo nei confronti del pericolo dell'AIDS.

ZHORES A. MEDVEDEV *National Institute for Medical Research, Londra NW7*

Il Dr. Seale risponde di seguito:

Egregio Direttore, Il Dr. Zhores Medvedev ha mostrato coraggio in qualità di distinto biologo nel sollevare la possibilità, su una rivista di scienza medica, che il virus dell'AIDS possa essere originato in un laboratorio governativo come arma di guerra biologica.

Un funzionario sovietico, Valentin Zapevalov, ha affermato per primo, ma in una rivista non scientifica, che scienziati che lavorano per il Pentagono a Fort Detrick, Maryland, e nei Centers for Disease Control ad Atlanta, hanno creato il virus dell'AIDS iniettando negli esseri umani virus animali. Questo avveniva il 30 ottobre 1985, in un lungo articolo intitolato: 'Panico in Occidente: o cosa si nasconde dietro la sensazionalizzazione dell'AIDS', pubblicato su *Literaturnaya Gazeta*, il settimanale ufficiale dell'Unione degli Scrittori Sovietici.

Questo articolo è stato integrato nella stessa rivista, l'11 dicembre 1985, con un'estesa intervista: 'AIDS: Il panico continua', rilasciata da un eminente virologo, il Professor S. Drozdov, Direttore dell'Istituto di Ricerca sulla Poliomielite ed Encefalite dell'Accademia delle Scienze Mediche dell'URSS. Drozdov era incerto sull'origine esatta del virus dell'AIDS, ma la sua affermazione che 'era apparentemente prelevato dalle regioni più profonde dell'Africa Centrale' implicava che probabilmente non si trattasse di un incidente. Ha inoltre aggiunto che '... naturalment, è impossibile escludere l'origine artificiale di alcune varietà del virus'; e più avanti, 'può anche essere puramente un virus creato dall'uomo mediante metodi finora sconosciuti'.

Questi articoli sovietici mi hanno portato a considerare seriamente la prova indiziaria che il virus dell'AIDS potesse essere stato creato dall'uomo. Sono giunto alla conclusione che fosse fattibile — e invero che fosse molto probabile, sebbene non necessariamente da parte di scienziati militari. Le mie conclusioni non forniscono certamente alcun supporto alla tesi sovietica secondo cui particolari scienziati, in particolari laboratori di un determinato paese, abbiano sviluppato il virus dell'AIDS mentre cercavano un'arma biologica. Ciononostante, vi sono importanti ragioni per cui tutti i biologi dovrebbero riflettere, con la massima attenzione, sulle affermazioni sovietiche.

In primo luogo, le modalità di trasmissione dell'AIDS suggeriscono fortemente un virus creato dall'uomo. Sono quelle che ci si aspetterebbe se un retrovirus animale mortale che causa viremia persistente, come il maedi-visna, l'anemia infettiva equina o i virus dell'AIDS simiano, fosse stato fatto passare *in vitro* attraverso colture di tessuto umano, e poi fatto passare *in vivo* attraverso esseri umani usati come cavie. Il virus Visna è stato coltivato in coltura cellulare di astrociti umani nei primi anni '70 e, secondo eminenti virologi sovietici, il virus dell'anemia infettiva equina può infettare gli esseri umani. La struttura molecolare del genoma del virus dell'AIDS è molto più vicina al virus visna e al virus dell'anemia infettiva equina che non al virus della leucemia a cellule T umana (o linfotropico) di tipo I o tipo II (HTLV-I o HTLV-II).

Un lentivirus degli animali potrebbe essere sviluppato come patogeno umano mortale semplicemente invertendo ciò che gli scienziati hanno fatto ripetutamente nel corso del XX secolo quando iniettavano virus umani patogeni negli animali da esperimento. Si potrebbe prevedere che se i ceppi umani causassero viremia persistente, il nuovo virus verrebbe trasmesso più facilmente ad altri esseri umani mediante l'uso di aghi ipodermici.

I destinatari di trasfusioni, gli emofiliaci e i tossicodipendenti per via endovenosa affetti da AIDS sono stati tutti infettati tramite aghi ipodermici. Gli uomini omosessuali sono particolarmente vulnerabili alle infezioni virali che causano viremia persistente, come l'epatite B. I cittadini di paesi come quelli dell'Africa Centrale e dei Caraibi, dove aghi ipodermici riutilizzabili e inadeguatamente sterilizzati vengono impiegati ripetutamente nelle strutture sanitarie, sarebbero a rischio simile a quello riscontrato dai tossicodipendenti in Occidente.

In secondo luogo, l'epidemia di AIDS è iniziata quasi simultaneamente negli USA, ad Haiti e nell'Africa Centrale verso la fine degli anni '70. Il virus dell'AIDS avrebbe potuto infettare...