AIDS MAN-MADE IN USA

Stefan Heym, uno degli autori più letti in entrambe le Germanie e saggista polemico, ha scoperto da un medico amico uno studio di 50 pagine del biologo di Berlino Est Jakob Segal. L'ex direttore dell'Istituto di Biologia Generale dell'Università Humboldt era appena tornato da Harare (Zimbabwe). L'opera scientifica di Segal sull'origine del virus dell'AIDS lo ha affascinato.

La traccia portava all'Istituto di Ricerca Militare di Fort Detrick, USA. Stefan Heym è rimasto affascinato e ha interrogato lo scienziato sui risultati delle sue ricerche genetiche ed epidemiologiche.

Stefan Heym: Signor Professor Segal, i fatti di cui vogliamo parlare con lei sono di tale portata che vorrei chiederle innanzitutto di descrivere brevemente il suo campo di attività per i nostri lettori in relazione al virus dell'AIDS.

Jakob Segal: Sono un biologo. Per molti anni ho diretto l'Istituto di Biologia Generale presso la Humboldt-Universität di Berlino. Il mio campo di lavoro era ed è tuttora la ricerca sulle proteine e sulla biologia molecolare; qui mi occupo principalmente della struttura delle proteine e dell'apparato genetico, che determina il modo in cui le proteine sono costruite. Molto di quello che so sull'argomento deriva dalla letteratura specialistica sull'immunologia, e poiché il sistema immunitario viene gravemente danneggiato dall'AIDS, conosco la letteratura recente e ho condotto ricerche approfondite sui miei dati.

I suoi lavori scientifici sull'origine dell'AIDS li ho letti. Sulla base di questi, come è arrivato all'idea di occuparsi in modo specifico del virus dell'AIDS?

Inizialmente non ne avevo l'intenzione. È stato nel mese di agosto 1985 che ho letto sui media la teoria secondo cui l'AIDS si sarebbe sviluppato da un innocuo virus africano della scimmia verde. Da biologo, la cosa mi è sembrata biologicamente del tutto improbabile, così ho deciso di indagare.

Chi ha sviluppato ed formulato originariamente questa teoria?

È stata formulata per la prima volta dal Dr. Max Essex negli USA. Essex è un rinomato virologo. Ma questa teoria non è stata pubblicata su una rivista scientifica specialistica. La stampa ne ha dato grande risalto, ma quando Essex ne ha parlato in due congressi nell'aprile 1985 ad Atene e a Bruxelles, non ha presentato alcun documento scritto in merito.

Un secondo fatto mi è apparso strano: nei mesi successivi si è sostenuto che questo virus delle scimmie fosse presente anche in molte persone sane in Africa e negli USA, senza causare alcuna malattia. Una trasformazione di questo virus non patogeno delle scimmie in un virus mortale per l'uomo sarebbe talmente complessa da essere praticamente impossibile.

Esiste un gruppo di ricercatori giapponesi guidati dal Professor Watanabe che ha esaminato il genoma del virus delle scimmie e dell'AIDS, scoprendo che la divergenza tra i due virus è fondamentale.

Lei è giunto alla conclusione, Signor Professor Segal, che il Professor Max Essex abbia fornito una pista falsa deliberatamente?

È una falsa pista consapevole, per deviare l'attenzione da dove la cosa è realmente nata.

Se i suoi lavori sono così chiari, vi sono altri colleghi che si sono occupati di questa ipotesi?

Se si osservano i dati epidemiologici, le caratteristiche cliniche dell'AIDS e la struttura dei due virus, si giunge inevitabilmente a questa conclusione. Ci sono altri ricercatori, non biologi ma studiosi di scienze materiali, che ne sono certi.

La prima ricerca su questo tema è stata condotta da un gruppo di ricercatori francesi nell'estate del 1983. Hanno isolato il virus per primi da un paziente affetto da AIDS negli USA.

Professor Luc Montagnier e il suo gruppo dell'Institut Pasteur hanno fatto proprio questo. Hanno chiamato questo virus LAV (Lymphadenopathy Associated Virus), un virus che distrugge le cellule linfatiche.

Tre mesi dopo Montagnier, il virus dell'AIDS è stato identificato negli USA presso il laboratorio del Professor Gallo a Bethesda, Maryland. Montagnier sostiene che Gallo avesse campioni del suo virus LAV per fare un confronto.

Nel 1983 nessuno sapeva ancora cosa fosse esattamente questo virus dell'AIDS?

Non si sapeva nemmeno se fosse un virus o una combinazione.

— o se il virus di Montagnier fosse identico all'HTLV-III.

Il virus HTLV-I, come Gallo ha dimostrato, causa una forma di leucemia, un tipo di cancro alle cellule ematiche...

Linfoma da T-cellule?

Sì. Questo HTLV-I è frequente in Giappone e nei Caraibi, ma raro negli USA e in Europa. Poco dopo, Gallo ha descritto un secondo virus della stessa famiglia: HTLV-II. Credeva che l'AIDS fosse imparentato con questi due virus e gli ha dato il nome HTLV-III.

Tuttavia, il gruppo di Montagnier all'Institut Pasteur ha analizzato la struttura del genoma e ha scoperto che le differenze tra HTLV-I e HTLV-III sono enormi, dimostrando che appartengono a famiglie virali completamente diverse.

Perché le cellule T si chiamano T-cellule e non X o Y?

Perché queste cellule provengono dal timo, un organo ghiandolare nel collo dietro lo sterno. Il timo produce le cellule T, che hanno un compito fondamentale nel sistema immunitario: controllano le difese dell'organismo e distruggono gli agenti patogeni.

Quando il virus dell'AIDS distrugge le cellule T, l'organismo rimane privo di difese immunitarie e non può più combattere le infezioni.

Le cellule T dirigono la produzione di anticorpi contro i patogeni. Senza le T-cellule non funziona nulla. Se il virus dell'AIDS distrugge o rende inattive le T-cellule, non possono più formarsi anticorpi.

Il pericolo dell'AIDS sta proprio nel fatto che malattie che normalmente non preoccuperebbero la salute umana possono diventare mortali a causa della perdita delle difese immunitarie.

(Inizio dell'articolo continua alla pagina successiva)

RETTIFICA

Accidenti, ancora una volta «Fairness ahead», l'inserto della taz, è stato fantastico negli ultimi giorni, nonostante tutti i risentimenti della redazione...

Servizio giornalistico di prima classe da e su Stoccarda: chiaro, preciso e informativo. Venerdì scorso poi, con il contributo del nostro autore...