UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA-LEÓN

UNAN-LEÓN

ÁREA DE CIRUGIA DENTAL

ÁREA DE MEDICINA ORAL

PERIODONCIA

"NOMENCLATURA DEL PERIODONTOGRAMA"

ELABORADO POR: COLECTIVO PERIODONCIA

Dr. Jordan Barahona
Dra Eyra Espinoza
Dra Alba Ximenez
Dra Glenda Juárez
Dra. Yanelli Guevara

León, 01 MAYO 2024

PERIODONTOGRAMA.

La enfermedad periodontal es una patología de origen multifactorial que se manifiesta tanto de manera clínica como radiográficamente con signos variables que pueden ser medibles y registrables. Un correcto Diagnostico periodontal es necesario para la realización de una terapia periodontal exitosa en nuestros pacientes. De manera que el diagnóstico es un análisis reflexivo de la expresión clínica de la enfermedad. El periodontograma es una forma gráfica de representar el estado periodontal del paciente.

Se basa en el uso de 5 colores (rojo, negro, azul, naranja y verde) los cuales representan distinta simbología y a continuación se presenta:

SE UTILIZARÁ EL COLOR ROJO PARA:

1. Dibujar el margen gingival.
2. Remarcar áreas de inflamación gingival.
3. Marcar los puntos sangrantes.
4. Borde defectuoso de restauraciones.
5. Dibujar un círculo que indica fístula.
6. Endodoncia (se pinta de acuerdo al estado radiográfico)
7. Furcas (se dibuja un círculo en la furca afectada).
8. Lesión periapical.
9. Caries.
10. Restos radiculares
11. Exudados

SE UTILIZARÁ EL COLOR NEGRO PARA:

1. Marcar las bolsas periodontales.
2. Colorear dientes ausentes (colorearlo completamente).
3. Dibujar la posición del diente incluido o retenidos sin colorearlo.
4. Impactación de alimentos. (Flecha en dirección al margen)
5. Diastemas (dos líneas verticales paralelas) 6. Desgaste dental por atrición, abrasión, bruxismo.
7. Fractura dental.
8. Ganchos o apoyos de removibles
9. Extraciones indicadas
10. Organos dentales en prótesis total, la corona en azul colocar TOTAL o EDENTULO según sea el caso.

SE UTILIZARÁ EL COLOR AZUL PARA:

1. Colorear restauraciones de amalgama.
2. Colorear la corona de dientes con prótesis fija(metal o porcelana,coronas ¾; coronas de implantes la raíz se bordeara como festoneada
3. Flecha que indica la migración, rotación y extrusión de un diente, mesialización,distalización, impactación de alimentos.
4. Prótesis parcial removible dibujando el gancho sobre el diente pilar.
5. Implante

SE UTILIZARÁ EL COLOR NARANJA PARA:



1. Colorear dientes y pónticos de una prótesis provisional.
2. Colorear restauraciones de resina.
3. Protesis de Vayplass la coronas en color anaranjado y raíces negras.

4. Carillas
5. Endopostes
6. Reconstruciones con fibras de pilietileno sobre la supercie dental que lo posea.


SE UTILIZARÁ EL COLOR VERDE PARA:


1. Dibujar línea mucogingival.

Para dibujar el margen gingival, se deberá obtener primero la distancia que existe entre el margen gingival y la unión amelocementaria, de esta manera, el margen podrá estar coronal, a nivel o apical a la unión amelocementaria.




COLOR ROJO	
Margen gingival: Para dibujar el margen gingival se deberán llenar las casillas correspondiente a cada diente y que se presentan en el periodontograma. El margen es la relación entre margen de la encía y la unión amelocementaria, por lo tanto, el margen podrá estar coronal, a nivel o apical a la unión amelocementaria. Cuando el margen se encuentra apical a la unión amelocementaria, los números en las casillas estarán precedidos por el signo negativo "-". Cuando se encuentra a nivel de la unión amelocementaria tendrá un valor de cero "0", y cuando esté coronal, se pondrá únicamente el número.	
Remarcar áreas de inflamación: Una vez que se ha dibujado el margen gingival, se deberá remarcar un poco más el área de la inflamación. Por lo general esta coincidirá con puntos sangrantes.	


Marcar puntos sangrantes: Estos se marcarán en el área que mostró la hemorragia al sondaje y por lo tanto, se maracará a la par del número en la casilla de sondaje.	


Bordes defectuosos de una prótesis: Se bordeará la restauración que presenta filtración, desajuste o fractura. Esta podrá ser parcial o completa. La figura muestra una restauración con todo su borde defectuoso (completa).	
Círculo que marca una fístula y endodoncias: Este círculo se dibujará en el sitio que se encuentre la fístula. Para dibujar las endodoncias, previamente se deberá haber tomado una radiografía y ésta se dibujará según lo muestre la radiografía. Se dibujarán por vestibular y lingual/palatino.	


Lesión de furca: La detección de la lesión de furca se hará con la sonda de Nabers, de manera visual por recesión gingival o en una radiografía. Se marcará el grado de la lesión de furca en su casilla correspondiente en el periodontograma. La lesión de furca podrá ser solo por vestibular o lingual o en ambos lados.	

Lesión periapical: Se dibujará un círculo en el ápice del diente afectado. La lesión periapical se dibujará por vestibular y lingual/palatino.	


Caries: Esta se dibujará en la cara del diente afectado y con la extensión que esta presenta. La caries puede ser solo en surcos y fisuras o destruir la corona del diente.	
Flecha que indica exudado: La dirección de la flecha será hacia incisal u oclusal y se colocará en el sitio que se encuentra el exudado. Los restos radiculares se pintará todo de rojo siempre con previa radiografía	
COLOR NEGRO:	
Marcar bolsas periodontales: para dibujar las bolsas periodontales se deberá llenar primero la casilla de margen y la casilla de sondaje. Se dibujará primero el margen y luego la bolsa. Se podrán encontrar bolsas en un solo punto del diente o en los tres puntos del dientes ya sean vestibular o lingual/palatino. Nótese que las bolsas periodontales se dibujan con líneas oblícuas.	


Colorear dientes ausentes: Deberá tomarse previamente una radiografía periapical para confirmar la ausencia total del diente. Cuando así sea, se dibujará el diente completamente en negro, además, en su casilla correspondiente se trazará una línea a lo largo de todas las casillas. Se dibujará por vestibular y lingual/palatino.	


Dibujar la posición del diente incluido sin colorearlo completamente: Se habrá tomado previamente una radiografía periapical para confirmar la posición del diente incluido. A diferencia del diente ausente, este no se colorea por completo.	



	
Diastemas: Se utilizarán dos líneas paralelas entre los dientes que presentan el diastema. Se marcará por vestibular y lingual/palatino.	


Desgaste dental por atrición, abrasión, bruxismo: Se dibujará en los dientes que presenten el desgaste y el grado de desgaste. Se deberá dibujar por vestibular y lingual.	
Fractura dental: La fractura puede confundirse con el desgaste dental, sin embargo, por lo general, las fracturas son más amplias que los desgaste aunque no siempre. Deberá dibujarse por vestibular y lingual/palatino.	


COLOR AZUL	
Colorear restauraciones de amalgama: Se dibujarán en la cara del diente que presente la restauración, así como su forma y extensión.	

Colorear la corona de dientes con prótesis fija: Se pintará toda la corona en azul de los dientes que presentes restauración.la raíz del diente ausente debe pintarse en negro por estar ausente. Deberá dibujarse en vestibular y lingual/palatino.	


Flecha que indica migración, rotación y extrusión de un diente: La flecha indicará la dirección en la cual se encuentra la posición del diente.	

Prótesis parcial removible: Deben dibujarse en negro las raíces de los dientes ausentes, las coronas de los dientes artificiales deberán pintarse en azul y en los dientes pilares se dibujará el tipo de retenedor.	
Implante dental: La raíz del diente se bordeará con una línea azul quebrada y por contener una prótesis.	

COLOR NARANJA	
Colorear dientes y pónticos de una prótesis provisional: Este se dibujará similar a la prótesis fija definitiva, solo varía el color.	

Colorear restauraciones de resina: Similar a las restauraciones de amalgama, las restauraciones de resina se pintarán sobre la superficie que presente la restauración, la forma y la extensión que éstas presentan.	
COLOR VERDE	

Dibujar línea mucogingival: Para dibujar la línea mucogingival se deberá llenar la	

casilla correspondiente a su valor. Se tomará el valor del punto medio de cada uno de los dientes. Previo al dibujo de la línea mucogingival debe dibujarse el margen. La figura muestra un sondaje de cero “0” por encontrarse a nivel de la línea amelocementaria.	

La casilla que corresponde a: Lesión de Furca , se llenará anotando el grado de la lesión. La lesión de Furca se clasifica en: Cero (“0”): no hay lesión de furca; grado 1: La sonda de Nabers penetra de 1 a 3 mm, grado 2: la sonda de Nabers penetra más de 3 mm pero no más de 6mm, grado 3: la sonda de Nabers pasa de lado a lado (de vestibular a lingual y viceversa).

La casilla de Movilidad dental se llenará anotando el grado de la movilidad. Movilidad cero (“0”): movilidad fisiológica del diente. Movilidad grado 1: el diente se mueve en sentido vestibular-palatino/lingual no más de 1mm; Movilidad grado 2: el diente se mueve en sentido vestibular-palatino/lingual más de 1mm pero sin intrusión; Movilidad grado 3: el diente se mueve en sentido vestibular-palatino/lingual con intrusión.

La casilla de Percusión , se deberá realizar la prueba de percusión vertical y horizontal. Se colocará el signo de “+”(positivo) ó “-“ (negativo) precediendo a la letra de “v”para percusión vertical y/o “h” para percusión horizontal. Ejemplo: +V –H

Una vez realizado el tratamiento periodontal del paciente, se realizará su respectiva reevaluación un mes después. En este momento se diagnosticará nuevamente y se decidirá su tratamiento adecuado. La hoja de periodontograma consta además de un espacio para evaluar al paciente durante de dos citas de mantenimiento. Las casillas se llenarán de la misma manera a lo expuesto anteriormente y escribirá la fecha en que se realizaron los mantenimientos.

REFERENCIAS

- Newman Y Carranza. Periodontología Clínica Esencial. (2023). España: Elsevier Health Sciences.

- (Barahona,Ximenez, Espinoza,Juárez,Guravara, 2024)