

Advanced Mathematics: The Method of Differentiation of Multivariate Functions and Its Applications

Wuhan University

Lai Wei

March 30, 2025

目录

1	多元函数的基本概念	1
1.1	平面点集	1
1.1.1	坐标平面	1
1.1.2	平面点集	1
1.1.3	邻域	1
1.1.4	聚点	2
1.1.5	由点集所属类的特征分类	2
1.2	多元函数的概念	3
1.2.1	二元函数	3
1.2.2	值域	3
1.2.3	推广	3
1.2.4	自然定义域	3
1.2.5	二元函数的图形	4
1.3	多元函数的极限	4
1.4	多元函数的连续性	5
1.4.1	连续性的定义	5
1.4.2	间断点的定义	5
1.4.3	连续函数的运算	5
1.4.4	多元初等函数	5
1.4.5	有界闭区域上多元函数连续函数的性质	5
1.5	例题	6
1.5.1	Problem 1	6
1.5.2	Problem 2	6
1.5.3	Problem 3	7
2	偏导数	7
2.1	偏导数的定义及其算法	7
2.1.1	定义	7
2.1.2	偏导数的求法	8
2.1.3	偏导数的几何意义	8
2.2	高阶偏导数	9
2.3	例题	9
2.3.1	Problem 1	9
3	全微分	10
3.1	全微分的定义	10
3.1.1	偏增量、偏微分	10
3.1.2	全增量	10
3.1.3	全微分的定义	11
3.1.4	例题	11

3.2	可微分的条件	12
3.3	全微分公式	13
4	多元复合函数求导法则	13
4.1	中间变量为一元函数情形	13
4.2	中间变量为多元函数情形	14
4.3	混合情形	15
4.4	抽象复合函数求偏导	15
4.5	全微分的形式不变性	15
5	隐函数的求导公式	16
5.1	隐函数的类型	16
5.1.1	一个方程的情形	16
5.1.2	方程组的情形	16
5.2	一个方程的情形	16
5.2.1	定理	16
5.2.2	例题	18
5.3	方程组的情形	19
5.3.1	定理	19
5.3.2	例题	20
6	多元函数微分学应用	23
6.1	向量值函数及其导数	23

1 多元函数的基本概念

1.1 平面点集

1.1.1 坐标平面

建立了坐标系的平面。二元有序实数组 (x, y) 的全体, 即 $\mathbf{R}^2 = \mathbf{R} \times \mathbf{R} = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbf{R}\}$ 就表示坐标平面。

1.1.2 平面点集

坐标平面上具有某种性质 P 的点的几何, 称作平面点集, 记作

$$E = \{(x, y) \mid (x, y) \text{ 具有某种性质 } P\}$$

1.1.3 邻域

设 $P_0(x_0, y_0)$ 是 xOy 平面上一点, δ 是某一正数, 与点 $P_0(x_0, y_0)$ 距离小于 δ 的点 $P(x, y)$ 的全体, 称为 P_0 的 δ 邻域, 记作 $U(P_0, \delta)$, 即

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid |PP_0| < \delta\}$$

或

$$U(P_0, \delta) = \left\{ (x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \right\}$$

注意

1. 点 P_0 的去心邻域, 记作 $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$, 即

$$\overset{\circ}{U}(P_0, \delta) = \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\}$$

2. 若不强调 δ , 也可记作 $U(P_0)$, $\overset{\circ}{U}(P_0)$

利用点与点集的关系, 可知

若有一点 $P \in \mathbf{R}^2$, 任意点集 $E \subset \mathbf{R}^2$

1. 内点: $\exists U(P)$, 使 $U(P) \subset E$, 则 P 为 E 的内点。
2. 外点: $\exists U(P)$, 使 $U(P) \cap E = \phi$, 则 P 为 E 的外点。
3. 边界点: $\forall U(P)$, 若 $U(P)$ 即有属于 E 的点, 又有不属于 E 的点, 则 P 为 E 的边界点。
4. E 的边界: E 的边界点的全体, 记作 ∂E

1.1.4 聚点


如果对于任意给定的 $\delta > 0$ ，点 P 的去心邻域 $\dot{U}(P, \delta)$ 内总有 E 中的点，那么称 P 是 E 的聚点。

例如，若 $E = \{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$ 。则 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $x^2 + y^2 = 2$ 都是 E 的聚点。

1.1.5 由点集所属类的特征分类

1. 开集：若点集 E 中的所有点都是 E 的内点，则称 E 为开集；
2. 闭集：若点集 E 的边界 $\partial E \in E$ ，则称 E 为闭集。

例如， $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 为开集， $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ 为闭集， $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 \leq 2\}$




1. 连通集：如上图(a)；
2. 非连通集：如上图(b)。

1. 开区域（也简称区域）：连通的开集；
2. 闭区域：开区域连同其边界一起构成的点集。

如 $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 2\}$ 为(开)区域； $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 2\}$ 为闭区域。

1. 有界集：对于集合 E ，若 $\exists r > 0$ ，使 $E \subset U(0, r)$ ，则称 E 是有界的。（就是说能找到一个“圆”把集合 E 包裹起来）
2. 无界集：若一个集合不是有界集，则称其为无界集。

例如， $\{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 为无界开区域； $\{(x, y) \mid x + y \geq 0\}$ 为无界闭区域。



1.2 多元函数的概念

1.2.1 二元函数

设 D 是 \mathbf{R}^2 的一个非空子集, 称映射 $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ 为定义在 D 上的二元函数, 通常记为

$$z = f(x, y), (x, y) \in D \quad (1.1)$$

或

$$z = f(P), P \in D \quad (1.2)$$

1.2.2 值域

上述定义中, 与自变量 x 和 y 的一对值 (即二元有序实数组) (x, y) 相对应的因变量 z 的值, 也称为 f 在点 (x, y) 处的函数值, 记作 $f(x, y)$, 即 $z = f(x, y)$ 函数值 $f(x, y)$ 的全体所构成的集合为函数 f 的值域, 记作 $f(D)$, 即

$$f(D) = \{z \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\} \quad (1.3)$$

1.2.3 推广

三元函数: $u = f(x, y, z), (x, y, z) \in D$;

n 元函数: $u = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n), (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in D$

1.2.4 自然定义域

使算式有意义的点的集合。

例如 $z = \ln(x + y)$ 的自然定义域为 $D = \{(x, y) \mid x + y > 0\}$ 。 $z = \arcsin(x + y)$ 的自然定义域为 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 。

1.2.5 二元函数的图形

设函数 $z = f(x, y)$ 的定义域为 D 。对于任意取定的点 $P(x, y) \in D$ ，对应的函数值为 $z = f(x, y)$ 。这样，以 x 为横坐标， y 为纵坐标和 $z = f(x, y)$ 为竖坐标在空间就确定一点 $M(x, y, z)$ 。当 x, y 遍取 D 上的一切点时，得到一个空间点集

$$\{(x, y, z) \mid z = f(x, y), (x, y) \in D\} \quad (1.4)$$

这个点集称为二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形，通常我们也说二元函数的图形是一张曲面。

例如，由空间解析几何知道，线性函数 $z = ax + by + c$ 的图形是一张平面，而函数 $z = x^2 + y^2$ 的图形是旋转抛物面。

1.3 多元函数的极限

如果在 $P(x, y) \rightarrow P_0(x_0, y_0)$ (即 $|PP_0| = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \rightarrow 0$) 过程中，对应的函数值无限接近于一个确定的常数 A ，那么就说 A 是函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 时的极限。

定义：“ $\varepsilon - \delta$ ” 语言

设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D ， $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的聚点。如果存在常数 A ，对于任意给定的正数 ε ，总存在正数 δ ，使得当点 $P(x, y) \in D \cap \ddot{U}(P_0, \delta)$ 时，都有

$$|f(P) - A| = |f(x, y) - A| < \varepsilon \quad (1.5)$$

成立，那么就称常数 A 为函数 $f(x, y)$ 当 $(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)$ 的极限，记作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \quad (1.6)$$

或

$$f(P) \rightarrow A (P \rightarrow P_0) \quad (1.7)$$

注意：

1. P_0 是 D 的聚点；
2. 证明过程中，核心在于寻找 $\delta = \delta(\varepsilon)$ ；
3. 与一元函数不同， $P \rightarrow P_0$ 是指 P 以任何方式趋近 P_0 ；
4. 若 P 以不同方式趋近于 P_0 ， $f(p)$ 趋近于不同值，则可以断定 $f(p)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限不存在。

1.4 多元函数的连续性

1.4.1 连续性的定义

设二元函数 $f(P) = f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点, 且 $P_0 \in D$, 如果

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0) \quad (1.8)$$

那么称 $f(P)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 连续。

注意: 若 $f(x, y)$ 在 D 的每一个点都是连续的, 则称 $f(x, y)$ 在 D 为连续的。

1.4.2 间断点的定义

设二元函数 $f(x, y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点, 如果函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点不连续, 那么就称 $P_0(x_0, y_0)$ 为函数 $f(x, y)$ 的间断点。

1.4.3 连续函数的运算

一元函数中关于极限的运算法则, 对于多元函数仍然适用。根据多元函数的极限运算法则, 可以证明多元连续函数的和、差、积仍为连续函数, 连续函数的商在分母不为零时仍连续; 多元连续函数的复合函数仍然是连续函数。

1.4.4 多元初等函数

与一元初等函数相类似, 多元初等函数是指可用一个式子表示的多元函数, 这个式子是由常数及具有不同自变量的一元基本初等函数经过有限次的四则运算和复合运算而得到的。例如 $\frac{x+x^2+y^2}{1+y^2}$ 、 $\sin(x+y)$ 、 $e^{x^2+y^2+z^2}$ 等都是多元初等函数。

1.4.5 有界闭区域上多元函数连续函数的性质

1. (有界性与最大值最小值定理) 有界闭区域 D 上连续的多元函数, 必定在 D 上有上界, 且能取得它的最大值和最小值。

也就是说, 若 P 在有界闭区域 D 上连续, 则必定存在常数 $M > 0$, 使得对一切 $P \in D$ 有 $|f(P)| \leq M$; 且存在 $P_1, P_2 \in D$, 使得

$$f(P_1) = \max\{f(P) \mid P \in D\}, f(P_2) = \min\{f(P) \mid P \in D\}$$

2. (介值定理) 在有界闭区域 D 上连续的多元函数必取得介于最大值和最小值之间的任何值。

3. (一致连续性定理) 在有界闭区域 D 上连续的多元函数必定在 D 上一致连续。

也就是说, 若 $f(P)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则对任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于 D 上任意两点 P_1, P_2 , 只要当 $|P_1 - P_2| < \delta$ 时, 都有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon$$

成立。

1.5 例题

1.5.1 Problem 1

设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}$, 求证

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = 0$$

Solution

$f(x, y)$ 的定义域为 $D = \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, 点 $O(0, 0)$ 为 D 的聚点。

$$\text{而 } |f(x, y) - 0| = |f(x, y)| = \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \right| \leq x^2 + y^2$$

对 $\forall \varepsilon > 0$ 要使 $|f(x, y) - 0| \leq x^2 + y^2 < \varepsilon$ 成立, 取 $\delta = \sqrt{\varepsilon}$, 则 $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, 有 $|f(x, y) - 0| < \varepsilon$ 。

于是

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = 0$$

1.5.2 Problem 2

求证函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限不存在。

Solution

显然, 当 $P(x, y)$ 沿 x 轴趋近于点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=0}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0;$$

当 $P(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋近于点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=kx}} \frac{xy}{x^2 + y^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2x^2} = \frac{k}{1 + k^2},$$

显然它是随着 k 的值的不同而改变的。

所以原函数当 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 时的极限不存在。

1.5.3 Problem 3

求

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{x}$$

Solution

$$\begin{aligned}\text{原式} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot y \\ &= \lim_{xy \rightarrow 0} \frac{\sin(xy)}{xy} \cdot \lim_{y \rightarrow 2} y \\ &= 1 \times 2 \\ &= 2\end{aligned}$$

2 偏导数

2.1 偏导数的定义及其算法

2.1.1 定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内有定义, 当 y 固定在 y_0 而 x 在 x_0 处有增量 Δx 时, 相应的函数有增量

$$f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)$$

如果

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (2.1)$$

存在, 那么称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数, 记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, z_x \Big|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \text{ 或 } f_x(x_0, y_0). \quad (1)$$

例如, 方程2.1可以表为

$$f_x(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x} \quad (2.2)$$

类似地, 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 y 的偏导数定义为

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y} \quad (2.3)$$

记作

$$\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}, z_y|_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}} \text{ 或 } f_y(x_0, y_0)$$

如果函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内每一点 (x, y) 处对 x 的偏导数都存在, 那么这个偏导数就是 x, y 的函数, 它就称为函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 x 的偏导函数, 记作

$$\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, z_x \text{ 或 } f_x(x, y)$$

类似地, 可以定义函数 $z = f(x, y)$ 对自变量 y 的偏导函数, 记作

$$\frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y}, z_y \text{ 或 } f_y(x, y)$$

由概念可知, 函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处对 x 的偏导数 $f_x(x_0, y_0)$ 显然就是偏导函数 $f_x(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的函数值; $f_y(x_0, y_0)$ 就是偏导函数 $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的函数值。

2.1.2 偏导数的求法

求 $\frac{\partial f}{\partial x}$ 时, 只要把 y 暂时看作常量而对 x 求导数; 求 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 时, 只要把 x 暂时看作常量而对 y 求导数。

推广: 三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 (x, y, z) 处对 x 的偏导数定义为


$$f_x(x, y, z) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y, z) - f(x, y, z)}{\Delta x} \quad (2.4)$$

注意:

1. $z = f(x, y)$ 的偏导数有2个: $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$, $u = f(x, y, z)$ 的偏导数有3个: $\frac{\partial u}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial u}{\partial y}$ 、 $\frac{\partial u}{\partial z}$;
2. $\frac{\partial z}{\partial x}$ 是一个整体、一个符号。

2.1.3 偏导数的几何意义

设 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 为曲面 $z = f(x, y)$ 上的一点, 过 M_0 作平面 $y = y_0$, 截此曲面得一曲线, 此曲线在平面 $y = y_0$ 上的方程为 $z = f(x, y_0)$, 则导数 $\left. \frac{d}{dx} f(x, y_0) \right|_{x=x_0}$, 即偏导数 $f_x(x_0, y_0)$, 就是这曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率 (如右图所示)。同样, 偏导数 $f_y(x_0, y_0)$ 的几何意义是曲面被平面 $x = x_0$ 所截得的曲线在点 M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率。



注意:

对多元函数, 若函数连续, 则偏导数不一定存在; 若偏导数存在, 则函数也不一定连续。例如, 函数

$$z = f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处是不连续的, 而 $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = 0$, 即函数在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在。

2.2 高阶偏导数

设函数 $z = f(x, y)$ 在区域 D 内具有偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x(x, y), \quad \frac{\partial z}{\partial y} = f_y(x, y)$$

于是在 D 内 $f_x(x, y)$, $f_y(x, y)$ 都是 x, y 的函数。如果这两个函数的偏导数也存在, 那么称它们是函数 $z = f(x, y)$ 的**二阶偏导数**。按照对变量求导次序的不同有下列四个二阶偏导数:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = f_{xx}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = f_{yx}(x, y) \\ \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) &= \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f_{yy}(x, y) \end{aligned} \tag{2.5}$$

其中第二、三个偏导数称为**混合偏导数**。同样可得三阶、四阶……以及 n 阶偏导数。二阶以及二阶以上的偏导数统称为**高阶偏导数**。

定理 如果函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数相等, 即 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 在区域 D 内连续, 那么在该区域这两个二阶混合偏导数必相等。

换句话说, 二阶混合偏导数在连续的条件下与求导的次序无关。推广: 高阶混合偏导数在偏导数连续的条件下也与求导的次序无关。

2.3 例题

2.3.1 Problem 1

证明函数 $u = \frac{1}{r}$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

其中 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。

Solution

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^2} \cdot \frac{x}{r} = -\frac{x}{r^3},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x}{r^4} \cdot \frac{\partial r}{\partial x} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3x^2}{r^5}$$

因为函数关于自变量的对称性，所以

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5}, \quad \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}.$$

因此，

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3r^2}{r^5} = 0$$

注：例中的方程叫做拉普拉斯 (Laplace) 方程，它是数学物理方法中的一种很重要的方程。

3 全微分

实质：寻找多元函数增量的一种线性近似表达。(局部)

3.1 全微分的定义

3.1.1 偏增量、偏微分

由偏导数的定义知道，二元函数对某个自变量的偏导数表示当另一个自变量固定时，因变量相对于该自变最的变化率。根据一元函数微分学中增量与微分的关系，可得

$$f(x + \Delta x, y) - f(x, y) \approx f_x(x, y) \Delta x$$

$$f(x, y + \Delta y) - f(x, y) \approx f_y(x, y) \Delta y$$

上面两式的左端分别叫做二元函数对 x 和对 y 的偏增量，而右端分别叫做二元函数对 x 和对 y 的偏微分。

3.1.2 全增量

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 的某邻域内有定义， $P'(x + \Delta x, y + \Delta y)$ 为这邻域内任意一点，则称这两点的函数值之差 $f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$ 为函数在点点 P 对应于自变量增量 Δx 和 Δy 的全增量，记作 Δz ，即

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y) \quad (3.1)$$

3.1.3 全微分的定义

设函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的某邻域内有定义, 如果函数在点 (x, y) 的全增量

$$\Delta z = f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)$$

可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\rho) \quad (3.2)$$

其中 A 和 B 不依赖于 Δx 和 Δy 而仅与 x 和 y 有关, $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, 那么称函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分, 记作 dz , 即

$$dz = A\Delta x + B\Delta y$$

如果函数在区域 D 内各点处都可微分, 那么称函数在 D 内可微分。

如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么这函数在该点必定连续。

3.1.4 例题

若已知如果函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - 3x + 4y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$$

问: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否可微? 若可微, 求

$$df|_{(0,0)}$$

Solution

由题意

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - 3x + 4y] = 0$$

所以

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0$$

又函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, 由上式得

$$f(0, 0) = 0$$

由原式

$$f(x, y) - 3x + 4y = o(\rho)$$

即

$$f(x, y) - f(0, 0) = 3x - 4y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

亦即

$$f(\Delta x, \Delta y) - f(0, 0) = 3\Delta x - 4\Delta y + o(\rho), \quad \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$$

由定义, 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且

$$df|_{(0,0)} = 3\Delta x - 4\Delta y$$

3.2 可微分的条件

定理1 (必要条件): 如果函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 可微分, 那么函数在点 (x, y) 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 必定存在, 且函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x, y) 的全微分为

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial z}{\partial y} \Delta y \quad (3.3)$$

利用定义判断可微的方法:

1. 先求 $f'_x(x_0, y_0)$ 、 $f'_y(x_0, y_0)$, 若不存在, 则不可微;
2. 判断

$$\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - f'_x(x_0, y_0) \Delta x - f'_y(x_0, y_0) \Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

是否成立。其中,

$$\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$$

若成立, 则可微; 反之, 则不可微。

注意: 与一元函数不同, 各偏导数的存在只是全微分存在的必要条件而不是充分条件。

定理2 (充分条件): 如果函数 $z = f(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x, y) 连续, 那么函数在该点可微分。

偏导连续, 即

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f'_x(x, y) = f'_x(x_0, y_0)$$

(f'_x 在点 (x_0, y_0) 处连续)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f'_y(x, y) = f'_y(x_0, y_0)$$

(f'_y 在点 (x_0, y_0) 处连续)

3.3 全微分公式

$$dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \quad (3.4)$$

特别地,

$$dz|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) \cdot dx + f'_y(x_0, y_0) \cdot dy \quad (3.5)$$

推广:

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz \quad (3.6)$$


4 多元复合函数求导法则

4.1 中间变量为一元函数情形

定理1: 如果函数 $u = \varphi(t)$ 及 $v = \psi(t)$ 都在点 t 可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f[\varphi(t), \psi(t)]$ 在点 t 可导, 且有

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt} \quad (4.1)$$

复合关系图:



证

由于 $z = f(x, y)$ 在 (u, v) 可微, 故

$$\Delta z = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \Delta u + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \Delta v + o(\rho), \rho = \sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}$$

上式两端同时除以 Δt :

$$\begin{aligned}\frac{\Delta z}{\Delta t} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta t} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} + \frac{o(\rho)}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial t} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta t} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} + \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \frac{\sqrt{(\Delta u)^2 + (\Delta v)^2}}{\Delta t} \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta t} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\Delta v}{\Delta t} + \frac{o(\rho)}{\rho} \cdot \sqrt{\left(\frac{\Delta u}{\Delta t}\right)^2 + \left(\frac{\Delta v}{\Delta t}\right)^2}\end{aligned}$$

由于 u, v 是可导的, 故二者连续, 从而:

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0, \Delta v \rightarrow 0$;

从而也有 $\rho \rightarrow 0$, 于是 $\frac{o(\rho)}{\rho} \rightarrow 0$.

令 $\Delta t \rightarrow 0$, 得全导数

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dt} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dt}.$$

证毕。

推广: 若 $z = f[\varphi(t), \psi(t), \omega(t)]$, 则全导数

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du}{dt} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dt} + \frac{\partial f}{\partial w} \cdot \frac{dw}{dt} \quad (4.2)$$

4.2 中间变量为多元函数情形

定理2: 如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 及 $v = \psi(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y)]$ 在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \quad (4.3)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \quad (4.4)$$

类似地, 设 $u = \varphi(x, y)$ 、 $v = \psi(x, y)$ 、 $w = \omega(x, y)$ 都在点 (x, y) 具有对 x 及对 y 的偏导数, 函数 $f(u, v, w)$ 在对应点 (u, v, w) 具有连续偏导数, 则复合函数

$$z = f[\varphi(x, y), \psi(x, y), \omega(x, y)]$$

在点 (x, y) 的两个偏导数都存在, 且可用下列公式计算:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x} \quad (4.5)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y} \quad (4.6)$$

4.3 混合情形

定理3: 如果函数 $u = \varphi(x, y)$ 在点 (x, y) 具有 x 对 y 的偏导数, 函数 $v = \psi(y)$ 在 y 点可导, 函数 $z = f(u, v)$ 在对应点 (u, v) 具有连续偏导数, 那么复合函数 $z = f[\varphi(x, y), \psi(y)]$ 在点 (x, y) 都存在, 且有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} \quad (4.7)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dy} \quad (4.8)$$

其他情形, 如函数 $z = f(u, v, x)$, $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(y)$, 即 $z = f[\varphi(x, y), \psi(y), x]$, 则

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot 0 + \frac{\partial f}{\partial x} \cdot 1 \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial x} \end{aligned} \quad (4.9)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv}{dy} \quad (4.10)$$

4.4 抽象复合函数求偏导

为了写法和计算上的方便, 引入记号 (若有函数 $z = f(u, v)$):

$$\begin{cases} f'_u \rightarrow f'_1, & f'_v \rightarrow f'_2 \\ f''_{uu} \rightarrow f''_{11}, & f''_{uv} \rightarrow f''_{12} \\ \dots \end{cases}$$

4.5 全微分的形式不变性

设函数 $z = f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $u = \varphi(x, y)$, $v = \psi(x, y)$, 则有全微分

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \\ &= \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} \right) dx + \left(\frac{\partial z}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dy \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial z}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \\ &= \frac{\partial z}{\partial u} du + \frac{\partial z}{\partial v} dv \end{aligned} \quad (4.11)$$

可见, 无论 u 和 v 是自变量还是中间变量, 函数 $z = f(u, v)$ 的全微分形式是一样的。这个性质叫做全微分的形式不变性。

5 隐函数的求导公式

5.1 隐函数的类型

5.1.1 一个方程的情形

二元方程：

$$F(x, y) = 0 \implies y = y(x) \text{ 或 } x = x(y)$$

三元方程：

$$F(x, y, z) = 0 \implies z = z(x, y) \text{ 或 } y = y(x, z) \text{ 或 } x = x(y, z)$$

5.1.2 方程组的情形

三元方程组：

$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = x(y) \\ z = z(y) \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x = x(z) \\ y = y(z) \end{cases}$$

四元方程组：

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} u = U(x, y) \\ v = V(x, y) \end{cases} \dots$$

统一：

$$\text{总变量个数} - \text{方程个数 (约束)} = \text{自变量个数}$$

5.2 一个方程的情形

5.2.1 定理

隐函数存在定理1： 设函数 $F(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数，且 $F(x_0, y_0) = 0$ ， $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ ，则方程 $F(x, y) = 0$ 在点 (x_0, y_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续导数的函数 $y = f(x)$ ，它满足条件 $y_0 = f(x_0)$ ，并有

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (5.1)$$

(交叉对应添负号)

该定理要求的三个条件：

1. 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数；
2. $F(x_0, y_0) = 0$ ；

3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$ ($F_y \neq 0 \Rightarrow y = y(x)$, 相应地, $F_x \neq 0 \Rightarrow x = x(y)$)。

就方程5.1作如下推导:

$$\begin{array}{c}
 F(x, y) = 0 \implies y = y(x) \\
 \downarrow \text{关于 } x \text{ 求导} \\
 F_x \cdot 1 + F_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \\
 \downarrow \text{从中解出 } \frac{dy}{dx} \\
 \frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} \quad (F_y \neq 0)
 \end{array}$$

隐函数的高阶导数:

$\frac{dy}{dx}$ 再对 x 求导数时, y 不能当作常数, 应作为 x 的函数 $y = y(x)$ 对待。

隐函数存在定理2 (三元方程): 设函数 $F(x, y, z)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数, 且 $F(x_0, y_0, z_0) = 0$, $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则方程 $F(x, y, z) = 0$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一个连续且具有连续偏导数的函数 $z = f(x, y)$, 它满足条件 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 并有

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} \quad (5.2)$$

(交叉对应添负号)

该定理要求的三个条件:

1. 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数;
2. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$;
3. $F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$ ($F_z \neq 0 \Rightarrow z = z(x, y)$, 相应地, $F_x \neq 0 \Rightarrow x = x(y, z)$ 、 $F_y \neq 0 \Rightarrow y = y(z, x)$)。

就方程5.2作如下推导:

$$\begin{array}{c}
 F(x, y, z) = 0 \implies z = z(x, y) \\
 \downarrow \text{关于 } x \text{ 求导} \\
 F_x \cdot 1 + F_y \cdot 0 + F_z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \\
 \downarrow \text{从中解出 } \frac{\partial z}{\partial x} \\
 \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} \quad (F_z \neq 0)
 \end{array}$$

求 $F(x, y, z) = 0$ 所确定的函数 z 的偏导数的方法:

1. 方程直接关于 x 或 y 求偏导 (z 看作 x, y 的函数), 解出 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ (复合函数求导法);
2. 公式法: 求出 F_x, F_y, F_z 代入公式。

5.2.2 例题

例1

验证方程 $x^2 + y^2 - 1 = 0$ 在点 $(0, 1)$ 的某一邻域内恒能唯一确定一个有连续的导数, 当 $x = 0, y = 1$ 时的隐函数 $y = f(x)$, 并求这函数的一阶与二阶导数在 $x = 0$ 的值。

Solution

记 $F(x, y) = x^2 + y^2 - 1$,

1. 显然 $F(x, y)$ 处处连续且具有偏导数;
2. $F(0, 1) = 0$;
3. $F_y = 2y$, 所以 $F_y(0, 1) = 2 \neq 0$ 。

利用隐函数存在定理1, 满足条件的隐函数 $y = f(x)$ 存在。
由

$$F_x = 2x, F_y = 2y$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{x}{y}, \quad \frac{dy}{dx} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = 0; \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y - x\left(-\frac{x}{y}\right)}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{1}{y^3}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{x=0} &= -1.\end{aligned}$$

例2

设 $z = z(x, y)$ 由 $F(x - z, y + z) = 0$ 确定, F 可微, 求证

$$\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = 1$$

Solution

记 $G(x, y, z) = F(x - z, y + z)$, 则

$$\begin{aligned}G_x &= F'_1 \cdot (1 - 0) + F'_2 \cdot 0 = F'_1; \\G_y &= F'_1 \cdot 0 + F'_2 \cdot (1 + 0) = F'_2; \\G_z &= F'_1 \cdot (0 - 1) + F'_2 \cdot (0 + 1) = F'_2 - F'_1;\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{G_x}{G_z} = -\frac{F'_1}{F'_2 - F'_1} = \frac{F'_1}{F'_1 - F'_2} \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{G_y}{G_z} = -\frac{F'_2}{F'_2 - F'_1} = \frac{F'_2}{F'_1 - F'_2}\end{aligned}$$

代入原式:

$$\text{左边} = \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F'_1 - F'_2}{F'_1 - F'_2} = 1 = \text{右边}$$

证毕。

5.3 方程组的情形

5.3.1 定理

隐函数存在定理3: 设函数 $F(x, y, u, v)$ 、 $G(x, y, u, v)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有对各个变量的连续偏导数, 又 $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, $G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$, 且偏导数所组成的函数行列式 (或称雅可比(Jacobi)式)

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 处不为零, 则方程组 $F(x, y, u, v)$ 、 $G(x, y, u, v)$ 在点 (x_0, y_0, u_0, v_0) 的某一邻域内恒能唯一确定一组连续且具有连续偏导数的函数 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$, 它们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0)$, $v_0 = v(x_0, y_0)$, 并有

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \\
 \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \\
 \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \\
 \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{1}{J} \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}.
 \end{aligned} \tag{5.3}$$

该定理要求的三个条件：

1. 在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 的某一邻域内具有连续偏导数；
2. $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0, G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$ ；
3. 函数行列式（或称雅可比(Jacobi)式）

$$J = \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 处不为零

5.3.2 例题

例1

求由 $\begin{cases} x + y + z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1 \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{dx}{dz}$ 、 $\frac{dy}{dz}$ 。

Solution

方程组对 z 求导

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} + 1 = 0 \\ 2x \frac{dx}{dz} + 2y \frac{dy}{dz} + 2z = 0 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} \frac{dx}{dz} + \frac{dy}{dz} = -1 \\ 2x \frac{dx}{dz} + 2y \frac{dy}{dz} = -2z \end{cases}$$

当雅可比行列式

$$J = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \end{vmatrix} = 2(y - x) \neq 0$$

时, 有

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dz} &= \frac{\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -2z & 2y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \end{vmatrix}} = \frac{2(z - y)}{2(y - x)} = \frac{z - y}{y - x} \\ \frac{dy}{dz} &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2x & -2z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2x & 2y \end{vmatrix}} = \frac{2(x - z)}{2(y - x)} = \frac{x - z}{y - x} \end{aligned}$$

例1

求由 $\begin{cases} x = e^u + u \sin v \\ y = e^u - u \cos v \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 。

Solution

原方程组两边求微分, 得

$$\begin{cases} dx = (e^u + \sin v) du + u \cos v dv \\ dy = (e^u - \cos v) du + u \sin v dv \end{cases}$$

当雅可比行列式

$$\begin{vmatrix} e^u + \sin v & u \cos v \\ e^u - \cos v & u \sin v \end{vmatrix} = ue^u(\sin v - \cos v) + u \neq 0$$

时, 有

$$dv = \frac{u \sin v dx - u \cos v dy}{ue^u(\sin v - \cos v) + u} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1} dx + \frac{-\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1} dy$$

$$\begin{aligned} dv &= \frac{(e^u + \sin v) dy - (e^u - \cos v) dx}{ue^u(\sin v - \cos v) + u} \\ &= \frac{e^u + \sin v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u} dy + \frac{\cos v - e^u}{ue^u(\sin v - \cos v) + u} dx \end{aligned}$$

所以

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\sin v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{-\cos v}{e^u(\sin v - \cos v) + 1}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\cos v - e^u}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{e^u + \sin v}{ue^u(\sin v - \cos v) + u}$$

例3

求由 $\begin{cases} 2xu + y^2v = 0, \\ yu + 3xv = 1, \end{cases}$ 所确定的函数的导数 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$ 。

Solution

方程组 $\begin{cases} 2xu + y^2v = 0, \\ yu + 3xv = 1, \end{cases}$ 两边关于 x 求偏导并整理得

$$\begin{cases} 2x \frac{\partial u}{\partial x} + y^2 \frac{\partial v}{\partial x} = -2u \\ y \frac{\partial u}{\partial x} + 3x \frac{\partial v}{\partial x} = -3v \end{cases}$$

当 $\begin{vmatrix} 2x & y^2 \\ y & 3x \end{vmatrix} = 6x^2 - y^3 \neq 0$ 时, 由隐函数求导公式即得

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{3y^2v - 6xu}{6x^2 - y^3}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{2yu - 6xv}{6x^2 - y^3}$$

类似可求得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{y^2u - 6xyu}{6x^2 - y^3}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2y^2v - 2xu}{6x^2 - y^3}.$$

6 多元函数微分学应用

6.1 向量值函数及其导数

由空间解析几何知道，空间曲线 Γ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t), \\ z = \omega(t), \end{cases} \quad t \in [\alpha, \beta]. \quad (6.1)$$

方程6.1也可以写成向量形式。若记

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}, \quad \vec{f}(t) = \varphi(t)\vec{i} + \psi(t)\vec{j} + \omega(t)\vec{k}$$

则方程6.1就成为向量方程

$$\vec{r} = \vec{f}(t), \quad t \in [\alpha, \beta] \quad (6.2)$$


定义1: 设数集 $D \subset \mathbf{R}$ ，则称映射 $\vec{f}: D \rightarrow \mathbf{R}^n$ 为一元向量值函数，通常记为

$$\vec{r} = \vec{f}(t), \quad t \in D \quad (6.3)$$

其中数集 D 称为函数的定义域， t 称为自变量， \vec{r} 称为因变量。

1. 一元向量值函数（向量值函数）与普通实值函数（数量函数）的关系：一元向量值函数是对普通一元函数的推广。现在，自变量 t 依然取实数值，但因变量 \vec{r} 不取实数值，而取值为 n 维向量。
2. 向量值函数的图形：

$$\begin{aligned} \vec{r} = \vec{f}(t) &= f_1(t)\vec{i} + f_2(t)\vec{j} + f_3(t)\vec{k} \\ &= (f_1(t), f_2(t), f_3(t)) \end{aligned}$$



若 $\vec{r} = \overrightarrow{OM}$ ，则 M 的轨迹（记作 Γ ）称为向量值函数 $\vec{r} = \vec{f}(t)$ 的终端曲线，曲线 Γ 也称为向量值函数 $\vec{r} = \vec{f}(t)$ 的图形。