

FRUTILLAS VF 2024-25

Última actualización: 30 septiembre de 2024

CREADO POR

P Meneses

CULTIVO

Frutillas

PAÍSES DESTINO

Australia

x

Canadá

x

Corea

x

Japón

x

USA

x

Momento	Objetivos	Producto	Ingrediente activo	Dosis	Unidad	Carencia (Días)	Mojamiento (Lts/há)
Fecha sugerida: 01 junio de 2024- 01 agosto de 2024 Estado fenológico: Receso Invernal	FUNGICIDA	ó METALAXIL 25 DP	METALAXILO25 % p/p	100	cc/Ha	60	600
		ó ALIETTE 80% WP	FOSETILO-ALUMINIO80 % p/p	50	gr/100L	60	
		ó DEFENSE 80 WP	FOSETILO-ALUMINIO80 % p/p	250	gr/100L	60	
	Reingreso: 12 Horas						
Fecha sugerida: 01 junio de 2024- 31 agosto de 2024 Estado fenológico: Receso Invernal	PLAGAS	ó DIAZINON 600 EC	DIAZINÓN60% p/v	350	cc/100L	50	600
		ó DIAZINON 40 WP	DIAZINÓN40% p/p	350	gr/100L	50	
		ó DIAZOL 40 WP	DIAZINÓN40 % p/p	350	gr/100L	50	
	Reingreso: 12 Horas						
		ó TRIPP	BIFENTRINA10 % p/v	60	cc/100L	50	
		ó BIFENTRIN 100 EC	BIFENTRINA10 % p/v	75	cc/100L	50	
Fecha sugerida: 19 agosto de 2024- 30 agosto de 2024 Estado fenológico: Inicio Brotación	PLAGAS	ó ACTARA 25 WG	TIAMETOXAM25 % p/p	60	gr/100L	18	1.000
		ó MAJESTIC	TIAMETOXAM25% p/p	60	gr/100L	18	
		ó IMIDACLOPRID 70% WP	IMIDACLOPRID70 % P/P	30	gr/100L	18	
		ó PUNTO 70 WP	IMIDACLOPRID70 % p/p	30	gr/100L	18	
		ó ABSOLUTO 35% SC	IMIDACLOPRID35% p/v	30	cc/100L	18	
	Reingreso: 6 Horas						
Observaciones: INICIO DE CONTROL DE INSECTOS, APORVECHAR MOMENTO DE PRIMAVERA IDEALMENTE HACER 2 APLICACIONES DE 2 INGREDIENTES ACTIVOS DISTINTOS							
Fecha sugerida: 19 agosto de 2024- 31 agosto de 2024 Estado fenológico: Inicio Brotación	ENFERMEDAD	ó CAPTAN 80 WP	CAPTÁN80 % p/p	200	gr/100L	35	800
		ó CAPTAN 83 WP	CAPTÁN83 % p/p	200	gr/100L	35	
		ó ORTHOCIDE	CAPTÁN80 % p/p	200	gr/100L	35	
		ó METALAXIL 25 DP	METALAXILO25 % p/p	100	gr/100L	35	
Reingreso: 12 Horas							
Observaciones: Observaciones: 1. Alternar siempre principios activos a fin de evitar desarrollo de resistencia. 2. Idealmente aplicar en condiciones sin viento y verificar correcto mojamiento del cultivo.							
Fecha sugerida: 01 septiembre de 2024- 15 septiembre de 2024 Estado fenológico: Inicio Brotación	ARAÑITA	ó ABAMAX 1,8% EC	ABAMECTINA1,8 % p/v	100	cc/100L	10	1.000
		ó ABAMECTIN 18 EC	ABAMECTINA1,8 % p/v	100	cc/100L	10	
		ó ABAMITE	ABAMECTINA1,8 % p/v	100	cc/100L	10	
		ó FAST 1.8 EC	ABAMECTINA1,8 % p/v	100	cc/100L	10	
		ó VERTIMEC 018 EC	ABAMECTINA1,8 % p/v	100	cc/100L	10	
		ó KANEMITE 15 SC	ACEQUINOCILO15,6% p/v	60	cc/100L	10	
		ó SANMITE WP	PIRIDABENO20 % p/p	75	gr/100L	10	
Reingreso: 12 Horas							
Observaciones: PRIMERA APLICACION PREVENTIVA DE ARAÑITA. APLICAR CON ALTO MOJAMIENTO, ASEGURARSE DE QUE SE MOJE TODA LA PLANTA							
Fecha sugerida: 16 septiembre de 2024- 30 septiembre de 2024	BOTRITIS	ó ROVRAL 50% WP	IPRODIONA50 % p/p	100	gr/100L	15	
		ó RUKON 50 WP	IPRODIONA50 % p/p	100	gr/100L	15	
		ó TERCEL 50 WP	IPRODIONA50% p/p	100	gr/100L	15	