
Klausur
Mathematik I - Theoretische Grundlagen der Informatik

HWR Berlin, Wintersemester 2022/2023

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger

Aufgabe 1 (Mengenoperationen)

(4 Punkte)

Gegeben seien die Mengen $A = \{1, 2, 3, 4\}$ und $B = \{1, 2, a, b\}$.

- (i) Bestimmen Sie $A \cap B$.
- (ii) Bestimmen Sie $A \cup B$.
- (iii) Bestimmen Sie $A \setminus B$.
- (iv) Bestimmen Sie $\mathcal{P}(A \cap B)$

Aufgabe 2 (Überlegungen mit Mengen)

(2 Punkte)

Finden Sie Gegenbeispiele für Mengen A, B, C zu folgenden Aussagen:

- (i) $A \cup B \subseteq A \cap B$
- (ii) $A \subseteq B \cup C \Rightarrow A \subseteq B \vee A \subseteq C$

Aufgabe 3 (Mengenbeweis)

(2 Punkte)

Seien M, N Mengen. Zeigen Sie, dass folgendes gilt:

$$\mathcal{P}(M) \cup \mathcal{P}(N) \subseteq \mathcal{P}(M \cup N)$$

Aufgabe 4 (Relationen)

(14 Punkte)

Gegeben seien die Relation $R \subseteq M \times M$ und $S \subseteq M \times M$ mit $M = \{1, 2, 3, 4\}$,

$R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 3), (3, 2), (4, 3)\}$ und $S = \{(1, 2), (2, 2), (1, 4)\}$.

- (i) Stellen Sie R und S als Adjazenzmatrix und Graph dar.
- (ii) Sind R oder S Ordnungen? Begründen Sie Ihre Entscheidung.
- (iii) Berechnen Sie $R \circ S$ und stellen Sie das Ergebnis als Adjazenzmatrix und Graph dar.
(Hinweis zur Erinnerung: Es ist $R \circ S = \{(x, y) \in M \times M \mid \exists z \in M : (x, z) \in R \wedge (z, y) \in S\}$)
- (iv) Wir bezeichnen im Folgenden $T = R \circ S$ (T als Abkürzung von $R \circ S$). Berechnen Sie $T \circ T$ und stellen Sie diese Relation als Adjazenzmatrix und Graph dar.
- (v) Sei $Id = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$ die Relation, die jedes Element von M mit sich selbst in Beziehung setzt. Geben Sie die Adjazenzmatrix und den Graph der Relation $O = Id \cup T \cup T \circ T$ an.
- (vi) Begründen Sie, dass O eine Ordnung ist.

(vii) Stellen Sie O als Hasse-Diagramm dar.

(viii) Als kleinstes Element bzgl. einer Ordnung $O \subseteq M \times M$ bezeichnet man ein Element k , so dass $\forall x \in M : (k, x) \in O$. Gibt es ein kleinstes Element in O ?

(ix) Als minimales Element bzgl. einer Ordnung $O \subseteq M \times M$ bezeichnet man ein Element m , so dass $\forall x \in M : (x, m) \in O \Rightarrow x = m$. Gibt es minimale Elemente in O ?

Aufgabe 5 (Relationen und Eigenschaften)

(5 Punkte)

Entscheiden Sie für jede Aussage, ob sie zutrifft, begründen Sie Ihre Entscheidung und geben Sie ggf. ein Beispiel an.

Es gibt eine Relation $R \subseteq M \times M$ über einer Menge M , die

(i) reflexiv und irreflexiv ist

(Hinweis zur Erinnerung: R ist reflexiv, wenn $\forall x \in M : (x, x) \in R$, irreflexiv, wenn $\forall x \in M : (x, x) \notin R$)

(ii) weder reflexiv noch irreflexiv ist

(iii) symmetrisch und antisymmetrisch ist

(Hinweis zur Erinnerung: R ist symmetrisch, wenn $\forall x, y \in M : (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$, antisymmetrisch, wenn $\forall x, y \in M : (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y$)

(iv) antisymmetrisch und irreflexiv ist

(v) symmetrisch und antisymmetrisch ist.

Aufgabe 6 (Beweis mit Relationen)

(4 Punkte)

Sei $R \subseteq M \times M$ auf einer Menge M . Zeigen Sie

$$R \text{ transitiv} \Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$$

Aufgabe 7 (Funktionen)

(2 Punkte)

Geben Sie für die folgenden Funktionen an, ob sie injektiv oder surjektiv sind und begründen Sie Ihre Entscheidung.

(Hinweis zur Erinnerung:

$f : M \rightarrow N$ ist injektiv, wenn $\forall x, y \in M : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$ und surjektiv, wenn $\forall y \in N \exists x \in M : y = f(x)$)

(i) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto |x|$

(ii) $f : \emptyset \rightarrow \{0\}$