

植物地理学名词解释 2020 级

1. **生物圈**：地球上所有生物及其生活领域的总和。
2. **种**：生物分类的基本单位，包括若干起源于共同祖先，形态和生物学极为相似的个体。
3. **物种**：是生物界发展的连续性与间断性统一的基本间断形式，在有性生物物种呈现为统一的繁殖群体，由占有一定空间，具有实际或潜在繁殖能力的种群所构成，而且和其他这样的物种在生殖上是隔离的。
4. **发育**：指有机体或局部从发生到成熟的过程。对植物个体而言，可以理解为种子萌发到开花结果到死亡的生命周期。（2019）
5. **繁殖**：植物发育到一定时期通过旧个体增殖产生新个体来延续种族的现象。
6. **环境**：生物有机体或生物群体所在空间内一切事物和要素的总和。（2019）
7. **生境**：一定时间内对生命有机体生活、生长、发育、繁殖以及对有机体存在数量有影响的空间条件的总和，不仅包括了对生命有机体有影响的自然条件，也包括了生物体种内和种间的相互影响。
8. **生态因子**：环境中对植物生长、发育、生殖、行为和分布有直接或间接影响的环境因子，如光照、温度、水分、营养等。
9. **环境胁迫**：当环境中某种生存条件出现异常变化，便会抑制生命活动或威胁植物生存，这种现象称之为环境胁迫。
10. **干扰**：动物啃食、寄生、风、火、土壤侵蚀等部分或全部地破坏植物的现象。
11. **适应**：产生改善生存条件和生殖效率的可遗传的进化性变异，包括形态、生理和发育等方面的性能特征。表现型适应：随外界环境的改变而改变；基因型改变：不随环境改变，以基因形式固定。（2019）
12. **植物内稳定**：植物控制小环境（包括微生物环境和内环境），使其保持相对稳定的机制，能减少植物对外界环境的依赖性，提高对外界环境的适应力。
13. **驯化**：是植物适应生存范围的上、下限发生移动，并形成一个新的最适点。
14. **谢氏耐性定律**：一种生物能够存在与繁殖，依赖于综合环境因子的存在，只要其中一项因子的质或量不足或过多，超过了某种生物的耐性限度，则使该物种不能生存，甚至灭绝。（2016、2018）

15. **生态幅**：描述生态因子适应范围的大小。
16. **生态类群**：在相似的生态环境条件下，经过相似的自然选择和进化，对某一项生态因子形成相似的可遗传的适应特性(包括形态、结构、生理和生长发育等)，从而具有相似的需求性和耐性范围，这样一群植物组合，称为生态类群。(2016)
17. **趋同适应**：亲缘关系相当疏远的不同类生物，由于长期生活在相同或相似环境中，通过变异和选择，形成相同或相似的适应特征和适应方式的现象。
18. **趋异适应**：同一种生物的个体在不同环境条件下长期生活，形成了不同的适应特征和适应方式的现象。
19. **生态型**：分布广泛的同种植物来说，长期生活在分布区不同生境中，发生基因型分化，形成对各自生境的不同适应特征，称为不同的生态型。
20. **生态差型**：如果同种分布区内不同生境特征连续变化，同种内不同生态型的适应特征也可能呈现连续变化的现象。
21. **光补偿点**：光合作用与呼吸作用达到平衡时的光照强度。
22. **补偿深度**：光合作用与呼吸作用达到平衡时的水的深度。(2016)
23. **热补偿点**：光合作用与呼吸作用达到平衡时的温度。
24. **黄化现象**：当植物长期处于缺乏光照的条件下，植物不仅不能形成新的叶绿素，还会使已有的叶绿素逐渐消失，植物体变成黄白色的现象。
植物必须在一定的光照条件下才能形成叶绿素，在黑暗条件下则能形成胡萝卜素，导致叶子发黄，称为黄化现象。
25. **光周期**：植物长期生活在具有一定光照长短变化格局的环境中，借助自然选择和进化，形成了各类植物所特有的对日照长短变化的反应方式。
26. **物候**：植物长期生活在一定季节性变温条件下，植物以此出现发芽、生根、长苗、现蕾、开花、结实、落叶等，与季节的变化相适应的现象。
27. **春化作用**：植物在某个发育阶段需要低温的刺激才能从生长转为发育，这种需要在一定时间内受到低温刺激才能开花结果的阶段称为春化。
28. **吸胀作用**：亲水凝胶吸附水分子并使其膨胀的过程。
29. **离子拮抗作用**：一种离子的毒害作用因其他离子的加入而减轻或消失的现象。
(2016、2019)
30. **替代种**：一个属内关系亲近的若干个种，特征相似而具有各自独立的分布区

(或稍交叉), 在空间上依次排开。(2016、2018、2019)

31. 生物入侵: 生物由原生地经过自然或人为途径侵入另一个新环境, 对当地生态系统和人类健康造成损害或生态灾难的过程和现象。(2016、2018)

32. 植被图: 又称地植物学图, 是以反映植物群落为主要对象的专题地图。(2016、2019)

33. 隐域性(非地带性) 植被: (2016、2018、2019)

草甸和沼泽分布在不同的气候地带, 而不能形成独立的地带, 被称为隐域分布的(泛地带性) 植被类型。(书)

分布在各个气候带内与气候没有必然联系, 而与土壤等其他因素有关的植被。(资料)

指在一定的气候带或大气候区内, 因受地下水、地表水、地貌部位或地表组成物质等非地带性因素影响而生长发育的植被类型。(百度百科)

34. 显域性(地带性) 植被: 分布在一定气候带内, 能反映气候带特征的植被。

35. 层片: 属于某一生活型的植物有相当的数量, 在群落中占据一定的空间, 所形成的特定结构。(2018)

36. 植物群落: 任何地段内, 具有相同的植物种类组成和空间结构、各植物之间以及植物与环境之间都存在相互作用的植物组合。(2018)

37. 边缘效应: 交错区中可能同时既包含两个交错分布群落中的一些种类, 也包括交错区中特有的种类。群落交错区种的数目及一些种的密度增大的趋势被称为边缘效应。(2018、2019)

38. 能量分配原则: 任何生物作出任何一种策略都意味着能量的合理分配, 并通过这种能量使用协调来促进自身的有效生存和繁殖。

39. 冷湖效应: 由于冷空气比重较大, 当冷空气团入侵, 在其控制下常出现晴冷天气。此时, 空气中湿度很低, 由于夜间地表长波辐射使大量热量向太空散失, 形成的冷空气沉积于地表之上, 与湖水相似, 称之为“冷湖效应”。一旦出现冷湖效应, 该地上空则出现逆温层。

40. 植物生活型: 根据植物对生态因素综合影响而形成的形态结构与外貌适应特征来划分植物类群, 称为生活型。

41. 生态位: 将种群的生存条件总和称为生态位。

42. 植物区系：植物区系是某一地区，或某一时期，某一分类群，某种植被等所含有的植物种类的总称。

43. 分布区：是一个种系或任何分类单位在地表分布的区域。

44. 种群：植物种内的个体常分成若干群，每个群成片地分布在某个地段内，及各群在空间上互有间断，称为种群。是同一时期内一定空间中同种生物个体的集合。

45. 成对种：异域分化的亲缘很近的两个种所呈现的地理隔离

46. 群丛：是植物群落分类的基本单位，是在主要种类组成上相同、外貌结构上一致，并与环境构成一定相互关系的一些植物群落的联合。(2019)

47. 群系：凡是建群种或共建种相同的植物群落联合为群系，是最重要的中级分类单位。

48. 植被型：把建群种生活型相同或近似，同时对水热条件生态关系一致的植物群落联合为植被型，最重要的高级分类单位。

49. 群落最小面积：基本上能够表现出群落类型植物种类的最小面积。即包含了群落大多数种类数，并能体现群落特征的最小空间。(2019)

50. 基部盖度：又称纯盖度，是指植物基部实际占的面积。

51. 植物群落的波动：在短期或周期性的气温或水分变动的影响下，植物群落出现逐年或年际的变化。

52. 演替：在某个地段上一个植物群落被另一个植物群落代替的过程。

53. 演替顶级（顶级群落）：演替到一定程度后出现的一个相对稳定的状态。

54. 有效积温法则：植物各个发育期实际上需要满足一定的有效积温后才能进入下一阶段的发育期。

55. 变水植物：本身没有保持体内水分平衡的内稳态机制，故体内水分随外界水分变化而变化，称为耐旱植物。

56. 恒水植物：植物体内有保持体内水分平衡的内稳态机制，绝大多数管束植物具有一定的调节和保持含水量的能力，体内水分不受外界环境影响。

57. 特有种：除极少量世界种外，各种植物的分布都限于某一地区范围内，称为该区的特有种。

58. 分布中心：种数最丰富的地区称为该属的分布中心。

59. 生长：发育中量的变化，表现在数量和大小的不可逆变化。(2016)

60. CO₂ 补偿点：光合作用与呼吸作用达到平衡时的 CO₂ 浓度。(2018)