

HammingDistance

ณ ดินแดนพันธุกรรมอันไกลโพ้น นักชีววิทยาสองคน อลิซและบ๊อบ กำลังศึกษาความแตกต่างของสาย DNA ของสิ่งมีชีวิตลึกลับที่เพิ่งค้นพบ พวกเขาพบว่าการวัด "ระยะห่างแฮมมิง" (Hamming distance) ระหว่างสาย DNA สองสายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำความเข้าใจความหลากหลายทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตนี้

อลิซและบ๊อบต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการเขียนโปรแกรมที่จะคำนวณระยะห่างแฮมมิงระหว่างสาย DNA สองสายที่พวกเขามี โปรแกรมของคุณจะต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจัดการกับสาย DNA ที่มีความยาวสูงสุด 1,000 คู่เบส

Input

อินพุตประกอบด้วยสาย DNA สองสาย s และ t แต่ละสายอยู่ในบรรทัดของตัวเอง สาย DNA ทั้งสองมีความยาวเท่ากันและประกอบด้วยตัวอักษร A, C, G, และ T เท่านั้น

Output

เอาต์พุตเป็นจำนวนเต็มที่แสดงถึงระยะห่างแฮมมิงระหว่างสาย DNA สองสาย

Input	Output
GAGCCTACTAACGGGAT CATCGTAATGACGGCCT	7

ข้อกำหนด

- Time limit: 100 ms
- Memory limit: 16 MB