

0.1 环与域

定义 0.1 (环)

若在非空集合 R 中定义了加法和乘法两种二元运算, 并满足下列条件:

- (1) R 对加法为 Abel 群;
- (2) R 对乘法为半群;
- (3) 加法与乘法间有分配律, 即 $\forall a, b, c \in R$,

$$a(b+c) = ab+ac, \quad (b+c)a = ba+ca,$$

则称 R 是一个环.

命题 0.1

一切数域都是环.

证明

□

例题 0.1

- (1) \mathbf{Z} 对加法与乘法是环, 称为整数环.
- (2) 数域 P 上的 n 元多项式集合 $P[x_1, x_2, \dots, x_n]$ 对多项式的加法和乘法是环, 称为 P 上的 n 元多项式环.
- (3) $R^{n \times n}$ 表示以环 R 中元素为矩阵元的 n 阶方阵的集合, 即 $\alpha \in R^{n \times n}$ 可写成

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in R.$$

记 $a_{ij} = \text{ent}_{ij}(\alpha)$. 由下面的两个关系:

$$(i) \text{ent}_{ij}(\alpha + \beta) = \text{ent}_{ij}(\alpha) + \text{ent}_{ij}(\beta);$$

$$(ii) \text{ent}_{ij}(\alpha\beta) = \sum_{k=1}^n \text{ent}_{ik}(\alpha)\text{ent}_{kj}(\beta)$$

定义的 $R^{n \times n}$ 加法与乘法使其成为一个环, 称为 R 上的 n 阶方阵环.

- (4) 设 $C([a, b])$ 是闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数的集合, 它对函数的加法与乘法是一个环, 称为 $[a, b]$ 上的连续函数环.
- (5) 设 A 是一个 Abel 群, A 的运算是加法. 在 A 中定义乘法运算为 $ab = 0 (\forall a, b \in A)$, 则 A 为一环, 这种环称为零环.

注 (5) 说明, 任何 Abel 群均可作为零环的加法群, 但是并非所有 Abel 群都可成为非零环的加法群.

证明

□

定理 0.1 (环的基本性质)

- (1) 在环 R 中可定义任何整数的倍数及正整数次乘幂, 并且满足

$$(i) \forall m, n \in \mathbf{Z}, a, b \in R,$$

$$(m+n)a = ma + na,$$

$$(mn)a = m(na),$$

$$m(a+b) = ma + mb;$$

(ii) $a^m \cdot a^n = a^{m+n}, (a^m)^n = a^{mn}, \forall m, n \in \mathbf{N}, a \in R$;

(iii) 若 $a, b \in R$ 且 $ab = ba$, 则 $(ab)^m = a^m b^m, \forall m \in \mathbf{N}$.

(2) 由分配律成立有

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m a_i b_j.$$

(3) $\forall a, b \in R$ 有 $a0 = 0a = 0, (-a)b = a(-b) = -ab, (-a)(-b) = ab$.



证明

(1)

(2)

(3) 事实上, 由 $a \cdot 0 + ab = a(0 + b) = ab$ 知 $a \cdot 0 = 0$. 同样 $0 \cdot a = 0, a(-b) = a(-b) + ab + (-ab) = -ab$. 最后 $(-a)(-b) = -(a(-b)) = -(-ab) = ab$.

□

定义 0.2

1. **交换环**: 乘法是交换半群的环.
2. **幺环**: 乘法是幺半群的环, 通常记幺元为 1.
3. **交换幺环**: 乘法是交换幺半群的环.
4. **无零因子环**: 任意两个非零元的积不为零的环.
5. 设 R 是环. $a, b \in R$ 且 $a \neq 0, b \neq 0$. 若 $ab = 0$, 则称 a 是 R 的一个**左零因子**, b 是 R 的一个**右零因子**, 都简称为**零因子**. 有时为方便也将 0 称为零因子.
6. **整环**: 无零因子的幺环.
7. **体**: 非零元素集合对乘法构成群的环.
8. **域**: 交换的体, 即非零元素集合对乘法为 Abel 群的环.



注 当 $n > 1$ 时, R 上的 n 阶方阵环 $R^{n \times n}$ 就不是无零因子环.

显然, 一切数域 P 都是域, 因而也是体.

命题 0.2

- (1) 环 R 为整环的充要条件是 R 的非零元素集合 $R^* = R \setminus \{0\}$ 是乘法幺半群 R 的子幺半群.
- (2) 若 R 是交换整环, 则 $R^* = R \setminus \{0\}$ 对乘法构成交换幺半群且消去律成立, 即

$$ax = bx \text{ (或 } xa = xb), \text{ 则 } a = b, \forall a, b, x \in R^*$$



证明

(1)

(2) 因为 R 是交换整环且 $R^* \subseteq R$, 所以 R 对乘法构成交换幺半群. 设 $a, b, x \in R^*$ 且 $ax = bx$, 则 $(a - b)x = 0$. 由于 R 是整环且 $x \neq 0$, 故 $a - b = 0$, 即 $a = b$. $xa = xb$ 的情况同理可证.

□

例题 0.2 设 p 是一个素数. 于是 \mathbf{Z} 中关系 $a \equiv b \pmod{p}$ 对加法及乘法都是同余关系, 因而在 $\mathbf{Z}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 中有加法运算, 使 \mathbf{Z}_p 为 Abel 群, 而且在 \mathbf{Z}_p 中有乘法运算, 使 \mathbf{Z}_p 为交换幺半群. $\mathbf{Z}_p = \{0, 1, \dots, p-1\}$. 又 $\forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \mathbf{Z}_p$ 有

$$\overline{a(\bar{b} + \bar{c})} = \overline{a(b + c)} = \overline{ab + ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \overline{ab} + \overline{ac},$$

即分配律成立. 故 \mathbf{Z}_p 是交换幺环. 又对 $a \in \mathbf{N}, a < p$, 由 p 为素数知有 $m, n \in \mathbf{Z}$, 使 $ma + np = 1$, 因而 $\bar{m} \cdot \bar{a} = \bar{1}$, 即 \mathbf{Z}_p 中每个非零元素可逆, 因而 \mathbf{Z}_p 是只含 p 个元素的域且非数域.

证明

□

定理 0.2

设 \mathbf{C} 为复数域, 考虑 $\mathbf{C}^{2 \times 2}$ 中子集

$$H = \left\{ \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \mid \alpha, \beta \in \mathbf{C} \right\}.$$

证明 H 是体, 称 H 为 \mathbf{R} 上的四元数体.



证明 容易验证 H 对矩阵的加法为 Abel 群. 又对 $\forall \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbf{C}$ 有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \gamma & \delta \\ -\bar{\delta} & \bar{\gamma} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha\gamma - \beta\bar{\delta} & \alpha\delta + \beta\bar{\gamma} \\ -\bar{\alpha}\bar{\delta} - \bar{\beta}\gamma & \bar{\alpha}\bar{\gamma} - \bar{\beta}\delta \end{pmatrix} \in H,$$

故 H 对矩阵乘法为么半群. 显然加法与乘法间有分配律, 故 H 为么环. 又若

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix} \neq 0,$$

则

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{vmatrix} = \alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta} > 0.$$

此时有

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}^{-1} = (\alpha\bar{\alpha} + \beta\bar{\beta})^{-1} \begin{pmatrix} \bar{\alpha} & -\beta \\ \bar{\beta} & \alpha \end{pmatrix} \in H,$$

即 $H^* = H \setminus \{0\}$ 为群, 因而 H 是体. 又 H 中有元素

$$A = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由 $AB \neq BA$, 故 H 不是域.

□

命题 0.3

设 \mathbf{H} 为四元数体, 令

$$\mathbf{1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{i} = \begin{pmatrix} \sqrt{-1} & 0 \\ 0 & -\sqrt{-1} \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{j} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{k} = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{-1} \\ \sqrt{-1} & 0 \end{pmatrix}.$$

则

$$\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k}, \quad \mathbf{i} \cdot \mathbf{k} = -\mathbf{j},$$

$$\mathbf{j} \cdot \mathbf{i} = -\mathbf{k}, \quad \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{i},$$

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j}, \quad \mathbf{k} \cdot \mathbf{j} = -\mathbf{i},$$

$$\mathbf{1}^2 = \mathbf{1}, \quad \mathbf{i}^2 = \mathbf{j}^2 = \mathbf{k}^2 = -\mathbf{1},$$

$$\mathbf{1} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{i} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{i}, \quad \mathbf{1} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{j}, \quad \mathbf{1} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{k}.$$

并且有下面结论:

(1) $\forall \alpha \in \mathbf{H}$, 存在唯一的一组 $(a, b, c, d) \in \mathbf{R}^{1 \times 4}$, 使得 $\alpha = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}$. 进而

$$\mathbf{H} = \{a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} \mid a, b, c, d \in \mathbf{R}\}.$$

(2) \mathbf{H} 的变换 σ :

$$\sigma(a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}) = a\mathbf{1} - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}$$

是 \mathbf{H} 的一个对合.



注 我们一般省略不写 $\mathbf{1}$, 即将 $a\mathbf{1}$ 简写成 a .

证明

(1) 根据 **定理 0.2**, $\alpha \in \mathbf{H}$ 有 $a, b, c, d \in \mathbf{R}$, 使得

$$\alpha = \begin{pmatrix} a + b\sqrt{-1} & c + d\sqrt{-1} \\ -c + d\sqrt{-1} & a - b\sqrt{-1} \end{pmatrix} = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k}.$$

由

$$\begin{pmatrix} a + b\sqrt{-1} & c + d\sqrt{-1} \\ -c + d\sqrt{-1} & a - b\sqrt{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 + b_1\sqrt{-1} & c_1 + d_1\sqrt{-1} \\ -c_1 + d_1\sqrt{-1} & a_1 - b_1\sqrt{-1} \end{pmatrix},$$

知当且仅当 $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c, d_1 = d$ 结论 (1) 成立.

(2) 再设 $\beta = a_1\mathbf{1} + b_1\mathbf{i} + c_1\mathbf{j} + d_1\mathbf{k}, a_1, b_1, c_1, d_1 \in \mathbf{R}$, 则

$$\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta), \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbf{H}.$$

$$\begin{aligned} \sigma(\alpha\beta) &= \sigma((a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k})(a_1\mathbf{1} + b_1\mathbf{i} + c_1\mathbf{j} + d_1\mathbf{k})) \\ &= \sigma((aa_1 - bb_1 - cc_1 - dd_1)\mathbf{1} + (ab_1 + ba_1 + cd_1 - dc_1)\mathbf{i} + (ac_1 + ca_1 + db_1 - bd_1)\mathbf{j} + (ad_1 + da_1 + bc_1 - cb_1)\mathbf{k}) \\ &= (aa_1 - bb_1 - cc_1 - dd_1)\mathbf{1} - (ab_1 + ba_1 + cd_1 - dc_1)\mathbf{i} - (ac_1 + ca_1 + db_1 - bd_1)\mathbf{j} - (ad_1 + da_1 + bc_1 - cb_1)\mathbf{k} \\ &= (a_1\mathbf{1} - b_1\mathbf{i} - c_1\mathbf{j} - d_1\mathbf{k})(a\mathbf{1} - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}) = \sigma(\beta)\sigma(\alpha). \end{aligned}$$

因此 σ 是 \mathbf{H} 的反自同构. 又因

$$\sigma^2(\alpha) = \sigma(a\mathbf{1} - b\mathbf{i} - c\mathbf{j} - d\mathbf{k}) = a\mathbf{1} + b\mathbf{i} + c\mathbf{j} + d\mathbf{k} = \alpha,$$

故 σ 是对合.



定义 0.3

若环 R 的非空子集 R_1 对 R 的加法与乘法也构成环, 则称 R_1 为 R 的**子环**. 若 R_1 还满足 $RR_1 \subseteq R_1$ (或 $R_1R \subseteq R_1$), 则称 R_1 为 R 的**左理想** (或**右理想**). 若环 R 的非空子集 I 既是左理想又是右理想, 也即 $RR_1R \subseteq R_1$, 则称 I 为 R 的**双边理想**, 简称**理想**.



注 $\{0\}$ 与 R 都是 R 的理想, 称为**平凡理想**. 在交换环中, 左理想、右理想与理想这三个概念是一致的.

定理 0.3

- (1) 一个环中任意多个理想之交还是理想.
- (2) 若 A 是环 R 的理想, B 是环 R 的子环且 $B \supseteq A$, 则 A 也是环 B 的理想.
- (3) 若 A 是环 R 的非空子集, 则所有包含 A 的理想之交仍是一个包含 A 的理想, 称为**由 A 生成的理想**, 记为 $\langle A \rangle$.



证明

- (1)
- (2)
- (3)



定义 0.4

设 R 是一个环, 对于 $a \in R$, 我们定义 $\langle a \rangle = \langle \{a\} \rangle$ 为由 a 生成的主理想.

对于 $a_1, \dots, a_n \in R$, 我们定义

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = \langle \{a_1, \dots, a_n\} \rangle.$$

为由 a_1, a_2, \dots, a_n 有限生成的理想. 一般地, 若一个理想能被有限个元素生成, 我们就称其为有限生成的理想.

定理 0.4

(1) 若 R 是么环, $a, a_1, a_2, \dots, a_n \in R$, 则

$$\langle a \rangle = RaR \triangleq \left\{ \sum_{i=1}^m x_i a y_i \mid m \in \mathbf{N}, x_i, y_i \in R \right\},$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1R + \dots + Ra_nR = \left\{ \sum_{i=1}^n s_i \mid s_i \in Ra_iR \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \mid m_i \in \mathbf{N}, x_{ij}, y_{ij} \in R \right\}.$$

进而有 $\langle 1 \rangle = R$. 若还有 I 是 R 的理想且 $a_1, a_2, \dots, a_n \in I$, 则 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \subseteq I$.

(2) 若 R 是交换么环, $a, a_1, a_2, \dots, a_n \in R$, 则

$$\langle a \rangle = aR = Ra = \{xa \mid x \in R\} = \{ax \mid x \in R\},$$

$$\langle a_1, \dots, a_n \rangle = Ra_1 + \dots + Ra_n = a_1R + \dots + a_nR = \left\{ \sum_{i=1}^n r_i a_i \mid r_i \in R \right\} = \left\{ \sum_{i=1}^n a_i r_i \mid r_i \in R \right\}.$$

进而有 $\langle 1 \rangle = R$. 若还有 I 是 R 的理想且 $a_1, a_2, \dots, a_n \in I$, 则 $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \subseteq I$.

证明

(1) 只须证明第二个等式. 设 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij}, \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} a_i s_{ij} \in Ra_1R + \dots + Ra_nR$, 记 $x_{i, m_1+j} = -r_{ij}, y_{i, m_1+j} = s_{ij} (i=1, 2, \dots, n; j=1, 2, \dots, m_2)$, 则

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_2} r_{ij} a_i s_{ij} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} + \sum_{j=1}^{m_2} (-r_{ij}) a_i s_{ij} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} + \sum_{j=1}^{m_2} x_{i, m_1+j} a_i y_{i, m_1+j} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1+m_2} x_{ij} a_i y_{ij} \in Ra_1R + \dots + Ra_nR. \end{aligned}$$

故 $Ra_1R + \dots + Ra_nR$ 对加法构成 R 的子群. 又因为 R 对加法构成 Abel 群, 所以 $Ra_1R + \dots + Ra_nR$ 也对加法构成 Abel 群.

注意到

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} \right) \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^{m_2} r_{kl} a_k s_{kl} \right)$$

的每一项都形如 $(x_{ij} a_i y_{ij} r_{kl}) a_k s_{kl} \in Ra_kR$, 故

$$\left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_1} x_{ij} a_i y_{ij} \right) \left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^{m_2} r_{kl} a_k s_{kl} \right) \in Ra_1R + \dots + Ra_nR.$$

因为 R 对乘法满足结合律, 所以 $Ra_1R + \dots + Ra_nR$ 对乘法也满足结合律. 故 $Ra_1R + \dots + Ra_nR$ 对乘法构成半群. 因此 $Ra_1R + \dots + Ra_nR$ 是 R 的子环.

对 $\forall r \in R$, 都有

$$\begin{aligned} r \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \right) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} (r x_{ij}) a_i y_{ij} \in Ra_1 R + \cdots + Ra_n R, \\ \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i y_{ij} \right) r &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{m_i} x_{ij} a_i (y_{ij} r) \in Ra_1 R + \cdots + Ra_n R, \end{aligned}$$

故 $R(Ra_1 R + \cdots + Ra_n R) \subseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R, (Ra_1 R + \cdots + Ra_n R)R \subseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$, 因此 $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$ 是 R 的理想, 且显然有 $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \supseteq \{a_1, a_2, \cdots, a_n\}$. 故 $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \supseteq \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$.

又设 I 也是 R 的理想且包含 a_1, \cdots, a_n , 则由理想的定义和加法的封闭性知

$$I \supseteq Ra_1 R + \cdots + Ra_n R.$$

故 $Ra_1 R + \cdots + Ra_n R \subseteq \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$. 综上可得 $\langle a_1, \cdots, a_n \rangle = Ra_1 R + \cdots + Ra_n R$.

(2) 只须证明第二个等式. 设 $r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n, s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n (r_i, s_i \in R)$, 我们有

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n) - (s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = (r_1 - s_1) a_1 + \cdots + (r_n - s_n) a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

因此 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 对加法构成子群. 又因为 R 对加法构成 Abel 群, 所以 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 对加法构成 Abel 群.

注意到

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)(s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = \left(\sum_{i=1}^n r_i a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n s_j a_j \right)$$

的每一项都形如 $(r_i a_i s_j) a_j \in Ra_j$. 因此

$$(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)(s_1 a_1 + \cdots + s_n a_n) = \left(\sum_{i=1}^n r_i a_i \right) \left(\sum_{j=1}^n s_j a_j \right) \in Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

又因为 R 对乘法满足结合律, 所以 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 对乘法也满足结合律. 故 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 对乘法构成半群. 因此 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 是 R 的子环.

对 $\forall r \in R$, 由 R 是交换幺环可得

$$r(r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n) = (r_1 a_1 + \cdots + r_n a_n)r = rr_1 a_1 + \cdots + rr_n a_n \in Ra_1 + \cdots + Ra_n,$$

故 $R(Ra_1 + \cdots + Ra_n) \subseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n, (Ra_1 + \cdots + Ra_n)R \subseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n$. 因此 $Ra_1 + \cdots + Ra_n$ 是个理想, 而且显然包含 a_1, \cdots, a_n . 故 $Ra_1 + \cdots + Ra_n \supseteq \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$.

设 I 是一个包含了 a_1, \cdots, a_n 的理想, 那么根据理想的定义和加法的封闭性, 有

$$I \supseteq Ra_1 + \cdots + Ra_n.$$

故 $Ra_1 + \cdots + Ra_n \subseteq \langle a_1, \cdots, a_n \rangle$. 综上可得 $\langle a_1, \cdots, a_n \rangle = Ra_1 + \cdots + Ra_n$.

□

定理 0.5

设 I 为环 R 的子环. 在 R 中定义关系 “ \sim ”,

$$a \sim b, \quad a + (-b) = a - b \in I,$$

则关系 “ \sim ” 对加法为同余关系. a 所在的等价类为 $a + I$. 关系 “ \sim ” 对乘法也为同余关系的充分必要条件是 I 为 R 的理想.

若 I 为理想, 则将 R 对等价关系 I 的商集合记为 $R/\sim = R/I$, 并且 $R/\sim = R/I$ 中可定义加法、乘法为

$$(a + I) + (b + I) = (a + b) + I, \quad \forall a, b \in R, \quad (1)$$

$$(a + I) \cdot (b + I) = ab + I, \quad \forall a, b \in R. \quad (2)$$

R/I 对这种加法与乘法也构成环, 称为 R 对 I 的商环.



证明 因 R 对加法为 Abel 群, 故 R 的加法子群 I 为正规子群. 由定理?? 知 “ \sim ” 对 R 的加法为同余关系, 再由命题?? 知在 R/I 中有加法运算 (1) 且为 Abel 群.

现设 “ \sim ” 对乘法也是同余关系. 对 $\forall a \in I, b \in R$ 有 $a \sim 0, b \sim b$, 因而 $ab \sim 0, ba \sim 0$, 故 $ab, ba \in I$, 因而 I 为 R 的理想.

反之, 设 I 是 R 的理想, $a, b, c, d \in R$ 且 $a \sim b, c \sim d$, 即 $a - b, c - d \in I$. 此时有 $ac - bd = ac - ad + ad - bd = a(c - d) + (a - b)d \in I$, 即 $ac \sim bd$, 故 “ \sim ” 对乘法也是同余关系.

当 I 为理想时, 在 R/I 中可定义乘法如式 (2) 且对 $\forall a, b, c \in R$ 有

$$\begin{aligned} ((a+I)(b+I))(c+I) &= (ab+I)(c+I) = (ab)c+I = a(bc)+I \\ &= (a+I)((b+I)(c+I)), \end{aligned}$$

并且

$$\begin{aligned} ((a+I)+(b+I))(c+I) &= ((a+b)+I)(c+I) \\ &= (a+b)c+I = (ac+bc)+I = (ac+I)+(bc+I) \\ &= (a+I)(c+I)+(b+I)(c+I). \end{aligned}$$

类似有

$$(a+I)((b+I)+(c+I)) = (a+I)(b+I) + (a+I)(c+I),$$

即 R/I 为半群, 且对加法乘法的分配律成立. 故 R/I 是一个环.

□

推论 0.1

若 R 为交换环, 则 R/I 也是交换环.



证明

□

推论 0.2

若 R 为幺环, 则 R/I 也是幺环且 $1+I$ 为幺元.



证明

□

例题 0.3 从定理 0.5 知 $m\mathbf{Z}$ 为 \mathbf{Z} 的理想, 故 $\mathbf{Z}_m = \mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 对剩余类 $(\text{mod } m)$ 的加法与乘法是一个环.

当 p 为素数时, \mathbf{Z}_p 为域.

若 m 是合数, 即 $m = m_1 m_2 (m_i \in \mathbf{Z}, |m_i| > 1, i = 1, 2)$, 则 \mathbf{Z}_m 有零因子 $\overline{m_1}, \overline{m_2}$.

例题 0.4 设 R 是一个环. 考虑 $R^{n \times n}$ 中子集

$$A = \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, j \neq 1 \text{ 时, } \text{col}_j \alpha = 0\},$$

$$B = \{\alpha \mid \alpha \in R^{n \times n}, i \neq 1 \text{ 时, } \text{row}_i \alpha = 0\},$$

则 A, B 分别为 $R^{n \times n}$ 的左理想与右理想. 当 $n \geq 2$ 时, 一般来说, A, B 都不是双边理想.