

0.1 伴随

定义 0.1 (伴随)

设 φ 是内积空间 V 上的线性算子, 若存在 V 上的线性算子 φ^* , 使等式


$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$$

对一切 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则称 φ^* 是 φ 的伴随算子, 简称为 φ 的伴随.

定理 0.1

设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性变换, 则存在 V 上唯一的线性变换 φ^* , 使对一切 $\alpha, \beta \in V$, 成立

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^*(\beta)).$$

 **笔记** 这个定理表明: 对有限维内积空间 V 上的任一线性算子, 它的伴随必存在且唯一.

证明 只需证明唯一性. 若 $\varphi^\#$ 是 V 上的线性变换且

$$(\varphi(\alpha), \beta) = (\alpha, \varphi^\#(\beta))$$

对一切 $\alpha, \beta \in V$ 成立, 则 $(\alpha, \varphi^\#(\beta)) = (\alpha, \varphi^*(\beta))$ 对一切 $\alpha \in V$ 成立, 即 $(\alpha, \varphi^\#(\beta) - \varphi^*(\beta)) = 0$ 对一切 $\alpha \in V$ 成立, 特别, 对 $\alpha = \varphi^\#(\beta) - \varphi^*(\beta)$ 也成立. 由内积定义即知 $\varphi^\#(\beta) - \varphi^*(\beta) = 0$, 即 $\varphi^\#(\beta) = \varphi^*(\beta)$. 而 β 是任意的, 故有 $\varphi^\# = \varphi^*$.

□

定理 0.2

设 V 是 n 维内积空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组标准正交基. 若 V 上的线性算子 φ 在这组基下的表示矩阵为 A , 则

(1) 当 V 是酉空间时, φ^* 在同一组基下的表示矩阵为 \overline{A}' , 即 A 的共轭转置;

(2) 当 V 是欧氏空间时, φ^* 的表示矩阵为 A' , 即 A 的转置.

证明 由伴随的唯一性知道本节一开始由 \overline{A}' 定义的线性变换 ψ 就是 φ 的伴随, 而 ψ 的表示矩阵就是 \overline{A}' . □

定理 0.3 (伴随算子的性质)

设 V 是有限维内积空间, 若 φ 及 ψ 是 V 上的线性变换, c 为常数, 则

$$(1) (\varphi + \psi)^* = \varphi^* + \psi^*;$$

$$(2) (c\varphi)^* = \overline{c}\varphi^*;$$

$$(3) (\varphi\psi)^* = \psi^*\varphi^*;$$

$$(4) (\varphi^*)^* = \varphi.$$

证明 由矩阵和线性变换的一一对应关系及矩阵共轭转置的性质即得. □

命题 0.1

设 V 是 n 维内积空间, φ 是 V 上的线性算子.

(1) 若 U 是 φ 的不变子空间, 则 U^\perp 是 φ^* 的不变子空间;

(2) 若 φ 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 φ^* 的全体特征值为 $\overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \dots, \overline{\lambda_n}$.

证明

(1) 任取 $\alpha \in U, \beta \in U^\perp$, 因为

$$(\alpha, \varphi^*(\beta)) = (\varphi(\alpha), \beta) = 0,$$

所以 U^\perp 是 φ^* 的不变子空间.

- (2) 取 V 的一组标准正交基, 设 φ 在这组基下的表示矩阵为 A , 则无论 V 是酉空间还是欧氏空间, φ^* 的表示矩阵总可写为 \overline{A}' . 由假设

$$|\lambda I_n - A| = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n),$$

则容易验证

$$|\lambda I_n - \overline{A}'| = (\lambda - \overline{\lambda_1})(\lambda - \overline{\lambda_2}) \cdots (\lambda - \overline{\lambda_n}),$$

故结论成立.

□