

## 0.1 全纯函数的 Laurent 展开

### 定义 0.1

称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} \quad (1)$$

为 **Laurent 级数**, 它由两部分组成, 第一部分就是幂级数, 第二部分是负幂项的级数. 如果这两个级数都收敛, 就称级数 (1) 收敛.

### 定理 0.1

如果 Laurent 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n}$$

的收敛域为圆环  $D = \{z : r < |z-z_0| < R\}$ , 那么它在  $D$  中绝对收敛且内闭一致收敛, 它的和函数在  $D$  中全纯.

上述级数的幂级数部分称为该级数的**全纯部分**, 负幂项级数部分称为该级数的**主要部分**.

**注** 下面我们将看到, Laurent 级数的一些重要性质取决于它的主要部分.

**证明** 设第一个级数的收敛半径为  $R$ . 对第二个级数作变换  $\zeta = \frac{1}{z-z_0}$ , 它对  $\zeta$  而言就是幂级数:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}(z-z_0)^{-n} = \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n}\zeta^n$$

设其收敛半径为  $\rho$ , 则当  $|\zeta| < \rho$ , 或者  $|z-z_0| > \frac{1}{\rho}$  时, 上述级数收敛. 记  $r = \frac{1}{\rho}$ , 则当  $r < |z-z_0| < \infty$  时, 级数 (1) 中的负幂项级数收敛.

如果  $R \leq r$ , 则当  $|z-z_0| < R$  时, 必有  $|z-z_0| < r$ , 这时级数 (1) 的第一个级数是收敛的, 但第二个级数却发散了. 当  $|z-z_0| > r$  时, 必有  $|z-z_0| > R$ , 这时级数 (1) 的第二个级数收敛而第一个级数发散. 所以, 两者不能同时收敛.

如果  $r < R$ , 则当  $r < |z-z_0| < R$  时, 级数 (1) 的两个级数都收敛, 而且在这个圆环中内闭一致收敛, 即级数 (1) 在上述圆环中内闭一致收敛, 根据 Weierstrass 定理, 它的和是圆环中的全纯函数.

□

### 定理 0.2

设  $D = \{z : r < |z-z_0| < R\} (0 \leq r < R \leq +\infty)$ , 如果  $f \in H(D)$ , 那么  $f$  在  $D$  上可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n, \quad z \in D, \quad (2)$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta-z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n \in \mathbb{Z},$$

而  $\gamma_\rho = \{\zeta : |\zeta-z_0| = \rho\} (r < \rho < R)$ . 并且展开式 (2) 是唯一的.

**证明** 如图 1 所示, 任意取定  $z \in D$ , 取  $r_1, r_2$ , 使得

$$r < r_1 < |z-z_0| < r_2 < R.$$

记  $\gamma_j = \{\zeta : |\zeta-z_0| = r_j\}, j = 1, 2$ . 由定理 ??, 得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta. \quad (3)$$



现在证明展开式 (2) 是唯一的. 如果另有展开式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a'_n (z - z_0)^n,$$

因为级数在  $\gamma_\rho$  上一致收敛, 逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{m+1}} d\zeta = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a'_n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_\rho} (\zeta - z_0)^{n-m-1} d\zeta \stackrel{\text{命题??}}{=} a'_m,$$

所以这个展开式就是 (2) 式.

□

**例题 0.1** 设  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ , 试分别给出这个函数在  $D_1 = \{z : 1 < |z| < 2\}$  和  $D_2 = \{z : 2 < |z| < \infty\}$  上的 Laurent 展开式.

**解** 当  $z \in D_1$  时, 由于  $1 < |z| < 2$ , 所以

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)} = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = -\frac{1}{2} \frac{1}{1 - \frac{z}{2}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} z^n - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n}.$$

当  $z \in D_2$  时, 由于  $2 < |z| < \infty$ , 所以

$$\begin{aligned} \frac{1}{(z-1)(z-2)} &= \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1 - \frac{1}{z}} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}}. \end{aligned}$$

□